








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3278/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3278/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3278/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3278/A

327<sup>8</sup>/<sub>A</sub>



72994  
IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI,  
MEDICI PARISIENSIS  
CELEBERRIMI,

De morborum internorum curatione,  
LIBER I.

*Illustratus eruditissimis LUDOVICI DVRETI rei medicae apud Parisios Regij Interpretis digniss. Aduersarijs, opera Ant. Valetij Iunianensis selectis, suisq; locis digestis.*


EIVSDEM HOLLERII.

DE { Febris. } DE { Remediis *κατά τόνους* in  
Peste. } Galeni libros.  
De materia Chirurgica. *libri iii.*

Accessit ad hanc Desiderij Iacobi Vandoperani Medici Praefatio de veterum Methodo in usum reuocanda; & his, quae in primis ad Medicinam faciendam necessaria sunt.



VENETIIS,  
*Apud Georgium Angelarium,*  
M. D. LXXI.







DESIDERII  
IACOTII  
VANDOPERANI  
MEDICI,

De ueterum Methodo in usum reuocanda, &  
his, quæ in primis ad Medicinam fa-  
ciendam necessaria sunt,  
PRAEFATIO.



QVOD plerique initio facere  
solent, ut uel eam artem, quã  
tractant & in qua uersantur,  
uel eius operis, quod in lu-  
cem editur, authorem diui-  
nis laudibus efferant: id eò  
minus nobis hoc loco faciendum putamus, quò  
& I. Hollerij in bene acta uita integritas, in do-  
ctrina industria inscribendo Hippocratica quæ-  
dam grauitas omnibus notior est, & Medicinæ  
ars pluribus commendatior, his præsertim gra-  
uissimis

a

uissimis



## P R A E F A T I O .

missimis temporibus, ut quæ sola ferè ex omnibus sophistica nescio qua in utranque partem scribendi, disputandi quæ ratione in uarias sectas, familias & disciplinas nondum penitus distracta uideatur. Idem tamen omnino illi imminere periculum, nisi Doctissimi uiri, qui ipsam regia authoritate profitentur, summa cura diligentia quæ succurrant, omnibus perspicuum est. Iam enim plerosque passim uidere licet, quos non pudeat insolenter gloriari, se Empyricos esse, alios Galenicos, nonnullos Hippocraticos, ut si quis eorum, quos non probant, mentionem fecerit, tanquam ægri nausæ molestiam quandam suscipiant. Nec desunt, qui omnia in dubium reuocare puerili quodam gloriolæ studio contendant, quòd alia ratione hominibus innotescere, & inanem quandam scientiæ persuasionem, ac uentum popularem aucupari non possint. Dissidentibus ita inter se Medicis, aliisque alios reprehendentibus sensim in animo uulgi opinio quædam de artis pulcherrimæ inconstantia radices altius agit, atque etiã propagatur ad nobiliores usque, ut iam ferè mulierculis, quàm medicis quibusdam, plerisque in locis maior adhibeatur fides. Longè itaque meo quidem iudicio cõsultius omnes fecerint, si quod temporis ponitur, cum in plurimis questionibus dialecticis & inutilibus, tum in laudanda arte omnium maximè necessaria, quasi,

ut



# P R A E F A T I O.

ut decet, tractetur, nobilitate ipsa blanda conci-  
liatricula satis est laudabilis, id ipsum sumere-  
tur ad docendum, & qua ratione in commu-  
nem Reip. usum integra seruari possit, & qua  
Methodo in maxima uitæ breuitate eius longi-  
tudo superari. Nihil enim frequentius ferè oc-  
currit, quàm ingenuos adolefcētes aut alio ani-  
mum appellere deuiis itineribus profectos; aut  
persæpe reuerti ex itinere, cū iam progressi  
essent multorum dierum uiam, aut denique ex-  
tremo confectos senio, longo usu, ancipitiq̃ue  
ægrorum curatione tandem discere, quæ diui-  
na antiquorum Methodo paucis annis comple-  
cti potuerunt. Quænam autem illa sit, aut qua-  
lis, neque tam breui exponi potest, neque si id  
fieret, facilè intelligi, aut persuaderi aliter insti-  
tutis. Ab ea enim plurimū differre nouimus,  
quæ uulgò ostentatur, & experientia ipsa edo-  
cti, & diligenti in Hippocrate, Platone, Aristo-  
tele, Galeno obseruatione, octo annorum spa-  
tio, quibus aliquādiu in hac florentissima Aca-  
demia, deinde aliis locis Philosophiam publi-  
cè professumus, adiecto etiam Hebraicæ &  
Arabicæ linguæ studio, quò nobis liceret Gen-  
tium illarum libros, quicunque a nobis cū  
alibi, tum verò maximè apud Iudæos ipsos re-  
periri potuerūt perlegere, non tam ad idioma-  
tis cognitionem, quàm rerum scientiam, ut si  
qua in re excellerent, aut reconditi aliquid ha-  
berent



## P R A E F A T I O.

berent, diligenter annotaremus. In quibus cer-  
tè omnibus inter cætera hoc quoque sumus cõ-  
sequeuti, ut uix plus fuci, solidæ scientiæ minus  
extitisse unquam putemus, quàm hoc nostro tẽ-  
pore, exceptis admodum paucis. Idque non  
quòd excellentiora ingenia nostrorum homi-  
num non sint: sed quia germanæ illius & anti-  
quæ Dialecticæ, sine qua exactè comprehendi  
nihil potest aut uia & ratione inuestigari, ue-  
ram & expressam effigiem nullam tenemus,  
umbra & imaginibus utimur. Quod opere ad  
id parato, si id ex usu Reipub. fore intellexerim-  
us, aliàs (fauciente diuino numine) sumus de-  
monstraturi. Nunc uerò rem ita habere ut di-  
cimus, facilè quiuis intelligere poterit, qui pau-  
lulum represso omni animi affectu, remotisque  
uerborum illecebris ac præstigiis, tria sibi pro-  
ponet ad contemplandum. Primum quo in sta-  
tu sint apud nos bonarum artium, ingenuarum  
que literarum studia. Deinde qui mores illo-  
rum, qui se solos natos putant ad omnia instau-  
randa & innouanda, ut præ se neminem non  
contemnāt. Postremò an ea Methodo quæ uul-  
gò circumfertur. Galenus Medicinam (de hac  
enim in primis intelligi uolumus, quæcunque  
sumus dicturi) in sectas miserè distractam, &  
penè ex urbibus explosam, in iucundissimum  
usum omnibusq; acceptissimum reuocarit, or-  
narit, auxerit, & magna ex parte inuenerit. Tū  
enim

*Dialecticæ ne-  
cessitas*

*1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>*



## P R A E F A T I O.

enim ex hac quasi quadam comparatione perspicuum fiet, quo cupidius illustrandis nostris alia uia, quàm deceat, incumbimus, eò maiorem nos confusionem inducere. Quod in nullius reprehensionem dictum accipi uelim, sed quasi in communi concilio in medium prolatum ad deliberandum, ut siquid a nobis ad communem studiosorum omnium utilitatem afferri uideatur, id non sit contemptui.

Nunquid enim, quæso, ut quod primū fuit, paucis attingam, iam in nobis ipsi sentimus res humanas ita habere, ut literis quidem maximè illustrentur, sed ita illustrari, ut quantò lux maior a literis affulsit, tantò maiores tenebras in rebus dignoscamus, & dum in utranque partem sine Methodo ueroque iudicandi instrumento de omnibus differimus, ad Socratē propius accedamus, qui quantò plura nouerat, tantò liberius profitebatur se nihil aliud scire, quàm quòd nihil sciret? Id liceat Socrati in quæstionibus de rebus in naturæ maiestate abditis, aut ad animi salutem uitamque parum conferentibus. In foro certè, cùm de crimine capitali agitur: in Medicina, cùm de morte ægri: in Theologia, cùm de salute animi, si Iuri speritus Medicus, aut Theologus idem profiteatur quis ferat? Quòd si certam exactamque aliquam regulam iudicandæ ueritatis habemus, cur non profertur & omnibus communicatur? Cur huc

a 4      atque



# P R A E F A T I O.

atq; illuc dialectica disputatione traductæ sententię sapius desinunt in *ἰσχυρὸς*? Habere autem nos aliquam præter Dialecticam, passim Plato, Aristoteles & Galenus scripsere ut docebimus. Sed dum, ea neglecta aut ignorata, Academicorū more uariè disputādo, unicuiq; optio & potestas relinquitur liberè iudicandi quod uelit, gloriola, aut utilitate aliqua, aut perturbatione illaqueatus animus, aut ignoratione obcæcatus, pro eo, quod semel amplexus est, tanquam pro aris & focus pugnat: in subsidiū Dialecticam, Rhetoricam, Grammaticam, & sapius Sophisticam garrulitatem accersit, aut, si ne istis quidem sat potens est ad dimicandum, ad iniurias, insidias, uerbera, arma sese applicat, adeo ut quod Dyogenes Laertius scribit, Nihil tam stultum esse, & ridiculum, quod non ab aliquo Philosophorum affirmatum fuerit, sic nihil tam impium & a ueritate alienum sit, quod non hac præclara disputandi & ornatè loquendi methodo sustineri posse speremus. Sic iam audacter quasi manu armata incursionem atque impetum facimus in leges, artes, sciētias omnes, ut nulla iam sit, in qua hæc ars uestigia non posuerit, horribilemque stragem ediderit. Sola hæcenus à reliquarum numero segregata fuerat Medicina. An nū occultè iam & sensim in ea quasi actis cuniculis, modò pfringit quedam à ueteribus rectè constituta, modò irrepit in



## P R A E F A T I O.

in sensus multorum, qui seipfos disputationum  
mutuis iniuriis ornatarum laqueis irretitos te-  
nent? Eas artes adhiberi in rebus grauioribus  
ueteres omnes prohibuere, Hebraei, Graeci, A-  
reopagitæ, Protagoræ libros Athenienses, quod  
publicè de diis & dialecticè disputaret, palàm  
lata sententia igni cremarunt, eumque tãquam  
Sophistã & Dialecticum Reip. philosophicæ-  
que ueritati inutilem suis finibus expulerunt.  
Galenus Academicorum, Peripateticorum, Pla-  
tonicorum, Stoicorum logicis disputationibus  
& præceptis, quæ adhuc nostris excellentiora  
fuisse demonstrare possum, se penè Pyrrhoniũ  
factum scribit, & in omnibus rebus hæsitantẽ,  
nisi bona quadam fortuna ac diuiniore ingenio  
certiorem multoque constantiorem Methodũ  
inuenisset. Ergo, inquires, has artes uel ad ora-  
tionis cultum & ornatum, uel ad rationis soler-  
tiam atque iudicium inuestigatas, & æternis li-  
terarum monumentis relictas, explodi & labe-  
factari uis? Minimè uerò: imò retineri, amplifi-  
ri, ornari, & in usum pristinum reuocari. Age  
enim, quæso, Num rectè dubitatum est ab Anti-  
quis, utrum eloquẽtia generi humano plus pro-  
fuisset, an nocuisset? Num sæpe conqueruntur,  
eloquentiam a natura ad salutem hominum &  
ad cõseruationem datam, ad bonorum pestem  
perniciemque conuertij? Quomodo tanta quæ-  
stio explicata est & definita? Nimirum si suis fi-  
nibus



## P R A E F A T I O.

nibus septa teneretur: si altiore ratione tãquam  
freño iniecto coerceretur: si non tanquam do  
mina, sed ministra, quæ diuiniore methodo in  
uenta essent & rectè cõstituta, populariter pet  
suaderet. Popularis enim (ait Cicero) est illa fa  
cultas, & effectus eloquentiæ est audientium  
approbatio. Eloqui copiosè, modò prudenter  
(ait alio loco) melius eum, quàm uel acutissi  
mè sine eloquentia cogitare. Rursus. Et tamen  
(inquit) a Philosopho, si eloquentiam afferat,  
non asperner: si non afferat, nō admodum de  
siderem. Dialecticæ quoque usum Aristoteles  
tribus aut quatuor terminis, tanquam cancel  
lis, circumscripsit ac definiuit. Valete enim ad  
commune colloquium, exercenda adolescen  
tium ingenia, & ad Methodum diuiniorem ac  
certiorem uiam parare. Vbinam, quæso, illa est  
Methodus præter Dialecticam, aut ubi doce  
tur, aut quotusquisque est, qui ea in scribendo  
utatur? Inane quoddam Demonstrationis no  
men, & Apodicticæ scientiæ in Scholis sæpius  
auditur, cuius splendidissimo titulo infinita so  
phismata integuntur. Sæpe uideas multos ini  
tio Apodicticè magno apparatu dicere ingres  
sos, tertio quoq; uerbo in Dialecticā captiun  
culam, & sæpius sophisticam incidere: audito  
rem uel lectorem, cui simile iudicandi instru  
mentum deest, mirari: circumscriptum ac dece  
ptum, cùm eam dissoluere non possit, descisce  
re



## P R A E F A T I O .

re a ueritate, sæpeque pro opinione inde concepta arma capere. An hoc docere est, an potius concitare discordiam, tantumque incendium, ut sæpe illi ipsi, qui accenderunt, ad id restringendum frustra conentur accedere? Decebat profectò, ut scribit Galenus, prius docere nos, quænam esset illa methodus, sine qua per eloquentiam & Dialecticam tot incommoda inuehantur: deinde in ea multum diuque exercitatos, cæteris uti. Hoc enim si fiat, Dialecticis, Rhetoricisque artibus nihil utilius, nihil iucundius, nihil magis necessarium puto. Alioqui, in grauioribus scientiis docendis, describendis, inueniendis, in medendo, iudicando de capite, informando animo ad salutem, nō iam de communi colloquio agitur, aut exercendo ingenio, aut instituendo ad exactiorem methodum, aut captāda populi approbatione, quibus finibus Veteres duas illas artes concludi uoluerunt: sed hic uir requiritur omni scientiarum necessariarum genere cumulatus, qui rem exactissimè intelligat, duobus tribusue uerbis, argumentisque luce clarioribus iudicet quid factō sit opus, neque inani uerborum tumultu, rationumque probabilium multitudine, ut uulgus imperitum: sed uel naturæ quodam bono, uel certissima illa methodo, quam tātō opere ueteres passim nobis commendarunt, cuiusque eruditionem metiatur. Si per hanc ueritate diligenter



# P R A E F A T I O.

ligenter inuestigata, rebusque tanquam ad exa-  
 ctissimam normam directis & diligentissimè p-  
 pensis, ut te ad eorum, qui audiunt, captum ac-  
 commodas, ornamenta Rhetorum, Dialectico-  
 rumque argumenta adiunxeris, modò pruden-  
 ter id fiat, plurimum profueris, idque ueteres  
 sæpe facere compertum est. Sin his duabus so-  
 lis artibus armatus accesseris, tanquam gladiū  
 in manu furentis crudeliterque inter populum  
 sæuiantis uidere uideor, cuius acies solis legi-  
 bus retundi queat. Atque utinam ut armis ad  
 bellum iustitiamque necessariis, certo tamen  
 tempore cū opus his non est, a Principibus  
 interdici solet. ita (quod in cæteris omnibus na-  
 tionibus longe, quā nos, pacatius uiuentibus  
 fieri comperio) eadem lex in huiusmodi arti-  
 bus ferretur, cū extra fines terminosque suos  
 egrediuntur: aut saltem, si ad scribendi differen-  
 dique de re qualibet licentiam unumquemque  
 liberum esse uolumus, in singulis scientiis gra-  
 uioribus uiri publico etiam sumptu præficeren-  
 tur, qui longo usu, prudentia, uera illa metho-  
 do diligentissimè instructi scripta omnium, ra-  
 tionesque in speciem quidem (ut scribit Gale-  
 nus) instar adulterinorum nummorum appare-  
 tes, sed si ad ueritatem conferantur, prauas ex-  
 penderet, & publico scripto tanquam edicto  
 quodam consignarent ac testarentur. Longè  
 melius profectò cum literis, literatisque omni-  
 bus,



## P R A E F A T I O .

bus, atque adeo uniuerſa Rep. ageretur, neque ſcientiæ uſque adeo contemptæ atque abiectæ apud pleroſque iacerent. Quis enim quotidie non uidet in iudicio, in foro, in curandis agris, conſilio capiendò, deliberando de Rep. noſtra hæc ornamenta ſcholæſtica exhibilari & explo- di, aut iiſdem, ſi æquiora ſint, uirorum grauiſſi- morum coronam ſollicitam ſuſpitione, ſuſpen- ſam uerbis, perturbatam prolixitate detineri, ubi ſiquis natura prudens, uſu confirmatus, et cum mediocribus literis interuenerit, duobus uerbis omnia definiet? Vt iam quos in Scholis magnificis promiſſis a nobis ſuperatos iri di- cendo præceptores pollicebantur, eorum iudi- cio ridiculi ſubiiciamur. Hinc iam parètes ma- ximis in erudiendis liberis ſumptibus, in nul- los tamen, aut perexiguos fructus abeuntibus defatigati, a literis ſuos auocant, à præceptori- buſque tantum hoc requirunt, ut paululum ul- tra primas literas progreſſi pueri, ciuilem quan- dam prudentiam & morum honeſtatem doceã- tur. Id enim multò præſtantius eſſe, quàm mul- ta ſcire. Sed longius communis huius calami- tatis dolore abductus fortasſe progredior. Ad alterum caput uenio.

Cum in animis hominum tantæ latebrę ſint & reſeſus, quo quiſque animo ſit, quid agat, quid ſpectet, iudicare difficillimum eſt. Sed no- ſtris temporibus multò, quàm unquam aliàs, diffi-



# P R A E F A T I O.

difficilius, quibus homo hominem horret, dissi-  
 militudineque studiorum societate dirempta,  
 quasi humani nihil amplius relictum sit, alter  
 ab altero perpetuò insidias sibi parari suspi-  
 catur. Nulla tamen unquam maior comitas, uer-  
 borum profluentia, eloquentia subtilitas, graui-  
 tas, aut, ut uerius dicam, uanitas. Totius mali  
 una eademque est origo. Natura enim in pue-  
 ris nuda uix apparet: in adultis leuiter tecta: in  
 grandioribus & aulicis uariè personata: in om-  
 nibus oratione deformatur. Hinc immanitatis  
 consuetudine efferata, quodam quasi èstu, effer-  
 uescit, tandemque ferocitate & pertinacia inu-  
 sitata in proximum quenque inuadit. Solo tan-  
 dem opere detegitur. Nullus enim tantisper  
 dum fallitur, falli se unquam putat, donec falsus  
 sit, tumque id ipsum luce clarius intelligit. Na-  
 turam (inquit ille) expellas furca, periones, te-  
 gas: tamen ipsa recurrit, ac se opere, uel euen-  
 tis prodit. Hoc certissimo argumento si quis  
 harum artium per se quasi sine rectore propria  
 & legitima opera expendat atque aestimet, per-  
 nicii nostræ cum magna calamitate Reip. con-  
 iunctæ latissimum campum ingredietur. Sed  
 hoc silentio præterire satius est. Tantum specte-  
 mus, num conferenda sint Dialecticorum scri-  
 pta cum operibus Hippocratis, Aristotelis, Ga-  
 leni, & similium. An ut illi sectas conciliant, li-  
 terarumve Professores perfidia hominum disso-  
 ciatos



## P R A E F A T I O.

ciatos rursus in pristinam cōcordiam reducūt?  
 An potius eosdem in uarias sectas & discipli-  
 nas distrahunt? Suo tempore ueteres præclaris-  
 sima Methodo, cuius authorem Plato Hippo-  
 cratem facit, uel pertinacissimum quenque ad  
 se alliciebant, breuissimoque tempore & ab a-  
 liis scripta cognoscebant, & in omni scientia-  
 rū genere plurima per se ipsi inueniebāt, adeo  
 ut Galenus ausus sit dicere, Platonis tot tanta-  
 que opera in Philosophia, Theologia, Medici-  
 na, Iureciuili, Mathematicis nihil aliud esse,  
 quàm exercitationes eius diuinæ Methodi, cu-  
 ius ideam animo consignatam tenebat, quasi  
 themata, quæ uulgò in Scholis in diuersis rerū  
 generibus pueris dictantur, ut Rhetoricæ &  
 Dialecticæ præcepta usu confirment. Horum  
 omnium loco in lucem quotidie prodeunt nō  
 libri, sed typis excussæ iniuriæ, iurgia, risus, scō-  
 mata, ut quo quisque maiorem alicui infamiā,  
 aut contumeliam intulerit, eò doctior & elo-  
 quentior habeatur. Qui æquiores sunt, corni-  
 cum, quod aiunt, oculos configunt. Hinc, dum  
 quisque tueri uult eum, cuius disciplinæ sese  
 mancipauerit, dissidia oriuntur, qualia quilibet  
 experiri potest, nihilque aliud, quàm in uitam  
 alterius inquiritur, ut si qua labes præcesserit,  
 eius narratione uirorum bonorum aures offen-  
 dantur, qui uel nescire, uel obliuisci uoluerūt.  
 Hoc iam non modò Christiano, Philosopho,  
 aut



# P R A E F A T I O.

aut Medico, sed ne homine quidem quantum-  
uis immani & barbaro dignum puto. Sed cum  
meliora non possint, orationem traducunt &  
conuertunt in uitiorum colluiem, grauioreq;  
se scelere obstringunt quam illi ipsi, qui perpe-  
trarunt. In reprehendendo quoque conuenien-  
tius esset, modestiam, quam a Christo discere  
non potuimus, saltem ab Ethnicis acceptam  
imitari. Verum, inquit Aristoteles, non solum  
illis agendæ sunt gratiæ, quorum opinionibus  
quis acquiescet, sed illis, qui superficietenus di-  
xerunt. Conferunt enim aliquid isti: habitum  
nanque nostrum exercuerunt. Si enim Timo-  
theus non fuisset, multum melodiæ nequaquam  
habuissimus. Si tamen Phrinis non extitisset,  
ne Timotheus quidem. Simili modo & de illis  
est, qui de ueritate asseruerunt. A quibusdam  
enim opiniones aliquas accepimus: quidam ue-  
rò ut hæ fierent, causa fuerunt. Sed his præter-  
missis ad reliqua progrediendum.

Similia omnia his, quæ diximus, (Nam hu-  
iusmodi tum artium, tum opinionum, tum Re-  
rum pub. mutationes certo quodam quasi cir-  
cuitu redeunt) (Galenî tempore fieri solita pas-  
sim apud illum uidere licet, qui magnam par-  
tem in huiusmodi erroribus refellendis uersa-  
tur. Qua autem ratione sibi cauerit, meliorem-  
que inuenerit uiam, qua ingredi tuto posset si-  
ne casu aliquo, aut prolapsione, cum ex aliis lo-  
cis



## P R A E F A T I O.

cis infinitis, tum ex illo opusculo de libris propriis intelligi potest. Confitetur enim Dialecticam sibi plurimum profuisse in his, quæ ex Aristotele diximus initio: in inueniendis autem & iudicandis, quæ ad Medicinam pertinent, alterius Methodi inuentione sibi fuisse opus. Ob hæc (inquit) cum deinceps me & Stoicorum & Peripateticorum illis temporibus celeberrimis, mancipassem, discebam quidem logicorum theorematum alia permulta: sed quæ postea considerans, inutilia prorsus ad Apodixes inueni. Subiicit paulò post se ad Pyrrhonorum ferè per præceptores hesitantiam & ipsum recidisse, nisi Mathematicis instructus fuisset, quorum exemplo admonitus cœpit relictis illis disputationibus logicis, lineares demonstrationes sequi. Theoremata autem, illa logica inutilia in Medicina eadem fuisse cum his, quæ a Cicerone in Topicis traduntur, aut similibus Dialecticis, intelliges tum ex Cicerone ipso, qui ea se a Stoicis, Academicis & Peripateticis accepisse passim fatetur, tum multò magis ex Galeno, præsertim in libris de dogmatibus Platonis & Hippocratis, ubi disputat cum Chrysippo. Neque dici potest de Sophisticis argumentis hæc intelligenda. Nam ibidem docet quatuor argumentorum genera esse, Sophistica, Rhetorica, Dialectica, & scientifica, ex quibus tria priora

b      ita



## P R A E F A T I O.

ita reiicit, ut sæpe fat illi sit ad refellendum, docere dialecticum argumentum esse. Coniugata, antecedentia, adiuncta, similia, dissimilia, Ethimologiam simplicisque locos Dialecticos ridet. Definitionem primo loco poni, diuisionem subsequi in docendo ac demonstrando, nihil aliud esse scribit quarto de Differentiis pulsuum, quàm petere principium. Ponitur enim, quod in questione est, atque etiam *φιλοριζία*, appellat, ueluti de finiendi quandam pruriginem. Si quando definiendi methodo utamur, ut in Arte parua, id ad memoriam fieri: ad exactam doctrinam & demonstrationem inutile esse. Vt enim Methodus illa compendiis artium describendis aptissima est, ita scientiæ ineptissima.

Totam hanc scientificam inueniendi indicandique uiam & rationem uno loco consilare, methodis pluribus. In artibus constitutendis, una: in nominibus distinguendis, altera: ut & in definitione, diuisione, questione affirmante, negante, in reprehendendo, in demonstrationibus suo ordine disponendis. Hac enim omnia tum inter se communem quandam habent methodum: tum per se unam propriam ac peculiarem, eamque certissimam, qua perpetuò Plato, Hippocrates, Aristoteles, & Galenus utuntur. Has omnes collegimus ex Galeno primùm: deinde ex codice quodam  
Ara-



## P R A E F A T I O.

Arabica lingua scripto, qui magna ex parte libros Galeni de Demonstratione explicat. Longè aliud artificium est, iudicium, inuentio in Poetis, Oratoribus, Dialecticis, & similibus, in quibus secundi iudicandi instrumentis utimur, quæ magis ad oblectationē, & opinionem audientium comparata sunt, quàm ad ueritatis inuestigationem, quod Plato quoque docet in Phædro. Proinde de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela Galenus monet, diligenter nobis considerandum esse: Nunquid qui suam sententiam ferunt, iudicandi instrumentum altero egens instrumento afferant. Ex ea tanquam communi radice singula peccata exoriri. Ac ne decipiamur (inquit) primum omnium iudicandi instrumentum contemplemur, quod, scilicet, altero instrumento non egens inuenire opus est, inuentumque omnibus hominibus ostendere. Paulò post, Vt pote autem in re ualde difficili, quemadmodum opere didicisti in istis uano sapientiæ nomine præditis, petulantibus, ac propterea ludibrio habitis, quòd neque uulgaria quæsitæ ad primum illud instrumentum iudicandi redigere ualeant, sibi ipsi eum constare oportet, qui scientiæ capax esse uelit. Ubique autem testatur se in eam methodum peruenisse primum Mathematicorum exemplo, deinde assidua exercitatione in singulis Medicinæ præceptis,

b    2    ut



## P R A E F A T I O.

ut tandem etiam longo hoc usu de uariis rebus in promptu ad amicos multos libros scripserit. Aristotelis quoque Analyticis parum se adiutum initio significat. Tandem tamen multa his, quæ inuenerat, similia in eo agnouisse. Consuetæ enim (ait de Soph. in uerbo) huic Philosopho dicendi breuitas, & ueluti per signa expromere multa: quia ad hos, qui iam audiuerant, scriberentur. Qui igitur exposuerunt, alii hæc in diligentiam ferre, quod decebat, ne tentarunt quidem: alii non consequuti sunt. Nos uerò tentemus non Aristotelis causa, neque ut orationi eius opem feramus, sed causa nostra. De Elementis quoque conqueritur, ab interpretibus (Græcos significat, quibus adhuc Latini sunt inferiores) non intelligi. Videntur igitur (inquit) Hippocrates atque Aristoteles eodem modo suum disposuisse sermonem. Verum expositores non assequuntur suum intellectum. Infinitis autem locis in Medicos sui temporis inuehitur, qui cum nihil aliud haberent in ore, quam Demonstrationem, neque tamen ea uterentur, neque quid esset, cognoscerent. Quod profectò si adhuc esset in uiuis, æquius multò in nobis reprehenderet. Neque ulla alia ratione dissentientes inter se, & multum disiunctas & disparēs hominum opiniones, ut suo tempore, conciliari posse doceret, nisi diuina illa methodo



## P R A E F A T I O.

do in usum reuocata.

Scio, quid uulgò contra afferri soleat, Apodixibus illis exactis nos carere, probabilibus oportere esse contentos & popularibus argumentis. In quo certè plurimùm abesse mihi uidentur a ueterum sententia, quasi si argumentum scientificum desit in quæstione, Methodo tamen demonstrandi, quæ propriam sibi ac peculiarem habet & inueniendi & iudicandi rationem a Dialecticis multùm discrepantem, uti non oporteat. Deinde hoc etiam falsum est, cùm uix apud Galenum unam aut alteram quæstionem reperire liceat, cuius demonstrationem non afferat, ut illam de animi immortalitate. Neque enim hanc certitudinem intelligit, quasi quod oculis cernimus, aut manibus contrectamus (nam id principiis duntaxat est tribuendum) sed qua nulla certior possit ab homine excogitari. Ob idque Aristoteles melius affectum esse scribit, qui per sensum cognoscit, quàm qui per scientiam. Omnia igitur siue certò inuestigari possint, siue non possint, ad hanc certissimam regulam primum expendi debent. Deinde ubi eo peruentum erit, quò exacta scientia deficiet, huic incommodo triplex remedium esse uoluerunt. Vnum, ut quàm maximè probabilia non uni aut alteri sectæ, sed communi hominum omnium consensui proferantur in medium, &

b 3      quæ



# P R A E F A T I O.

quæ parùm absint a uera demonstratione, adhibitis etiam testimoniis eorum, qui diis propinquiores & amiciores fuerunt, ut iubet Plato in Timæo. Alterum, ut ingenuè fateamur nos duntaxat probabilibus uti, & quibus non ita sit fidendum, quasi exactè demonstrarentur, Vt idem Plato præcipit in Timæo, & Galenus nono de Dogmatibus, ne qui audiunt, a nobis decepti humanam opinionem, tanquam certissimam scientiam apprehendant. Postremò ut si qua sint huius generis, legibus definiantur, aut oraculo diuino. De anima igitur (inquit Galenus ex Platone) quam partem mortalem, quam diuinam sortita sit, & ubi & quibuscum, & quomodo separatim condita fuerit, si Deus aliquis comprobaret, una hac demum ratione certum aliquid possemus confirmare. Quòd uerò a me illud, quod uerisimile uidetur, dictum fuerit, & nunc & postea maiori etiam adhibita consideratione asserere non dubitabimus. In quo etiam Galenus fatetur se nihil pronunciare audere. In his igitur, quæ sub demonstrationem non cadunt, uel leges, aut sacras literas. (hoc .n. significat, quod dicit Plato, Si Deus aliquis comprobaret) uel si hæc defunt, quod rarissimum est, ad probabilitatem confugiendum, in qua nihil temerè affirmari debet, nec quasi pro aris & focis pugnandum pro opinione ut uulgò fieri solet, unde



# P R A E F A T I O .

de ex communi sapientium iugo fiunt doctrinarum diuortia . Eadem quoque uia & ratione probabilia illa exquiri debent, qua necessaria & scientifica argumenta . Sic nullus excusationis locus relinquitur, quò minus diuina illa antiquorum methodo utamur, praesertim nobis, quibus longè plura, quàm illis, & legibus, & sacris literis, & optimè a nostris inuentis definita sunt . Ob eam causam Galenus non dubitandum scribit, quin recentiores Hippocrate multò edoctiores euadant, si hac insistant uia . Nam & quæ ille multis annis magnisq̃ue laboribus inuenit, breui licet perdiscere, & multò plura eadem ratione inuenire . Quòd si, ut semper ferè fit, demonstratione uti possumus, quid opus est inani uerborum profusione, dialecticarumq̃ue ratiocinationum congerie superflua onerare studiosum ad finem artis longissimæ festinantem, & pro uerissima scientia opinionum commenta obtrudere, quæ paucissimis diebus, natura ueritatem indicante, aut euentu naturam horum hominum detegente, sæpius post infinita homicidia, strages, pericula, adolescentium corruptionem magno cum totius Reipub. periculo & literarum omnium deleri quotidie obseruamus? Sic semper discimus, ad solidam exactamq̃ue scientiam nunquam penetraturi . Galenus scribit initio octauæ de Placitis, una demonstratione

b 4 lineari



## P R A E F A T I O.

lineari certissimè comprehendi potuisse, quæ importunitate Dialecticorum argumentorum Chrysippi coactus in septem libros protraxit. Quam etiam causam fuisse comperio in multis aliis operibus, cur ad facietatem usque exuberet in disputando. Id enim non Asiaticæ cui dam redundantia tribuendum puto, qui Hippocratis breuitatem plerisque in locis usque adeo miratur, & amplectitur: sed cum Medicis, quicquid in buccam ueniebat, in Scholis & libris garrimentibus garrulus esse cogebatur, adhucque saepius conqueritur sua ab illis non posse intelligi, qui quod Demonstratione carerent.

Hæc igitur certissima, uerissimaque ratio sola mihi uidetur superesse, qua non solum Medicina, sed scientia omnis faciliè comparari, conseruari, ornari, amplificari possit, dissidentes hominum opiniones conciliari, bella, seditiones, iurgia tolli & radicitus euelli, quibus simul cum literis his miserrimis temporibus pene oppressa est Respub. Huic uni Methodo, quantulacunque sit in nobis, nos debere fatemur, quicquid adhuc sumus in bonarum artium studiis consequuti, si modò aliquid consequuti uidemur. Hæc sola, quæ sunt in Philosophia & Medicina, ingeniis eruuntur, ad id, quod necessarium est, acutis atque acribus: eaque exercitata oratione poliuntur.

Hic



## P R A E F A T I O.

Hic Medicus si minus erit usu peritus initio, attamen in inueniendo, ueteribusque explicandis exercitatus: hac ipsa exercitatione communi istos quidem Philosophos & Oratores superabit, neque se ab iis contemni ac despici sinet. Sin aliquis extiterit aliquando, qui Academicorum more de omnibus rebus in utranque sententiam possit dicere, & in omni causa duas contrarias orationes præceptis Dialecticorum cognitis explicare, aut Arcesilaæ modo & Carneadis contra omne, quod propositum sit, differat, quique ad eam rationem adiungat hunc rhetoricum usum, moremque exercitationemque dicendi: is sit uerus, is perfectus, is solus orator. Nobis profectò si nihil aliud afferat, nunquam summus aut Philosophus, aut Theologus, aut Medicus futurus est. Nam neque sine antiquæ illius methodi nervis satis uehemens & grauis, nec sine uarietate doctrinæ solidioris satis politus & sapiens esse talis potest. Patiamur igitur quemlibet pullos suos excludere in nido, qui euolent clamatores odiosi ac molesti: Has tamen pueriles delitias in grauioribus scientiis depingi si Respub. patiatur, id impune nunquam feret. Quòd si hæc a studiosis & ingenuè natis adulescentibus, in quibus diuini illi animorum igniculi alienis moribus, atque opinionibus nouis nondum sint restincti, æquo animo accipi intellexerimus,



## P R A E F A T I O.

lineari certissimè comprehendi potuisse, quæ importunitate Dialecticorum argumentorum Chrysippi coactus in septem libros protraxit. Quam etiam causam fuisse comperio in multis aliis operibus, cur ad facietatem usque exuberet in disputando. Id enim non Asiaticæ cui dam redundantia tribuendum puto, qui Hippocratis breuitatem plerisque in locis usque adeo miratur, & amplectitur: sed cum Medicis, quicquid in buccam ueniebat, in Scholis & libris garrulentibus garrulus esse cogebatur, adhuc sepius conqueritur sua ab illis non posse intelligi, qui quod Demonstratione carerent.

Hæc igitur certissima, uerissimaque ratio sola mihi uidetur superesse, qua non solum Medicina, sed scientia omnis faciliè comparari, conseruari, ornari, amplificari possit, dissidentes hominum opiniones conciliari, bella, seditiones, iurgia tolli & radicitus euelli, quibus simul cum literis his miserrimis temporibus pene oppressa est Respub. Huic uni Methodo, quantulacunque sit in nobis, nos debere fatemur, quicquid adhuc sumus in bonarum artium studiis consequuti, si modò aliquid consequuti uidemur. Hæc sola, quæ sunt in Philosophia & Medicina, ingeniis eruuntur, ad id, quod necessarium est, acutis atque acribus: eaque exercitata oratione poliuntur.

Hic



## P R A E F A T I O.

Hic Medicus si minus erit usu peritus initiò ,  
attamen in inueniendo, ueteribusque explican-  
dis exercitatus: hac ipsa exercitatione commu-  
ni istos quidem Philosophos & Oratores supe-  
rabit, neque se ab iis contemni ac despici si-  
net. Sin aliquis extiterit aliquando, qui Aca-  
demicorum more de omnibus rebus in utran-  
que sententiam possit dicere, & in omni causa  
duas contrarias orationes præceptis Dialecti-  
corum cognitis explicare, aut Arcefilæ modo  
& Carneadis contra omne, quod propositum  
sit, differat, qui que ad eam rationem adiungat  
hunc rhetoricum usum, moremque exercita-  
tionemque dicendi: is sit uerus, is perfectus, is  
solus orator. Nobis profectò si nihil aliud af-  
ferat, nunquam summus aut Philosophus, aut  
Theologus, aut Medicus futurus est. Nam ne-  
que sine antiquæ illius methodi neruis satis ue-  
hemens & grauis, nec sine uarietate doctrinæ  
solidioris satis politus & sapiens esse talis po-  
test. Patiamur igitur quemlibet pullos suos  
excludere in nido, qui euolent clamatores o-  
diosi ac molesti: Has tamen pueriles delitias  
in grauioribus scientiis depingi si Respub. pa-  
tiatur, id impune nunquam feret. Quòd si  
hæc a studiosis & ingenuè natis adolescenti-  
bus, in quibus diuini illi animorum igniculi  
alienis moribus, atque opinionibus nouis non  
dum sint restincti, æquo animo accipi intellexe-  
rimus,



P R A E F A T I O.

rimus, nostras in hac re obseruationes, quas multas domi habemus ex ueteribus laboriosè ad nostram utilitatem collectas, lubenter sumus communicaturi, parum admodum solliciti de his, quæ sophisticè in contrarium afferri possint ab huiusmodi artium scriptoribus, qui contra omnia subtiliter & ornatè disputant.

Neque enim ob id uiri boni, quæ sine suo detrimento tribuere aliis possunt, ita sibi retinere debent, ut inde Respub. detrimentum capiat, potiusque omne periculum subeundum, quàm patiantur literarum studia ita distrahi, & in sectas Philosophorum dilacerari.

Homo (inquit Ennius) qui erranti comiter mōstrat uiam,

Quasi lumen de suo lumine accendat, facit

Vt nihilominus ipsi luceat, cū illi accenderit.

Ad hanc cœlestem ac diuinam ingenii uim hominibus a diis immortalibus tributam, ut Plato scripsit, si quis naturam & usum adiunxerit, ei ad absolutionem perfectionemque summi Medici nihil deesse puto. Iudicium enim a Philosophia primū: deinde ab his artibus, atque disciplinis, quæ inde ductæ sunt, expolitur & confirmatur. Qui natura ualent, alii *φασια*, alii ratione & partibus *συναρτιας* excellent. Vsus confirmat utrumque, & utroque confirmatur. Hinc nullo metu, magno totius Reipub. commodo ad ægros non Vates, non Dia-



## P R A E F A T I O .

Dialecticus, non Orator, sed summus Medicus omnibus tamen illis longè diuinior & admirabilior accedes, summaque prudentia morbi speciem, causas, accidentia, & ueluti proprietatem colliges, locumque affectum diligenter notabis, ægri naturam & omnium illius partium, quomodo sese habeant ad remedia, remediorumque uires cum agro comparabis. In cognitione autem morbi primum quidem constitutionem anni, situm, uentos, aquas, consuetum uictum regionis & ciuitatis intelligere oportet, deinde ea, quæ morbo sunt propria. Ex his etiam nescio quid proprietatis morbis accedit, ut his aut illis auxiliis uel iuentur, uel lædantur ægri. Neque etiam solum spectandum ut iuues, sed ut ne lædas, aut è morbo morbum facias. Exempli causa, In dolore capitis ( ut in nostris scholiis admonemus ) si quis Paralyti opportunus est, a cucurbitulis metuendum. Si imbecillis æger pulmonibus, periculum est, ne sufa materia & illecta masticatoriis in pulmones descendat. Idem iudicium est, si fauces imbecilliores fuerint. In Errhinis metus quoque est, ubi uel oculi facillè læduntur, uel ozenis laborant nares. An æger siccior sit uentriculo, uel hepate, uel uegetiore intestinorum sensu, & similia, diligenter perpendes. Remedia enim quadam, quæ multis aliis prodesse solent, huic infestissima sunt. Hic agere,



## P R A E F A T I O.

grè, hic facilè mouetur. Ita remedia distinguenda sunt, & ægris, morbis, ætati, regioni, & similibus accommodanda. Atque hæc eò dico, ne putes tibi satis esse ad Medicinam faciendam remediorum præscriptiones multas circumferre, aut libellos, quibus ad praxim institumur, aut si remedia te aliquando sefellerint, in Authorem culpam conferas, sed in te ipsum, qui ineptè & sine methodo ea adhibueris. Neque enim Methodus illa minus necessaria est in medendo curandisque ægris, quàm aut in studendo, aut scribendo, aut docendo: imò fortasse magis, ut passim docet Galenus.

Hæc igitur sunt, *φιλῶτατοι*, de quibus initio præfationis loco putavi uos esse admonendos, nescio quàm bene, certè amicissimè. Neque enim quisquam alieni artificii stultus aut invidus existimator ita in animum inducat, quasi hæc aut popularis auræ captandæ cupiditate, aut utilitatis alicuius specie in lucem proferamus. Totum enim hoc, quicquid est, multis nostris sumptibus confectum est, & erant fortasse alia, quibus in hominum conspectum uenire possemus, quanquam hoc quàm minimi facimus, præsertim hoc tempore, quibus quid, quæso, sperandum est uiro bono, potentissimo inimico fastu, dominatione obtrectatorum, infidelibus amicis, pluribus invidis? Adde quod ad id consequendum breuitate  
tem-



## P R A E F A T I O.

temporis impediēbamur, cū Typographi ita urgerent, ut uix sepositum tempus esset ad dimidiam eorum partem exscribendam, quē mēte concepta tenebamus, tantū abest ad corrigendam & perpoliendam. Sed cū ita tulisset casus infestissimus, ut nobis Arelata urbe florētissima in patriam redeuntibus, necessariō huc mandum esset Lutetia, ob eamque causam in idem cubiculū conuenissemus ego & D. Chrystophorus Burgensis nobis amicissimus & in Medicina facienda exercitissimus, Præceptorum quondam nostrorum Syluii, Goupyli, imprimisque Hollerii interitum grauissimē ferebamus. Hic enim si in uiuis adhuc fuisset, non ignorabamus, quanta nos solita illa sua beneuolentia & humanitate excepisset. Sed quod fortuna omnium bonorum inuida nobis de eruditissimis illius colloquiis ademerat, id singularis quædam liberalitas Consiliarii illustrissimi Andreæ Pastorei compensauit, diuini illius uiri multis libris manu scriptis exhibitis. In quibus perlegendis si cumulatē ingenio nostro satisfactum est, dolor certē non est imminutus. Dolebamus enim mirum in modum tantis operibus præmatura morte in pestilentissimo aere abreptum extremam manum imponere non potuissē, eodemque fato & Remp. tot bonis priuari, & memoriam præceptoris amantissimi imminui. Itaque ne id saltem omni ex parte fieret,

cū




## P R A E F A T I O .

cum discedendi urgeret necessitas, amplissima hac occasione oblata, neque laboribus & uigi-  
liis, neque sumptibus pepercimus, quò in prae-  
ceptorem officium praeistaremus, si non quale  
aut exoptabamus, aut eius magnitudo postula-  
bat, saltem quod per temporis breuitatem li-  
cuit. Facilius enim, si quid minus bene a nobis  
diceretur, aut perpoliretur, grauioribus aliis il-  
lius operibus sarciri posse, minoreque multò  
studiorum incommodo uidebamus, quàm oc-  
casionem semel praetermissam recuperare. Eo-  
que consilio interea hoc leuioris operæ in ordi-  
nē redeimus, auximus, scholiis illustrauimus,  
quòd multa deesse uiderentur ad exactā mor-  
borum, caussarum, signorum, remediorum co-  
gnitionem, ut quod non eo animo scriptum es-  
set, ut in lucem ederetur, sed ut potius in Scho-  
lis doctis iuuenibus consuetò more dictaretur.  
Multas illius Observationes in marginibus ad  
memoriā descriptas, fideliter inseruimus, quas-  
dam etiam nostras adiecimus, quid cauendum  
esset, quid sequendum, quæ recentiorum quo-  
rundam uirorum doctissimorum de morborū  
caussis sententia a ueteribus dissidens, aliquan-  
do admonuimus, omnia quidem tanta breuita-  
te, quanta fieri potuit, minutissimisq; literulis,  
ne quod enchiridii uice uolebamus esse studio-  
sis, id in molestam magnitudinem uoluminis  
excreceret. In quo certè eò alacriore animo a  
nobis



## P R A E F A T I O.

nobis est elaboratum, quòd a celeberrimis in hac florentissima facultate Parisiensi Medicinæ Doctoribus, imprimisq; D. Pietro Decano, D. Ioanne le Côte, & D. Rochon, publicis Professoribus (quibus studiosi quantum debeant, omnibus perspicuum est) nostrum hoc institutum non modò non improbari, sed uehementer etiam laudari intelligebamus. Ad id etiam faciendam nos adhortabantur D. Mizaldus uir omni scientiarum genere exornatus, & D. Gabriel Dauagneus Belignaceus Medicus doctissimus & nobis amicissimus. Tot igitur tantisq; uiris ~~quibus~~ si quid utilitatis, ut speramus, nostris laboribus estis percepturi, gratias etiã habere debetis.





IACOBI  
HOLLERII

STEMPANI,

MEDICI PARISIENSIS  
celeberrimi,

DE MORBORVM INTERNO-  
RVM REMEDIIS,

LIBER PRIMVS.

*De dolore capitis. Cap. I.*



**D**OLET CAPVT, intemperie, *Causa.*  
aut solutione continui. Intemperies  
simplex, composita: sine materia, cū  
materia: illa quæ uel in toto cerebro,  
uel in uenis, arteriis, membranis,  
neruosisque corporibus. Solutio cō  
tinui fit acri humore erodente, pu  
tri, bilioso, salso, vulnere, casu, contusione pūctura, mali  
gna qualitate, ut in lue uenerea, carie, distentione. Distē  
tio ferè à copia humorum, uel flatuum: humorum qui  
dem, uel omnium, uel aliquorum, uel alicuius. Fit quo  
que obstructione, cū uidelicet angustias meatuum ca  
pitis intercipit humor crassus & uiscidus, aut spiritus ue  
hemēter uaporosus, in futuris, ossibus palati colatoriis,  
& quæ ad nares, aures, oculos & spinam pertinent.

Dignoscitur ex uarietate causarum efficientium, ex *Signa.*  
partium laborantium natura, ex loco, ex qualitate pro  
pria. Causæ efficiētes, externæ, internæ. Externæ, ællus,  
perfrictio, ebrietas, casus, ictus, uictus, uapor aliquis, ut  
fumus, grauis odor, aut naturæ ægri repugnans. Internæ,  
intemperies naturalis, aut contracta morbo, quantitas,  
qualitas materiæ humorum, uel uaporum, mala confor  
matio



# DE MORBIS INTERNIS

matio, obstructio. A partium natura: nervosorum corporum magis punctorius: arteriarum pulsatorius: stupidior in uenis & cerebri substantia. In perioftio superficialis: altus in meningibus. Intra caluariam ad radices oculorum extensus. In plenitudine grauis, in acri humore & uapore rodens: sed uapor distendit magis, humor magis mordicat. Vbi distentio citra rofionem, spiritus flatuosi uel humoris non rodentis copiam indicat. Distensio cum pulsu, membranarum inflammationem sequitur: cum grauitate, copiam membranis conceptam & inhærentem: sine grauitate & pulsatione, copiam crudi flatus. A sanguine ferè in frontem: à pituita in occiput: à bile in dextrum latus: à melancholia in sinistrum decumbit. Sunt quibus arteriarum intemperies sanguinem spirituosum multum colligit, unde dolor pulsatorius & uehemens excitatur. Quibusdam uermes generantur in cerebro. Id raram, quod tamen memoria nostra uisum est. Et cuidam Italo ex frequenti odoratu basilicæ herbæ natus scorpio in cerebro uehementes dolores & longos, mortem denique attulit. Humor autem & uapor uel in cerebro gignitur, uel aliundè ascendit, ab extremo police, & planta pedis à uenenato, uulnere clauso, utero, hepate, liene, uentriculo, pulmone & aliis.

## Curatio.

Curatio in his est. In Phlebotomia, Arteriotomia, Sanguisugis, Cucurbitulis, Purgatione, Potionibus, & Medicamentis materiam præparantibus, Topicis repellentibus, concoquentibus, mitigantibus, alterantibus, digerentibus, roborantibus, Phenigmis, Sinapismis, Cauteriis, Paracentesi. Hæc omnia remedia sunt dolorum capitis.

## Phlebotomia.

Phlebotomia imperatur, si plenitudo & sanguinis copia, si uehemens obstructio est, si uulnus, casus, concussio, febris, inflammatio, atque adeo, ubi intolerabilis dolor est.

Si à reliquo corpore uitium est, primùm axillarem, deinde cephalicam, aut semel mediam diuidito.

Si

*sig. doloris  
capitis supra  
a loco afflicto*

*hoc uenit  
i guerram  
maior afflicto*

*.N.*



Si à suppressis mensibus, aut hemorrohidibus, uenas malleoli incidito: perseverante malo, uenam frontis, temporum, quæque post aures sita est, apperito. Eâ tamen eligito, in cuius regione dolor incumbit magis.

Arteriotomia probatur in iis, qui ob intemperiem arteriarum capite dolent, ac uertigine. Atque ubi sanguis calidus & uaporosus dolorem facit. Eligenda in fronte, temporibus, aut post aures, quæ micat, magis calet, & rubet, & ubi dolor acerbior est. Ex 6. de sanit. tuë. 13. metho. lib. de sang. missione.

*Arteriotomia.*

Vacuato iam corpore & contumaci malo, sanguisugæ extremo naso affiguntur, post aures, & uenis, quæ in caluaria eminent. Aliquando iis, qui ita assueti sunt, & multi sanguinis, post maiora remedia sanguinem è naribus irritamus.

*Sanguisuga.*

Cucurbitulæ primùm leues occipitio uel ceruicis initio, deinde cum scarificatione affiguntur.

*Cucurbitula.*

Post phlebotomiam & ante phlebotomiam imperatur purgatio, aliquândo et sine phlebotomia purgamus.

Ante phlebotomiam leui pharmaco, cuius uis hepar non superet, sed tantum uenter, mesenterium, sima hepatis, & intestina repurgentur, quale hoc erit.

*Minoratiua.*

R. cassiæ aut cathol. unc. i. aut cassiæ unc. s. quadrante horæ ante pastum.

Post phlebotomiam, si quis humor uitiosus relictus est, & si quidem recens dolor est, materia sequax, & subtilis, & tenuis, nulla quoque obstructio est, leui pharmaco uteris, ut Cassia, Rhabarbaro, Manna, Catholico: Mollioribus atque diuitibus, Electuario de succo rosarum, Diaprunon, Hyeræ puluere: Catholico in aliis, quales sunt hæ formulæ.

R. decoct. prunorum, tamarindorum, passularum, triū florum cordialium, quantum sufficit ad dissolutionem unc. 2. mannæ.

R. Cassiæ fistulæ unc. s. mannæ vn. i. dissolue in supradicta decoctione, uel sero lactis, uel aqua hordei, ptisanæ.

Pauperibus, loco mannæ, penidia imperabis, uel cathol.

A 2 thol.



# DE MORBIS INTERNIS

thol. 3. 6. casfiæ fistulæ unc. s. aut cathol. uel casfiæ 3. 6. diaprunis 3. 2. Ex his omnibus cum saccharo fiat bolus, aut, ut supra dictum est, dissoluantur. Rhabarbarum aliquando per se, aliquando cum casfia imperabitur. Pueris scr. 2. infunduntur in aqua endiuæ cum modico cinamomi: mulieribus, à 3. 1. ad 3. 1. & semissem: uiris, ad 3. iii. Mollioribus, & quibus alius facile commouetur 3. iii. casfiæ, & scr. 2. rhab. satis esse possunt. Ex his fit bolus cū saccharo. Aliis, casfiæ fistulæ 3. 6. addimus scr. 4. aut circiter rhab. Pulvere hyeræ picræ sic ut edū erit. R. pul. hieræ picræ recentis. 3. 2. excipiantur modica conserua uiolarum (ad tollendum amarorem.) Aut hæ pillulæ fortiores erunt.

R. pul. aloes 3. 1. mastic. cinamo. ana scr. s. diagridii gr. 4. (ad eradicationem) cum succo citri fiant pillulæ. In crassis & uiscidis humoribus, magnis quoque obstructionibus, grauior fere atque contumacior morbus est. In quibus & phlebotomia, si cætera consentiunt, necessaria est, & potiones, quæ materiam incidant, & attenuent, a quibus purgationes per interualla, ualidiq̃ue clysteres. Topica ex iis, quæ incidunt & attenuant. Er-rhina, Apophlegmatismi, Suffumigia, Gargarismata, Frictiones, Vincula, Cucurbitulæ, Sinapismi, Setones, Ferrum, Ignis.

Phlebotomia, ut prius, instituenda satis amplo uulnere Oxymelite, aut aliis descriptis materia præparabitur, aut hac potione.

R. stechad. citrini unc. 2. fiat decoctio in aqua purissima ad quart. 3. In expressione collata dissolue mellis communis, aut mellis albi, uel sacchari albisissimi lib. s. plus minusue. Fiat syrupus, utatur ieiunus, duabus horis ante cenam, dosi trium unciarum. Hæc potio putredinem arcet, extenuat, detergit, roborat non solum cerebrum, sed uiscera omnia, & corpus, laudata Græcis & Arabibus. A qua, usus esse potest syrupi de stechade incompleti, id est, sine aromatibus (deiractō croco.) Atque hinc syrupi completi, id est, cum speciebus. Eodē modo

usus spiritus  
de picræ:

pitæ.

causæ doloris  
capitis & uis  
a crassis et  
uiscidissimis  
rib:

philia

preparatio  
mag.



modo ex acoro, (*omnibus morbis à defluxione confert, quia astringit*) & fœniculi radice, oxymel parari potest, atque hinc hydromel.

Calidiores syrupi suspecti sunt, ubi plethora, febris cruditas in primis uenis. Hinc enim augentur febres, liquesfacta cruditas trahitur in corpus, fusa plenitudo apoplexias, febres, tabes, & alia mala inuehit. (*Hic quoque considerandum anni tempus, regio, agri tēperatura & ætas*) Purgationes fiunt ex hyera diacolocynthidos, agarico, & aliis, quale hoc est.

*Syrupi calidi.*

R. pul. hyeræ diacolo. 3. s. agarici tro. scrup. 2. masti cis, bdelli, ana scrup. s. nucis moscatae Gr. 8. cum succo absynthii formentur pillulæ. Delicioribus naturis poterunt excipi pulueres in modico conferuæ anthos. Solent autem parare syropos, quibus interuallis utendum sit, quos ita conficies, ut in decocto describantur quæ attenuent, concoquant, aperiant, roborent, & conuenienter purgent, quale hoc est.

*Pillulæ.*

R. rad. graminis, petroselini, asparagi, ana unc. s. sem. anisi, & fœniculi ana 3. i. bethonica, stechados ana P. 2. florum cordialium ana P. 1. passul. mundatarum (*carum caro relaxat*) unc. s. liquiritiæ 3. 2. polipodii quercini unc. s. aga. trocisc. 3. 6. foliorum senæ (*orientalis. Nostra nullius ferè est momenti*) mundatorum, & in fine decoctionis positorum unc. 2. s. fiat decoctio in aqua purissima ad gr. 3. In coll. dissol. sacch. albissimi q. s. Fiat syrupus mediocriter coctus, utatur singulis hebdomadibus unc. 1. s. cum unc. 2. hydromelis, aut ptisanæ. Erit autem calidius cum hydromelite, frigidius uero cum ptisana. Fortius.

*Syrupus.*

R. polipodii quercini, rad. acori, ireos, sem. carthami ana unc. 1. s. sem. anisi, fœniculi, cuscute ana 3. 2. sebesten, N. 12. Cetherac, scolopendriæ, bethonica, summitatum lupuli, agrimonie ana P. 1. stechad. arabici, & citrini ana P. s. foliorum senæ mundatorum, & in fine decoctionis positorum unc. 4. agar. recenter tro. unc. 1. s. turbith gūmofi unc. 1. fiat decoctio ad lib. 1. In coll.

*Syrupus.*

A 3 dissol.



# DE MORBIS INTERNIS

dissol. sacch. albiss. & mellis albi bene despumati ana lib. s. Fiat syrupus coctus secundum artem: accipiat unc. i. cum hydromelite, aut ptisanæ unc. 2. semel in 12. dieb.

## Pillula.

R. agar. recens troc. 3. 2. turbith. 3. i. s. salis gemmæ, & zinziberis (ad correctionem. Secus materiam subtilem uacuaret, relictâ crassâ.) an. scrup. i. Infunde omnia in uino albo, fiat leuis feruor super calidos cineres, deinde fortis expressio. Expressæ materiæ adde pul. hieræ dia col. 3. iii. pul. hieræ picræ scrup. 4. malaxentur cum uino expressionis, fiat massa, capiat 3. i.

Post purgationes imperare solent, quæ confirmant uentriculum & uiscera, quale hoc est.

Conseruæ.

R. mithridati ueteris, conseruæ buglossæ, & acori an. 3. i. Capiat manè diei sequentis.

Trociscus.

R. specierum electuarii diambæ 3. i. pliris sarcotici & aromatici rosati an. 3. s. excipiantur in modico conseruæ anthos, uel cum syrupo de corticibus citri, aut de stœchade, fiat trociscus.

## Topica.

*Repellentia in  
dolor cati:*

Repellentibus statim initio utendum est. Sed in dolore calido, magis refrigerantibus, ut & in corporibus durioribus, ætate regione calidiore iuuentute. Contra uerò temperanda res est in contraria conditione, quale hoc est, quod uehementer repellit & refrigerat.

Frontale.

R. olei rosati recentis unc. 2. aceti albi, & aquæ rosarum (in potu nocet ob odorẽ, nisi sumatur aqua peculirosi.) an. 3. ii. agitentur diu, & refrigerentur in aqua frigidissima putei, aut niue pro frontali. Aliud.

R. olei uiol. & ros. an. unc. i. aceti albi, succi agrestæ an. 3. 2. Diuitibus adde camphoræ gr. 4. Linteolum insuccatur: postea frigida uel in succis semperuiui, centi nodiæ, portulacæ, lactucæ, psilii rosarum, malorum granatorum, capreolorum uitis, omphacis, mespilli, cucurbitulæ, cucumeris. parabilia remedia sunt: oportet autem hæc subinde renouari, quia statim incalescunt.

N.

R. Cerati



## Secundus ordo.

R. Cerati Gal. diu subacti cum succo portulacæ, ut simili unc. 2. illinatur fronti, & superponantur folia salicis.

R. mucilag. sem. psilii, mucilag. sem. althææ, & cidoniorum an. 3. 6. agitentur cum modico aceti.

R. olei rosati & cham. ana unc. 1. aceti 3. iii. hieme pueris, eunuchis, & mulieribus conuenit. In quibus nimia refrigeratio periculosa est. Iam progressio morbo, olei cham. anethini, lilii aliquid adiciendum.

## In frigido.

R. dialthææ unc. 1. agitetur in mortario, primum quidem cum oleo rosato, deinde ut procedit morbus, cum ol. de mastiche, de cydoniis, de spica. Et diuitibus addi possunt. Gr. 2. mosci. olea conueniunt cham. aneth. (in declinatione, quia odoratum.) de lilio, laurinum, mastichinum, de spica, de costo. In quo serpillum, menta, thimū orig. rosmarinus, maiorana, calendula, pulegium, ben, nux moscata, garyophilum, cinamomum coxerint.

R. serpilli M. 1. coquatur in qr. iii. olei cham. & lib. s. Olea. uini rubri. Fiat decoctio ad consumptionē uini in uase duplici. Deinde fortis expressio, seruetur oleū ad usū.

R. garyophil. nucis moscatæ an. unc. s. fiat decoctio in qr. iii. olei cham. & uini rubri 3. 4. ad consumptionem uini in uase duplici ut prius, lento igne, ac sine fumo.

R. terebinth. lib. 1. mastich. cin. nucis muscatæ ana 3. 1. garyophil. galangæ, zedoariæ, ladani an. unc. 1. s. succi ebuli, succi cucumeris asinini, ana unc. 1. Puluerisatis puluerisandis in alambico distilletur oleum secundum artem.

Laudant & oleum sabacinum, iasminum. Nec omitendum est remedium mulieris apud Paulum.

## Preparatio.

Radices itaque cucumeris asinini concides in taleo las, & cum absinthii coma hydroleo incoques. Fouebis partem hydroleo, materiam uerò modo emplatri impones.

comiza in  
frig. dolore.

remedium pauli  
dolore frig.  
capitis



# DE MORBIS INTERNIS

## SCHOLIA.

Medico ad egrum accedenti primum pars affecta inuestiganda: deinde affectus: postremo ex utrisque ineunda curatio. Partes affectæ in capitis doloribus ita distinguuntur. Si digito pressa cute doloris sensus acerbior, pili erecti, & oculorum radices, uel partes internæ molestiam non sentiunt, cutis uel pericraneum laborat: sed pericraneum à frigore frequentius ob similitudinem, cutis ab æstu, sordibus, multis capitis integumentis, ut in mulieribus & similibus: dolorq; in pericraneum ad oculi palpebras usque, tantum peruenit. Intra cranium dolor obtusus, arteriarum uenarum & substantie cerebri affectionem indicat, quod sensu sint imbeciliores: punctorius menyngum & neruorum. Sed in neruis communicatur parti cui inseruntur: in arterijs pulsus percipitur: contundens & profundus in membranis ossium hæret. Sic deprehensa parte affecta, ad affectus distinctionem & curationem primo uidendum, an cum febre, an sine febre. Si cum febre incæperit, & permaneat, internam partem affici significat, & futurum delirium portendit. In acutis post tertium aut quartum diem superueniens, sanguinis fluxus indicium est, modo cetera consentiant, atque hic nullo modo curandus, ne crisis impediatur. In ea tamen, quæ per uomitum futura est, admoueri medicamenta possunt ad dolorem leniendum, nullo naturæ impedimento. Quod si sine febre sæuiat, uel in parte est dextra, sinistra, superiore, inferiore: uel in toto. Dolor sæpius recurrens, statisque temporibus & alterutra partem occupans ad futuram usque, Hemicranea est: in anteriore parte, Cephalalgea: post multum tempus, Cephalea. Siccitas uehementem dolorem non infert, quia non sit confertim: nec proinde melancholia, nisi à bile flaua adusta, uel bile mixta, uel spiritu distendente. Neque humiditas, nisi ob copiam, ut pituitæ frigide, quæ noctu potissimum infestat, facileq; propriis signis pituitam significantibus discernitur. Distentio cum grauitate & pulsu, sanguinis copiam: sine grauitate, bilem demonstrat ceteris tamen perpensis, ut uictu præ-

*si dolor capitis  
incipiat de febre  
et permanet  
quasi signum fuit.*




precedente, temperamento, regione, ætate, anni constitutione. A calore uehementissimi sunt dolores, sed breuiores: à frigore minus subiti & diuturniores: ab ossis carie, uermibus, scorpione, subiecto pure, angusto loco comprehenduntur. Postrima consideratio, an per consensum fiat. Cuius hæc sunt signa uniuersa. Si nulla euidentis causa antegressa fuerit: si frequenter repetat: si cum alterius partis affectu inualescat & eo sublato leuetur: denique si uel totius corporis plenitudo & cacochimia sit, uel partis alicuius uitium præcesserit. Modus autem huius communicationis, siue consensus duplex. Nam partes inferiores uel ad caput aliquid transmittunt, ut uaporem aut humorem: uel sola connexionem, & quasi contagione quadam cerebrum afficiunt. Ex uentriculi tunicis externis ac sinu, fumi efferuntur ad caput per neruorum rectitudinem, & per œsophagum, cuius signa sunt, crudititas, antecedēs, ebrietas, cibi corruptela, dolor, nausea, oris amaritudo. Ab utero fit post mensium retentionem, aut seminis putrescentis, aut si qua sit illic humorum perturbatio. Tunc dolor in occipite percipitur, uel illic incæpit, præsertim nulla materiæ translatione facta, propter consensum uteri cum cerebro per spinalem medullam, cui robustis uinculis connectitur. A iecore magis per uenam cauam: a liene per arteriam magnam fit materiæ ad caput translatio. Sed an à bile in dextrum latus, à melancholia in sinistrum dolor decumbat, controuersum est: cum & uena caua & arteria magna à iugulo in utrumque latus traducant ramos, ut nulla ratio adferri queat, præter rectitudinem, cur in hanc potius, quàm in alteram partem dolor inuadat, cum tamen rectitudo parum momenti habeat in his, quæ per uias communes transferuntur. Sed dolor frequentius synciput præhendit multis de causis. Nam illic panniculorum partes suturis interseruntur, & uasa, arteria, præsertim, ac materia omnis seu uapor eò peruenit, suturæ raræ, craneum tenuissimum, & fistulosum, tenuium uasorum copia. Vnde fit, ut semper fere illic incipiat sudor. Atque hæc in uniuersum dicta sint de causis & signis doloris capitis.

Do-



# DE MORBIS INTERNIS





*In omnibus capitis doloribus commune est, ut in principio parti repellentia admoneantur: in decremento, digerentia: in fine declinationis, roborantia.*

Vbi intolerabilis dolor est. Cornelius Celsus tantum in dolore intolerabili uenam aperit. Sed citra hunc, in propositis conditionibus etiam secanda est. A quacunque autem causa dolor excitetur, si uehementia urgeat, duabus de causis uena tunditur. Una, quod uix dolor tantus esse queat sine materia calida: altera, quia metus est inflammationis, & resolutionis spirituum. In dolore quoque à bile emittitur sanguis, non ad uacuationem sed uentilationem. In quo si Phrenitidis metus sit, uenae sub lingua aperiantur: uel cucurbitulae ad humeros, aut collum applicentur cum scarificatione: uel fiant ligaturae; & frictiones in extremis partibus, potissimum carpo & pedio. In uaporibus denique discutiendis ligatio colli, & ducta manus sursum, ut uis spiritus, caloris & sanguinis cogatur in caput, & ita uapor tenuetur, & discutiatur. Vbi cum febre dolor inuadit, liberior phlebotomia.

Eam tamen eligito, &c. In diuersione non est eligenda uena partis dolentis, sed uena frontis secanda, potissimum si posterior pars capitis doleat. Sin anterior, & exigua sit quantitas materiae, secatur, quae est inter spatulus.

Arteriotomia. Arteriae sectio remedium est singulare in omni dolore pulsatili, ut Rasis docet: sed periculosum, quia Chyrurgis minus usitatum. Debet autem arteria scindi e directo partis affecte, & in principio ad maximam sanguinis copiam. In quo uidendum, num per maiores & internas arterias uapor efferatur. Sic enim nihil conferet, ut ex cap. 8. lib. 3. de locis affectis perspicuum est. Huius loco applicatur cauterium actuale in media parte capitis prope suturas. Si ignem refugiant, applicetur potentiale, Synapismi, Dropaces, Capitella ex aluta, inducta emplastris conuenientibus.

Sanguinem è naribus irritamus. Hoc fit nares frequenter scalpando, setis quoque, & folio arundinis, aut festuca, aut herbis quibusdam aculeatis, aut asperis uenas narium irritando ad hemorrhagiam, aut sanguisuga pinnis narium affiguntur. Sin neque his prodeat, cucurbitulae cum scarificatione



## DE MORBIS INTERNIS

catione admoveantur, ut præcipit.

**Cucurbitulæ.** Cauendum, ne ager facile paralyfi capiat in partibus, quæ nervos accipiunt à loco ubi debent cucurbitulæ applicari.

**Ante Phlebotomiam leui phar.** Hoc fit, ne eduotione sanguinis excrementa uentriculi & intestinorum in uenas rapiantur. Sed horum loco, clysteribus (& tutius, propter cassiam, quæ cerebrum fumis replet) ante sanguinis missionem uti possumus, emollientibus & detergentibus, si sine febre: infrigidantibus, si cum febre dolor sit, præsertim: cum resistit aluus. Sæpe enim uaporibus sursum latis suppressa aluo, dolor commouetur: clystere iniecto, sedatur. Sin perseveret, uenam secato. Cæterum, hæc minoratiua dantur per quadrantem horæ, aut etiam per horam ante prandium: tunc ut cibi gravitate mittantur deorsum: tum ut fumos arceant, qui e cibo feruntur ad caput. Contra fit, cum caput purgandum nobis proponimus, ut pillulis. Exhibetur enim quatuor horis post cœnam, ut medicamentorum uis simul cum alimentis uapore ducatur ad caput. Ad diminutionem uerò materiæ pillulæ leues dantur tribus horis ante cœnam.

**Rhabarbarum, Manna, &c.** Rhab. fumosum est admodum: ob id minus conuenit, nisi infundatur in aqua endiuie, uel uiolearum. Ab Hyera auferenda sunt aromata, ut crocus, quia caput tentando, augent dolorem, ut Gal. docet de compositione hyeræ agens. Idem fiat in Syrupo de stecade. Manna facile bilefcit in ualde biliosis. Minus nocent odorata, cum ualde laxantibus miscentur, quia non diu retinentur in corpore. Aromata adduntur, quia roborant, & teuitate partium inuant medicamentorum penetrationem.

**Pillulæ.** In affectibus siccis melius purgabitur materia bolo, uel potius medicamenti humidis & liquidis, quia pillulæ omnes calide sunt & siccæ, saltē ob aloem, proinde quæ maiorem inducunt alterationem.

**Phlebotomia, ut prius.** In crassis & uisidissimis humoribus ac materia frigida, metuenda est uenæ sectio. Si tamen uenæ tument, & sanguis abundat, cæteraq; concurrunt, poterit fieri, dato ante clystere ad diuersionem. Sin minus, à clystere



flere incipiendum, qui materiam discutiat, incidat, alteret, & euacuet. deinde leui medicamento utendum. ne cruda materia agitetur, ut pillulis leuioribus, de hyera simplici, agar. tro. cum oxymelite simplici, paulatim progrediendo ad fortiora, nisi grauiora symptomata statim extremis remediis cogant uti.

R. Stecados. Flores anihos, stecados, chamomile in omnibus capitis doloribus valent, etiam in materia calida. Nā mirificè roborant cerebrum. In declinatione tamen ponuntur potius, & repressa fluxione.

Calidiores syripi. Leuioribus ergo antè est utendum, ut mell. ros. syr. capill. uen. de bizantiis, acetos. simpl. & composito. Deinde de hyssopo, de prasfio, de a coro, de stech. &c.

R. graminis petro. In affectu melancholico parum cōueniunt hæc diuretica, quòd humor melancholicus per urinas uacuari nequeat, cum splen nullum habeat consensum cum renibus per uiam communem, nisi addantur ad incisionem & attenuationem. Sed tunc sufficient semina anisi, fœniculi, apii ad. 3. s.

In aqua frigidissima. Celsus scribit nihil equè prodesse capiti, atque aquam frigidam: adeo ut cum, cui caput infirmum est, iubeat per æstatem id bene largo canali quotidie aliquandiu subicere. Observatum quoque ab auctore, quendam, cum 40. annos laborasset emicranea, frustra aliis auxilijs adhibitis, consilio Medici frigida sæpius lauasse frontem, atque inde persanatum, nisi quod materia deriuata in æsophagū & illic concrescens, prohibebat deglutionē. Quia tamen cerebrū frigidum est, & mēbrū princeps, à frigidissimis metuendū, aut cum summo iudicio utendum. Ceterum topica, quæ repellunt, tepida admoventur, ubi materia frigidior & crudior: frigida, ubi materia calida & biliosa.

De diuturnis capitis doloribus.

Cap. II.

**I**N diuturnis capitis doloribus intemperies causa est uel solutio continui. Intemperies, ut dictum est, sine materia, quæ ubi firmata est, egerimè curatur, uel cum materia,



# DE MORBIS INTERNIS

materia. Atque hæc ferè frigidus uapor & flatus, uel materia crassa est & frigida. Flatus aliquando ex inopia caloris & materia alimenti: aliquando alimenti uitio; nunquam uitio pituitæ crassæ & uiscidæ, quæ membranis inhærescit, unde uehemens distentio membranarū, ut inde futuræ relaxentur. Atque hic sensus primū frigoris, quanquam aliquando agitatione materiæ & putredine calor succendatur, ubi iam febris, & aliquando inflammatio succedit. Sed sine his, quasi maleolis obtusis, acutis, feriantur, dolent. Rarius arteriarum uitio & bilis permixtæ flatibus, aut aliis de causis. Ex signis iā dictis, antecedente uita, temperamento tum totius corporis tum præcipuè capitis: deinde etiam uiscerum & aliis de causis requirendum.

Iam diuturno & contumaci morbo caput tondatur aut radatur ad cutem: tum fortioribus utemur remediis, quale est oleum de castoreo, & euphorbio, quod confici oportet ex lib. j. olei de Keiri, & un. s. euphorbii, uel castorei, quale hoc est.

R. ol. de Keiri lib. s. ceræ unc. i. s. liquefiant in uase duplici, deinde insperge euphorbii 3. 2. plus minùsve.

Oppugnandus quoque morbus est Masticatoriis, Apophlegmatismis, Caputpurgiis, Errhinis, Pomis odoratis, Sacculis, uel Cucuphis.

## Masticatoria.

R. masticis 3. 2. piperis 3. i. radices capparis 3. s. cum aceto scillitico formantur tres pillulæ, teneat in ore & mandat. Idem facit illud.

R. staphysagriæ puluerisatæ, conditi an. 3. 2. excipiantur melle, teneantur in ore. Aliud.

R. piretri, staphysagriæ an. scrup. 2. liquiritæ scrup. i. masticis 3. i. fiant pillulæ.

## Apophlegmatismi.

R. sinapi unc. s. hyssopi. P. 2. fiat decoctio in uino rubro cum modico melle, fiat gargarismus.

## Errhina.

Errhinum caputpurgium fit ex succo, uel aqua maioranæ



ioranæ, betæ, anagallidis, cucumeris agrestis, adiecto pipere, castoreo, euphorbio, elaterio, heleboro, conditi gallia muscata, piretro, pane porcino, sinapi, molco. Succi itaque tepidi & excepti uola manus naribus attrahantur. Pulueres insufflentur in nares, aut alicui oleo commixti illinuntur, ut oleo de costo, de spica, irino, & simili. Delicatis additur modicum musci, aut ambræ, quale hoc est.

R. succi maioranæ unc. 2. succi betæ unc. 1. aceti scyllitici unc. s. misce, fiat errhinum, attrahat tepidum naribus. Aliud.

R. piperis, castorei an. scrup. 1. helebori, galliæ muscatæ an. scrup. s. fiat puluis. Modicum insuffletur in nares. Aliud.

R. olei de spica unc. 1. elaterii 3. 1. in diuitibus adde mosci gr. 2. illinantur nares interiores.

*Pomum odoratum.*

R. Cinamomi, garyophilorum, nucis moscatæ, ligni aloes, pulu. maioranæ, an. 3. 2. galliæ muscatæ 3. 1. mosci, ambræ an. gr. 2. fiat puluis omnium: deinde cum ladano & mastice agitatis in mortario cum modico oleo de spica, de costo, de ben, fiat pomum.

*Cucupha.*

R. sem. cumini, & sen. baccarum lauri an. 3. 2. nucis moscatæ, cinamomi, garyoph. an. 3. 1. galliæ muscatæ, mastichis, sandaracæ an. scrup. 2. Fiat puluis omnium pro Cucupha facta cum rasura scarlatæ. Extrema remedia sunt raso capillo Sinapismi, Dropaces, Phenigmi, Cauteria, & Paracentesis. De quibus alio loco.

*Curatio sodæ per communitatem.*

R. aloes optimi 3. 1. cina. xylobalsami, asari, spicæ nardi, mastichis an. gr. 6. croci gr. 4. fiat puluis, detur cū unc. 3. aut 4. aquæ, aut seri lactis.

Proportio aloes est centum ad sex. In delicatioribus uero, loco aloes, debemus imperare scrup. 4. Rhabbari.



## SCHOLIA.

**Masticatoria.** Pituitam purgant ex attrahentibus parata, ut piretro, staphisagria, cubebis &c. Digerunt ex resiccantibus magis, quàm calfacientibus, ut mastiche, uice moscata &c. Modus utendi est, ut sacculis reponantur, aut excipiantur ficibus, cera alba, aut uino incocta contineantur ore, aut per se sumantur. Nocent, si fuerint ulcera in ore, uel faucibus, uel pulmones oportuni ulceri, phlegmoni, fluxioni. Tunc errhina commodiora, quæ materiam deducant ad nares. Nam etiam si humor illeclus è capite, uel mungendo, uel expuendo repurgetur, fit tamen humori consuetum iter, & noctu inter dormiendum ad partes infirmas delabitur. Tempus utendi matutinum, & ante cibum.

**Errhina.** Sicca ex acri materia fiunt, elaterio, pipere, synapi, elleboro, melanthio, ciclamine, maiorana sicca, pyrethro, hyssopo, thimo, satureia, anagallide, & similibus. Liquida ex iisdem exsuccatis, uel liquore mixtis, succo betæ, foliorum hederæ, quibus & arida permiscuntur. Sicca insufflantur corniculo, uel fistula, uel inspirando trahuntur, uel excepta oleo illinuntur, uel ex aceto, aqua maiorana, hyssopi, aqua uite, innoluta lini theolo raro in formam noduli ad mouentur naribus. Liquida attrahuntur tepidè. Efficacissima sunt, addito scammono & farina excepta, ut adhæreant. Post horum usum, si mordicatio percipiatur, lac muliebre in nares iniiciendum, uel oleum uiolatum. Tempus utendi matutinum, longè à cibo: à balneo, uel aliter laxata cute. Ab imbecillioribus paulatim transeundum ad fortiora, ut euphorbium, elaterium, lacte, mucaginibus, butyro prius temperata. Nocent oculis imbecillioribus, & iam laborantibus, atque ubi nasus opportunus est ulceribus, ut aliquando in lue uenerea. Tum satius gargarismatis uti, quæ ab oculis diuertunt. Sternutatoria nocent in defluxione ad pulmones inuant, quibus caput uaporibus repletum est, & quibus iam tenuata, incisa, & incocta est materia.

**Cucupha.** Pulvis capiti inspersus commodior. Executi-

tur,



# LIBER I.

tur, & nouus manè reponitur. Cucupha semper eadem adhibetur, & sudore ac pinguedine imbuta, sæpius nocent. Sunt tamen loco pilei.

De dolore capitis ab ebrietate.

Cap. III.

**E**brietas grauissima adfert symptomata, eaq; partim subitanea, partim longuo tempore contracta, quale illud est annotatum ab Hippocrate, Si quis ebrius repente obmutuerit, &c. & quæ a Galeno annotata sunt, c. 5. li. 5. de locis affectis, Epilepsiæ, Dementiæ, Conuulsiones. Si dolor capitis solius, a crapula hesterni motus, & crudum uinum in stomacho restiterit, uomitus, aut malè uomētibus, uentriculi a foras, remedio ē. Vbi uacuus b uēter est, & tamē c uaporibus dolor commouetur, non sine ratione uulgò persuasum, uini noxam uini potu elui, quia inde uapores crassi disperguntur eo modo, quo dolore oculorum inde ortos scripsit Hippocrates d meraca potione discuti. Somnus, inedia, quies, optima: cibi euchyimi, qui facilè coquantur, e gallorum testes in aqua hordei cocti, pulli collumbarum, pisces saxatiles & molli carne. Ebrietati naturali quadam proprietate repugnant amigdala amara, brassica, cuius meminuit Theophrastus quarto de historia stirpium.

## SCHOLIA.

Κραπήλη Hippocrati dicitur hæc affectio, nostris crapula, omnis nimirum noxa ē uino contracta præsertim in cerebro, ἀπὸ τοῦ κα'ρηονπαλλισθαί. Nec mirum grauisima symptomata uini immoderata potione induci. Cum enim sit temperatura calidum, substantia tenuis, uel non admodum crassa, utroque sursum repit: tenuitate promptè omnia pene trahit, & in substantiam neruorum ingreditur, ac uaporibus caput & cruditatibus replet, unde uniuersum corpus necesse est uariè affici. Sed quomodo uini noxam, eiusdem potio per sanat? Nimirum quæ mala suæ substantiæ tenuis copia inuexit, eadem sua qualitate tollit calefaciendo et exiccando. Simulas, periculosa omnia subsequuntur.

De dolore capitis a perfrictione. Cap. II.

**N**on concidit facies, sed est f decolor, tardior, mēs, & animæ g functiones, frigidis nō iuuātur, sed calidis.

B Calc-

a Vt extra

dice cypri,

acoro uerò,

carioph. ab

synth. men-

tha origan.

fiat saccu-

lus uentricu

lo admonen

mus.

b Vomito

ne & foru.

c Hi cum

exitum non

hēant, distē

tione dolo-

rem pariūt.

d Sec. 6. li.

2. Epidem.

e Gallorum

testes nō sūt

neterū: sunt

enim uirosi

& effæti.

f Nā quæ

sunt propin

qua & uici

na, itemq;

cōia, ea pri

mum et ma

xime affici

solent Hip.

lib. de hu-

mior.

g Natura-

les, anima-

les.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Datur Calefaciūt oleum rutaceum, irinum de spica, de there-  
 theriace ad binthina, costinum, quibus hyeme rigida, & ubi calore  
 magnitudi maiore opus est, stiracem calamitam, benioinū, euphor-  
 nē auellane bium, aquam uite, mithridatium, *a* theriacā, & similia  
 hora sōni . permiscemus. Affectu perseverante, raditur caput, aut  
**b** De his ca. detunditur, paulo crassiora medicamēta, quam in aestu  
 s. li. 3. Insti adhibentur: sed tonsis, & capillo pauco, aliquo tamē te-  
 tut. Chir. ctis, liquidiora. Ceratum *δ'α' ε'υφ'ορ'ε'ι'ο'υ*, ex olei anethi  
**c** Cū uni- un. x. tribus ceræ, una euphorbij. *b* Sinapismus, capitel  
 versale, tū la, diachylum ireatum, & similia conueniunt. Non est  
 particulare utendum phlebotomia, cucurbitulis, remedijs luis ue-  
 idq; ex ce- nerea, ubi sola intemperies est. Alimenta, uinum tenue  
 phalicis. cibus calidus, *c* balneum, motus, loci calidi habitatio,  
**d** Hic oleo odor suauis, calidus, *d* illitus narium, auris frictio.

## SCHOLIA.

*De hoc dolore à frigore, lege Aurelianum primo Chron.*  
**e** Siue per Rarò huiusmodi dolores ex sola intemperie fiunt, & si fiant,  
 idiopathiā breui materiam accumulanti, præsertim in plenitudine labo-  
 cerebri, siue rantibus, & caccohymis. *De vertigine. Cap. IIII.*  
 per sympa- *δ'ι'ο'ς* Græcis, uertigo, nobis, quum caput *e* circūagi ui-  
 thiam. detur. Scotodinos, cum ēt, tenebræ focolis offundūtur,  
**f** Quod fit aut spectra *g* rubētia, quæ denuntiant *h* Maniam: aut ru-  
 translata bore saturata, quæ Epilepsiam, ex inordinato motu spi-  
 ad neruum rituum & flatuum. Hæc omnia aliquando gignuntur in  
 opticum ma capite: aliquādo ex *i* inferioribus partibus corporis hu-  
 teriā. iusmodi spiritus efferuntur. Quod iis fere cōtingit, qui  
**g** Inflāma- cruditates colligunt: quibus sæpius hepar calidius est:  
 tis spiritib. quibus ex hepate in uētrē regurgitat *k* bilis: quibus ar-  
 ab aestu, & teriosum genus intemperatū est, plenum feruido & spi-  
 incādescen- rituoso *l* sanguine. Si in capite primum generatur malū  
 te sāguine. iisdē remedijs utitor pro uarietate materiæ, quæ in do-  
**h** Modò lore capitis descripta sunt. Si ab arteriis arteriæ post au-  
 nulla ptur- res incidantur. Si à cruditate, ea concoquatur & tempe-  
 rationis cri rantior  
 rice excusatio possit adferri. Tun enim ad salutem hæmorrhagiam por-  
 tendunt. *1* Vt à pulmonibus & uentriculo: quæ tamen cardiogmo distin-  
 guuntur. *k* Quæ cardiogmum committit. ex aph, 17: lib. 4. *1* Cuius in-  
 ordinatum motum marmarjga sequuntur.







## DE MORBIS INTERNIS

**a** Si modo becillitate, qui uapores secernit, secreto dissoluere nequit. Ali  
phrenitis cu quando humor illic prauus acervatur, uel genitus, uel alium  
rationē pos de accitus, uel cibus corruptus continetur. Idem fit ab aliis  
sit recipere, uiscerib. hepate, liene, utero, toto corpore, excrementis retenu  
ut nec repē- tis, hamorrhoidibus suppressis. Primario caput affici conici  
re phreniti- mus, si sensus externi sensim leduntur, si in nulla parte infe  
dis paroxys- riore uitium præcesit. Ab impuro corpore, cerebro infirmo, si  
mus ex diu coctionis tempore, & cum à somno surgunt, uehementius  
turna gene uertuntur tenuis urina, pauca, albus dura, color cuti, similis  
ratione abo humori. A uentriculo, si nausea, deiecta appetentia, stoma  
riatur: nec chi dolor, & similia præcesserint. Curatio perficitur sublati  
phreniticus causis per contraria: sanguinis missione (si cōueniat) e cepha  
sit tremulus lica, uel mediana, uel basilica ex arteriis post aures: caute  
aut et fana rio. In uaporib. a materia calida primum digerendo, deinde  
ticus, cū al uacuando, postea astringendo, uapores prohibendo pulueri  
u excremen bus, opiatu similibus: per topica discutiendo, roborando: ieiun  
tis biliose i nos reficiendo optimis alimentis, & citò nutrientibus. Nocet  
etura exper caput frictio, nisi post purgationem, uel aliaru partium fri  
ctibus, & im ctionem. In capite fiat panno sicco, partib. inferiorib. calido.  
pedimento Spectra rubentia) Hippocrati, & Aureliano μαρμαρυ-  
partu, qua uai dicuntur λαμπρόν τινυαί πυράδης, spectra rubra  
rum officio oculis obseruantia, è quibus de humore peccante coniecturā  
uita carere facimus. Alius ἀμαρυαί, ἢ μαρμαρυαί. Est autem facilis  
nequit. transitus uertiginis ad Epilepsiam, unde & ueteres paruam  
**b** Sine ullo Epilepsiam uocauerunt.

infirmi-  
tatis  
metu.

De phrenitide. Cap. V.

**P**hreniticos ita a curabis. Viribus integris **b** sanguinē  
**c** Ad cau- detrahes e c cephalica (nisi plenitudo d adsit, alioqui  
sa conuēla .n. oporteret e prius secare iecorariam) angusto f forami  
remotionē, ne, ut uulnus celerius coalescat. Quod etiam fideliter  
& antece- ligabis, aut g pice obduces, ne temeritate phrenitici dif  
dentis aur soluatur, & ita prorumpat sanguis. Obseruandum tem  
sionem. pus, quo minus furere uideatur. Ministris quoque opus  
**d** Vniuersi est, qui phreniticum contineant: alioqui periculum, ne  
f. corporis, agitatione corporis uena phlebotomum eludat, aut am  
ad uasa.

**e** Nisi etiam symptoma prohiberet. f Ne ampla fiat spirituum dissipatio.  
; Vel linaminto ex aloë, albumine oui & pilis leporum confectio.



prior adigatur plaga, uel locusturpiter laceretur. Detrahatur pro uiribus, uitato animi deliquio. Paulus in iis, qui nimium corpus agitant, uenam in fronte, alii uenâ nasi. Diocles uenam sub lingua diuidit. Nonnulli sanguisugas fronti, temporibus, naso, caluariæ infigunt. Sunt qui auriculas scarificent. Sed hæc omnia non nisi progressio morbo & uacuato corpore tempestiua sunt.

De aere, ubi collocentur, iâ olim disputatum est. Antiqui ferè tales ægrotos in tenebris continebant, tum quia in luce spiritus agitati furorem exasperarent: tenebras quoq; ad somnum & quietem conducere existimabant. Asclepiades phreneticos in lumine esse habendos dixit, quia tenebræ terreant, quia lucido loco sensus occupantur, atq; interim mens quiescat. In tenebris uerò quietis sensibus, mens altis cogitationibus & uisis sese exagitat. Sed hoc fere Græcis & Latinis placuit, ut qui luce offenditur a habeatur in tenebris, aut mediocri luce collocetur: quem tenebræ lædunt, in luce collocato: qui utroque pariter offendit, mediocri luci habeatur. Et si uires ualent, lucido magis, si infirmæ, magis tenebroso iuuatur. Hæ & alia plura apud Celsum & Aulianum de morbis acutis.

Fuit & alia controuersia de tondendis, aut radendis Phreneticis, Asclepiades radi noluit, nec etiam tondi, quia, uidelicet, raso capillo aut detonso copiosior materia in caput attollitur, unde capilli fruticant magis, & seges detonsa uberius prouenit. Itaque cum oporteat materiam a capite reuelli, non in caput attrahi, non erunt tondendi. Hoc uerò reliquis omnibus Medicis placuit. Tondendi phrenetici (*Ab initio*) radendi etiam, nisi prohibeat frigus, remissionis tempore, longius a cibo. Sic enim remedia commodius adhibentur, caput leuatur onere, & fumi facilius digeruntur. Missio sanguine molliusculis clysteribus (*Cauendo à calidis ut hyemalibus, bene dicta*) utemur, interim etiam acriusculis, & maxime si phlebotomia omissa est, qualis hic est.

R. decoctionis fursurum libr. i. In qua dissolue cathol. drach. 6. sacch. rub. mellis ros. collati an. unc. i. ol.

B 3 uiolati

a Spiritus  
dissipatio-  
ne, et humo-  
ris biliosi or-  
gasmo.

b Ad arcen-  
dam mate-  
riam, infrin-  
gendam et di-  
gerendam.

c Ad renul-  
sionem bilis  
Talis autem

clyster impe-  
dari poterit

R. decoct. la-  
ctis. plantag.

nenuph. pa-  
riet. alibea-

lib. i. in qua  
dissolue ca-

tholi. dr. 6.  
mel. ros. co-

lati, sacch.  
alb. an. unc.

i. ol. uiol.  
unc. 3. sal.

cōm. dra. ij.  
fiat clyster.



## DE MORBIS INTERNIS

**a** Hæc pur- uiolati unc. 3. lalis communis drag. 2. Imperandæ etiā  
gatio aptè a purgationes leues (Et in pauca quantitate, ne calfaciant  
præscribe- & agitent humores.) quales descriptæ sunt in dolore ca  
iur. R. fol. pitis ab humore bilioso, aut hæ.

end. siario. R. succi granatorum acidorum, & dulcium an. unc. i.  
scab. acctos. s. sacchari in aqua endiuivæ dissol. dr. 6. fiat potus, uel.  
flor. trium R. succi ros. unc. 2. sacchari similiter dissol. dr. 6. leui-  
cordial. an ter ferueant in calidis cineribus. Opulentos adhibitis  
P. i. tamar- ministris continebis, aut etiam uinculis colligabis, ut  
rind. pas- pauperes. Vincula enim utilia sunt, quia motum reti-  
sul. munda. nent, & materiam à capite reuellunt.

polyp. quer  
nian. dr. 3.

### Topica.

Vitandus assiduus refrigerantium usus ne in Lethar  
sem. aceto. gum commutetur morbus. Deinde quia constringunt  
melon. cu- poros, unde sumi in capite retinentur. Licebit uti ijs,  
curb. an. dr. quæ in capitis dolore calido descripta sunt. Primū qui-  
i. si. decoct. dem repellētibus: deinde ijs erit admiscendum aliquid  
in qua infu chamomelini olei. (Cum succo apij ad resoluendum, uel  
derheielect. fortiore, ut calam. origani, in declinatione) Licebit etiam  
dr. i. santal. uti in declinatione boieo, in quo serpillum & alia eius  
citr. scrup. modi coxerint, ut concilietur somnus. Hordeata paren  
i. In expres tur ex aqua decocti quatuor seminum frigidorum. Per  
so dissol. ca. fundatur caput & facies, abluantur pedes & manus, ex-  
tol. uel cass. cipiatur quoque uapor: hoc modo.

un. s. syrup. R. uiolarum, hordei excorticati, capitum papaueris  
ro. pall. lax. albi, rad. e mandragoræ an. M. j. fiat decoctio in aqua pu  
unc. s. si. po risima. Vbi refrixerit facies ægri, inde abluantur pedes  
tio. quoque manus. Deinde sponsia immersa in his, id est,  
b Ad dige. in decocto, subinde naribus admoueat.

rendum. Iuscula cū capite uno papaueris albi coquantur, mul  
c Mascula. ta lactuca alterentur, uel hoc nodulo.

R. quatuor sem. frigidorū maiorum, papa. albi an. dr.  
s. fiat nodulus, qui iponatur i iusculis. Utatur cichorio,  
& lactuca, elixis, & modico saccharo uiolato cōlperfis.

### Frontalia.

R. ol. ros. unc. j. aceti drac. ii. populeonis (Ad somnum  
Sed recens esse debet, quia antiquum calfacit) dr. ii. misce p  
frōtali. Oleū, in quo uina torpedo exticta sit, ac deinde  
coxit



coxerit, in quo lactuca coxerit, folia aut capita papaue-  
ris recentis, a oleum uiolatum, de nenuphare, de papa a *Succi p4*  
uere, de mandragora, de cucurbitula. Quale hoc est. *paueris ni-*

R. olei de mandrag. uel de aliquo alio ex supra dictis gri. *Ceterū*  
unc. ii. populeonis. unc. s. aceti drag. ii. Agitentur & mi *hac adbiben*  
sceantur pro frontali. Aliud fortius. *tur, quum*

R. a opii, croci an scrup. i. distēperentur in uini albi, *symptoma-*  
& aquæ ros. an. dr. i. cum linteolo in eo madefacto fiat *tum summa*  
frontale. Conciliato somno, & experfecto agro, facies *sunt omnia:*  
abluatur decocto cham. aut anethi. Non utendum som-  
niferis, quæ intro sumuntur, nisi uires ualeant: alioqui  
horum usu languidus calor extinguitur.

*Potio ad somnum.*

R. syrup. de nenuph. syrup. de papa. an. dr. vi. decocti  
lactucæ, unc. ii. fiat potus. detur hora somni. Alia.

R. lactucarum P. i. b dactilos N. iii. caput unum papa-  
ueris albi, fiat decoctio ad unc. iiii. In quibus dissol. sy *b Dactyli*  
rup. c ros. unc. i. s. misce, detur hora somni. *phreniticis*

R. ros. uiolarum, absinthij an. unc. s. opii. gr. i. simul *nō exhiben*  
mixta leuiter bulliant, collentur cū unc. 4. iusculi pulli, *di, quod ua*  
sorbeat. Nimiū sopitos his remediis ita excitabis. *poribus ca-*

R. succi. rad. scēn. unc. ii. s. aceti albi, in quo nux mu- *put oppleāt.*  
scata coxerit. unc. i. s. cum spongia ex aqua hyssopi ex- *c De siccis*  
pressa, & rursus madefacta in supra dicto succo, fiat er- *uulgò dicti:*  
rhinū, attrahatur naribus. In eūdem usum pulegiū aut  
hyssopusteritur, & ex aceto naribus admouetur.

### SCHOLIA.

*Mania & Melancholia, deliria sunt sine febre: Phreni-*  
*tis & παραφρεσύν cum febre. Hæ duæ species distinguuntur*  
*continuitate. Nam παραφρεσύν symptoma est in statu fe-*  
*brium ardentium, tum quibus incandescit, & remittitur.*  
*Phrenitis uero morbus est continuus, febrim, & mentis per-*  
*turbationem inducens. Hipocrati tamen interdum Phreni-*  
*tici dicuntur, quibuscunque mens oblata est. Causa duplex*  
*una à bile naturali, idest tenuiore sanguine ad cerebri*  
*menyngas affluente, & in illis inflammationem, uel etiam*  
*in cerebro ob exitum è uasis, angustio loco coarctationem.*  
*& prohibitā trāspirationem, procreante, uel feruente dum*

B 4 taxat;



# DE MORBIS INTERNIS

taxat, unde Hippocrati deliria securiora cum risu. Altera a bile non naturali, id est, acri & adusta, quæ quò acrior est, & adusta magis, eo seuiora & periculosiora accidentia inuehit. Signa patognomica sunt, febris, delirium, continuus. Curatur primum clysmate molliente & alterante, si & per morbi seuitiam, & agri morositatem liceat: sectione cephalica, ut eius loco, cucurbitulis humeris & natibus cum scarificatione admotis, aut sectione uenæ sub lingua, materia fluxu te: in statu, uenæ frontis. Topicis initio repellentibus, deinde uersi corporis admixtis paulatim resoluentibus, purgatione bilis, potioribus priuationibus cordi accommodatis in uirium imbecillitate, sed in bile ne: quæ sit, adusta humectantibus & melancholico humori propriis, aliquum spūs uo perpetuò humectata, urina prouocatione (si retenta sit) aialis cere per admoti non calfacientia.

**De motu p** Ol. de papauere, de mandragora) His cō iudicio uten-  
habetur, & dum, ne cerebro natura frigido noxa inferatur, idq; in mini-  
utalis adi ma dosi, & in principio aut uigiliis. Temperari possunt mulie-  
tu è corde ris lacte puellæ lactatis, qd frigidiusculū ē. Possunt quoq;  
ad cerebrū. pānos succis intingere, uel aquis in hyeme, & admonere frō  
**b** Si modo ti, qui remouendi sunt, ubi incaluerint, & sæpius repetendi.  
apoplexia Potest etiam è tritici farina sola cum succo & oleo uolatū  
fortis non fieri cataplasma, & fronti applicari non dormientium.  
sit, sed debi Syrupi de papa.) His quoque non utemur nisi coacti, &  
lis. Est. n. in firmis uiribus. Cum enim frigidissimi sint, de caloris natui  
sanabilis va extinctione periculum imminet. Ad uirium robur & confer-  
lida apople uationem addantur syrupus uolatus, pulueres cordiales, ut  
xia. de gemmis, diamargariton frigidum, aquæ buglossæ, borragi  
**c** Dura fri nis, & in bile adusta, puluerum loco, confectio alchermes in-  
ctione, um- minima dosi pro imbecillitate uirium, & extra uentis fluxū.  
culis quoq; **Opii)** Fusus opis in pueris, mulieribus, mollioribus pericu-  
dolorificis, losus est: in robustioribus minus: assuetis, ut quarundam ra-  
ut concretigionum incolis, nullo modo, etiam si per os sumatur. Vidimus  
humores fu enim ab Hispano in summo aestu semiunciam sine noxa deuo-  
dantur, ac ratam. In dolore capitis, non croco, qui molestiam auget, sed  
spūs anima nuce moscata, debet corrigi.

lis exitu ha-  
beat, utalis  
aditum.

De a Apoplexia. Cap. VI.

**A** Poplecticum b ita curato. Homine agitato, concuti-  
to c fricato. Sæpe. n. similes apoplecticis cōcidūt ex  
leui



Ieni obstructione, quæ agitatione corporis discutitur. a *Ac præ-*  
 Ea obstructio a crassis uaporibus esse potest, uel quia *sertim u, q*  
 pauca materia est, quæ obstruit. Similis quoque Apo- *breuiore et*  
 plecticis a sunt, qui Apoplectici & Cataleptici uerius *crassiores ut*  
 dicentur, ex plenitudine totius corporis uel capitis, un *collo, quib.*  
 de uia spirituales intercipiuntur. Quibus uena brachii *uitalis spūs*  
 interna quidem, si totius corporis plenitudo est, cepha *aditu ad ce*  
 lica, si tantum capitis, statim *b* aperienda est. Hoc enim *rebrum pro*  
 remedium sæpe satis est. Eiusmodi historia est apud *libetur.*

Aerium, capite de Catalepsi. Iuuenis quidam multi san *b Nā apho*  
 guinis derepentē mutus factus est. Tres dies integros *niā sine fe-*  
 ita iacuit: quarto die multo profuuiio sanguinis è nari- *bre uenæ se*  
 bus liberatus est. Aphonian Græci affectum eum uo- *ctio soluit.*  
 cant. In apoplexia, quam frigidus & crassus humor ex- *sect. 5. li. 2.*  
 citat, priuatione motus & sensus, ac prope extincta re- *Epidem.*

ctrice anima, hominem c loco lucido & tepido coloca- *c Ut splen*  
 to, ac corpus uehementius concutito. Tum *d* multa fri- *dore lucis*  
 ctio conuenit, unctio ex oleo calente, & maximè earum *materia fo*  
 partium, quæ magis refrixerint. In Phlebotomia, quæ *ras euocet.*

uel hominem liberat, uel occidit, ita te gerito. Si nihil *d Ad exci*  
 e repugnat, præparato prius *f* corpore, & *g* in tempore *tandam na*  
 uenam cephalicam incidito: parum detrahito. Post ali- *turæ uim, li*  
 quot horas, si perseueret malum, alteram cephalicam *eranda ob*  
 uulnerato, nec ita multum sanguinis detrahito. Hæc *structa &*

uero repugnant, quòd aliquando immodica uenere, aut *preparādā*  
 alia quauis spirituum inanitione uirtus corporis exau- *materiam.*

sta est. Hic scarificatione, cucurbitulis, sanguisugis to *e Ut effæte*  
 to corpore fixis contentus esto quemadmodum in obe- *uires nō sint*  
 fis corporibus, mollioribus, & debilioribus: in qui *ut a uenere.*  
 bus uenæ i uel non apparent, uel non ferunt phle- *f Ut clyste*  
 botomum. Preparatur corpus, subducto prius uen- *re acri.*

tre, totius corporis fotu ex oleo calido, chamæmeli- *g Si solius*  
 no, anethino aut simili, asperam *x* frictione, cōcussione *fit cerebri*  
 corporis symptoma.

*h* Effectis a uenere uiribus, phlebotomiæ loco admonenda sunt cum sca-  
 rificatu cucurbitulæ, natis præsertim, ceruici & scapulis.

*i* Propter earum angustiam.

*x* Quæ naturam excitet, & humores fundat.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** *Vel olei* corporis & ambulatu, ut sanguis crassior & frigore cō-  
*de absynth.* gelatus recalescat, attenuetur, & melius affluat, opor-  
**c** *mentha* retque iustum uulnus infligere. alioqui subsistet san-  
*an.unc.3.* guis quanquam non uniuersim, sed interuallis detrahē  
**b** *Balneo* dus sanguis est. Occasio est in remissione, aut quo tem-  
*maria uul-* pore non ingrauescit malum. Remissio intelligitur li-  
*gō nuncu-* beriore, quam antea, respiratione, pulsu meliore, &  
*pato.* ubi partis alicuius torpor cœpit egelari. Alioqui si,  
**c** *Ad arcen* quod sæpe fit, aliter uenam aperias, aut egrum præcipi  
*dos fumos* tabis, aut nihil iuuabis, exitu materiæ negato. A Phle  
*et inhibēdū* botomia spes salutis, si pulsus, respiratio, faciei color,  
*catarrhum.* partium frigus, mens, motus, sensus, omnia, aut ex his  
**d** *Ut i lib.s.* aliqua in melius conuertantur. Alioqui si non accreuit  
*ol. et quar.* malum, ex altera cephalica iteranda sectio est. Quod si  
*i. vini.* ne tum quidem proficitur, desperatur æger. Secta uena  
**e** *Ad exci-* quiescat æger, atq; interim stomacho & uisceribus con-  
*tandā natu* sulamus hoc modo.  
*ra vim.* R. ol. *a* de spica un. 3. mast. unc. i. liquefiāt in *b* uase  
**f** *Qualis es* duplici, & cū ciperi, macis, cina. an. scrup. 2. coralli rub.  
*se poterit ex* scrup. i. misceantur cum rasura scarlatæ, aut gossipio ap-  
*origa. cala-* plicentur calida. Poterit etiam aliquid syrup. *c* rosa-  
*mint. stach.* ti deuorari. Visceribus sic.  
*beton. cha-* R. summitatum absynthii. M. i. sem. carui, cumini an.  
*map. folio-* unc. s. fiat decoctio in olei. & *d* uini an. quantū sufficit.  
*rum lauri* Inde foueatur regio *e* hepatis & lienis. Post hæc clyster  
*an. M. s.* acris iniiciēdus est, ex decoctionis *f* capitalis lib. i. adie-  
**g** *Ex flori-* ctis sem. carui, cumini, baccarum lauri unc. s. Deinde in  
*bus rorisma* decoctione dissolue pul. hieræ picræ, & diacolocynth.  
*rini cōfecti.* an. drag. 3. mellis *g* antofati, sacchari rub. an. unc. i. sa-  
**h** *Vel ruta-* lis drag. 2. *h* olei anethini unc. 3. Sæpe fit, ut *i* resi-  
*cei, dum* stat clyster, aut per os reuomatur: tum fiat tale sup-  
*effœta inte-* positorium.  
*stinorū uis* R. pul. hieræ diacolocynt. dr. 2. castorei, sem. carui,  
*languet.* & rutæ an. scrup. 2. sal gemmæ scrup. 1. cum melle, *q. s.*  
**i** *Motu pe-* fiat suppositorium bene longum. Quod si nec hoc mo-  
*ristaltico et* do aliud quicquam reddit, cucurbitulis utendum est,  
*subsulum* ex libello *d* cucurbitula. Reddito clystere aliquātiſper  
*facto.* quiescat æger. Postero die.

R.



R. pul. hieræ *a* diacolocynth. drag. 2. theriacæ *b* uete *a* Vel sim-  
ris drag. i. dissol. in aquæ uitæ & calendulæ an. unc. i. *plicis.*  
cū cocleari, aut siphone infundatur in gullā. Interim *b* Ut septen-  
quoq; utēdū est remedijs, quæ Apoplecticum excitāt. *nis, exoluta*  
Oleum uitrioli plurimum commendatur. Quod si de *opi vi.*  
est, dissoluantur drag. 2. uitrioli in unc. i. olei de spica,  
de costo, de castorea, de scylla, aut simili, hoc modo.

R. scill. cōcisæ in taleolas unc. 2. castorei unc. s. uitrio-  
li drag. 3. fiat decoctio in olei anethini & uini an. lib. s.  
ad consumptionem uini. Nares & palatum hoc oleo il-  
linantur. Sunt & alia, quæ apud Græcos & arabes inue-  
nias. Potio.

R. cast. scrup. 4. mastich. sem. rutæ, sandali citrini, nu-  
cis moscatæ an. scrup. s. ponantur in manica Hipp. &  
collētur quater. Cum aquæ uitæ & calendulæ an. unc.  
i. s. f. potio, infundantur in gulam.

R. cōf. iris, *c* acori an. unc. s. cōf. salu. unc. 2. diu agitē  
tur in mortario, ex *d* aquæ saluæ unc. 2. Fiat fortis ex-  
pressio cū supradicta aqua uitæ. Traiciatur per mani-  
cam Hippocratis, fiat potus.

R. Capillorum hominis minutim concisorum unc. s.  
cast. scrup. 2. heleb. scrup. i. incorporentur in opopana-  
ce fiat suffu.

Caputpurgijs fortioribus, illitionibus palati ex pul-  
ueribus, masticatoriis *e* apophlegmatismis utendum.

Sed prius suffumigijs & uaporibus materia inciden-  
da. Radendum quoque caput est, fouendumq; ex oleo  
calēte, in quo pulegium, serpillum, alia quoq; eiusmo-  
di coxerint.

Deinde Dropacibus, Sinapismis *f* Sartagine Rasīs u-  
tendum est. Cucurbitulæ quoque & sanguisugæ, iam be-  
ne purgato corpore, conueniunt.

R. olei rutacei unc. 3. picis nigræ lib. i. liquefiant in  
uase duplici, deinde adde pyrethri, sinapi, piperis albi  
an drag. 3. Misce, extende in aluta, calidum appone, re-  
noua priusquam refrigescat.

R. ficus pingues q. s. leuiter incoque, deinde cum du-  
plo sem. sinapi contunde ad formam emplastri. Aliud.

R.

*c Calami**aromatici.**d Aut aquæ**uitæ, aut me-**lisophyli.**Suffumi-*  
*gium.**e Horū ma-**teria descri-**pta est in co-**phalalgia**frigida.**f Ut candem**ti sartagine**excitetur so-**pita cere-**bri vis.*



## DE MORBIS INTERNIS

**a** Idempla R. a oxycrocei unc. 3. fortiter agitetur in mortario cū  
strū ab ace oleo laurino. Deinde addantur gra. sinapi, pirethri, sta-  
to & croco physagria, piperis albi, euphorbii ana dr. ii. misce.  
nomen hēt. Rasis sartaginē calefieri dū candeat, interdū laudat,  
Hic uerò ad & de proximo admoueri capitū. His remediis per lōgio  
incidendum ra interualla utendum est, aut breuiora, ut res patitur.  
et foras euo Apoplexia secundo aut tertio die iugulat, aliquādo  
cādum præ b primo. Ut ergo celerior est, aut minus celer, ita erūt  
scribitur. interualla remediorum, aut longiora aut breuiora.  
b Ut quæ R. succi rosarum, mellis albi an. unc. 3. fiat syrupus se  
fortis exi- cundum artem: loco mellis potest substitui saccharum.  
stir. Quædam apoplexia fit a multitudine humorum, quam

plethoram uocant, & ea dicitur ἀπόλησις. i. interceptio  
arteriarum & uenarum. Eam sanat subita & diligens san-  
guinis detractio. Pōt at esse repletio humorū, & tñ erit  
inanitio spiritūū ut ī his q̄ uenere immodica statim a ci-  
bo utunt. Nā in coitu multus spiritus uitalis effūdatur.

### S C H O L I A.

In Apoplexia homo repente concidit sine motu et sensu.  
Sic ab Authore obseruatum, in frigida & Austrina aeris  
constitutione Medicū quendam Doctissimum sexagenariū,  
ultimo Ianuarii, die Lutetiæ, a cœna concidisse mortuum,  
Ruellium Septembri periisse quarto die, sicut & Bibliopolam  
quendam eodem die, uia Iacobeæ. Pictorem quoque mense  
Aprili, anno 1545. interiisse, stertenti Apoplexia: eodē men-  
se figulum in suburbio Iacobæo leui Apoplexia Paralyticā  
altera parte euasisse, utrunq; uinosum & macilentū, ut inde  
intelligas uim ambientis in suscipiēte preparato. Nos quoq;  
eadem ferè constitutione temporis Arelatæ uidimus Medicū  
apoplexia paulò ante cœnam correptum interiisse repente.  
Acutissima Apoplexia mox iugulat, & spiritum adimit:  
fortis, uiolentum trahit: tertio loco est, quæ non uiolentum  
quidem & intentum, sed inaequalem, inordinatum, et inter-  
mittentem, desinitq; in Paralyfim. Unde animadversione di-  
gnū illud uidetur, quod scribit Gal. in 51. Apho. lib. 6.  
Quicumque sani capitis dolore derepente capiuntur, & sta-  
tim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi fe-  
bris apprehendat. Interpretatur enim de Apoplexia, forti,  
quæ



que tamen primo, secundo, aut tertio die perimit. Hinc quoque perspicuum est ex difficultate respirationis de magnitudine morbi coniiciendum esse. Qua nota etiam distinguitur a Caro, & Catalepsi, in quibus libera manet respiratio. Apoplexia nomine non semper in hac significatione Hyppocrates est usus. Funt Apoplexiæ, uel quia spiritus animalis, qui per ueruos descendit, non conficitur a cerebro ob intemperie totius substantie ipsius: uel quia intercipitur, idque uel a pituitoso humore crasso & uiscido, confertim cerebrum irrigante, quales sunt senibus familiares & hieme, ut scribitur 3. Apho. mulieribus minus molesta ob menstruat purgatione: uel ab humore melancholico, periculosa, & qua hominem occupant a quadagesimo anno, usque ad sexagesimum, sicuti docetur Aph. 57. lib. 6. uel a sanguinis eruptione & plenitudine, aut crassis uaporibus cum humore uias spirituum intercludentibus, ut in ebris quibusdam. Omnium facilis dignotio ex propriis cuiusque humoris signis. Si qua a sola intemperie, non nisi longa temporis progressionem induci potest. Nulle unquam uel difficulter curantur. Si qua tamen curationis spes, ea fiet primum clysteribus acerbis, ab imbecillioribus initio sumpto, id est, qui fortiter trahentia non recipiunt, ut colicithidem, quia prius inanendum, quam a partibus remotis trahendum: suppositoriis, dum clysteres parantur, sanguinis missione, præsertim, cum uenæ tument, & distendantur, ligaturis fortissimis, & dolorificis, frictionibus asperis extremarum partium, hemorrhoidum inflatarum apertione, potionibus exalfaciensibus & extenuantibus, pillulis dissolutis in aquis sepius repetitis, sinapi ori imposito, & dissoluto in oxymelite, uel benedicta, uel diaphemico, uel sinapi dissoluto aqua uite & naribus illito sale in os iniecto, frictione palati, sternutatoris post uniuersalia remedia: appositis naribus ut ruta, castoreo, galbano, euphorbio, sinapif. dropace, canteorio, & si paroxismo liberentur, cocta materia & edueta.

Hominem concutito, fricato.) Collum commouendum, fricandum, et contrectandum durius, qua parte uenæ sunt et arteriæ. His enim prohibetur congelatio, sanguis incalescit, attenuatur, melius fluit, & preparatur ad uenæ sectionem.

Vena brachii interna) Magna inter omnes dissentio de

uenæ



## DE MORBIS INTERNIS

a Lethargus uene sectione in Apoplexia Arabes initio eligunt saphenam affectio est uel maleoli. Sed cum exigua sit, & ualde remota, nec sanguis cerebri à ce nis satis, nec sat citò inde reuelli potest. Poplitis uena cōmoleri & repē dior, quia amplior, & iunior. Deinde cephalica utriusque una obliuio brachii, ad utramque partem exonerandam: postea ad deri- ne nomen uationem, uene iugulares, quæ ualde tumēt. Angusto tamē habens: aut foramine, metu hemorrhagiæ, sectio facienda, & coliben- est delirium in dus sanguis medicamento Galeni ex pilis leporis, aloë, thu- termissionis re, & albumine oui, conuenienti ligatura asseribus utrinq; expers, cum ad collum applicatis supra iugulares, à clauiculis ad aures, febre, sopore & à sterno ad mentū, ne prohibeatur libera respiratio. Qd et celeri obli in cane sumus experti exectis etiam pilis. Venas lingua uione coniu aperire non licet, contracto ore. Ex uenulis nasi nihil iuna Etu, & phre tur eger ob paucitatem sanguinis. Venæ frontis à iugula- nitidi sæpe ribus oriuntur, nec tam conspicua sunt. Hali Abbas non si succedit sed ne ratione sanguinis missionem reiecit in Apoplexia, in ad malum. qua non tument uenæ. Sternutatoria quoque reicienda, Omnis. n. fri cum sit humor in corpore cerebri, non in uentriculis.

gida intem. Cucurbitulis) Vbi sectio uenæ non conuenit, illius loco peries cali- cucurbitulis utendū. Quæ si adherere possint prope iugula de succedēs res et quasi sub mēto, melius erit, quā in humeris aut dor malo esse so so. In hypochondriis nocent, impediendo motum musculo let. Cuius rum abdominis in respirando, nisi extra paroxysmum.

morbi cau- Theriacæ ueteris) Minus cōuenit tum propter adstrin- sa est intem gentia, quæ multa recipit, tum ob uim opii non omnino com periet cere- sumptū uetustate. Hæc omnia humorē cerebri corpus irrigā bri frigida, tē altius impingunt. Horū loco detur dr. i. cocciar. dissoluta humida, pi rū in aqua uitæ, uel cast. ʒ. i. aut ii. tū piperis, Zinzib. et eis tuitosa, quæ phor. momentū. Expurgato tamē cerebro cōuenire possunt.

memoria ma De a Lethargo. Cap. VII.  
gis, q̄ facul- Lethargi b signa colliges ex Actio, p̄dictionibus coa- rates reliquas, cis

lædit. Huius signa sunt inexpugnabilis dormeindi necessitas, frequens oscitatio, apertæ mandibulæ, magna rara spiratio, pulsus lenti, rari, languidi, manuum tremor, faciei decoloratio, pendulæ genæ, excrementorum alui liquidorum aut siccorum, non ægri sponte excretio, urina tumentorum similes, quæ magnam in uenis spirituum perturbationem significant. b Quibus distinguitur ab apoplexia, epilepsia caro, catalepsi et comate.



cis Hippoc. Quarto de causis pulsum. Sed plenissime a Si nō sit in  
ex Aureliano, 2. acutorum. sanabilis v

Lethargum cognitum ita a curabis. Initio b materiā qui supue-  
repelles: deinde ægrum c excitabis: tum materiā uacua nit phreniti-  
bis: postremo cōfirmabis caput: accidentia corriges: & di, et in quo  
in primis rationem d uite institues. excrementa

Loco itaque lucido & tepido collocabis: materiam non sponte  
repelles oxyrhodino. Hoc autem minus aceti recipiat, ægri feron-  
quā in Phreniticis. Deinde oxyrhodinū parandū erit tur, ut a de-  
ex ol. rosac. chamemel. adiecta minori parte aceti. E.g. lino, tū etiā

R. ol. ros. & chamemel. ana unc. i. s. aceti drac. 3. oportetq; affundi in eā partē capitis, ubi iūctura est corona ne muscoli  
lis. Tū clysteribus acribus, & suppositoriis utēdum est, sphynsteris.  
qualia i Apoplexia descripta sūt. Postea uero Frictio b Quæ afflu-  
nibus, Vinculis, Vellicationibus: partim, ut his materia it a crudita  
reuellatur: partim, ut inde æger excitetur, Excitatur te humorū.  
quoque hac potione. c Ne motrix

R. mithridatii drac. i. dissol. in aquæ uite & calēdu- cerebri fa-  
læ. an. unc. s. Similiter theriaca uti licet. Sed tutius post cultas oppri-  
clysteres & uacuationes, & hoc quoque excitat. matur. Eris

R. e castorei, lapidis gagatis, cornu cerui, abrotoni, aut lethar-  
capillorū hoīs ana scrup. i. Excipiant pice humida: fiat gicus excita-  
fumus, qui adhibeat naribus. Statī initio, si corpus san dus eo stu-  
guineū est, & tolerāt uires, è cephalica sanguis detrahē dio, cui sese  
dus est. in lethargo, clysteribus & glādulis acribus po- addixerit,  
tius, q̄ pharmacis purgātibus utēdū est. Vbi tamē diu- clāgo retuba-  
turna passio est, & uires tolerāt, utimur primū syrapis ru, si miles:  
incidētibus, quales antea descripti sunt. Deinde ex hyc tinnitu auri  
ris, Picra, & Diacoloc. & Agarico purgamus. Postea cu et argēti, si  
curbitulas ceruicis initio, ac deinde scapulis, metaphre auarus. etc.  
no, lūbis, & cruribus affigimus, ex qbus ad purgationē d Quæ æquē  
localē ueniēdū est, p errhina, Diamassemata, Illitiones pugnet cum  
palati, et capitis, Dropaces, Sinapismos, Phenigmos. morbo et na

Pulegium itaq; thymum, organū, aliaq; id fgenus ture stude-  
in- deat. Sed hic

vino abstinedum, utēdūq; hydromelite simplici, vel origanato, cibo modice  
materie, qualitate humido, cōsistentia sicco. c Hoc suffumigiu q̄ minus  
cōueniat, qui epilepsia corripi solēt. f Vt hyss. calamint. s. æch. cala. ar. om.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Vel succi incocta aceto, naribus ita admovebis, ut calidus vapor radicū sēni ad cerebrum pueniat, ex quo nares inunges hoc modo cu. unc. 3 i R. ol. irini unc. j. acetī scylli. unc. s. castoris dr. ij. a mi acet. scyll. in sce. Pollea etiam errhinis suprà descriptis uti licebit. quo nuc. mo Palatum ilines sinapi trito ex aceto & melle cōmixto. schata dr. s. Dumq; hæc sunt, per intervalla clysteres iniicies. Ca- infusa fue- put æilare rades: hyeme b detōdesi fonebilq; primum, ris. unc. s. c decocto serpilli, satuireæ, puleg orig. coctorum in ol. b Ne frigo & aceto. Deinde inunges & fouebis ol. de scylla d prius ris vil humor descripto, ol. philosoph. de gagate, serap. de pipe. de eu et vapor exi phor. quæ a Mes. describuntur. Alioq. irino, sãplucino. i. tu prohibea de maiorana, aut rorisina. comparato, uel hoc cerato.

tur. R. ol. laurini unc. 4. cere tantundem. Liquefiant in c Huius hæc uase duplici, fortiterq; agitetur cum succo apii & rutæ, eru formul. quibus adde castorei puluerisati unc. i. hinc ad dropa- R. serpil. m. cem prius e descriptū trāseundum est, ex quo ad sinapis i. coquatur i mum. Sinapismo at sic utendum est, ut simul atq; pars li. i. olei cha erubuerit, & euellatur, parsque oleo calido foueatur. me. et li. s. ui Quod si dolor uehemens inde excitatus est, leniendus ni ad eiusdē erit rosaceo, meliloti, chamemeli, aut maluæ decocto.

consump. Oportet autem sinapismum subigi ex aqua, ut uult Nec negligē Oribasius, non ex aceto, ut recentiores sere Medici, & dū mulieris olim Archigenes. Aetius ex aqua, ubi præmaduerint fi illius reme- cus sicce. Credidit. n. Oribasius uim sinapismi aceto dis diū, cuius de solui. Id quod experientia didicit. Huic rei utile est dia scripta ē a caphragias Aureliani: aliorum, diascyllatum, ex capri- Pau. Aegi. no stercore, aceto, uel pollea subacto

historia. ca. Sunt & fPhenigmi, qui rubrificant, ex nasturtii semī de lethar. ne, sinapi, helenii radice, columbarum agrestium sterco d C. de apo re, scylla in mortario trita & illita, aliorum tunica, la plexia. & ethimali, cantharidum puluere, urtica, atramento e Ibidem. sutorio, euphorbio. Hæc autem tandiu inhereant, dum f Phenig- pars erubescat. Si quæ ampullæ excitatæ sunt, compun mis & fina gantur. Ampullas attollet, quod sequitur.

pismis mi- R. sinapi, piperis, euphorbii ana drach. i. Incorporen tur nimè uten- dum in lethargo, quod coniunctus cum febre sit, quæ hæc calida respuit.

quo. debet & cōfici sinapismus.



tur melle anacardino, & in parte sinantur, dum ampul-  
læ tumeant. Mel anacardinum ita fieri oportet. Anacar-  
dos septem diebus in aceto macerabis prius contritos:  
tum in eodem coques, dum tertia pars aceti consumpta  
sit. Refrigerari fines. Quod supernabit oleosum, mel  
est anacardinum. Albucaſis in aqua macerat & coquit.  
Alii mel anacardinū appellant, in quo anacardi fuerint  
cōditi. Oportet aut, quemadmodum in apoplexia dixi,  
dum hæc fiunt, stomacho & uisceribus consulere.

## S C H O L I A.

¶ *Leihargus, Caros, Arabibus Subeth, Catoche, Cataphora, Coma, affectiones sunt somniculosa, in quibus somnus arctius, quam pro natura lege, hominem complectitur, obid que inter morbos aut morborum symptomata numerantur. Sed neque de nominum distinctione, neque de causis satis cōstat inter Medicos: In Leihargo agere perpetuò in somnū labitur, obliuiosus, stupidus, crebro oscitans. Sape ore hianti persistit, uelutos claudere oblitus. Urinam reddit iumentorum lotio similem: sumptam matulam quandoque se tenere non meminit, argumentum læse potissimum memoriae, & posterioris uentriculi, aut potius substantiæ cerebri. Cā est intemperies frigida & humida cum pituita cerebrum madefaciente, & tumorem frigidum efficiente, quæ incalescens & semper putrescens febrem lentam inducit. Aliquando succedit Phrenitidis, febri continenti, & similibus ob cerebrum impensius refrigeratum, uel immodicam uacuationem, et natui caloris imbecillitatem. In Καρῷ siue sopore profundo, somnus profundior, quam in superiore, oculi perpetuò clausi, oīs sensus atque motionis priuatio, excepta respiratione, quæ manet illæsa. Vnde perspicuum, cum Leihargo conuenire materia, crassiq; & uiscido humore procreari, licet etiam & à crassiore uapore per consensum, uel à toto corpore, ut in uigore & accessionibus febrium à pituita: uel uentriculo, hypochondriis, intestinis, medicamentis calidis, aut laxantibus, putredine à uermibus, ut in pueris. Differre autem primum loco, quia fit in anteriore cerebri parte, non uentriculo. Sic enim Epilepsiam potius inferret. Deinde materiæ putredine. Neque*

C

enim

quod cōfi  
nat mel  
anacardinū

affectiones  
somniales

eger  
lethargie  
sig<sup>a</sup>:

cari sig<sup>a</sup>



# DE MORBIS INTERNIS

enim humorem habet putrescentem, neque cum febre. Postremo, quia sequitur aliquem morbum, sepius febrem pituitosam & spuriam, uehementiorem tamen febre lethargica, cuius uelut symptoma est. Succedit quoque comitiali morbo, cerebri compressioni, fracto cranio, oblesis menyngibus, uehementiori in temporibus ictui. In Catalepsi ager exiguum quid aliquando loquitur, aliquando penitus motus est sensus sopiuntur. Ab utroque differt siccitate. Fit enim (si Galeno credimus) à uehementi refrigeratione, cum quadam siccitate. Deinde loco à Caro, quia fit in occipite. Sed certior distinctio & patognomonicum signum est, quod egri oculos apertos habeant, atque in eo permaneant habitu, quo correpti sunt. Tē sione nimirum inducta à siccitate, præcipue in musculis oculorum, qui in superioribus affectibus humore dissoluti concidunt, & eosdem claudunt. Catoche idem significat. Scribit enim Paulus, affectum, qui veteribus κατὰ τοχος, dicebatur recentioribus Catalepsim siue κατὰ χλω nominari. Alij distinguunt, Catoche esse ἀγρυπνον κῶμα, soporem uigilantem, cum ager somno premi uidetur, & tamen uigilat, sed nec loqui, nec membrum ullum mouere potest, ut Scribit Galenus, Comm. 2. in lib. Prorrh. Cuius affectus contrariæ sunt causæ, biliosus humor, & pituitosus. Cataphoram Galenus 13. Methodi sumpsisse uidetur, tanquam genus omnium soporum sine febre. Rursus Coma omnem Cataphoram significat, diuiditurq; in uigilans, & non uigilans, passim apud Galenum. Sed remota omni nominum ambiguitate, de qua toties ille ipse celeriter ad pactionem ueniendum esse iubet, ne rerum cognitionem, de quibus perpetuò agendum, præcipiat, Medico egrum sopore correptum cernenti, primò considerandum, an respiratio læsa sit. Sic enim erit Apoplexia. Sin libera appareat, proximū, an oculos clausos habeat, an apertos. Clausi, Lethargum, uel Caron indicant. Quod ut distingatur, uidendum deinde, in sit febris, nec superuenerit alteri morbo. Sic enim erit. Lethargus, in quo etiam tremorem manuum, uultum discolorum, turgidū, pulsus tardos, debiles &c. notat Hippocrates. At si sine febre, & post alium morbum aut accessionem febris spurie, Caroticus ager est. Sin oculos apertos habeat,



tos habeat, & rigidum sit corpus, Catalepsim indicamus. Cuius causa (ut dicetur) uel sanguis est, uel melancholia. Si partim uigilet, partim dormiat ἀγρυπνον καὶ κοιμᾶ. De humore exasperante deinde indicandū ex proprijs cuiusque signis. Curatio perficitur, primum sanguinis missione (si uenae tumeant) è cephalica: deinde uena frontis. Alioqui periculosa sanguinis missio in tanta frigiditate. Clysteribus primum tenuantibus & alterantibus pituitam, postea trahentibus & acutis glandibus, frictione uehementi, ligaturis extremorum, auulsione barbae, capillorum capiti, pudendorum, suffitu ex foetidis, unctione synapi facta in palato, aut benedicta, aut hyera picra. Post haec omnia, sternutamentis. In principio repellentia admouenda sunt sincipiti, licet magis in occipite sit affectus. Est enim rarius, & multis futuris periculum.

Excitatur quoque) longè lepidius, nō sine tamen medica Satyr. 3.  
ratione Opimum illum auarū apud Horatium Medicus fide lib. 2.  
lis e somno profundo reuocauit, qui.

Quondam lethargo grandi est oppressus: ut heres.

Iam circum loculos, & clauas letus, onansq;.

Curreret. Hunc Medicus multum celer, atque fidelis.

Excitat hoc pacto: mensam poni iubet, atque.

Effundi saccos nummorum, Accedere plures.

Ad numerandum: Hominem sic erigit, addit & illud.

Ni tua custodis, auidus iam hoc auferet heres.

Men' uino? Ut uiuas igitur, vigila.

Non dissimili techna alter uinosus excitatus fuit, cum audisset uasa sua uinaria uehementius commoueri, atque inde unum ebibat. Non inutile etiam sonitu tubarum & musica noctu aut interdum agrum aliquo, aut per cubiculum ambulante circumducere. Ceterum notandum, quod admonet Hippocrates 3. de morbis. Cum multum liquidumque per aluum deicit Lethargicus, pusillam, uile spem esse.

Caltore.) Mirificè prodest nervosis affectibus, etiam in potu sumptum Mesue à granis tribus ad quatuor dabat ex nox, melite, idq; posuacuationes.

C 2

Postea



## DE MORBIS INTERNIS

Postea Cucurbitulis) In statu cum multo igne & scarificatione affigendæ sunt occipiti, non solum ad sanguinẽ, sed ut inde etiam calor natiuus excitetur, & materia reuellatur. In principio, humeris ad diuersionem & euacuationem.

De caro. Cap. VIII.

**C**Aros cum Lethargo conuenit, sed maior ac profundior sopor est. Stimulati non excitantur: interrogati non respondent.

Eadem curatio, quæ lethargi: nisi quod magis incidentibus & attenuantibus utendum est.

Est & quoddam genus delirii inter phrenitidẽ & Lethargum ex bile & pituita. Veteres Tiphomaniam aut tiphoniam appellarunt. In qua affectione si superat bilis, coma peculiariter appellatur: si pituita, Catochos.

Fit & Coma, ubi à calidioribus & humidioribus uaporibus ex reliquo corpore sublatis caput repletur.

Catalepsis nomen ambiguum est. Nam aliquando subita uocis amputatio, sensus & motus priuatio intelligitur, quam Aphoniam Hypocrates uocauit, Græci etiam Apolipsin.

Ea interim fit plenitudine sanguinis, quæ uias spiritus animalis intercipit. Sed quæ peculiariter Catalepsis dicitur, à melancholico succo aut uapore posterius cerebrum obturante & siccante fit. De repente muti fiunt: neque concidunt: sed in eodem habitu permanent: aperti oculis, si prius aperti essent: stantes, si starent: sedētes si sederent: ex quo Vulgus credit nō dolere, aut ita mortuos uiuere. Sed (ut loquuntur) raptos.

### S C H O L I A.

Ea interim.) An ab intemperie sola fiat Catalepsis, an cum humore: & si cum humore, quisnam ille sit, non facile est diiudicare. Galenus enim uidetur ab intemperie frigida sicca fieri censuisse. Sed cum repente inuadat & desinat, intemperies autem sicca repente induci nequeat, aut tolli, necessario confiteri cogimur aliquem subesse humorem. Aetius præter sanguinem, atram bilem ponit. At si ita res habet, cur non omnes melancholici incidunt in Catalepsim? Præsertim si fiat  
Melancholia



in uentriculis. Nisi dicamus in Catalepsi non uentres, ut in Melancholia, sed uenas & arterias, quæ in cerebri menyngibus disseminate sunt, eo humore repente & affatim impleri, inflatas distendi: inde sequi rigorem totius corporis instar corporum frigore concrecentium. Fit etiam à sanguine multo et copioso uenas inflante, & tensas retinente, sicuti cum humores in conuulsione nervos contrahunt. Eodem ergo modo fit Catalepsis, quo Apoplexia, nimirum substantia cerebri irrigata per defluxionem, uel sanguine, uel melancholico humore.

Paralitica remedia. Cap. 9.

**P**aralysis de qua hic agimus, familiaris apoplexiæ, resolutio est dimidii corporis non totius, quarundam partium, non omnium, à crasso & frigido humore à quo neruosum genus remollitur atque resoluitur.

In his clystere primum utendum est molli quidem, si diutius feces alui subliterint: deinde etiam acriori.

Partes resolutæ oleo moderato, sed calente, fouendæ sunt.

De phlebotomia nõ cõuenit inter Græcos & Arabes.

Detrahendus quidem sanguis est mediocriter ex cephalica partis integræ, authoribus Græcis. Frigidum. n. eorum corpus. Itaque larga sanguinis missione languidum calorem extinguere metuunt.

Rasis & qui hunc sequuntur ex utraque cephalica ad tres aut quatuor libras. Postridie etiam ex uenis lingue sanguinem detrahunt. Græcis tutius adhærebis.

Instituendus uictus. Primum quidem leuiter incidat attenuet & detergeat. Potus sit hydromel ex sexcupla aqua, in qua modicū stechados aut acori (vulgaris astringit, & nervis robur addit) aut ireos Florentiæ coxerit gratia exempli. horum & similium unc. i. in lib. ii. aquæ quale est.

R. rad. ireos Florentinæ unc. i. coquatur in lib. ii. aquæ dum dimidium libræ consumptum sit. In coll. diffolu. mellis communis quartarium unum: despumetur, fiat hydromel despumatum. Poterit & cinamomum & mastix, & garyophilum in aqua concoqui atque in-

C 3 de hy-



DE MORBIS INTERNIS

de hydromel parari. Loco etiam mellis saccharo (*Can-  
dum magis exiccat.*) utemur si febris suspitio est modico  
que cinamomi, aut rerum eiusmodi uti oportebit.  
Quale est.

R. aquæ coctæ lib. i. colletur per manicam Hippocra-  
tis cum sacchari unc. iii. & drac. ii. cinamomi.

*cibus.* Utatur assis carnibus, quæ garyoph. cinam. & lardo  
configantur: uel lardum, quo figuntur, aspergemus, pul.  
cinamomi, nucis moscate, & garyophilorum.

Utatur granis pini conditis, & canela tritis. Absti-  
neant aqua, & uino, & longiore somno.

*incisio mæ* Materia potionibus incidenda, ut hydromelite, (*oxy  
mel noxium, ob acetum*) in quo stechas, cæteraq; eiusmodi  
coxerint ut est super illum, pulegium, & similia. Dein  
de purgandum hac potione.

*purgatio*  
*2. s.* R. pul. hieræ diacolocynth. drac. ii. masticis, bdellii  
an. scrup. i. nucis moscate, spicæ, rosarum an. unc. s. om-  
nia incorporentur modico conseruæ borraginis, uel hac  
ueterum potione.

*alia purgo.* R. polyp. querc. unc. s. sem. anisi, & apii an. drac. s.  
fiat decoctio ad unc. iii. quæ collatur per manicam  
Hypp. cum unc. i. mellis albi, cinamomi, drac. s. In coll.  
dissol. pul. hyeræ diacolo. scrup. iii. pul. hieræ picræ  
scrup. ii. fiat potus.

*pilule*  
*pag. 3.* Possumus uti & pillulis elephanginis, imperialibus,  
assaieret, de agarico, scetidis, cochiis. Aliis quoque supra  
descriptis, cap. de soda phlegmatica, ubi etiam syrupi de  
scripti sunt, qui plurimum conferent, si per interualla  
paralyticis imperentur.

Dum hæc fiunt, oleo calente, sed temperie non ita ca-  
lida resolutæ partes fouendæ sunt. Stomacho etiam &  
uisceribus, ut prius, consulendum est.

*conseruæ.* Conseruæ quoque instituendæ sunt, iux, anthos, sal-  
uiæ, stechados (*quæ due principatum obtinent*) enulæ, gen-  
tianæ, acori, ireos, zinziber conditum, conditanaux mos-  
cata, theriaca, mythridaticum. Dosis conuersarum ad  
unc. i. aut. ii. quas utiliter commiscebis cerebro leporis

*assruæ* alio



alio quod peculiari natura conuenire scribunt paralyticis.

R. conf. iux, conf. anth. & salu. an. unc. i. cerebri leporis recenter assi unc. s. cinamomi, nucis moscatæ an. drac. i. cum saccharo in aqua iux dissoluto fiat elect. secundum artem, uel conditum. Huius detur unc. i. uespere, duabus horis ante cibum, & in ingressu lecti.

Theriaca & mythridaticum, ut & alia omnia remedia fortiora, magis conuenient post purgationes. Dosis scrup. ii. uel drac. i. quæ interim commiscebis conseruis, aliquando dissolutis in hydromelite, in aqua uel decocto iux, calendulæ, rorismarini, salu. stecha, aqua uitæ, aut uitis.

Post hæc cucurbitulæ locis affectis sine scarificatione aptandæ sunt, ac deinde collocandæ, sed maximè radicibus neruorum.

Probant quoque uomitiones semel in hebdomada. à cibo. In paralisi linguæ noxiæ) Stuphas siccas, & balnea. Stuffæ parari debent ex decocto herbarum conuenientium, maioranæ, saluiæ, origani, calamenti, calendulæ, sarmentorum uitis, pulegii, serpili, stechados, & rerum eiusmodi.

Collocabitur resolutum corpus loco bene concluso, ne fumus decocti euanescat. In decoctum, filices candentes iniiciemus, ut fumus fiat. Ex iisdem rebus balnea comparentur. Probant quoque balneum ex decoctione uulpis integræ, cum herbis suprâ memoratis, inunctiones primùm molles seu leues, deinde acres.

Partes itaque primùm oleo cham. de meliloto, anethino, amygdalarum dulcium, de lilio, hyperico, iasmino, de Kyri, de nucibus, de sem. lini, de maiorana, de galbano, nardino, cambino, raphanino, ricinino, de costo, de spica, laurino, de cucumere asinino, sinapino, de pipere, de euphorbio, de pirethro. Oportetque à leuioribus ad fortiora progredi. Floccilane in his oleis inungendi sunt, & ex his fouendæ partes affectæ, postea etiam contegendæ.

C 4 Olea

*theriaca :*

*cucurbitulæ :*

*stuphe :*

*olea pro inunctionibus :*



## DE MORBIS INTERNIS

Olea cōponuntur ex olei quatuor, aut quinque partibus, aquæ uiuæ, aut succi conuenientis parte una, & aliorum quorundam medicamentorum decima, uel duo decima, quale hoc est.

R. ol. de Iasmino lib. i. aquæ saluie, aut succi iuæ, uel uini, in quo iua coxerit, unc. iiii. castorei, pirethri, euphorbii, piperis, beniouin, assæ fœtidæ, opopanacis, galbani, gagatis lapidis, horum unius unc. i. fiat decoctio ad aquæ, succi, aut uini consumptionem. Olea composita. Oleum de scylla (vel oleum antiquissimum, in quo sit decocta scilla. Valde enim incidit) prius descriptum. Aliud.

R. terebinthinæ lib. ii. laterum antiquorum, aut (ut uult Albucasis.) recentium in oleo iasmino extinctorum, macis, stiracis ana unc. i. beniouin unc. s. fiat distillatio in alambico uitreo. Tres humores fluent, quorum tertius erit optimus. Oleum de lateribus, lege Mesuem.

Balsamum, & oleum balsaminum mirè commendantur, sed rariora sunt, & tantum principum. Sed his respondere uolunt, quod sequitur.

R. thuris albiss. malt. ana unc. ii. ligni aloes unc. i. garyoph. galangæ, cinamomi, zodoariæ, nucis moscatæ, cubearum ana drac. vi. myrrhæ, aloes, labdani, sarcocolæ castorei ana unc. s. baccharum lauri, nucleorum pini ana drac. vi. ireos, aristolochiæ rotundæ, dictamni, consolidæ maioris ana unc. i. gummi elenii, opopanacis, beniouin ana unc. ii. succi iuæ, succi herbæ paralytis ana unc. iii. terebinthinæ ad pondus omnium. Omnia concorporabis, distillabis in alambico uitreo.

Extillabit aqua primum: deinde ueluti oleosum quid: postremo quasi mel.

Probatur & oleum uulpinum descriptum à Mesue, & hoc quoque.

R. unguenti de bdellio unc. iii. liquefiat in uase duplici cum olei de terebinthina, de scylla, aut similis unc. iii.

Opti-



Optimum erit corpora paralytica inungi ad ignem  
samentorum uitium.

Alius mollis perpetuò seruari debet clysteribus, aut  
pharmacis lenibus, aut suppositoriis.

Modus operationis medicamentorum, & eorum, quæ  
partibus affectis apponuntur.

Vnctionum, dropacum, Phenigimorum, Sinapismorū  
ut pars in ruborem attollatur, non exulceretur. Et cucur-  
bitularum brevis mora esse debet, ne quod attractum  
est, dissoluatur.

Sunt, qui certum experimentum dicant, si pars affe-  
cta decocto maioris tithimali foueatur. Deinde folia  
eius integra parti supponantur.

Errhinis & Apophlegmatismis, ut prius, ut edum est.  
Apophlegmatismis cum nodulo, aut bacculo, ori apposi-  
to, ut diximus. Paraliticiis, & neruorum doloribus labo-  
rantibus uinū prorsus fugiendum est. Potus sit illis mul-  
sa, aqua mellita, quæ sit ex partibus octo aque, duabus  
uel tribus mellis albi, uel sacchari. Coquantur omnia  
simul. Colentur per manicam Hippocratis cum drag. ii.  
cinamomi, uel decoctum acori conditi.

*Pillule cochleæ Rasis, & Mesues.*

R. pul. hyerę picrę drag. ii. interioris colocynthidos  
scrup. i. diagredii scrup. s. & gr. vi. turbith gummosi, ste-  
chad, ana drag. s. cum succo fœniculi fiant pillulæ pro  
duabus dosibus.

*Cochleæ Nicolai ex Galeno.*

R. aloes, absynthii, pulpæ colocynth. scammoni ana  
scrup. i. mastice scrup. s. cū succo fœniculi fiant pillulæ.

R. aloes, scammoni, colocynthidos, agarici, bdellii,  
gummi arabici, ana scrup. s. & gr. v. cum succo absynthii  
fiant pillulæ cochleæ. Eiusmodi pillulæ & caput pur-  
gant, & uarios humores detrahunt, nec stomachum  
lædunt.

#### SCHOLIA.

In stupore, seruatō motus aut leuitor leso, sensus amitti-  
tur, aut debilior redditur. In Paralyfi utroque priuatur  
pars



DE MORBIS INTERNIS

pars agra, illeſis tamen ſenſibus interioribus. Non enim, ut in Apoplexia, uitium eſt in cerebri ſubſtantia. Si id acci-  
 dat omnibus partibus infra ceruicem: meninges, aut ſpinalis me-  
 dulla in exortu affecta eſt. Altera corporis parte reſoluta,  
 dimidia, tantum pars ſpinalis medullæ afficitur, aut menyn-  
 dum. Si qua uerò pars ſola (nam partes omnes motu uolun-  
 tario prædita, præcipue quæ proprium neruum & peculiare  
 habent, huic malo obnoxia ſunt) ſiue in capite, ſiue infra cer-  
 uicem laboret, in illius particulæ neruo, uel eius exortu mor-  
 boſa eſt affectio. In ἀπρωία, uocales nerui, per quartam uer-  
 tebram exorti: in ἀπρωία reſpiratoriꝝ patiuntur. Sic oculorum  
 reſolutio, ad neruos, qui à ſecunda coniugatione & caluaria  
 emersi, in oculi muſculos diſperguntur referenda eſt: palpe-  
 brarum, ad neruum tertie coniugationis per foramen oſſis  
 orbite tranſeuntis: labiorum ad latum muſculum, neruos è  
 primis uertebraſ, & ramos è tertia coniugatione: lingue deni-  
 que (quod fit præcipue in balbis poſt Apoplexiam) ad neruum  
 è tertia, aut ſeptima coniugatione in lingua perreptantem. Eo-  
 dem modo reſoluta manu, in principio ceruicis, uel quinta  
 uertebra affectio ſubſiſtit. Senſus tamen aliquis quandoque  
 relinquitur, primæq; brachij partes illeſæ ſeruantur. Minore  
 noxa laborant ob leſionem in ſeptima, aut octaua, ſed maxi-  
 mum inde thoraci inferitur nocumentum. In reſolutione par-  
 ui digiti & media parte annularis, afficitur neruus in cavi-  
 ta te olecraniꝝ ſiue cubiti: in alijs uerò tribus (ceteris illeſis) uel  
 nerata eſt aut affecta ſpinalis medulla, circa principium ner-  
 uorum brachij. Per deſluxionem omnes digiti patiuntur, aut  
 per concuſſionem. In ſectiōe, non eſt neceſſarium, quòd ner-  
 ui brachij in principio iungantur, & ſupra cubitum ſeparen-  
 tur. Cruribus reſolutis, aut pedibus (in quibus facilius cura-  
 tur hic morbus, quàm in manibus, ob ſiccio-rem & robuſtio-  
 rem neruorum, quos habent, naturam) in uertebraſ lumborū,  
 aut inguinibus conſiſtit affectio. Sua etiam eſt ano, ueſicæ, pu-  
 dendæ reſolutio. Si deſcendat inteſtinum rectum, muſculi ſu-  
 ſpendentes malè habent, qui ſunt in ipſius lateribus. Si excre-  
 menta retineri non poſſunt per aliquod tempus, ſphincter re-  
 ſolutus eſt. In reſolutione muſculi ueſicæ, & cum pudendum  
 erigi

reſolutio part  
 in parti-  
 culari uero  
 proueniat.

reſolutione  
 cruribus



erigi non potest, existente seminis flatulenti multitudinem (quod saepe contingit ob uolentiores contrectationem, natationem in aqua frigida, refrigerationem circa perineum, compressionem, equitationem longuam, & corporis extenuationem) nervi ab osse sacro uesicae inserti ac pudendo sunt in uitio.

Parte affecta hoc modo diligenter observata, ad causas uolendum. Continens siue coniuncta, necessario in nervo est, per quam spiritus, tanquam radius in partes inferiores diffunditur: eaque uel intemperies sola, uel cum humore. Trallianus aliquando fieri scribit ab intemperie sicca & calida sine materia. Vix tamen credendum. A calore quidem fieri posse perspicuum est, emolliendo nervos, humores pituitosos liquando, & aditum humorum defluxioni patefaciendo. Quod minus sua tenuitate facit calori iuncta, ut Galenus docet. Sed cum subito & confertim Paralysis hominem corripit, dubitandum non est substantiam nervorum humore per defluxionem imbuui, unde molliores redditi extenduntur, & relaxantur, sicuti & tendones. Quod fit, ut ob plenitudinem & obstructionem spiritu non transiente, uel quia leuissima contractione est opus nervo ad mouendam partem, membrum concidat & immobile permaneat.

Sed à quo humore id fiat, non minus difficile est indicare. Doctissimis tamen uiris non sine ratione uidetur, neque à melancholia, neque à bile extra uenas excitari Paralysem. Non à melancholia, quia nervos siccat potius & cogit, quam emolliat, ut in Elephanticis, quorum membra aridiora facta non resoluuntur, sed imbecillius sentiunt: neque à bile. Cum enim siccandi uim habeat, & acrimoniam adiuncta, conuulsionem potius inducit, nervos contrahendo & conuellendo. Ergo uel à sanguine solu (nisi per accidens) uel pituita fieri potest, eaque uel crassa uel tenui. A sanguine rarius. Inde tamen oritur, cibus tenuior est sanguis, & multitudine sua uiam spiritum intercipit, aut humiditate eosdem extinguit, aut nervos molliendo dissoluit. Idem fit à pituita tenuiore, sed multa, à cerebro defluente, & in nervorum substantiam penetrante. Frequentius autem à crassa nervo tenaciter inherente. Quae omnia ex humorum in corpore exuberantium propriis notis, ac uictu antecedente

erigi non potest.

à quo humor  
proueniat  
v. l. 1.



# DE MORBIS INTERNIS

recedente facile discernuntur.

Cause antecedentes sunt, quaecunque nervos contundere, comprimere, emollire possunt, casus, ictus, contusio, somnus in spelunca, domus recens polita, lunæ radius, exercitium à cibo, uel somnus. Sed frequentissima Lutetiae nova è gypso politura & hunc morbum, & alios frigidos inducit. Arelata gravissimam uidimus, ex leui uulnere, illeso cranio, sed sanie per meatus suturae sagittalis ingressa sensim ad tenuem menyn gem, quæ cerebri substantiam obuoluit, nervos, uenas & arterias sustentat. Vnde primum eiusdem partis resolutio, ex qua mors consequuta est, secto cranio pus inuentum. Quod F. Valeriola, uir omnium, quos adhuc familiariter nosse cõtigerit, Philosophiæ & Medicinæ peritissimus annotauit: cuius observationes, & in huiusmodi portetosis morborum generibus ingeniosas curationes propediem in lucem exituras magno desiderio expectamus.

Curatio perficitur, primum purgato uentriculo, & intestinis uel pillulis leuioribus, uel clysteribus: syrupis attenuantibus, aperientibus, digerentibus: deinde pillulis paulò fortioribus. Post purgationem, usu theriacæ per aliquod tẽpus, inunctione leuiori ad ualentio rem progrediendo: repetita purgatione (morbus enim contumax est, & diuturnus) opiatis gargarismatis, masticatoriis, pulueribus, dieta in corpore humidiore, unguentis, emplastris, linimentis, balneis, cucurbitulis frequenter adhibitis, exulceratione facta, aquis destillatis, uictu tenui. In particulari Paralypsi topica adhibenda sunt eo tantum loco, ubi affecti nervi, uel musculi est origo.

Phlebotomia.) In plethora, & sanguinea resolutione, contusione, ictu, aut casu de sectione uenæ nulla dubitatio, defluxionis præsertim imminente periculo: liberior quoque, si febris iuncta sit, sed in omnibus ad exiguam quantitatem. Vena linguae, si ipsa resoluatur, aperiri debent, præcedente tamen purgatione, & deriuatione.

Acori) Vulgarem intellige, cuius radix leuiter astringendo, & resiccando nervis relaxatis addit robur. Iris quoque resens pituitam purgat, & serosos humores: sicca, pituitam attenuat, & incidit. Potest etiam ex huius radice, & salina decoctio.

N. i. adu  
practico  
chirurgia

curatio

acori us



*Et o hydromel parari.*

Partes primum oleo &c.) Olea calida, parùm exiccantia non conueniunt, ut de lilio. Cùm enim nerui constitutio frigida sit & sicca, ab ea indicatione sumpta, emollientibus non est utendum. Admiscenda etiam tandem erunt, quæ leui astrictione & temperato calore partem affectam robovent. Foveantur partes oleo: deinde pellibus agnorum pinguium, aut uulpis odore conuenienti imbutis ad ignem inuoluantur. Sequentibus sæpe usus est author.

R. uini rub. lib. i. olei lumbricorum. lib. ii. aquæ uitæ unc. ii. corniculorum cerui magis spongiosorum unc. iii. pulueris chamomilæ unc. i. salis unc. s. mastiches drac. vi. bulliant omnia in duplici uase ad uini consumptionem. Probè misceantur.

Ciconia implumis, sed uiua tandiu coquatur, dum carnes ab ossibus recedant: tum in mortario teratur: rursus in oleo coquito: cocta sacculo fortiter colato, & abiectis reliquis, ceræ, colophonix, sæui tauri, olei laurini an. lib. ii. olei mastichini, medullæ cerui, adipis ursi an. lib. i. galbani, terebinthinæ an. unc. iiii. coniungantur. Emplastrum molliora, diachilon, resumptuum, &c. soluta in oleo cham. uel nardino: postea, quæ discutiunt, ut acopa: postremò attrahentia, & roborantia, ut metasyncritica.

*De conuulsione canina. Cap. X.*

**S**pasinus caninus subita est contractio, uel tempore facta resolutio musculorum masticatoriorum, & eorū, qui peculiariter lati appellantur.

Animaduertendum itaque, utrum resolutio sit, an conuulsio:

In resolutione pars affecta, laxa, mollis, à sana trahitur. In Cōuulsione, dura & contenta trahit sanam. In Paraly siue Resolutione saluatio multa: in Conuulsione non ita. In materia frigida, efficiente causa huius passionis, si nihil repugnat, sanguis mittitur, sed moderatè. Primum quidem, è cephalica: deinde è uenis sub lingua.



# DE MORBIS INTERNIS

gua. A sanguinis missione incidendum & attenuandum hoc modo.

R. acori, & stechados an. M. s. fiat decoct. in qr. v. aquæ purissimæ. Collaturæ addatur mellis communis lib. s. (plus minusve) fiat mellicratum despumatum, aromatizatum cum drac. nucis moscatæ. Quod si res urget (acuta enim hæc, & tarda aliquando passio est) clysteres acres iniicies.

*hierapachii* Purgabis ex hiera Pachii, ex descriptione Scribonii, cuius hæc est descriptio.

R. pulv. colocynt. drac. iiii. opopanacis, & sagapeni an. drac. i. & Gr. vi. marrubii, stechados, agari. camedreos an. scrup. iiii. petroselini, aristolochiæ, rotundæ, piperis albi an. scrup. ii. cinamomi, nardi, spicæ, mirrhæ electæ, folii, croci an. drac. s. Gr. iiii. Opopanax, & sagapenum in mortario tundantur, cum affusione modici mellis liquidi, aut syrup. de stechade. Reliqua puluerisata misceantur, cum melle q. s. fiat electuarium.

R. supra dicti elect. drac. ii. s. castorei drac. s. dissoluantur omnia in supra dicto mellicrato, q. s. fiat potus. Vide Scribonium largum. Alioqui alia conuenienti potione purgabimus. Partes affectæ, & tota ceruix oleo aut unguento inducenda sunt, quale hoc est.

R. rad. althæe unc. i. sem. scænegreci conuasati unc. s. fiat decoctio, in olei conuenientis qr. iiii. aquæ saluiæ qr. i. Fiat fortis expressio. Inungatur locus, & tota ceruix. Deinde cum lana insuccata in hoc oleo, partes affectæ, & ceruix muniantur.

Postea uerò licebit uti oleo de cucumere asinino, de scylla. Et in his liquefacere duodecimam partem ammoniaci, bdellii, opopanacis, galbani. Post hæc Apophlegmatismis, Caputpurgiis, & aliis, quæ caput partim euacuant, partim corroborant, utendum erit.

Nodulo itaque, foliis lauri pleno, & in decocto conuenienti madefacto, palatum illinendum erit, quale hoc est.

R. nucis moscatæ, piriethri an. drac. ii. sinapi, piperis an.



an. drac. i. decoquantur omnia in mulſe unc. iiii. Ex eadem mulſa poterunt fieri caputpurgia. Probatur hoc Caputpurgium.

R. anagall. panis porcini, nuciſ indicæ, nuciſ moſcatae, cucumeris aſinini, piperis, acori, pirethri an. unc. s. Conquaffata omnia bulliant in olei de Keiri lib. ii. aquæ maioranæ qr. iii. uel in ſola aqua maioranæ.

Uſus tempore reſupinetur æger, & ſtomacho uacuo, quinque aut ſex guttæ naribus inſtilleantur: aut ſæpius nares interiores inungantur. Oleum verò unctiõni occipitii, colli, regionis ſub mento, & affectæ partis conuenit.

Teneat in ore acorum conditum, zinziber conditum, nucem moſcatam. Frictiones quoque auertendæ materiæ conueniunt. Sic etiam cucurbitulæ, quæ primæ, & ſecundæ uertebæ ceruicis admouendæ ſunt.

Inueterato atque contumaci morbo Rariſ probat cauteria poſt aures, & in ceruice.

Dropace quoque ſimpliciori utendum erit ex picis drac. iiii. olei liliorum unc. i. liquefactis & exteſis in acuta.

Caſtoreum quoque teneatur ſub lingua. Hinc ad Sinapiſinos, & Phenigmos deueniendum eſt.

Viſtus inſtituatur incidens, & attenuans, qui in media materia temperetur. Cibus ſit liquidus.

Quæ topica admoueantur, conſeruentur calida. Nā refrigerata uehementer nocent.

Loco tepido, lucido, ſtragulis quoque mollibus decubat. Madefactionibus capitis abſtinendum eſt, quia caput replent.

## SCHOLIA.

*Quæ ad huius morbi exactam cognitionem pertinent, ſequentis capitis ſcholiis explicabuntur.*

De



DE MORBIS INTERNIS

De conuulsione. Cap. XI.

**C**onuulsis eadem ferè ratio uitæ instituenda est, ut èt  
phlebotomiæ: siquidem à plenitudine crudorum hu-  
morum contracta est.

Initiò ceruicem, & uicinos musculos laxante & emol-  
liente oleo, eoquè tepido fouebis, lanaque in eo immer-  
sa conteges. Atque, ut calor conseruetur in parte, uesi-  
cam ex dimidio plenam oleo tepente superpones, aut  
eiusmodi sacculos.

R. sem. lini leuiter conquassati M. s. furfuris frixi, flo-  
rum cham. & anthos an. P. i. salis communis torrefacti,  
& puluerisati. unc. s. fiat sacculus, aut plures eiusmodi sac-  
culi, qui subinde recalfacti calorem in parte retineant:  
Leues sint sacculi, & ea omnia, quæ levis partibus, atque  
dolentibus superponuntur. Clysterum quoque molliù  
usus est, ut hic antiquorum.

R. rad. altheæ unc. ii. sem. lini, & fœnugr. an. unc. s. fiat  
decoctio in aqua ad lib. s. cui adde olei communis lib. s.  
fiat elyster, tepidus iniiciatur.

Articuli corporis linteis calentibus fouendi sunt.

Materia hyssopi decocto in mulla, & rebus eiusmodi  
incidenda est.

Deinde purganda, ut prius, in spasmo canino, & soda  
phlegmatica, aut agarici, aut diaphenici drac. iii. In con-  
ueniente mulla dissoluantur.

Molliter fricetur ceruix, spina, spatulæ cum unctione  
conuenienti, qualia sunt.

R. olei therebintinæ, olei, olei lumbricorum an. unc.  
ii. axūgæ humanæ unc. i. simul misce, liquefiāt simul.

R. olei de costis, cum quartâ parte pinguedinis ca-  
storis, lutræ, melis, quem Taxonem, aut Blerellum vul-  
gò uocant.

R. vulpem bene pinguem corio detractò, & exente-  
ratam, confixam garyophilis, infarctam hoc modo, &  
assatam.

R. rad. altheæ & liliorum an. unc. s. rad. atori, ireos an  
drac. ii, camepitheos, herbæ costi, maioranæ, calendulæ  
an.



an. P. ii. florum anthos, meliloti & chamæ. an. P. i. styracis, ladani pinguis, masticis, castorei an. drac. iii. Omnia in mortario contundantur cum oleo de uermibus.

Malaxentur, farciatur uulpes, & bene consuatur, affletur cum aspersione aquæ uitæ. Quod distillatur pingue, excipiat subiecto uase, in quod infusum sit acetū.

Deinde uulpes in aqua coquatur: quod supernabit, pingue, tum in aqua, tum in aceto, usui referuetur.

Vtilissimum est post unctionē pellibus hædorum, agnorum, luporum, vulpium, arietum, recēs extractis, atque etiam dum calidis partes iunctas cōtegere. Quod si pelles iam refrixerint, immergendæ sunt oleo calido, ut recalescant. Aliud.

R. uini rubri libr. s. ol. liliorum libr. ii. rasuræ mollioris partis, & magis spongiosæ cornu cerui  $\mathfrak{z}$ . i. salis  $\mathfrak{z}$ . i. florum cham. drac. vi. masticis drac. s. bulliant omnia in uase duplici ad uini consumptionem. Hinc ad unctiones calidiores transeundum est, de quibus supra.

Balneum quoque commendatur ab antiquis, ad umbilicum ex hydræleo, cuius modus est ex æquis partibus aquæ & olei. Persenerante malo, olei balneum conuenit calidum, & domicilio calido, quod ita præparabis. Quintam partem olei calfacies, & quatuor partibus non calfactis commiscebis. Alioqui ex decocti fœnu græci in aquæ tribus partibus, & olei tertia parte balneam præparabis, quo totum corpus immergatur.

Sed balnei modum esse oportet, ne uires resoluantur. Itaq; solis irrigationib. utendū erit, ubi uires nō sinūt.

A balneo tempestiua est unctio ex supra dictis oleis, aut in quo ruta, conisa, rosamarinus, artemisia, leseli cum modico cinamomi coxerint, quibus aliquando decima aut duodecima pars adiicienda est.

Veteres omnes & recentiores Medici castoreum propinant è mulsâ. Dosis castorei à  $\mathfrak{z}$ . ii. ad drac. ii.

Cucurbitulæ partibus affectis, sed cum scarificatione admouendæ: sed iam progressio morbo, & bene purgato corpore.

Aurelianus in accessione, leuibus: in dimissione, cū

D scar-



# DE MORBIS INTERNIS

sacrificacione utitur, occipitio & collo defixis.

Remedium Hippocratis est aqua frigida, in iuvene bene carnosio, & ætate media.

Paulus, Celsus, Aurelianus, tota denique posteritas reprobauit. De excitanda febre non conuenit. Qui pro-

uocāt, utuntur auctoritate Hippocratis, Aph. 70. lib. 5.

Herophilus quoque febriculam laudauit: Asclepiades simpliciter febrem. Auicennas & Arabes febrem prouocari nolunt, nisi diariam.

Cæterum ex Gal. sic habeto. In morbis frigidis, quos humor crassus, contumax & multus generauit, febris satis uehemens excitari potest. Leuis enim nocet, nec prodest, exemplo filii Numeni, cui, cum apoplexia correptus esset, febris accessit mediocris: quæ cum noceret, & per infirmitatem caloris non prodesset, mors sequuta est. Oportet enim febrem fuisse magnam, quæ talem humorem calfaceret, incideret, concoqueret, & discuteret. Itaque ut est materia, ita febris consilium temperandum est, sitq; non minor, quàm quæ profit, neque maior, quàm quæ lædat.

## SCHOLIA.

*preter*  
In Paralyfi resolvuntur nervi, & languidiores, humore flaccescunt, ita ut concidant in partem sanam; in conuulsione, contorquentur muscoli simul cum nervis & tendonibus, contrahunturq; pater uoluntatem ad suum principium, & partem sanam secum in angustum adducunt. Exempli gratia, Conuulsis temporalibus musculis, contrahuntur dentes, ac strident, resolutis, hiatus fit oris. Proinde si σπασμὸν, nervorum distentionem, ut Celsus, interpretari uelis, ambigua uox erit cum Paralyfi, cum distentio & contractionem & extensionem significet. Hinc quoque perspicuum, Paralyfim à siccitate uix, aut nunquam fieri. Siccitatis enim ea est natura, ut absumpta pororum humiditate corpus contrahat, nunquā relaxet, nisi fortasse per accidens, ut si ob siccitatem nervi spiritu primati non turgeant, neque dilatentur, sed flaccescant. At si paulò diuturnior sit, & intemperantior siccitas, haud dubiè, ut æstus chordas citharæ impensius resiccatas tendit ac rumpit: sic nervos eadem, aut similis in corpore siccitas



tas præsertim calori iuncta flectet, contrahet, & tandem etiã disrumpet, non autem relaxabit. Humiditas tamen utrumq; efficit. Nam & tendit solidam substantiam penetrando ac dilatando, ut pluvioso tempore eadem chorda inflantur: & relaxat leniendo, ut si quis corium resiccatum pinguedine oblinat, uel humore imbuat. Quare tam conuulsionis, quàm Paralyseos humiditas causa esse potest. Sed in illa nervos contrahit ob plenitudinem: in hac, relaxat ob madorem. Siccitas autem nunquam efficiet Paralysem, nisi κατὰ συμβεβηκός. Inde etiam efficitur, humorem in Paralyse tenuiorem esse debere, quia in solidam substantiam nervorum penetrat: in conuulsione uerò crassiorem, quia tantum replet.

Duplex alia difficultas. Una, quòd cum in conuulsione affectio sit sæpius in nervis, quàm in musculi corpore, nihilominus musculi, non nervi morbus esse dicatur. Altera, quia definitur per motum, cum tamen pars læsa ita immobilis rigeat, ut in contrarium nullo modo flecti possit. Hoc fit, ut dicam uerbo (non enim argumenta soluere, nostri est instituti) τὸν κοινὸν κίνησιν ἢ ἰσχυρὸν κίνησιν. Illud uerò, quia musculus, proprium est motionis instrumentum. Quomodo autem ad proprium cuiusque particule organi morbus referri debeat, Galenus copiosè docet de morborum & symptomatum causis. Nobis satis fuerit morbi huius notionem primum animo complecti: deinde partem affectam nosse: tertio, affectionis causam: postremò, curationis summam. Quæ omnia breuiter sic habeto.

Cum uel corpus, uel illius membrum aliquod repentiè contortum & inflexum apparuerit, perinde ac si in naturali situ esset, rigidum tamen est, nec ab eo situ potest dimoueri, & si eo uel inflectere coneris, quòd, cum secundum naturam habebat pro arbitrio dirigebatur, conuulsionem esse suspicandum est musculorum, uel plurium, uel alicuius, qui ad sua ipsorum principia contracti, partem simul, cui inseruntur, adducunt, immobilemq; reddunt, ita, ut uel recta, uel inflexa, uel contorta uideatur. Hoc tamen obseruato, ne id articulorum ossium uitio fiat. In his enim sæpe uel callus gignitur, uel delapsus humor intra cavitatem prohibet liberam in iuncturis motionem. Quod intelligitur, si nec repentiè, nec affatim, nec

D 2 post



## DE MORBIS INTERNIS

post febrem ardentem affectio inciderit : si luxatio fuerit in particula læsa, non rectè curata : si contusio, aut aliquid simile antecesserit. Tunc enim muscoli primario non afficiuntur, sed flecti ossa in iuncturis nequeunt, licet ipsi quoque tandem trahantur in consensum. Cum enim diu manent immoti, otio propriam mouendi vim tandem amittunt.

Partis affectæ dignotio est huiusmodi. Si totum corpus subito conuellitur, ut in Epilepsia, nervorum principum patitur. Si caput antrorsum curuatur, & mentum annectitur pectori, duo muscoli anteriores caput flectentes laborant, estq; emprosthotonos. Si in dorsum & scapulas contorquetur, ex duodecim musculis caput extendentibus in posteriore parte colli, uel aliqui, uel omnes afficiuntur, diciturq; affectio hæc, opisthotonos. Quando cervice recta & immobilis manet, in neutram partem curuata, utriusque musculi & anteriores & posteriores tetanon efficiunt. Si oculus contorquetur, *ἑρπασμός* erit, musculis, qui ipsam movent, conuulsis : si mandibula, *τρίσμος*, temporalibus contractis, uel nervis è secunda & tertia coniugatione. Si labra & nares, & pars contracta sanam ad se adducit, in uitio est latus musculus, ex quo musculi narium, superciliorum, & labiorum fiunt, uel nervi à primis uertebriis & ramis tertiæ coniugationis. Græcis *κυνός σπασμός* nominatur. Si utraq; pars, dextra scilicet, & sinistra laxatur, musculi utrinq; contracti, *Sardonium* risum faciunt, maxillares nimirum in latera, os & labra deducentes, ita ut ægri perpetuò ridere uideantur. Idem iudicium de cæteris partibus. Semper enim affectio ad musculum authorem illius motus, qui læsus est, referri debet.

Fit autem hic affectus nervis, uel musculis aut exiccatis uel calefactis : ut à uulnere, & post largam sanguinis missionem, febres ardentes, menyngum inflammationes, uel cerebri. Atque sic leihalis est. Aut congelatis : ut ob refrigerationem humorum, uel sudorem refrigeratum, uel uentum frigidiorum. Aut inflatis : ut à pituita uiscida (nam rarò fit à sanguine) uel post morbum non satis exiccatum, uel sanie collecta in aliqua parte capitis, ut menyngibus, ob uulnus : uel à flatibus medicamenti, uel agitatione materie, ut post  
hellebore



hellebori potionem. Ab ebrietate, crapula, suppressa uacuatione consueta, exercitatione intermissa, phlegmone, dolore, consensu uteri, morsu, puncto nervo, aut tendone, affecto ore uentriculi ab eruginosa & biliosa materia, uermibus, fungis, ab ictu fere uenenata, & simil.

Hippocrates hæc omnia ad duas causas reduxit, inanitionem & repletionem. Tertiam recentiores addiderunt per con dolentiam, affectumq; uocant non proportionatum ad materiam, cum mouetur cerebrum in sese, ut expellat, quod noxiū sentit, ut dolente nervo ob puncturam, aut alicuius animalis uenenosi morsum. Sed hanc Galenus ad inanitionem: alij, quia materia uenenosa est, licet pauca, ad plenitudinem referunt. Hellebori quoque potio ad utranq; causam reduci potest. Ex antecedente uita, uel morbo, uel habitu corporis omnia facile discernuntur.

In curatione torture oris superiore capite descripto utendum clystere, deinde coquentibus pituitam: in plenitudine sine cruditate, sectione uenarum lingue, gargarismatis digerentibus, formulis in ore retentis aqua uite formatis quibus nihil præstantius, iunctionibus, sacculis, fumigij, emplastro ex gummis calfacientibus.

Ab inanitione non curatur sed prohibendū, ne fiat sublata causa, ut in febre ardentissima & phrenitide, si à nimia siccitate periculum immineat conuulsionis, spinam inungendo, ne nerui exsiccentur, uel irrigatione ex refrigerantibus ob febre, & humectantibus, ob neruorum siccitatem.

A uomitu, aut immodica uacuatione curari potest, humiditatem reparando per humectantia, & quæ heceticis prosunt.

Si à punctura fiat, vulnere latiori reddito & aperto oleum de terebinthina imponendum, uel de euphorbia cum emplastro de Galbano sedandus dolor, vulnus ad cicatricem nõducendum, nisi post multum tempus. Extremum remedium est, tendonem uel neruum ictum abscindere in parte supra puncturam.

A uenenosi animalis morsu, cucurbitula cum multo igne supra partem affigenda, uel cauterium, uel antipharmacum. Intrò sumenda theriaca cum herbe decoctione, quæ sit ueneno accommodata, theriaca etiam uulnere imposita prodest.

D 3

A sanguine



## DE MORBIS INTERNIS

*A sanguine, sepius repetenda est uenæ sectio, & oleis medys utendum. A pituita, curatur coctione materie & eductione, ut de Paralyfi dictum est, additis malacticis ad inunctiones, balneis, & similibus.*

*In conuulsionibus capitis & humorum refrigeratione, calidioribus utendum partes lana succida inuoluendo, cucurbitulis, sectione quandoque illius uenæ, quæ supra primam dorsæ uertebam apparet.*

*Amenyngum punctura, aperiendum cranium trepano, aut alio instrumento, ut materia transpiret, aut epipasticis trahenda, nisi subsit plenitudo.*

*A uentriculo, tutius clysteribus acribus, aut pilulis utimur quàm uomitu, ne os uentriculi contactu ueneni laedatur. Conueniunt etiam spinæ inunctiones.*

*Vnctione conuenienti.) Sequens medicamen excellentissimum est, in resolutione linguæ, oculi, labiorum, risu Sardonio, tremore capitis & totius corporis, ac omni capitis percussione inflatis præcordiis, & similibus.*

*R. cinamomi, croci nardi, costi, styracis rub. opopanacis, myrrhæ, melanopiperis, seminis rutæ succi abrotani an. drac. ix. dauci drac. iij. s. moschi, beniouini an. drac. i. mellis q. s.*

*Pinguedini anserum syluestrium quos uocant Otidas, & Phalacrocoracum (vulgò Cormoranos nominant) plurimum tribuunt leniendis doloribus Sortilegi. Paranda autem est eo modò, quo Gattinaria ex Nicolao Forentino docet de anseris vulgari, capite de Spasmo. Oleum de enula, irinum, de ligno sancto, crocinum Mesue, lumbricorum, axungia humana, de styrace, de euphorbio, de castoreo, piperibus philosophorum, de costo cum parte illius pinguedinis, aut mellis, & modico castorei piperis, euphorbi conueniunt.*

*Cucurbitulæ.) Cauendum, ne tendonibus affigantur, sed musculi principio, aut medio, ad iuuandum eiusdè actionem. Quibusdam locis commodè adhiberi non possunt, ut labris, supercilis, digitis, ubi sanguisugæ: aut earum loco, ut in palpebris, & lingua, scarificatus erit ex uso.*

*Aquæ perfusio, febris.) Hæc duo remedia à ueteribus multum commendantur. Periculosa tamen sunt, ut ratio, & experientia demonstrant. Timendum enim in perfusione fr*  
*gide i*



gide, ne materia magis inde refrigerata, altius impingatur. Si tamen spes certa subsit calorem à frigore, quasi antiperisthasi quadam intro posse cogi, ut in principio, estate media, iuvene bene carnosio, non omnino negligendum, Febrem quidem Hippocrates dixit morbis à crassa pituita mederi, rigore & calore: quia rigor materiam commouet, exagitat & purgat: calor coquit, tenuat, incidit, resoluit. Sed cum, si uehementior sit, tollat egrum: minor uerò coquendo morbo non sit satis: longè tutius est eam uitare, nisi sponte superueniat. Difficile enim fuerit in medio consistere.

De incubo.

Cap. XII.

**I**N cubus, q̄ ephialtis, epiboli a, à Themisone, pnigalion dicitur, neque deus, neque semideus, neque Cupido, quod ueteres crediderunt, neque dæmon, neque incubans uetula. Sed uapor quidam crassius, qui partim uias spiritus animalis intercipit, unde & loquendi & respirandi difficultas: partim animæ offunditur, unde phantasia, & spectrum quoddam, quale b frequens est in somniis.

Sed ideo incurfare, atque etiam opprimere thoracem, constringere collum, præcidere uocem, apparet, quia his maximè partibus labor est. Pueros & c obesa corpora aliquando suffocat: alioqui Epilepsiam denunciat.

Incubus enim, Epilepsia quædam nocturna est. Multos olim Romæ, quod scriptum reliquit Syssimachus, uno anno confecit. Itaque qui incubo opprimitur, statim excitandus est. Postea uidendum, ne affectio eiusdem redeat.

Imperanda est sobria uita, cœna frugalis, uitæ ratio è media d materiam, frequens ablutio extremorum. Sæpe etiam pectendum caput est ex ebore e in posteriorem partem ducto pectine.

Melicratum plus minusve dilutum pro fratione, in quo radix fœniculi, asparagi, petroselini, graminis, acetosæ, cichorii, endiuix, radicis capparis, hyssopus, buglossum, borrago, endiuia, summitates lupuli, fuma-

D 4 ria

a Ex Paulo Aegin. cap.

15. lib. 9.

b Præsertim melancholicis &amp; pueris.

c Vbi materia exitus non habet.

d Neq; humida, neq; sicca, sed tepata: ut carne uetulina, panem medio, eoq; bene fermentato.

e Occiput uersus.

f Temperamenti &amp; cal.



# DE MORBIS INTERNIS

*a Verū sco-* ria *a* cetherac, *b* scolopédrium, capillus ueneris, cuscu-  
lopendriū . ta, passulæ mundatæ ab arillis, pruna, sebesten, flores an-  
*b Phyllitis* thos, uiolearum, borraginis, decoxerint. Quale hoc erit.  
*Mattheoli.* R. rad. sceniculi, radicis graminis an.  $\bar{z}$ . s. summitatū  
*c Vel po-* lupuli, P. ii. hyssopi, trium florū cordalium, passularū,  
*tius syrup.* liquiritiæ an. P. i. fiat decoctio ad lib. i. s. in col. dissol. *c*  
*uiolacei &* mellis albi, sacchari albissimi an. unc. ii. fiat melicratū.

*capill. uen.* Deinde purgandum corpus hoc modo.

*an. unc. ij.* R. castiæ, uel cathol. drac. x. dissolue in sero lactis ca-  
d vt si uenæ prin, uel alterius cum  $\bar{z}$ . i. syrupi uiolati, fiat potus.

*sint sangui* Pro ratione materiæ licebit uti fortioribus, quæ par-  
*ne distetæ.* tim in capite de Epilepsia, partim in capite de Melan-  
*e Ut masti* cholia dicentur.

*che, salua,* Nec omittenda phlebotomia, si res d exigat.

*maiorana.* Clysteres quoque & frictions ex usu sunt, quia fu-  
*f Ut puluis* mos reuellunt. Errhina quoque & Apophlegmatismi  
*ex corallo,* ex leuiori e materia. Cucurbitulæ in cruribus & omo  
*saccharo ro* platis, pulueres quoque, maximè à cibo, qui fumos pro  
*sa. & mar-* hibeant f & morbo conueniant. Qualis hic est.

*garitis con-* R. g coriandri preparati drac. ii. specierum diamarg.  
*fectus.* frigidi, & diarhodon abbatis an. drac. i. semini nigri pœo  
*g Vel hunc* niæ  $\bar{z}$ . ii. coralli rub. drac. s. macis, cinamomi an.  $\bar{z}$ . i. cum  
*prescribes.* modico sacchari rosati, fiat mixtura, utatur post pastum  
*R. coriadr.* cochlearis dimidio.

*prepar. dr.* Bibere quoq; medio h pastu, nō in fine, hoc adiuuat.

*ij corall. ru-* Cucuphæ queque parandæ sunt ex floribus anthos,  
*br. margar.* stœchados, & cæteris rebus capitalibus, ut prius.

*electarum* Dropax quoque i simplex tum hypochondriis, tum  
*an. drac. s.* etiam capiti commodè aptari potest. Calidus applica-  
*rasure ebo-* tur, & ne pertinacius inhæreat, linteolum rarius, & ue-  
*ris, oss. de* hementer attritum k interponendum est. Compona-  
*corde cerui* tur dropax ex quinque partibus picis, & una olei de spi  
*an.  $\bar{z}$ . i. ci-* ca, uel mastiche.

*namomi gr.*

SCHO-

*vi. sacch. ros. unc. iiij. f. puluis subtilis. utatur à pastu cochlearis dimidio.*

*h Ut iactis cibi fundamentis.*

*i Ex pice.*

*k Inter picem & cutem.*



Ἐφιάλτης, ἀπὸ τοῦ ἐφάλλισθαι, quòd qui eo affectu laborat noctu quiddā sibi incubere existiment, à quo innadantur & opprimantur cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpedita, ut prope suffocari videantur, unde & à Themisone, epistolarum libro II. (teste Aureliano) τριγὰλιων ἀπὸ τοῦ πνίγισθαι. Ex ueteribus etiam nonnulli ἐπιβολὴν nominarunt, quod Aurelianus quoque refert. De parte primario affecta non omnium idem iudicium. Interpretes Arabū priorem cerebri uentriculum uel spinalis medullæ exortum uapore crasso, aut etiam humore, qui tamen facilè dissoluitur, oppleri aiunt. Posidonius non humore, sed crasso & frigido uapore spiritus animales per neruos ferri prohibente. Vtrunque minus probabile. Alioqui enim inde necessè esset uel Epilepsiam, uel Apoplexiam, uel Caron generari, aut saltem respirationi tantam noxam non inferri, aut thoraci, à quo cum totius mali origo ducatur, grauiusq; ceteris laboraret, in eius uenis summam plenitudinem esse consentaneum est. Quod & symptomata indicant, pondus nimirum thoracem opprimens, & difficilis motus eiusdem inter dormiendum, uel inchoata coctione, ex fumis nimirum, & flatibus, qui tum excitantur, pulmones & septum transuersum prementibus, presertim cum nō tam libera sit respiratio per somnum, quàm inter uigilandum. Quòd autem in eo leditur imaginatio, quæ est in prioribus uentriculis, id fit per consensum, ut in melancholia hypochondriaca. Fumi enim ex crassione sanguine sursum lati timorem animo incutiunt, varièq; imaginationem afficiunt, ut docet Galenus de locis affectis: atque hinc fit, ut quidam Dæmonem esse putent. Si diu tamen perseueret, frequentiusq; repetat, cerebro si essentialis, degeneratq; in Apoplexiam, uel Epilepsiam, uel melancholiam.

Causæ antecedentes sunt, crapulæ & eruditates, pessima victus ratio, multitudo crassi sanguinis, suppressi menses, aut hemorrhoides, & similia. Summa curationis (mutandæ tamen pro causarum uarietate) est huiusmodi.

Clyster discutiens flatum & euacuans in paroxysmo, sanguinis missio in plenitudine è basilica, uel mediana, præser-



## DE MORBIS INTERNIS

tim si sanguis crassior appareat, & sine pituita, pituita co-  
ctio, euacuatio, optate quibus flatus discutientia miscean-  
tur, pulueres flatus discutientes, vñctiones pectoris, sacculi  
cordi applicati, parciore cœna, vel nulla, cibi minimè flatuosi,  
decubitus in latus.

Quod Theologi existimant. Non omnino certè con-  
temnenda est veterum Theologorum authoritas, omniumq;  
gentium communis ille consensus de Incubo & Succubo, cui  
etiam attestatur experientia. Memini enim me in Primiti-  
uæ Ecclesiæ historiis legisse Cathecumenos huiusmodi demo-  
num ludibriis uexari solitos, qui deinde cœnæ sumptione libe-  
rabantur. Multa quoque sunt apud D. Augustinum de Incu-  
bis & Succubis libro 15. de Ciuitate Dei, ut hinc ferè cogi-  
mur fateri incubum alium demonis arte induci, alium corpo-  
ris morbum esse. Nisi quòd summa Christi luce nobis af-  
fulgente, ab his tenebris nunc non est metuendum. In Gento-  
litiis illis ceremoniis multa huiusmodi deliramenta reperiun-  
tur de Sympithis, & Pythone, spiritu diuinatore occupatis,  
sed multò lepidiora in Hebræorum Rabbinis. Scribunt enim  
huiusmodi phantasmata ex semine Adam procreata fuisse,  
centum illis & triginta annis, quibus ab uxore abstinent,  
postquam Cain fratrem interfecit. Pro singulari remedio in-  
bent circulos septem circum sepulchrum fieri, ne cadauer in-  
tromittendum subeant, eoq; ad nocendum utantur. Platoni  
ci hæc referunt ad oracula, vaticina & somnia. Sed & in ue-  
terum Medicorum libris multa remedia reperiuntur ad Sym-  
pithos, & demone occupatos, & incubos, ut apud Aët. &  
Alexandrum. Qualis est illa Hippoc. antidotus territis lemu-  
ribus & demonio occupatis, lunaticis cum spuma tauri, quæ  
in codice manu scripto sic legitur.

R. nuces cupressi 50. Caricarum pinguium sine nu-  
cleis, pass. mund. ab arillis an. drac. xij. (fortasse 3 xij.)  
ladani, styracis opt. myrrh. aspalti, bdelij, radice aspho-  
deli, enulæ an. 3. vii. cardamoni 3. v. sabinæ unc. 4. folii,  
costi, spicæ. ros. baccarum iuniperi an. 3. iii. schœn. cas.  
lentisci an. 3. ii. croci, cyperi, lybisti. an. unc. i. vini opti-  
mi & mellis q. s. Nuces cupressi fractæ triduo maceren-  
tur in vino optimo: coque lento igne ad vini consum-  
ptionem



ptionem aliquam, & cola. Tum in uini libr. ii. carnes si-  
cum tritas diu contere uino, & additis mellis libr. ii. ite-  
rum coque ad mellis crassitudinem, & sacculo excola:  
tum adde passulas, & dactylorum carnem, & in mortario  
diu contere. Hinc styracē, ladanū, terebinthinā cū modi-  
co melle diu terēdo in mortario misce, ex quo pulueres  
coniunge sedulō, & uitro reponē. Da dr. ii. uel dr. iii. in  
catarrhis, fluxionibus, mulierū morbis à frigore & flatu.

Non iniucundum est, quod nobis contigit nuper apud Ar-  
uernos in Cœnobio quodam. Cū enim Pharmacopola, quem  
nobiscum habebamus, inter dormiendum incubo laborasset,  
qui in eodem cubiculo erant, accusauit. Se enim ab illis noctu  
propē iugulatum fuisse, constricto collo. Quod cum socij auda-  
cter negarent, totamq; in eum culpam reicerent, qui noctem  
insomnem furore quodam percitus duxisset, iussimus deinde,  
ut solus lautē cœna sumpta, exhibitis etiam flatuosis alimen-  
tis, dormiret, cubiculo nudiq; optimē clauso. Redijt paroxys-  
mus, demonē esse iurauit, cuius etiam faciem & gestus miri-  
ficē depingebat. Neq; unquam illi aliter persuadere potui-  
mus, nisi ubi curationem nostro consilio adeptus est.

De Epilepsia.

Cap. XIII.

**E**pilepsia conuulsio est a corporis. Nascitur, ubi hu-  
mor crassus & frigidus offarcit anteriores uentri-  
culos cerebri, ex quo uniuersus motus, & ueluti raptus  
totius corporis. Contorta b facies, in uoluntaria c sem-  
effusio, & interim affectio, quæ apoplexiæ proxima est.

Pueros ferē uexat, quo tempore dentire d incipiunt,  
unde puerilis e morbus ab antiquis appellatus. Ut etiā  
lunaticus, quia interlunio nati, obnoxii huic morbo exi-  
stimantur, ut & qui concepti sunt fluentibus f mensibus.

g Perseuerat hic morbus ad h annos pubertatis, sol-  
uiq; consuevit in masculis, cū semen emittere inci-  
piunt. In mulieribus, quum primum effluunt menses  
quos annos si superat, desperata i res est.

Nascitur

h Si achorum capitis copia morbi occasionem non tollat.

i Quod impressa maneat maligna in cerebro qualitas, quæ natura benefi-  
cio non potuerit emendari.

a Vniuersi,  
eaq; typica,  
cum mentis  
& sensuum  
oblesione.

b Nā quæ  
uicina sūt,  
quæq; com-

munia ( vt  
suprà com-  
memoratu  
ē) ea primū  
maximēq;

c Doloris  
ui, & labe-  
factata se-  
resoluta in-

strumento-  
rum sperma-

ticorum re-  
tentrice fa-  
cultate.

d Cum septi  
mestres sūt.

e Gal. com-  
mē. ad aph.

5. sectio. 1.  
lib. 6. τὸν

ἐπιδημιον.

f Ob impi-  
ritatem ex

synatrismo.  
g Aph. 45. l.  
2. & 7. li. 5.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** *Uti picro* Nasceitur aliquando consensu *a* stomachi, aut aliarum  
*cholico dyo.* partium corporis. Aliquando spiritu quodam *b* uirulen-  
*b* *Ut a cor* to ex partibus inferioribus sublato in caput. Sepe etiam  
*ruptione se* primarius *c* cerebri affectus est.  
*minio i mu* Quos uexat paroxysmus, sic habeto. Corpus, quod  
*lieribus hy-* rapitur, loco lucido & *d* mediocriter calido collocato. *e*  
*stericis.* Sublimiori capite, ex quo membra *f* supernè deorsum  
*c* *A pitui-* confricari debent.  
*ta & melā* Dentes, quos sæpe *g* constringunt, unde etiam immi-  
*cholico hu-* net *h* suffocatio, uel manibus, uel quavis alia ratione *i*  
*more.* diducendi sunt.  
*d* *Ut foras* Ex quo hac formula, & lingua, & palatū illinenda *k* sūt  
*euocetur hu* R. theriacæ uel mytridatii ℥. iiii. dissolu. in unc. i. suc-  
*mor.* ci rutæ, cum penna, uel linteolo extremitati baculi alli-  
*e* *Ut reuoce* gato, palatum & lingua affricentur. Tum.  
*tur humor.* R. beniouini, mummiæ, picis nigræ an. ℥. i. uniantur  
*f* *Ut nati-* cum succo rutæ, fiat suffumigium pro naribus, aut eadē  
*us excite-* simul liquefacta naso interiori inungantur. Vomitus, si  
*tur calor.* fieri potest, excitetur oleo ex penna illito interiori par-  
*g* *Ex con-* tioris. Alioqui perseverante paroxysmo.  
*uulsione tē* R. cast. ℥. ii. beniouini ℥. i. diss. in oxymelitis scyllitici  
*poralis mu-* ℥. i. s. cū cochleari, distractis dentibus ingeratur in gulā.  
*sculi, qui* Dydimus Medicus extracto sanguine ē pedis pollice  
*primum af-* labra epileptici inungebat. Orpheus, & Archelaus con-  
*fici solet ob* taminabant faciem ex quacunque parte corporis ducto  
*cerebri affi-* sanguine. Atque ita statim exurgere epilepticos testa-  
*nitatem.* ti sunt. Post paroxysmum clyster iniiciendus est, qualis  
*h* *A suppress* hic ueterum.  
*sione excre-* Pueris autem, sublato paroxysmo, remediis iam præ-  
*menti fuli-* scriptis, prohibenda est mali generatio ac labes, abstinē-  
*ginosi: unde* tia uini, usu frequenti pulueris confecti ex pæoniæ radi-  
*salina à spi-* ce & semine. uisci quern. puluer. contra uermes & sac-  
*ritus prohi-* charo cando: quibus etiam soluentia misceri possunt. ut  
*bitione cras* R. rad. & sem. pæoniæ an. drac. ii. sem. contra uerm. drac.  
*sescit.* ij. rhei. elect. ℥. ii. sacchar. unc. ii. f. puluis subtiliss. De-  
*i* *Ut exitū* tur  
*habeat fuligo & cerebrum aeris inspiratione recreetur.*  
*k* *Ad correctionem presentis symptomatici.*

*pulsio*



tur ex cochleari semel aut bis in hebdomade, sereno coe  
lo, declinante luna, cum iusculo.

R. decocti aristolochiæ, centaurii minoris, uel cala-  
menti libr. i. in quo dissol. pul. hierę picrę. pul. hierę dia-  
coloc. an. drac. iiii. olei cham. unc. iiii. sacch. rubri, mellis  
communis an. unc. i. salis drac. ii. Post clysterem refouen-  
di sunt cibus boni succi, ex quo melicratum imperadum  
est ex hyssopi decocto, stæchados, calamenti, aut syrupus  
acetosus, oxymel simplex, oxymel scylliticum.

Deinde purgandum erit cum hiera picra, & hiera dia-  
col. Hæc enim purgatio maximè probatur antiquis.

Nec omittenda phlebotomia a si omnia consentiunt.

Iis uerò, quibus inueteratur Epilepsia, ad cautionē,  
uenam b è malleolo diuides ueris initio. Iam progressio  
uere, melicrato hyssopi, aut simili pparabis, &, ut prius  
purgabis. Aut, ut ueteres uoluerunt, amplissimam colo-  
cynthida cauabis, reiectis seminibus, & interiore mate-  
ria: tum undiquaque c induces pasta. Deinde cauatam  
colocynthidam, passo, aut alioqui uino dulci implebis.  
adiectis quatuor foliis rutæ & d obolo cinamomi. effer-  
uebit uinum, in calidis cineribus: deinde per noctem si-  
netur in colocynthide. Postridie per linteum bene mun-  
dum percolabitur, & bibetur.

Post purgationem reficiendum corpus est. Post tres  
dies, inde cucurbitulæ in hypochondriis affigendæ: dein  
de scapulis cum scarificatione. Aliquot diebus interie-  
ctis, iterum purgandi sunt, ex eoq; cucurbitulæ occipitio  
affigendę caput radendum est, aut certè detundendum.

Comparanda cucurbitula, e & per interualla spurgan-  
dum, ut etiam Autumno ad helleborum ueniendum sit.

Hoc

presertim ueteribus solennia fuisse remedia. ut. R. ther. veter. mylbridiatij,  
an parteis equal. rad. enule campan. libr. s. saluie stæchados, beton. an.  
unc. s. Temperentur per noctem uino maluatico: deinde fiat aqua stillati-  
tia, mane utatur. Aliud ex Actio. R. veratr. nigr. castorei, scam. an. drac.  
ij. opopanax. cumini thebani siue regij, centaur. nitr. sulph. viii, abroton.  
ammoniaci, sem. rutæ syluest. an. drac. ij. confusa & cribrata excipian-  
tur mulsæ organata. f. pil. ad magnitud. fabæ egyptiæ.

a Si magni

tudo causæ

hoc postu-

let, materia

orgasmus,

cerebri op-

pressio, hy-

pocondrio

rum obstru-

ctio.

b Ad ma-

iozem reuul-

sionem, ut

fiat humor

καταρρο-

ς, quie-

rat κατάρ-

ρος.

c Ne exha-

let humor.

d Ut gra-

uis. x. vel

drac. s.

e Ex cepha-

licis.

f Ut pil. ex

hier. picra:

quin etiam

epilepsia &

pituita in

terata hæc



DE MORBIS INTERNIS

Hoc modo ueteres helleborum propinabant.

R. fibrarum radice hellebori ℥. ii. distemperentur in unc. i. melicrati: deinde siccetur in umbra, & pulueris entur: tum adiecto eodem pondere piperis, & modico mel li misceantur, uel è mulla propinentur. Galenus pluri- mum commendat hieram diacolocynthido, quæ helle- borum recipit. Tentatis itaque leuioribus remediis, nō est metuendus a usus hellebori. Post hæc sternutato- rius, quæ puluerem b rad. pœonię recipiant, & masticato- riis utendum erit.

Sanguisugæ etiam fronti, & per ambitum capiti, affi- gende sunt. Fuerunt in ueteri Medicina, qui eunuchis- mum, id est, castrationem e maxime probauerint.

*Formula sternutatorij.*

R. pyrethri, pul. radice pœoniæ an. ℥. ii. nucis mos- chatæ ℥. i. hellebori nigri puluerisati ℥. s. fiat puluis, qui insuffletur in nares. Eadem quoq; præter helleborum mastiche incorporata masticatorium efficiunt. Vsus con- ferre acori, aut stæchad. theriacæ, mytridatij, maxime conuenit, idque d iam purgato corpore. Electarium quo- que Razæ. cuius e hæc est descriptio.

R. pyrethri, seseleos, stæchados ana drac. x. agarici drac. v. cordumeni recentis & acuti, assæ optimæ, aristo- lochiæ rotundæ ana drac. j. s. excipiantur omnia melle scyllitico Detur auellanæ magnitudine ieiunis.

Galenus in libello de consilio in comitialibus con- quassatam scyllam in uase meliteo, id est, in quo antea mel repositum fuerit, aut alioqui coctum recondit: uas pelle inducit, & fideliter occludit: tum meridiano soli ob- uertit, prohibetq; aquilonibus: subinde aliter atque ali- ter obuertit, ut omni ex parte radij solis uas calfaciant. Scyllam colligit sub cane, quo tempore mel scylliti- cum præparat, finitque quadraginta f diebus. Postre- mō aperto uase, liquor, qui è scylla desudauit, excipi- tur, & melle addito dulcoratur. Dosis paruulis drac. s. aliis. drac. ij. Materia reliqua scyllæ cum melle subigi- tur, atque eodem modo, sed nō tam utiliter Epilepticis imperatur. Alii succum scyllæ pari mellis ponderi com- miscent,

a Cum de- lectu præ- scripti.

b Ut vene- nata aura exhauria- tur.

c Ratione- vsus vene- ris, non sper- matis.

d Cum tan- tum agitur de in cere- bri resti- tuenda.

e Viderha- zem lib. 9. ad Almās. cap. de Epi- lepsia.

f Toto tem- pore canicu- la.



miscet, ut fiat mel scylliticum. Pueros uerò clemētius habere oportet.

In primis uitæ ratio nutriti<sup>a</sup> instituenda est, quæ geret lac utile, ac paulò calidius, & siccus, quàm temperatum sit. Pueri corpus molliter <sup>b</sup> fricandum est, & inungendum, tum etiam caput detonsum ex oleo anethino, rutaceo, de maiorana, irino, adiecto pulueris momento, cyperi, aut ireos. Cucupha quoque comparanda.

R. cyperi, ireos florentiæ ana ℥.ii. sem. seseleos, & pæoniæ ana ℥.i. capill. uen. flor. anthos, & chamæm. ana ℥.i. macis, cinamomi ana gr. viii. Fiat puluis pro cucupha. Sed & pueri <sup>c</sup> inungatur melle, & succo rutæ, uel salis granum immittatur podici.

Paretur electarium ex butyro, & saccaro, quo etiam nutritrix papillas mammarum illinat.

Comparetur mel passulatum hoc modo.

R. aga. trochiscat. unc. s. infundatur in aquæ libr. s. agaricum detrahatur in eadem infusione, detracto agarico, passule bene pingues distemperentur, dum turgeant: turgidæ in noua aqua coquantur: ad extremum coctæ expri mantur in aqua, in qua coxerint. Expressio cum aqua rursus coquatur ad mellis crassitudinem. Paulò adultiores, ut qui secundum aut tertium annum superant, passulis, prunis, ficibus eo modo maceratis uti possunt.

Iisque electariis, & passulato melli puluis pæoniæ & hyssopi adici potest. Purgentur ex drac. iii. cassiæ, & ex manna, & penidiis præparatis, ut ante dictum est.

Radix pæoniæ in taleolas discisa, & ita transfixa filo suspendatur è collo.

Syrupus acetosus, melicratum, absynthii decoctum, cicerum rubrorum, uomitus iisdem conueniunt.

## S C H O L I A .

Caducum, à cadendo, Comitiale, à Romanorum Comitibus, Lunaticum, quòd motu lunæ commoueat, vel interlunio natos corripit, vulgò hunc affectum vocant, Auicenna puerorum matrem, nominibus impositis, habita ratione, vel symptomatum, vel loci, vel causæ efficientis, vel eorum, qui eo frequentius solent corripì, ut pueri. Apud Græcos tamen ferè semper

*puerorum curo:*

*a Condiatur in scula hyssopo, salina & similibus.*

*b Ut fiat corpus & diapog. Tor.*

*c Ut ei feratur aluus Qui. n. crassiores sunt, aluo quoq; adstrictio- re, ut plurimum, sunt epileptici.*

*d Cassia nō admodū probatur ad curationē epilepsiæ, quod resoluat.*



## DE MORBIS INTERNIS

semper à magnitudine non accepit. *Επιληψία* enim dicitur, quòd, ut ait *Aurelianus*, sensum atque mentem pariter apprehendat, Antiquioribus *επεὶ νόσος*, id est, sacer morbus, quò eius magnitudinem, ut ait *Galenus*, designarent. *επὶ* enim magnitudinem significat. Quamquam *Aurelianus* significationem etiam aliam affert, vel quod diuinus sit morbus, & à diis immissus in vindictam: vel quid sacram occupet animam, vel in capite fiat, tanquam animæ loco sacratio. Ob eandem causam *Hippocrati*. *Ηρακλῆα νόσος*, nominatur. Non quòd *Hercules*, ut ait *Galenus*, eo morbo laborarit, sed ut eo nomine, τὸ δυσκαταρχήτων designaret: licet, authore *Aristotele*, reuera *Hercules* epilepticus fuerit. *Arctæus* addit veteribus *Elephantiasim* quandoque dici, quò nullo remedio superari queat. Ab omnibus morbis frigidis capitis distinguitur potissimum uehementi & inæquali corporis concussione, & spuma in ore collecta. Que tamen nota in leuiori morbo non apparet, ut eo, qui excitatur ob tenuiorem materiam, & fumum acrem. Facile. n. & citò soluitur. Est autē conuulsio omnium partium corporis nō perpetua, sed per interualla, cum mentis & sensu oblesione. De cuius causis, generationis modo ac loco non eadem est omnium sententia. *Veterum. n.* prope omnium communis consensus est, ab humore crasso, viscoso, & fere semper frigido procreari, obstruente (ut quibusdam placet) medium ventriculū cerebri, vel (ut alijs) posteriorem, vel utrunq; vel modò vnum, modò alterū, vel etiā primum. atq; ita fieri, ut interceptis vijs, spiritui ad nervos non pateat aditus. Addunt nonnulli, non sine probabilis ratione, quandoq; id contingere ob angustiam meatus à posteriore cerebro ad spinam, vel imperforatam, aut strictionem lacunam ad palatum, aut ad nares. Et certe *Galenus* de usu partium scribit optimè cōparatum esse à natura, ut per decliues cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per corpus narium, orificijs perspicuis ac magnis, pituita, aut alia cerebri excrementa excernantur, ne animal frequenter corripiatur *Epilepsia*: videmusq; per illam viam expurgari materiam, que *Epilepsiam* excitauit, ac spumam ex ore educi. In contrariam tamen multa à doctis afferuntur.

Primum ab intemperie fieri non posse videtur, sine vapore aut



re aut humore. Citiùs enim interiturum est animal, quàm ad tantam perueniat intemperiem. Hoc enim modo corpus non còuelleretur: sed ab omni prorsus actione desisteret. Licet Hippocrati duæ conuulsiois causæ sint, plenitudo & inanitio. Quod de particulari intelligendum videtur. Hæc autem & vniuersa est, & mentem sensusque omnes oblaedit. Nam sine mentis lesione conuulsio, etiã si totius sit corporis, Epilepsia non est. Neque ab humore crasso. Cita enim solutio, materiæ & paucitatem & tenuitatem indicat, quòd crassa difficile moueantur. Idem demonstrant oscitatio, sternutatio, spumæ per os exitus, tenuioris materiæ indicia. Fit enim spuma, cu frequenti inspiratione & expiratione, violentoq; motu aqua tenuis agitur, & spiritus, aut substantia quadam vaporosa comprehenditur. Accidit quoque frequentius ingentis hominibus, ob tenuem cerebri substantiam valde sensilem, vicius rationem vaporosam, flatus, vinum fumosum, & similia. Adde omnem Epilepsiam per consensum à tenui substantia oriri, vt vaporibus bilis flauæ & porraceæ, eorundem agitatione & acrimonia, fumis, odoratis, aere, vel vento per nares concepto. Videtur ergo causa esse pituita tenuis, spumosa, bilis flaua, atra tenuior, aut eius ichor, vapor acris, odor ob cerebri exactiorem sensum. Neque etiam fit obstructione spirituum transitum impediẽte. Oporteret enim vel motum in vniuersum prohiberi, vel minui, quantitate spirituum, qui trãseunt, non sufficiente ad partes inferiores mouendas. Sed vehementior, quàm antè, apparet concussio, et motus inæqualitas. Probabilius multò, cerebrum in seipsum contrahi, vt expellat, quod noxium est, sicuti in sternutatione, quæ veluti parua quedam Epilepsia est, vt rectè dixit Auenenna. Sed in hac excutitur, quod est in anteriore parte cerebri iuxta narium foramina. In illa, quia in posteriore parte materia subsistit, difficilior materiæ dissipatio, vnde pars affecta, & generationis locus intelligi possunt.

Cognoscimus à pituita fieri, si eger frequenter expuere solet, si somnus longior, & profundior, si ingenium stupidius, ex victus ratione, excrementis, actionibus, colore, & similibus. Contraria fiunt in biliosis. De ea, quæ per consensum fit, dicetur sequenti capite.

E A dextra



## DE MORBIS INTERNIS

*A dextra parte incipiens cum tinnitu aurium, clamore, stridore dentium, eiectione seminis, uehementi concussione, et quæ ab ineunte ætate consenuit, aut hereditaria est, grauissima, & quæ vix curari vnquam possit.*

*Contrà, breuitas paroxysmi, uaccidentium paucitas, retardatio, uerecundia, & si sine spuma fiat, facileq; ruta, vel hyssopi, aut similibus odoratu recedat, hæc omnia morbi facilitatem indicant. Soluitur aliquando, mutata ætate, victus ratione, & superueniente quartana: in gravidis, edito fœtu, mensium profluuio.*

*Conueniunt in maioribus natu, & à sanguine, clyfma, sanguinis missio è cephalica, prouocatio hæmorrhoidum, menses: in pituitosis, oxymel scyll. syrup. de pomis comp. pil. ante cibum, syrupi concoquentes, purgato à pituita & cruditate ventriculo prouocatio vomitus (licet Galenus contra Erasist. vomitionibus, interdicit, quia manifestè caput replent) repetita purgatio, pilule addito castoreo, theriaca, mythri. (nisi metus sit à calidis) opiate, dicta, caput purgia cum succo sampsuchi, pyrethro, Zinzibere, radice pæoniæ, suffumigia cauteria. Nocent Cassia, Catholicon, radix, vel succus apij, quo tamen Galenus utitur in consilio Epileptico.*

*A tota proprietate valent, & huic effectui maximè accommodata sunt, scylla, Enula campana, syrupus de pomis, pilule de euphorbio, pæoniæ radix & semine luna descrecente collectum, uiscus quern. seseli, coagulum leporis, cinis cuculi, cranium hominis, ossa humana nescientibus data potui, (valent etiam in arthritide) cornu alces, aqua gallitrici, theriacalis, agar. troch. semine palmæ Christi, ungula asini, vesica apri, talus, suillus cor talpe, flos angallidis rub. corallus, smaragdus, hyssopus, inquinatio oris è sanguine ægri, splen equi, cerebrum cameli, & mustelle, lapis pulli hyrundinis, oleum phyl. de gagate, balsamum, de piperibus, de cucumere asinino naribus inditum, electarium Rasis, & quod sequitur.*

*R. ossis caluarie humane unc. s. seminis pæoniæ maris, radicis eiusdem ana drac. ij. saluie, hyssopi, rutæ sicce ana drac. i. flor. rub. anag. & borrag. ana P. i. seminis atriplicis drac. i. ungule asini, tali suilli ana drac. i. rasura eboris, cornu cerui, coralli rubri ana ꝯ. ij. diamarg. frig. et calidi ana ꝯ. i. fiat puluis*



pulvis ex omnibus : deinde incorporetur in cons. anthos & borrag. ana unc. i. s. mellis cum aceto scyll. cocti ad crassitudinem unc. ij. theriacæ, mithri. ana drac. ij.

Pueros sæpe uexat) Pueris familiaris duabus de causis. Una, ob multitudinem humoris & vaporum, unde etiam in illis somnus multus, & profundus, ut scribit Arist. de somno & vigilia. Altera, ob vermium putrescentium tetrum uaporem ad cerebrum ascendentium, aut eorundem uiuorum, sed materiam commouentium. Auicenna scribit, ab Epilepsia ferè tutos esse, quibus in capite fiunt vlcera apostemata, fluxus narium. Nutrici imperandus aque potus, ut etiam Arist. præcepit, vel hydromel, victus attenuans, abstinencia à coitu, ne lac corrumpatur, aut eius materia alteretur, purgatio humoris peccantis, exercitium, electaria, lac asininum, in quo cocta sint, vel infusa, quæ affectui conueniunt. Pueris verò pulvis cum melle aut lacte, cauterium in posteriore parte capitis, præsertim si sint obesiores, pulvis inspersus capiti. Grandioribus, clysteres leuiter purgantes & attenuantes, Syrupi, potio purgans, bolus. In vermibus, quæ necant vermes, vnguenta ex amaris admota non ori ventriculi, sed umbilico. Mithridatium est theriacam tanquam fortiora Galenus vituperat.

Scapulis cum scarifica.) Petrus Merenda scribit in comitiali morbo admodum vehemente, exiguo intervallo sæpius repetente, nec aliis remediis cedente, se quàm plurimos per admota collo propè scapulas rubrificantia medicamenta, donec vesicæ excitarentur, breui temporis spatio ad pristinum rationis usum frequenter perduxisse, & ab accessionibus liberafse, qui deinde decenti curatione, ad integram sanitatem perducti fuerunt. Sed hoc faciendum esse post purgationem, nisi morbus vrgeat. Sed neque hæc, neque setones, neque cauteria conueniunt circa caput, nisi morbus cerebro sit essentialis, ut fiat diuersio à cerebro.

a Ad reuocandum cursum & prohibendâ generationē.  
b Si non detur secandi venam occasio.

De Epilepsia per consensum à stomacho. Cap. XI IIII.  
Sanguis è a poplite, vel malleola, aut eodem loco scarificatio: sæpe repetita purgatio ex his c pilulis.

R. pul. hieræ picræ ℥. ii. agar. trochif. rhab. electi an. ℥. i. mastichis, santalini citrini, macis, ros. an. Gr. vi. cum machicis.

E 2 succo



# DE MORBIS INTERNIS

*a* Huc quo- succo citri fiant pilulæ: *a* aut idem puluis incorporetur  
que spectat in unc. s. catholici, ut fiat bolus.

*catapotia* Aut omnia dissoluantur in sero caprino, uel decocto  
ex rheo & cicerum rubrorum. Inungatur stomachus cum olei ma-  
aloe cōfecta stich. unc. i. corali rubri, & pul. rad. pœoniæ an. ℥. ii. Co-  
*b* Ut mate- rallus, radix pœoniæ, Iaspis uiridis, c collo suspendan-  
ria morbifi tur, ut contingant stomachum.

*cæ genera-* Cæterum materiæ morbi habenda *b* ratio est.  
*tio prohi-* Quibusdam enim *c* gracilibus & iracundis in ieiunio  
*beatur, tol-* influit in stomachum ad modum sensilem sanies bilio-  
*laturq; colle* sa. Quibus panis per se, si non sitiunt, alioqui ex uino  
*ctio.* albo tenui, diluto, austeriusculo, aut uino granatorum

*c* Quibus la remedio est.  
*te sunt ue-* Aliquādo crapula in causa est. Nonnunquam humor  
*ne.* crassus, & frigidus. His supradicti syrupi *d* incidentes cō  
*d* Ut oxyme ueniūt. eadem quoq; *e* purgatio, & uomitus. Quod si ex  
*li simplex* spiritu uenenoso, qui ex parte aliqua in caput attolli-  
*& scylliti-* tur, præliganda *f* pars est. Cucurbitula affigenda loco.  
*cum.*

*e* Ex hiera Locus *g* theriaca, mythridatio, contrita anagallide  
*uraq;* ruffa inducendus est, uicinia in uescam attollenda ex si-  
*f* Ut aditu napi, pipere, euphorbio incorporatis teriaca, uel melle  
anacardino.

*ad cerebrū* Quod si locus præligari non potest, ut matrix, renes,  
*prohibea-* cucurbitulis utendum erit cum scarificatione. Postea  
*tur spiritus* purgādum *h* est. si fuerit opus. Et emplastra, ut prius, ad  
*ille veneno-* regionem partis *i* apponenda.

*sus.* S C H O L I A.

*g* Vnde, tol Epilepsia aliquando fit in cerebro tantum, sine vlla par-  
*litur aura* tium subiectarum concussione, sed solius capitis. Quod rarū  
*venenata.* est, ab authore tamen annotatum & obseruatum in sacerdo  
*h* Pilulis iā te quodam annos 30. nato. Illud Medicis visum est contingere  
*prescriptis.* re maligna aliqua materia in dextro ventriculo contenta,  
*i* Et, si hyste præsertim cū in dextram partem caderet. Sapiſime fit per  
*rica sit mu* consensum, tum ob causas superius dictas, tum propter au-  
*lier, hysteri* ram ex aliqua parte ad cerebrum sublatam. Cuidam Scoto  
*ca erut præ* atate florente, pilo ruſo, e sura dextra, veluti gutta crampa  
*scribēda re-* (ut vulgò appellant) incipiebat. inde totius corporis concus-  
*media.* sio cum spuma. Soluebatur uomitionibus biliosis, eoq; affectu  
corripiebatur



corripiebatur declinante luna ad interlunium. Monacho Parisiensi annorum 30. corpore nigro & piloso, è malè curato liene in febre continua vapor quidam mensuris interuallis cum tumultu exiliebat. Qui ubi ad sinistram mammam perueniat, modò pronus, modò supinus concidebat sine sensu & motu. Postea confricatis aceto temporibus, oculos aperiebat, manu locum dolentem ostendens. Liberatus paroxysmo nocte consequentem insomnem ducebat. Carnotensi adolescenti è minimo digito sinistro ad regionem cordis perueniebat: unde palpitatio. Hinc ad caput, unde casus. Aura ascendente manus conuellebatur. Alteri Scoto incipiebat à tremore dextri brachij, ad mammam progrediendo. Inde conuulsio sine sensu, memoria, & voce. Renocabatur cibo & potu, quæ non sentiens quoque deglutiebat. Multis fit primùm tremor & conuulsio brachij deinde capitis concussio. In adolescente Picardo annos nato 15. à torpore manus dextra initio accepto, contrahebantur tres primi digiti: index vt extendebatur. Ita cadebat obtorto brachio, & corpore inflexo. In alia, ab artic. humeri, mali initium: deinde tremor totius brachij: ex quo astricto dentium et casus. Multis à crapula, alius à venere, aliquando à tumoribus commouetur conuulsiones epileptice. Sæpissimè ab utero, vel ob imprægnationem uel retentionem aut corruptionem spermatis, vel secundine. Ab inedia etiam huic morbo inimicissima, vt quæ inter ea, quæ caput replent excellat, ut inde quoque brachia, manusque uehementem tensionem sentiant, & imbecillior stomachus grauitèr offendatur, ut scribit Galenus.

Varia est horum omnium curatio. Ligatio supra locum, sanguinis missio è uena proxima, cauterium, uel uesicatorium in parte affecta, ita ut uulnus diu relinquatur apertum, oxyrhodinum capiti affusum, frictiones in paroxysmo, fumigia, succus rutæ uel trifolij naribus impositus, uel, ut uult Apuleius, succus angallidis rub. cum melle, uel ireos, uomitiones uentriculo pleno (alioqui noxiæ, ut Galen. docet) sternutatoria post purgationem: in ieiunis, uel ira, melicratum, uel mica panis uino intincta: in uentriculo affecto, lenia medicamenta (nam à fortioribus semper læditur) pilule, opiata, pulueres à pastu, emplastra, sacculi, triphera persica in ueri affectibus, pessaria, eductio eius, quod retinetur, corroboratio



# DE MORBIS INTERNIS

a Quæ delirium est febris expers cum tristitia & metu sine causa manifesta coniunctum.

b Suo temperamento immutati.

c Non pituitam. Sanguis enim materia est humoris melancholici, tunc venenata qualitate affecti.

d Humoris

sanguinei so roboratio vteri: in gravidis, emplastrum pro matrice, vmbles per a- Etio, sacculus, &c.

duktionem. Agarici. Non ita magna vis purgandi inest agarico,

e Quorum nisi in magna. Huic affectui mirum in modum conuenit, suffusio sta ventriculo infirmo, colicis doloribus, & similibus. Initio tabilis est ex men phlegmaticorum morborum non exhibendus. Propterea naturalis vi Auicenna in horum curatione gradatim peruenit ad agartio æcono- cum, cui suffragatur experientia.

mia.

De a Melancholia.

Cap. XV.

f Per syna **M**elancholia nonnunquam uitio cerebri b & capitis, trismu seu quod cum calidius fit, sanguinem c adurit, atque eo collectione. adusto fumi melancholici animum exagitant. Eiusmodi

g Per gene enim facie ferè sunt admodum rubente, rubore quidem rationem. saturato, & tandem liuescente. Quibus etiam aliquando

h Et ij di- adnascuntur d pustule. Deinde etiam, qui flauo sunt e co stentas ha- lore, quibus caput calidius bilem adurit.

bent sangui Alii uerò fuitio lienis, aut g hepatis, melancholicum ne uenas, sanguinem toto corpore h colligunt.

cum habitu i Tertium genus melancholix est, quæ hypochondria corporis ex ca dicitur. Horum omnium signa & phantasmata ex li- tenuato, bello de k melancholia Aetius trāstulit: quædam etiam squalido & Aurelianus annotauit in chronicis.

ficco. Itaque initio mali repellentibus utendum est oxy-

i Ex melā- rhodino, aut mixta materia media, ut chamæmelino, & cholici hu- quæ de Soda dicta sunt.

moris in hy l Phlebotomiam omnes ferè imperant, atq; in pri- pochondrys mo

synatrismo. Hæc verò melancholia ructus & flatus cum dispepsia ha- bet coniunctos.

k Qui liber Galeno tribuitur.

l Ad declinationem causæ antecedentis, amotionem coniunctæ, tempera- menti restitutionem, & superstitis materiæ preparationem.



- a Melancholia scilicet quæ localem habet in cerebro generationem.  
 b Melancholia totius corporis & hypochondriaca.  
 c Medianam vulgò dictam, quæ æquè vacuatur à capite, ac è toto corpore, ad generationem prohibendam & corrigendum symptoma.  
 d Vt fiant menstruales, & fiat humor, κατὰ πρῶτον, qui erat ἀναγγονος.

mo genere a cephalicam : in b secundo ac c tertio, medianam præferunt.

Hippocrates in libello de uirginibus scripsit uirgines interim fieri melancholicas, resistente menstrua purgatione : idque multò magis, si utuntur amoribus. Idem quoque uiduis accidere consuevit, dum curis & mœrore animum conficiunt.

In his enim ex uehementi animi motu cerebrum laborat, atque ideò infirmatur. Refluit ab utero ad cor sanguis uitiosus, atque ita animam corrumpit. His uena malleoli d aperienda est, aut idem locus per interualla, repetita scarificatione. Probatur etiam uena, e quæ inter annularem & minimum, uel medium & annularem digitorum excurrit. Perseueranti malo uena in fronte diuiditur. Oportet autem latum f uulnus inferre uenæ, &, si quidem sanguis crassus est, semel ac plurimum detrahere.

g Alimenta è media h materia instituenda sunt. Panis triticeus bene coctus: uinum album, tenue, odoriferum. Omnino cruditas i uitanda est, & potus sine k cibo, uel in fine pastus.

Clysteribus per interualla utendum est: primum quidem leuioribus, qualis hic est.

R. surfurum hordei M. i. summitatum anethi, chamæmel. meliloti, an. M. s. semin. rutæ, & fœnic. ana. drac. ii. Fiat decoctio ad lib. i. In colatura dissolue mellis anthosati, sacchari rubri an unc. s. ol. l unc. iii. Postea uerò decoctioni

h Neque imbecilli, neque forti. Dicuntur autem media, quæ sunt succi satius alibilis : ut pipiones perdices, vitulina caro.

i Quod obstructions pariat.

k Id in omni melancholice genere. l Vi olei violacei.

E 4

e Præstue-

rit media-

nā, aut basi-

licam per-

tundere.

f Vt exitū.

habeat cras-

sior sanguis

g Hæc ad

generationē

melancholi-

ci humoris

prohibendā

pertinent.

Cum hac ve-

rò victus ra-

tione, lactis

asinini vsus

(si minus ob-

murmurent

hypochon-

dria) mirifi-

cè confert :

Itē balneū

aque dulcis

egelidæ, diu

turnius syr.

molac. vsus

uere nono.



# DE MORBIS INTERNIS

a *Vel utri-* coctioni adiciemus polypodii unc. i. atq; aliquādo dis-  
 usq; vnc. s. soluemus cassiæ a aut cathol. drac. vi. aut hieræ b picræ  
 b *In opia-* unc. s. uel diaphœnici, uel diapruni tantundem.

ta, non in Ex quo materia c purgāda est. Sed præparanda prius  
 puluere. leuioribus d quidem remedii, quæ in Epilepsia diximus  
 c *Vsu cly-* & capite de Incubo: cum his etiam.

sterum me- R. succi borag succi buglossi, depuratorum an. libr. ii.  
 lancholica succi pamorū odoriferorū lib. iii. folliculorū sennæ unc.  
 collectio va iii. sem. anisi, & sceniculi an. drac. ii. Senna distemperc-  
 cuanda. tur diem integrum in succis: deinde leuiter bulliat, &

d *Vt deco-* cum sacchari libr. i. s. fiat syrupus clarificatus, & aromati-  
 cto polypo- zatus. Dosis, unc. ii. e cū aqua buglossi, borraginis, lupu-  
 dy, lupul. lorum, fumarix, cuscute, aut sero lactis. Melancholia

scelop. bor- leuiter, & per interualla purgari debet. Itaque folliculo-  
 rag. radicu- rum sennæ f unc. s. drac. vi. unc. i. in iusculo galli decre-  
 larum ape- piti, galinæ, pulli, aut alterius carnis, uel piscium deco-  
 rictium, cū quimus. Deinde sorbetur iusculum. Alioqui foliorum

syrupo ca- sennæ unc. s. sem. g anisi, cinamomi an. drac. s. florum an-  
 pill. ven. de thos, & borraginis florum uiolæ an. P. i. fiat infusio,  
 bisantiis, o- uel decoctio in sero caprino. Aliquando semunciam b

xymel. scyl- cassiæ, aut catholici adiciemus. Galenus & reliqui Medi-  
 litico, modò ci probant purgationem ex pul. hieræ picræ drac. i. pul.  
 in hypochō- epithimi drac. ii. Sed hæc purgatio æstate non conuenit,

driis non sit potiusque utendum erit cassia, aut cath. dissol. in sero la-  
 synatrismus ctis. Decoctum, in quo medicamenta dissoluuntur, hoc  
 e *Vel vnc.* modo melius fit.

iij. R. summitatum absynthii, & fumarix an. P. i. trium  
 f *In singu-* florum cordialiū an. P. s. Fiat decoctio, aut infusio suprā  
 las doses. calidos cineres. In col. expressa dissolue i medicamēta.

g *Vt discu-* Vbi uigiliæ urgent. poteris hoc imperare.  
 rantur fla- R. triferæ persicæ unc. s. specierum hieræ picræ Gal.  
 tus, quos sē- drac. vi. epith. pul. foliorum sennæ an. ℥. iiii. cum modi-

na excitat. co  
 h *Vt R.* cass. recens extractæ vnc. s. f. bolus. Detur, & superbibat dū-  
 tum drac. ij. foliorum sennæ in decocto prunorum damascenorum in-  
 fusorum & bullitorum.

i *Vt Triferam* persicam, si sit contumacior humor. vel infunde folic. sen-  
 næ drac. i. s. dissolue catholicum, cum dupla senna & rheo.



co sacchari uiolati, fiat mixtura. Dosis ad unc. s. dissoluta in sero caprino. Pulueres quoque subinde imperandi sunt, & condita, ut.

R. pul. elect. lætificantis drac. iiii. sacchari rosati, & uiolati an. unc. s. detur drac. iiii. in cochleari cum modico uino albo odorifero: Aliud.

R. elect. lætificantis a & diamargarit. an. drac. ii. citri: mellonum, cucumeris, citrulorum an. ꝰ. i. macis, spicæ an. ꝰ. s. sacch. rosati, quod sufficit, fiat mixtura: aut si uis, incorporentur in conf. borraginis, buglossi, ros. an. unc. s. Fiat conditum b Balnea temperata per interual la conueniunt.

Cucurbitulæ leues in hypochondriis, quæ discutiant flatu: atque ubi dolor est, cum c scarificatione. Vbi uerò pertinax morbus est, secūdæ d uenæ capitis e & sanguisuga affigendæ. Aperiendæ infernæ f purgationes, uis pharmacorum augenda g est, imperandaque hiera dia col. quæ epithymum, aut sennæ puluerem, deinde etiam quæ helleborum recipiat.

Helleborismis h quoque utendum est. Nec enim frustra dictum est ab antiquis indigere helleboro, qui mente non ita constarent. Itaque sic imperabis.

R. pul. hieræ diacol. ꝰ. iiii. pul. epithymi, & foliorum sennæ an. drac. ii. Excipiantur modo melle. Deinde sero caprino dissoluantur. Fiat potus.

R. ramentorum i helleb. unc. i. Fiat infusio per tres dies in aquæ pluuialis unc. iiii. deinde lento igne decoque ad tertias. Col. addantur mellis optimi despumati unc. ii. Huius mellis cochleari puluerem hieræ diacol. miscebimus.

Reliquū mel seruabimus, & per interualla cochleare dabimus

cum habent in melancholia, quæ locale habet in cerebro generationem.

f Vt hæmorrhoidum, menstruorum, si suppressa sint.

g Vt æquali medicaminum excessu contrarius naturæ excessus abigatur.

h Purgationibus ex helleboro albo, aut nigro.

i Albi quidem, si pugnandum sit cum symptōmate: nigri, si cum synsismo.

a Rhazis li.  
s. Continen  
tis, & lib. 9

ad Alman  
sorem.

b Confectio  
alkermes

cū quadru  
pla borragi

nis cōseru  
sit tibi om

nis instar.  
conditi. & c

R. confectio  
alkermes.

unc. i. s. com  
ser. borrag.

unc. iij. f. mi  
stura. Detur

ad magnitudi  
nem unius

auellane.

c Hæc sca  
rificatio in

utilis.

d Recta frō  
tis aut ve

na puppis,  
quæ in occi

pitio est.

e Hæc po  
tissimum lo



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Ex helleboro albo. dabimus, dissolutum in pingui iusculo, ut incitetur a uomitus. Alius helleborismus.

**Caterū non** Raphanus acerrimus in taleolas diuidatur. Ramento datur hellebori substā rum hellebori drac. iiii. Taleolæ configuntur, transfixas bori substā sub dio per noctem collocabis. Postridie ramenta detra tia, sed ean hes, & ita diligēter, ut nihil remaneat hellebori. Ex quo tum dilutū, talcolas in oxymelite, tribus horis macerabis macera idq; ad 3. y tas comesdes, & oxymel superbibes.

**Neque hic** Post horas aliquot uomitum ciebis. Quodd si uenter quidem om flatuosus est, fouebis b oleo, in quo rutæ, anethi, dauci, nib. ut nec cumini, & similium semina coxerint. Eadem semina in pueris, nec puluerem redacta, adiecto, piperis & cina. mometo, mel senibus. le anthosato excipies, & ita exhibebis.

**b** Aut deco Dropax c calidus proximè descriptus breuibis inter eto stoma uallis uentriculo affigetur, & toti metaphreno. chico.

## SCHOLIA.

**c** Ex pice Melancholia differt à Phrenitide, quia sine febre est, & naual. unc. furo re. **Mania**, quia cum metu & tristitia. Fitq; vel ab iij. olei ru intemperie frigida & sicca, & humore melancholico eiusdē tacei. unc. i. tēperiei, siue cerebro primario affecto, siue à toto corpore, siue ab hypochondriis. Quæ postrema flatuosa magis est. Atque

hæc est vulgaris omniū fere sentētia. Quæ tamē ita accipiēda nobis haudquaquam videtur, quasi nulla melancholia cum febre sit, aut ab intemperie frigida semper oriatur. Experientia enim constat in febre hominem melancholicum sepe reddi, aut post febrem, vel alium morbum. Dico timidum, tristē, sine furore, multæ falsa, ridiculæ, & ab omni ratione aliena animo mouentem, læsa imaginatrice, & ratiocinatrice facultate. Quæ propria sunt melancholice symptomata, neque Phrenitidi vera, neque mania, neque παγαφροσινη communia. In febre ardente Burgundus quidam Lutetie multis clarissimis Medicis astantibus mortuum se affirmabat simul cū fratre ibi decumbente. Precabatur Medicos ne amplius anime impedimento essent, quo minus è purgatorio euolaret ad Deum. Aliquando inuabatur moribundum, quasi efflaret animam mouebat, vi spectarent expiratum: postea summo timore, & omnium desperatione corripiebatur. Tandem opportunis remediis adhibitis, & hæmorrhoidum profusio liberatus



ratus est. Alius itidem se mortuum, & sine animo putabat ob idq; cibum omnem reformidabat, quod mortuos edere negaret. Tandem optimo consilio effectum cadaver, mensæ accubens, cuius exemplo cibum sumpsit. Multa similia quotidie experimur ex quibus intelligi potest melancholiam sæpe fieri, uel calore resoluta, uel calidiorē cerebro, aut corpore colligente melancholiam, non adurente tamen: alioqui in Maniam degeneraret. Humor enim hic, uel à partis intemperie generatur, uel relinquitur post inflammationes, uel crassior in obliquitate venarum inclusus ac torpidus malignam aliquam qualitatem contrahit, & uapore atro (est enim maxime vaporosus) spiritus vitales, & animales inficit, unde metus, tristitia, palpitatio cordis, inflatio carotidum, pulsatio in multis corporis partibus, alius dura, macies corpore refrigerato, & cogitationes somniantibus similes consequuntur. Qui si in cerebro obstructionem fecerit, Epilepsiam: si in mentem repat, ut ait Hipp. id est, cerebri & spirituum temperamentum mutet, melancholiam procreabit. Ob idque ab uno horum duorum morborum in alterum facilis est mutatio. Sunt tamen duo perpetua, & pathognomonica signa, metus & tristitia sine causa. Quæ à solo humore melancholico pendent, siue per se, siue aliis mixto, superante tamen, ut neque de materia, neque de parte affecta dubitare possimus. Sanguis enim, cum mobilis sit suavis, & lucidus, hominem potius in spem erigit, ac letitiam & comitatem inducit. Bilis, acrimonia, calore & mobilitate, præcipitem hominem efficit, & ad sæuitiam, non metum prouocat. Adusta, & φθὴρὰ καὶ, βρηνώδης. Melancholia colore atro timorem ac tristitiam: firmitate & crassitie, in opinione suscepta, quantumuis ridicula, constantiam affert.

A toto corpore fieri intelligemus ex causis præcedentibus, signis melancholici sanguinis in toto corpore apparentibus, victus ratione, missione sanguinis crassi, tempore anni, regione, ætate, declinante, temperamento, mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis, varicibus curatis, corpore gracili, nigro, hirsuto, venarum latitudine, distentione ob flatum, sanguinis copia, curis, laboribus, victus ratione tenui, sordida. A cerebro uero, si mæror, & tristitia perseverarint, sine tali corporis constitutione.

Conueniunt



## DE MORBIS INTERNIS

Conueniunt clyster ( Nam in omnibus aliis astricta est & flatibus distenta ) sanguinis missio, Syrupi, purgatio, cremor hordei, veratrum, opiate, epithemata, sacculi, inunctiones, foci, topica, balneum, lotiones capitis & pedum, cauteria, trepanum, masticatoria, sternutatoria, errhina, embrocationes. Humida letificandi vim habentia, & spleni propria. Valet ad melancholicos cum metu, & anxietate electarium sequens auctori vñtatum.

R. emblic. dr. x. ros. dr. vi. caryophyl. nardi, cyperi, asari, mastichis, ana drac. ij. cinamomi, Zedoarie, ana drac. ij. nucis mosc. macis. carda, camph. moschi ana drac. i. syrupi rosa. vel mellis ros. q. s. fiat elect. Dosis drac. ij. cum liquore conuenienti.

*crudi*

Tertium genus ) Hypochondriaca melancholia non fit à succo frigido sed fumis malignis & acrioribus ad cerebrum elatis. Quando scilicet vena mesaraica inter ventriculum & hepar ardore quodam effernescunt, & obstructione aliqua laborant, unde humores crudi & melancholici illic conclusi flatus multos procreant, & ad caput elati melancholica symptomata ac difficultatem anhelitus. Percipitur rugitus, & veluti murmur quoddam (est enim hoc signum maxime proprium) circa hypochondria, modoq; incipit ab hepate, modò à liene, cum humor ille inter lienem & ventriculum subsistit in venis. His enim duobus locis fieri potest vel ab intemperie, vel obstructione, vel ab utroque. Contingit frigido ventriculo existente, & calido hepate. Inde sequuntur cruditates, refrigeratio corporis & sanguinis, macies sudor, plurimum sputum, sed imprimis, ut dixi, perpetui rugitus circa hypochondria, & somnia turbulenta cum metu, & tristitia. Quibus duobus signis collegimus morbi essentiam in nobilissima muliere, quam Medici alij frustra curauerant, ut imbecillitate stomachi laborantem. Summa erat macies, uehemens extremarum partium frigus, sibilus auris sinistrae, somnia turbulenta. Curatio absoluta fuit minoratio ex Cathol. & diaphæn. syrupis & apozematibus melancholiam ad expulsionem preparantibus, focius hypochondriorum, unctionibus, pharmaco ex hiera diacoloc. Potest etiam fieri hypochondriaca melancholia à partibus inferioribus ventris,



ventris, quæ calida intemperie laborant, vel effusa bile atra a Proprie  
per mesenterium, & partes ventris, magno intestinorum calo & catachri  
re adurente chylum. In cruditate optimum, arctius ventricu sticos vsur-  
lum ligari, ut flatu impediatur, & melior fiat coctio. pato.

Hellebori) In hoc duo cauenda. Primum, ne detur in sub b Fluxus  
stantia, sed vel in decoctione, vel infusione, idq; post vniuer- humoris a  
salem purgationē. Alioqui conuulsionem affert, vel ingulat. capite in to  
Deinde, ne misceatur myrabolanis, aut adstringentibus, ne tum corpus  
diutius retineatur in corpore. Ex hieris accommodata sunt aut aliquā  
tantum huic affectui, quæ veratrum, aut colocynthidem reci corporis p-  
piunt. Sed in constitutione humida tātū, & pituitosa, quia tem.  
nimis exiccant. Hiera logodium, quæ utebatur Ptolomeus c Ingenū  
rex ad omnia vitia melancholica, probatur Alexandro. tarditas.

De a Catharro.

Cap. VIII.

d Quod duo-

Catarrhus nomen generale b defluxus, aut destillatio calis mate-  
est. Nam κατάρρεω uerbum id sonat. Peculiariter flu- ria non ha-  
xio est a capite in fauces. Catarrhus uero alius pituito- beat liberū  
sus, tumque distentio est, faciei pallor, frigiditas capi- exitum fau-  
tis, ad somnum inclinatio, piger motus c hebes anima, cibus inter-  
& sensus. Voxque d per nares obmurmurat, intercepta ceptis.  
uia. Adde e temperamentum, locum, anni f constitutio- e Frigidum  
nem, rationem uitæ, urinæ quoq; crudiores sunt. & humidū.

Alius calidus est, ferè a pituita salsa, aut alioqui acri f Frigidam,  
humore. Hic totius capitis g dolor est. Rubent b oculi, humidam,  
interiores partes oris, exulcerantur. Adde & cætera ex aquiloniā:  
terna, & urinas magis coloratus. Catarrhus aliquando p g Ab humo-  
uenas & arterias diffluit in corpus. Hic ferè ceruicis, sca rum acrimo-  
pulatum membrorum & lumborum k dolor est. nia & mea

Catarrhus, l ubi leuis est & frigidus, fotu m capitis, tuū obstru- curo  
sed sine frictione, ex linteis calentibus, ut calor in pro- ctiones.

fundum n subeat, leui gargarismo, caput purgiis curari h Suffusio-  
potest. Ita tamen fouebis caput, ut nullo modo frices. ne subtilisfi

Nam m humoris

& caloris secundum meuynges.

i Serosi humoris acrimonia. k Et paraplegiam inducit.

l Generatione cause & symptōmate.

m Ut sacculis ex milio, surfure & sale.

n Atque humorem concoquat.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Gargaris Nam in Catarrhis frictione capitis non est utendum.  
**mus ad flu-** Leuis medicina.

**xum in aspe** **a** R. rosarum M. j. fiat decoctio in aqua & modico ace  
**ram arteria** ti, unde leuiter colluat os, uel utatur modico conseruæ  
**aut nares** rosarum, & syrupi de rosis siccis. Caput purgium.

**prohibedū .** R. seminis nigellæ romanæ drac. ij. seminis drac. j. cō  
**inapig** **b** Vel maio quassata frigatur in sartagine, cum leui asperione aque  
**rana succus** maioranæ. Fiat nodulus : **b** applicetur naribus. Quod si  
**per nares ē** resistat uenter c semunciam cassiæ quarta parte **d** horæ  
**uola manus** ante cibum imperabis.

**educatur .** Vbi uerò **e** calidus est, sed leuis balneum aquæ dul-  
**c** Ne suppres cis sat esse potest, ubi corpus non fuerit neque plethori-  
**sa aluo, au-** cum, neque cacochymum, aut inunctio capitis, aut fron-  
**geantur ca** tis, è rosaceo è caseo molli, & recenti, è cauliculis lactu-  
**pitis symp-** carum subactis, è posca, Sacculus è rosis. Quod si pur-  
**tomata .** gatio imperanda est, quia resistit aluus cassiam f man-  
**d** Ne in a- nam imperato.

**limentū uer** Vbi uerò **g** uehementior Catarrhus est, **h** maiora re-  
**tatur.** media ex usu sunt. Quod si ex uehementia Catarrhi,  
**e** Vt si quis quod sæpe fit, **i** præsens suffocatio imminet, clysteri-  
**in sole iter** bus **k** acriusculis statim utendum. In quibus hieræ picræ  
**fecerit .** semuncia dissoluta sit.

**f** Modò non **l** Quod si corpus **m** sanguinem & bene carnosum est,  
**fit ager pi-** uena in brachio angusto **n** foramine aperienda est.

**procholos** Cucurbitulæ magnæ scapulis & brachiis affigendæ .  
**ava .** Totus thorax ex oleo de liliis, de lino, amygd. dulcium.

**g** Genera- chamæ butyro recenti, o cocta radice althææ cum axun-  
**uione, causa** gia

**o** Symptomate .

**h** Qualitate contraria **o** utendi assiduitate .

**i** Materie in pulmones prolapsu .

**k** In quibus vis sit ex alto reuocandi ac reuellendi .

**l** Ipsiusq; catarrhi qualitas ægri naturæ sit consentanea .

**m** Ad prohibendam generationem materie reuulsionem **o** funesti sym-  
**ptomatis correctionem .**

**n** Ne spiritus, natiuusque calor dissipentur, qui cum catarrhi materia  
**pugnant .**

**o** Hæc sub cineribus stupa inuoluta coquitur .



gia gallinæ, uel simili, uel butyro malaxata *a* inungen- *a* Ad eius co-  
 dus est. Gargarismata, *b* quæ reprimant fluxionem, Ca- *ctione, quæ*  
 putpurgia, Frictiones & uincula, quæ eandem diuertāt, *excepit, ma-*  
 imperanda sunt. Vbi uerò *c* nullum tale accidens inter- *teria, & e-*  
 turbat curationē catarrhi, frugalis *d* uita imprimis im- *iusdem ex-*  
 peranda, cœna nulla, aut pauca, declinatio *e* à uentis, *clusionem.*  
 solis & lunæ. 33. radiis, abstinencia à fuino & rebus ua- *b* Cuiusmo-  
 porolis, à *g* somno diurno, qui etiam noctu breuior *di ex syru-*  
 esse debet. Utantur hordeato, auenato, ubi resiccandum *po myrtillo*  
 est. Conuenit *h* orizogala, amygd. cum sacch. ros. ubi re- *rum cum de*  
 tinenda defluxio, incrassanda & coquenda. Aqua fri- *cocto plan-*  
 gida ore colluta in calidis: subtepida in frigidis fluxio- *tag. hordei.* *patus.*  
 nibus, conuenit.

Secunda mensa carne cydoniorum, piris austeriuscu- *c* Ut cum  
 lis & coctis, post etiam coriandro uti oportet, ut confir- *suffocatio*  
 metur uenter, & fumi prohibeantur. In frigido, uino *non est in-*  
 quidem uti licet, uerò medico. In pastu medio non frigi- *metu, sed so-*  
 do, sed refracto, aqua subtepida, aut pane tosto. Clyste- *lius catar-*  
 rum usus, sed *i* mollium probandus est. Phlebotomia à *rhi curatio*  
 Græcis ferè omissa est & Arabibus, nisi ubi ea adsunt, & *nis est habē*  
 quæ Mesues annotauit in hoc capite. *da ratio.*

Purgationes initio leuiore, qualis est cassia ad 3. j. *d* Ut assue-  
 aut drac. x. imperata, ac per interualla usurpata, cui ali- *ta uite por-*  
 quando in fluxione calida addere licet elect. de succo *tio deducāt.* *purgō*  
 ros. 3. ij. iam progressu morbo, & ubi signa coctionis ap- *e* Quia hu-  
 parent. poterit catholicum imperari ad drac. vj. adiecta *mores fun-*  
 infusione 3. ii. agarici, & drac. s. rhab. Nonnunquam etiā *dunt.*  
 in his catarrhis imperamus rhab. infusi 3. iiii. puluerisa *f* Quia ex-  
 ti uerò 3. ii. qui dissol. in hac decoctione. *primunt.*

R. pul. hordei ana P. j. trium florum cordialium, *g* Ratione  
 liquiritiæ rasæ ana drac. ii. fiat decoct. pro una dosi, in *fluxionis nō*  
 qua dissol. rhab. & c. ut dictum est. Post hæc etiam iam be- *materiæ.*  
 ne maturato morbo fortioribus uti licebit, qualia in *h* Qui cor-  
 Gatinaria, concoquit.

*i* Si non adsit capitis dolor. *x* Ne incitetur catarrhus.

*l* Quatuor hæc sunt corporis plethora, generatio ab hepate calidiore &  
 sanguine subtilissimo, prolapsus in partem cuius officio uita carere ne-  
 quū, febris coniunctio.



DE MORBIS INTERNIS

*a* Ut diacar Gatinaria. Peculiariora uero remedia alia *a* continentur  
thamo. ore: alia *b* deuorantur: nonnulla *c* naribus applicantur:

*b* Ad infrin eaque aut retinent, aut leniunt & coquantur, aut repur  
gendum. gant. Retinent, ut.

*c* Ad lenien R. ros. hordei, agrimonix ana P. i. sem. plantag. pap. al  
dum. bi, portul. ana drac. i. fiat decoctio ad ℥. iiii. In col. disso.

*d* Ad deri diamori ℥. i. uini granatorum ℥. s. Aliud.

uandum & R. aquæ hordei nõ excorticati ℥. iiii. dianuci ℥. i. Ali.

& cerebrũ R. iulep. ros. unc. iiii. syrupi myrtillorum ℥. i. Aliud.

recreandũ. R. aquæ rosarum ℥. iiii. camphoræ ℥. i. Aliud.

R. corticum papaueris albi, rosarum siccarum an. P.  
ii. boli armenæ drac. ii. fiat decoctio. Hæc ore contine-  
mus, & inde os leuiter colluimus. Alioqui fiunt pilulæ,  
quæ in ore continentur.

R. bolli armenæ lotæ cum aqua ros. terræ sigillatæ lo  
tæ cum decocto papaueris an. drac. i. elect. diatragacan-  
thi frigidi cum oui albumine dissol. unc. s. cum modico  
syrup. ros. de siccis. Fiant pilulæ ad magnitudinem lu-  
pini. Aliud.

R. anisorum, coriandri præparati an. drac. s. macis, ci-  
namomi, spice, ireos coralli rubri an. ℥. i. sem. papa. al-  
bi in uino cocto macerati an. ℥. i. gummi tragacanthi,  
mastichis an. drac. i. omnia incorporentur in succi liqui-  
ritiæ ℥. i. cum leui astusione syrupi myrtillorum. Fiant  
trochisci pondere drac. s.

Possumus uti solo tragacantho, terra sigillata, & in fri-  
gido catarrho spica. Vbi leniendum est, glycyrrhiæ suc-  
cus maximè conuenit, aut decoctio pectoralis, ut deco-  
ctio pectoralis Rhasis.

*Decoctio pe* R. iuiubas N. xx. sebesten xxx. passul. enucleat. ℥. i.  
*toralis ex* utol. siccarũ unc. s. liquiritiæ rasæ drac. v. caricas x. Fiat  
*Rhasæ.* decoctio in tribus libris aquæ, dum redeat ad unam. Ad-  
de, si uis, semen bombacis, capillorum uen. & alia, quæ  
incidunt, aut repurgant.

Post initia, utendum est elect. diaireos, commiscen-  
dumque est diatragac. unc. i. Quale hoc est.

R. diatragac. frigidi unc. i. diaireos simpl. unc. s. fiat  
pul. Teneat in ore. Verum, ut minuitur Catarrhus & ma-  
turatur,



curatur, plus diatēos miscendum erit. Retinendū est, cum fluxio uehementior, & periculosior. Aut etiam ubi leuis est. Sed hic ferè sine purgatione corporis, illic post purgationem. Utuntur suffumigiis, quale hoc est.

R. olib. sandaracæ an. dra. ii. fiat decoctio in uino adstringente, excipiaturn fumus. In frigida.

R. ligni aloes, costi an. ℥. ii. galliæ moschatæ dra. s. olibani, sandaracæ an. ℥. i. cum lityrace liquida fiant pilulæ, & super prunas suffumigium. In calida, suffumigia fiant, hoc modo.

R. santali citrini on. s. ros. uiolarum an. P. ii. fiat decoctio in aqua, & inde suffumigium. Utendum quoque ponis odoratis est, ut prius. Cucuphis & aliis rebus roborantibus cerebrum. Ligatione in duobus digitis manus dextræ, stuphis siccis, postremo etiam cauterio hoc modo. Radatur caput in syncipite medio, qua parte sutura coronalis est, fricetur locus calente linteo. Sinapis mus, aut phenigmus applicetur, uesicæ excitentur & diu contineantur, ut fluant. Caules itaque ad ignem tabefactos axungia porcina inunges, & superpones loco. Quibus si nihil proficitur, cauterio utendum erit.

## SCHOLIA.

Nulla ferè corporis hamani ægritudo est, quæ non defluxione humoris alicuius è capite, aut excitari, aut incrementum accipere possit. Atque id generalius sumpto nomine, catarrhos Græcis appellatur. Propriè tamen cum in nares defluxio sit, coryza: in fauces, branchos, in gurgulionem, staphyli, & xior, dicitur. Causas omnium, signa, & remedia persequi, longius esset, quàm pro instituto. Hoc admonuisse satis fuerit, distillationem eiusmodi, non solum, ut multi scribunt, à cerebri intemperie frigida, & humida, aut ab omnibus, quæ replent caput, originem habere. Nam sæpe calidius cerebrum plus uaporis attrahit, qui deinde, ut in aere pluuia, superueniente frigore concrescit, atque exprimitur, calore & siccitate, ueluti quodam naturæ circuitu tandem absumitur. In omnibus tamen capitis repletionem esse certum est, quæ hanc defluxionem parit, idq; à uaporibus alimenti, humorum, viscerum vitio, caloris capitis imbecillitate, quia non confi-

F cii



## DE MORBIS INTERNIS

cit alimentum, aut uapores non dissoluit, defectu alimenti proprii, atque inopia, ut in uentriculo. Sed duo perpetua ferè sunt huius mali seminaria, calidius hepar, uenter frigidior, adiuncto partium mittentium meliore, cum imbecillitate recipientis, quibus additur, pulmo, uterus lien, &c. Aer deinde externus, frigidus quidem, aut exprimendo, aut calorem intro cogendo, calidus uerò & austrinus, caput replendo, & humores liquando, ac dissoluendo. Frequentius tamen materia cerebro conclusa per astus in superficiem, per frigora, in medium corpus, & partem imbecilliore delabitur. Cutis quoque densitas & alus astrictio plurimum accelerant catharrum.

In calido, uena sectio aliquando conuenit, diuersio per clysteres, leuis purgatio, gargarismata ad astringendum. Errhina ad diuertendum, fumigia ex ligno aloes, beniuino, styrace, olibano. gallia moschata, sandaraca, carioph. lauro, baccis iuniperi: in calido, uapor humidus ex aqua ros. uiol. sancta. camphora, sacellationes, formulæ in ore, in crassantia, alterantia, in frigido, magis cōstringentia, & calida, pilule, theriaca, cucupha, sacculus siccans, inspirationes incidentes, poma odorata, exulceratio in interiore brachio, seton in syncope medio, qua parte coronalis pilus raditur, frictio, sinapis mus, phenigmus, uesicatoriū, cauteriū, frictiones vicinarum partium & capiti consentientiū, meliores, quàm capitis, nisi bene puro corpore, ordo à crurib. ad spinā, brachia, cernice, & gulares, post aures, occiput, synceput frictio capitis cu spōgia.

Vapor non modo prohibendus in fine pastus, sed dum fit cōcoctio. Tum enim eleuatur plurimus, ut ex ructib. apparet. Quo tempore fluxio excitatur, magis scripticis utendum, ut uesperti, mane uerò lenientibus, coquentibus, expurgantibus thoracem. Galenus sub finem 6. Epid. scribit Catarrhum, Asthma, Conuulsionem sanari febre, ut inde intelligamus calidis & siccis potius in hoc affectu esse utendum. Assuescendum emungendis naribus potius, quàm expuitioni.

Quia per nares crassa & tenuia expurgantur sine damno reliquarum partium, per os tenuia tantum, & cum periculo pulmonum, ac uentriculi. Adde quod consuetudine facta expuitioni, per somnum, & occupato animo materia in infe-

riores



# L I B E R I.

riores partes ab ore delabitur.

Cibi parcitas presertim uespere, panis sicci esus, declinatio non autem nocturni aeris, & radiorum lune, potus paucus, presertim sicca. materia existēte, cruda, quo tempore situ quoque minor est. b Quod con- Supinus decubitus oculis confert, sed catarrho noxius. Pili. neētat oca- la Mesue de cynoglossa ualde auctori probata, sed quarum lum cū sua non una est apud omnes descriptio, conserua quoque rosarū orbita. cum mastiche, bolo Armena, syrupo myrtillorum, terra sigil c Cuius ge- lata, & quod sequitur. neratio est

Rec. anisi, coriandri, an. dra. s. macis, cinnamomi, ireos flo affluxus ren. coralli rubri, spice nardi, ros. rub. an. 3 i. mastiches. 3. materie nō q. gummi, drach. malax cum aqua ros. dra 1. omnia incor. est perennis. porentur cum succo liquiritie. Fiant trochisci ponderis dra. d Vi phlebo i. teneat sub lingua. tomia pur- gatione.

Ad destillationem uuae & faucium, fumigium.

Rec. styracis liquid. ficuum pinguium florum amygd. se- c Ad humo minis hyoscyami an. dra. iij. Cum sicu, & styrace diu teren- ris concocti do incorporentur. Fiant trochisci Ter in die, manē, in meri- digestionē. die, & uespere fiat suffumigium. Deinde interpositis tribus f Perēni ge- neratiōe af- fluxus cā.

De a Ophthalmia.

Cap. XVII.

Ophthalmia, inflammatio est eius tunicæ, quæ cor- & sympto- necē adnascitur. Coniunctiuam b uocant. Hæc produ matiū uehe- citur à pericranio, à quo uasa deducuntur in oculum, mentia. per frontem mediam, & tempora. Itaque ferè superficia lis inflammatio est cum rubore, dolore, tensione, quæ ut augmentur, ita affectus magnus est. Exiguus, ut minuū g Ad gene- tur. In exigua c inflammatione, maioribus d remediis rationē pro- non est opus. Sed rosarū succo, oui liquore tenui, aqua libēdā, m. ros. aut plantaginis, lacte mulieris, uel asinæ curari po- teria cursū test. Oportet hos succos instillare oculis, eosdē cōtege- reuocandū, re pāniculo lineo, iisdē liquoribus insuccato. Postea ue causamq; ro iam declināte malo, santalos citrinos, modicū mace- coniūctam ris, aut spice in aqua rosacea feruefacta e adhibebimus. amouendū. h Cuiusmo- di sunt fron-

Vbi uerò fgrauius malum est g phlebotomia, arte- h Cuiusmo- riotomia, cucurbitula, sanguisugæ, scarificatio, purga- di sunt fron- rio, cauterium, paracentesis, fortiora collyria, & loca- talia, vulgo lia h remedia instituenda sunt. dicta.

F 2 Phlebo-



DE MORBIS IN TERNIS

*a* *Et si mor* Phlebotomia, ubi *a* cætera consentiunt, ut ætas uires,  
*bi species,* tempus, regio, & si dolor urget uehementius, ac rubor  
*magnitudo,* & tensio maior est, subducta sponte sua, uel molliori cly  
*causa &* stere aluo, Cephalicam aperito eiusdē lateris: *b* amplo  
*symptoma* uulnere, & quātum tolerant uires c sanguinem educito.  
*desiderent,* Tum si fuerit opus, paululum recreatis uiribus, & leui  
*& ex afflu* pharmaco purgato corpore. Hipp. de locis in homine  
*xu materiæ* metuit, ne fortiori pharmaco humores corporis agitati  
*ab orgasmo* confluant in oculos. Quod consilium multis ē recentio  
*magna sit* ribus Medicis probatum est.  
*ophthalmia* Itaque si biliosus sanguis est, quem ferè dolor acer  
*bvt calor cō* bior sequitur, rhab. cassia, manna, catholico, electario  
*tra naturā* de succo rosarum, Hiera picra uentrem subduces. Dissol  
*euanescat.* ue æstate in sero lactis, decocto uiolarum & hordei.  
*c Sepe ad li* Reliquis tēporibus, in decocto pectorali. Fortiores sunt  
*pothymiam* pilulæ aureæ, pilulæ lucis. Hiera diacolocyntidos.  
*usque.* Si pituita, ex hiera picra, pilulis elephang. agarico mix  
*d Adrenocā* tis formentur pilulæ. Diaphœnicon quoque ex usu est,  
*dum fluxu.* pilulæ fœtidæ, & coccia.  
*e Quinēt oc* In melancholicis, hiera Ruffi, hiera diaco. addito epi  
*cipiti & to* thymo, aut foliis fennæ. Per interualla, clysteres & sup  
*to capiti sūt* positoria loco purgationum esse possunt. Alioqui reuo  
*cornicula* candæ sunt purgationes. Iam bene purgato corpore.  
*affigenda.* *d* Cucurbitulæ scapulis, & initio cernicis figendæ  
*f' t fiat re* sunt, ubi & f scarificatio conuenit, si quidem locus ad  
*uulsio &* mixta cucurbitula uehementē intumescit, atque ubi gra  
*euacuatio* uitas est capitis. Perseuerante malo, uena frōtis, uel quē  
*man. festa* syncipite apparet, quæ post aures, quæ in temporibus, in  
*materiæ i o* quibus ea eligenda est, quæ tumet, rubet, pulsat magis  
*culū fluētis* cæteris. Reliquias inflammationis uacuat ea, quæ ad ma  
*g Quod mi* iorem angulum est. Loco phlebotomiæ nonnunquā hi  
*nus dissipē* rundines inducūtur. Cartilago quoque auriculæ scarifi  
*tur spūs.* catur. Quæ uena ad policē uergit, mediæ ramus est, quæ  
*h Idē Gal.* initio secta plurimum diuertit, & uiribus g minus detra  
*cap. ultimo* hit, quā secta cephalica. Arteriotomia locum habet, ubi  
*lib. de cur.* calidius & spirituosus sanguis est. Huius rationem de  
*ration. per-* scribit Galenus ad h finem 14. Methodi medendi, & Nic  
*sang. miss.* sues cap. de ophthalmia, Cauteria tamen ad coronalem  
 futuram.



suturam, ut prius post aures in occipitio, è regione oculi laborantis in ceruicis initio imprimi possunt. *caut. ria*

Paracentesis fit hoc modo. Prehendes digitis cutem cum carne quę initio ceruicis ad cauum occipiti: tū acum traductam filo serico satis crasso transfiges. Et ita locum peruium ad triginta aut quadraginta dies per mites, per interualla sublato, ac deinde reposito si- *a Cum mate*  
lo. Topicis uero hoc modo utendum est. *a* Initio qui- *ria fluit, &*  
dem reprimendum: *b* augmento, aliquid coquentium & *tātū pars ca*  
reprimendum miscendum est. Ut uerò procedit mor- *let et rubet.*  
bus, hæc augenda sunt & minuenda, quę reprimunt. *b Cum mate*  
Postremo roboranda pars est. Fouentur itaque *c oculi*  
ex decocto uiolarum, rosarum, sem. psilii, papa. albi, cor- *ria pars ali*  
ticis radicis mādregoræ, foliis populi, salicis, rubi, myr- *qua fluxit.*  
ti & similium, distincta ratione ex natura humoris, *c In fluxio-*  
qui fluit. *nis initio.*

In augmento, decocto maluarum, althææ, cydoniorū, adiecta modica quantitate eorum, quę reprimunt.

Procedente morbo, flores chamęmeli, anethi, melilo- ti miscendi sunt. Postremo etiam fœnugræci decocto. Vbi reprimendum, aqua communi, aqua rosarum, aut plantaginis decoctio fit.

In augmento, lacte, postea etiam uino diluto.

Itaque ubi topicis utendum est, fouendus locus deco- ctione frigida, aut tepida, si leuæ adsunt, & pertinacius *d Si calida*  
inhæret pituita, tum *d* medicamentum oculis instillan- *fit materia.*  
dum. Postea gossipium madefactū in liquore conuenien- ti linteolo lineo inuoluitur: linteolum similiter insucca- tur, & ita oculo insternuntur: tum ita alligantur fascia, ut ne oculus grauetur, aut doleat.

Oportet enim quę oculis adhibetur, læuia esse, mol- lia, præterea sine morsu, sine emplastica & uiscida natu- ra, quę pertinacius inhereat, & celerius indurescat.

Quater in *e* die remedia innouantur, aut etiā sæpius, *f Imo decies*  
si urget dolor. Quod si per exteriores partes, quod sæ- *f* *Ut secun-*  
pe fit, fluxio est, frons & tempora reprimente emplastro *dum pericra-*  
inducenda sunt. *nis tunicā.*

Conueniunt itaque initio *g* aqua rosarum, oui li- *Ad repri-*  
quor *men-*



# DE MORBIS INTERNIS

quor tenuis, lac muliebre, aut asinæ. Succus rosarum, cōserua rosarum. cum oui albumine, muscillago sem. psilij, & similia. Vel hæc composita.

R. succi mororum agrestium resiccati ʒ. iiij. (plus, minusve) quas cum oui albumine commiscebis, & siccabis rursus. Vfus tempore, drac. ij. pulueris in lacte muliebri & aqua rosacea dissolues. Vteris autem, ut supradictum est, scilicet, instillando cum gossipio insuccato. Oui albumen agitatū, & despumatū cum decocto papaueris albi, aut aqua rosarum utile est. Aliud.

R. muscil. sem. psilij, seminis cydoniorū extractæ in aqua papaueris ana. ʒ. i. liquoris tenuis oui drac. vi. camphoræ Gr. viij. croci Gr. iiii. Vbi dolor urget uehementius, utendum est opio. Sed ab eius usu, oculos decocto meliloti tepido, aut simili a fouendus est.

## Collyrium album.

Et corrigatur interperies quam induxerit opium.

R. gummi arabici, tragacanthi, amydi an. unc. i. cerusæ lote drac. i. s. opii. Gr. vii. Cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore drac. ii. in lacte muliebri dissolue. Crescente morbo.

R. cerusæ plumbi lotæ cum aqua rosarum & persiccate. drac. ii. camphoræ ʒ. s. cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore dissolue in lacte.

si est albu:

Toto reliquo tempore morbi licebit uti si est, id est, collyrio albo cum opio, si uehemens dolor est: imminuta dosi opii, si nō tam uehemens: omnino sublato opio, si leuis est.

b In quo parcura digerendi ac repellendi esse debet.

Sed addere oportet in b augmento sarcocolæ nutritæ in lacte mulieris dra. i. Et ut procedit morbus, in declinatione augenda sarcocolæ dosi est, ac tandem sola sarcocola nutrita in lacte, & uino, uel aqua fœniculi dissoluta utendum est.

c Vbi tantū repellendū.

d Vbi modicè digerendum.

Mucilag o psilii c initio: d cydoniorum, in augmento: lini aut althææ, in statu: fœnugræci, in declinatione conuenit. Sed ab vna ad alteram paulatim transeundum est. In declinatione.

e Ex lacte muliebri, vel asina.

R. sarcocolæ nutritæ ʒ. iiij. & s. croci, spicæ. an. ʒ. i. drac. aloes drac. s. Aloe lauatur in aqua fœniculi. Huius pulueris



pulneris drac. ij. in aqua sceniculi dissolue, aut aqua rosarum, si quid ruboris & caloris superest. Aliud.

Ouum crudum, coctum & ita induratum, calidum per se, uel è lacte muliebri subactum applicabis.

*Pulvis citrinus, quo utendum est in augmento & statu.*

R. sarcocolæ drac. v. aloes lotæ in aqua rosarū drac. i. tragacathi drac. s. opij. ʒ s. uel Gr. vi. Quo tempore ouū crudum integrum sine testa per se, uel cum lacte muliebri exceptum gossipio apponi potest. Roborando oculo uinum a adstringens dilutum aqua sceniculi, in qua spica aut stæchas coxerit, competit.

*Frontalia.*

R. mannæ thuris, mastichis an. drac. ii. agentur ex oui albumine. Aliud.

R. farinæ fabacæ M. i. cum oui albumine, fiat emplastrum. Aliud.

R. mirrhæ, thuris an. drac. ii. farinæ uolatilis. M. s. cum oui albumine fiat frontale. Aliud.

R. boli armenæ ʒ. i. aquæ ros. ʒ. iij. aceti. ʒ. i. cū duobus albuminibus ouorum, fiat frontale.

Balneum in declinatione imperari potest b Errhina quoque, gargarismi & masticatoria. Neque omittendæ sunt frictiones initio ductæ supernè deorsum est ad diuertendum. Vide Aetium.

## S C H O L I A.

Morborum oculi ut infinita propè multitudo est, ita in illis distinguendis maxima confusio, præsertim ijs, qui ad Ophthalmiam similitudine quadam accedunt, & inflammationem annexam habent, quales sunt, taraxis, phimosi, chemosis, & ophthalmia propriè dicta. Montanus uir alioqui doctissimus ceteris accuratius hæc distinxisse epistola quadam uidetur, à ueterum tamen sententia, ut Galeni & Pauli Aeginetæ, longè discedens. Scribit enim chemosin palpebrarum inflammationem esse, licet aliquando partes ceteras in consensum trahat. At Paulus Aegineta tumorem albi oculorum esse uult, quam sequitur inflammatio & palpebrarum contorsio. Vidius quoque (ut doctissime

a Aut collyriū ex quarta aqua rosarum parte, una uini & pauco mastiche confectum.

b Propter oculorū & nariū sympatiam in ophthalmia nunquam tuto errina præscribuntur.

10. cōsilio. 229.  
Montanus d  
chemosi op-  
pinio.



## DE MORBIS INTERNIS

*taraxis qd?*  
*si adyctas*  
D. Gorraeus annotauit) negligentius à τὸ κατ' ἰντρον legi-  
χρῆμασι ἀπὸ τῆς φημώσεως. Sed his pratermissis omnia facili-  
mè sic distinguuntur. Si leuis quædam inflammatio, & ueluti  
phlegmones principium sine discrimine partes oculi inua-  
dens primo intuitu appareat, cum rubore quidem, sed exi-  
guo, quem dolor mitis consequatur, taraxis erit duntaxat,  
id est, oculi perturbatio. Hæc enim certissima signa sunt,  
quod hic affectus, neque phlegmone sit confirmata, neque  
vnius magis, quàm alterius partis proprius, neque uche-  
mentem dolorem habeat, aut tumorem. Quibus est deiciat à  
caussa externa excitatum fuisse, ut sole, fumo, puluere,  
oleo, radijs lune, uino, esu caparum, eruca, alliorum, sina-  
pi, ictu, quæ omnia ab egro diligenter exquirenda) tum nul-  
la in iudicando dubitatio esse poterit. Paulus à manifesta  
tantum caussa fieri vult. Experientia tamen constat non  
rarò ab interna excitari, præcipuè uitio uentriculi, & post  
egregiam potationem, neque tamen propriè esse Ophthal-  
miam, licet aliquando in corpore cacochymo, & si negli-  
gatur, in eam faciliè degeneret. Si uerò palpebræ tantum  
inflammationem patiantur, atque in sese concidant, ut ocu-  
lus aperiri nequeat, phimosi erit, id est præclusio quædam,  
& quasi ligatio eorum, quæ secundum naturam aperta &  
reclusa esse debent, siue cicatrice, aut carnis incremento par-  
tes coalescant, ut labra uteri, siue inflammatione, ut palpe-  
bræ oculorum. Contrà, si oculus apertus maneat, nec clau-  
di possit, albo nimirum oculi in tumorem sublato, atque  
eminente nigro uerò subsidente, & ueluti hiatus quendam  
efficiente, chemosis est. In qua præter ruborem, & in-  
flammationem, patognomoni cum signum est, palpebra-  
rum, ut ait Paulus, ectropi, id est, conuersio, quia adduci  
non possunt. At si coniunctiua tunica, siue adnata pleg-  
mone laboret, cum tumore, tensione, dolore, calore, & rubo-  
re, Ophthalmiam esse non dubitandum. Ergo taraxis (quam  
Ophthalmiam non ueram vulgò appellant) affectio est om-  
nium oculi partium externarum communis: phimosi, pal-  
pebrarum chemosis, albi oculorum: Ophthalmia, adnata mem-  
brana propria.

Sæpe omnes inter se, uel plures commiscuntur.

Fium



Fiunt Ophthalmie, ut ceteræ inflammationes, à sanguine, bile, pituita, melancholia, flatu. Sed frequētius à sanguine, aut bile.

Sanguineæ signa sunt, tumor maximus in loco, rubor, tensio, lachrymæ crassiusculæ, quæ faciliè exsiccantur, sordes molles in oculorum angulis. Quibus adde redundantis sanguinis in corpore indicia.

Biliose, tumor moderatus, in superfice, color subpallidus, dolor acris & mordax, lachrymæ uel nullæ, uel parvæ, salsæ, amaræ, statim concrecentes, sordes in angulis siccæ, & asperæ, uigiliæ, excrementa biliosa, corpus gracile, quandoque febris tertiana, si materia fuerit in uentriculo.

A pituita, tumor maior, sed laxis, color albus, lachrymæ plurimæ, tenues, insipidæ, sordes uel nullæ, uel molliusculæ, corpus pituitosum, &c. A flatu rara est, tentionemq; habet sine grauitate.

Per defluxionem fieri intelligimus, cum repente inuadit, nec præcesserunt lachrymæ, sordes, erosiones à quolibet aeris excessu. Per essentiam uerò ex contrarijs signis, & dolor ad interiores capitis partes non perueniat, à quibus adnata membrana nascitur. Humidior autem efficitur ob materiæ multitudinem, tenuitatem, loci affecti raritatem, caliditatem aeris, uirtutis expultricis robur, & retentricis imbecillitatem. Sicca, quam Græci xerophthalmiā uocāt, contrarijs causis constat, periculosiorq; est ob materiæ acrimoniam, quæ sæpe ulcus inducit.

Sedato capitis dolore, si adsit, conueniunt sanguinis missio sæpius repetita, cucurbitulæ cum scarificatione, clyster, topica, repellentia, collyria, anodyna, purgatio, balnea, meri potio, emplastra. In taraxè, subducto agro à causa externa abluatur oculus tepida primum, deinde frigida, abstinentia à cibo, somnus. Perpetuò & subinde imponenda medicamenta, quia eluuntur nouo humore, & lachrymis affluentibus. Nonnulli è recentioribus Hippocratis auctoritate fortiores purgationes non probant, quòd sic commotus humor d'fluat in oculum: alij contrà. Non dubium tamen est contumaces ophthalmias reperiri, quæ non nisi paulò uehementioribus curari possunt, ut hierà diacolocyn. & similibus. Sed omnia pro humoris quantitate & qualitate temperanda.

Amplio



## DE MORBIS INTERNIS

Amplio foramine.) Tum ut crassior sanguis exeat, tum ut maturius animi deliquium sequatur. Quod plurimum conferre ostenditur historia adolescentis, de sanguinis missione, 6. Epidimion. 1. I. Methodi, 2. ad Glauco. Aetius è fronte, & angulo maiore. Sed hoc post sectionem cephalicæ, perscuerante dolore. Tunc enim primariam uena frontis, ac tandem, quæ est in maiore angulo ad nares, secari potest. Cæterum ramus mediæ initio diuertit, & minus detrahit viribus, quàm cephalica.

Oportet hos succus instillare oculis.) Satius erit plurimum diluere oui liquore optimè confracto, ut nihil habeat viscidum, & lacte mulieris iuuenula, deinde etiam sænugræci decocto. Aut rosas, myrtos, rubos, & similia cum sænugræco, chamemelo, seminibus lini, & similibus in aqua simplici aut plantaginis incoquere. Deinde pannis mollibus ad oculi magnitudinem complicatis, insuccatis & admotis partes vicinas fouere, Aestate quidem frigidis. Hyeme verò calidis, sæpius in nouatis. Lenta Galenus laudat, quia aspera oculum offendunt Periculosa tamen sunt, si nimis corpulenta & viscida, quia frequenter loco adherent, aut exsiccantur, aut putrescunt, sed tu maximè si pustula aliqua subsit. Narcotica, si acrior dolor sit & humor, effluxum prohibent, acrimoniam retundunt, est oculi sensum hebetiorem reddunt. Sed his neque in principio neque ante purgationem est utendum, idq; necessitate cogente, ut docet Gal. 3. I. Aph. lib. 6. ubi addit etiam indurari, & astringi. Vitriolum humidioribus oculis nonnulli inspergunt oui albumine tritum, & aqua calida coctum dum concreseat. Deinde exprimunt, & liquorem oculis infundunt. Ab acrimonia tamen cauendum. Cerusa veneta optima est dissoluta in lacte decoctionis soliorum capiti seminis papaueris pulticula è semine papaueris, albi, & hyosciami, decoctum foliorum papaueris, capiti seminis, & inde fatus. In sænugræco bene loto & macerato magna vis inest. Bene purgatus multum abluitur, maceratur per diem in aqua purissima, in fictili bene coquitur: abiecta aqua, alia infunditur, coquitur puro igne, idq; iter faciendum affusa semper aqua noua, ut omnis auarritudo eluatur. Coquitur vero ad liquidum mellis spissitudinem operto vase



*vase. Sine expressione colatur linteo. Colatura servatur vsui a Quæ sit fe-  
ad tertium diem ad summum.*

*De a Debilitate vsus.*

*Cap. XVIII.*

**M**YOPAS Græci uocantur, qui à primo naturæ ortu non nisi admota oculis cernunt. Idque b exertis bri vitio cō propè oculis, palpebris constrictis, atque conniuenti- sistat, vel bus. Id quod efficit c tunicarum oculi raritas, tenuitas, spiritus ani- humoris, subtilitas spiritus visorij, qui priusquam an- malis, vel gulum faciat, dissoluitur atque euanescit. tunicarum

Sunt, qui eo nomine vespertinam etiam d aciem ap & humorū pellant, cum interdiu obscure: noctu & sine luce na, acu oculi. tius videant. Rara affectio hominibus ab eadem causa, b Propter nisi quod illic infirmitas maior est: hic luce quidem dif spiritus vi- fluit spiritus, nocte cogitur atque temperatur. Contra sarū pauci- verò Nyctalopes interdiu vident, e caligant ad lucer- tatē, tenui- nam, quanquam & hoc nomen nocturnæ cæcitatē ad tatē & tuni- Myopas etiam transferant, vt Octavius. ce raritatē.

Amaurosim vero & Ambliopiam, hebetudinem, atq; c Presertim obscuritatē visus ita distinguunt: illius multæ causæ notæ corneæ & sunt: huius, nulla f causa manifesta est. Quia cum pupil- vna. la pura sit, neq; vitium vllum appareat in oculis, uiden d Quod am- di tamen g coniectura quadā curationē amolimus, me- biente aere dicamentis, quæ Oxydorci, & Oxydorcicā pharmaca ap crasiore a- pellantur, quia, videlicet, cum nullum accidens manife nimalis spi- ritus cogat.

Causæ tamē utriusq; mali, uel in humoribus oculi: e Quia spi- uel in natura uisorij spiritus: uel in tunicarū habitu: uel ritus eorum qua interceptus est, ant resolutus neruus opticus. Sūma- uisorius cras- tim in his, quæ natura ad legitimā uidēdi facultatē insti- sior est, non- tuit, Spiritus neq; b crassior, neq; tenuior esse debet, ac- aereus. ria tū natura, tū substantia, tū qualitate moderna, iusta ē f Vnde hæc quātitate, quæ omnia pendēt à natura sanguinis & pitui a recētiori- tæ, i qbus substantia est spiritus. Téperatus. n. sāguis eū dē bus gutta se spiritū gingit: intēperatus uerò uitiosū reddit. Subtilior rena dicta, spiri- quod nullo

*quod in oculo cerni possit, vitio, videndi facultas amittitur.*

*g Vt cū clauso altero oculo, pupilla non dilatatur: vnde nerui optici obstru- ctionis fit significatio. h Ne contiguum aerē illustrare non possit.*



# DE MORBIS INTERNIS

spiritus obscuro loco melius habet, ut in vespertina acie. Tenebris. n. colligitur, crassescit & frigidior reddit. Idē

a Galen. c. efficit ut & minima a cernamus, & pingamus calamo :  
i. li. de sym- sed tantum ea, quæ in proximo sunt. Contra uerò cras-  
ptom. caus. sior spiritus, ut in senibus, remotius posita intueri po-  
b Id est, ca test, tantum cernit maiuscula, eademque calamo pin-  
citatis no- git. Ex quo inuenta est ratio Opticorum in specula-  
eternæ, desi- ribus, ut conuexa, minores : concava, maiores : plana,  
derata ra- æquales formas & literas representēt. Ut enim oculares  
tione rñs su radii maiorem minoremve angulum describant, ita for-  
vaoyuas in mæ proponuntur.

Curatio.

Curatio b Nyctalopis & debilitatis uisus. Hæc uitia magna ex parte ab humorum uel uaporum crassitie exci-

c Que sign. ē tatur: multo maximè, si repente orta sunt, & e grauitas  
partis ab hu sentitur in radice oculorum.

morū copia Aperiatur itaque primum cephalica, si res postulat.  
oppressa. Alioqui si d cacochymū corpus est, purgetur hoc modo.

d Et si hu- R. pul. hieræ picræ Gal. ℥. ii. pul. diacol. drac. s. casto.  
mor crassus ℥. s. sem. fœniculi, nucis moschatę ana Gr. vi. cum succo  
à concoctio rutæ formentur pilulæ. Possunt & pil. cocciis pil. lucis,  
ne segregat- elephanginis, mixto aga. purgari. Mollis teneatur aluns  
tus uidea- pilulis factis ex aloes drac. i. terehinth. drac. ii. uel cas-  
tur. sia. Alioqui e polypodio, enico, mercuriali, multa borra-

e Si pilulis gine, iusculo concoctis. Tum ferrhinis, apophlegmatif-  
stomachicis mis. Iternutatoriis utendum erit.

uti nō licet : Cucurbitula occipitio fixa cum scarificatione ea ni  
ut in hamor obstructions liberat, ut ea ipsa etiamdum herente ali-  
roidas habē quando uisus restitutus sit.

tibus. Constrictio colli ita spiritū impellit in oculos, ut in-  
f Errhinis de ampliatis viis & spiritu liberiore, uisus reddatur, aut  
minimè utē certē acuatur. Post hæc extrahendus sanguis ex angulis  
dum, nisi su oculorum. Rhazes etiam è fronte, Mesues è naribus.

blato omni

Topica.

inflammatio- Infinita propè describuntur, quæ ex uariis authori-  
nis metu. bus colligi possunt. Tradunt capras non minus noctu  
cernere, quàm interdiu. Et ideo caprinum iecur, si uesti-  
tur, restituere uespertinam aciem iis, quos Nyctalopas  
uocant. Idem iecur assum & cum sale comestum iuuat.

Aut



Aut sanie, quæ inde effluit, dum affatur, oculos illinunt. Alii uaporem elixati iecoris excipi iubent.

Sunt qui hirci potius, quam capræ, & hirci montani iecur imperant. Nonnulli configunt caryophyllis: alii irrorant aqua fœniculi: hocque remedium commune faciunt Myopibus, qui tantum noctu uident Octanius & Herophilus, quod a non probat Aetius. In senectutis magis, quam oculorum uitio succum mali granati optimo melli æqualiter commiscebis: aliquot dies insolaris, aut calidis cineribus coques. Conuenit pictoribus, lectoribus, & scriptoribus.

Alii granatum acidum, deposita duriore testa, contundunt: melli miscent: concoquunt, ac tandem uehementer exprimunt, eidem remedio, fœtori oris, firmandis dentibus, gingiuis, ozænis (quando carnes quædam adnascuntur dentibus.) Herbæ cōueniunt, fœniculus, ruta chelidonia, euphrasia uerbena, asparagus, bethonica chamædryes, raphanus, balsamita, pimpin. caryophyllata, apiū, maiorana, marrubium, parietaria, hyperici flores, meliloti, roris marini. Aromata, macis, cinamomum, nux moscata, lignum aloes, spica, santali. Conseruæ enulæ, acori. Horum omniū usus est, uel quia edūtur, uel quia multo feruent, aut in puluerem redacta sicca collyria faciunt. Aut melle commiscantur, ut eorundē succus. Aut in alābico distillantur. Redditur aqua efficacior, si quid mellis liquidioris commisceas, dum distillātur. Atque hac etiā fortior, cum mel scylliticum in alambicū coniicitur. Laudata est olim lactuca syluestris. Cuius rei argumētum, quod Aelianus scribit, Accipitrem tinnūculum (Quercellam uocant) acerrimo lactucæ syluaticæ succo oculos illinire, atque laborātem aciem instaurare. Quod deinde Medici secuti sunt. Atque hinc oculorum medicina Hyeracia, quasi Accipitraria uocata est.

Aqua, quam scribunt restituisse uisum cæco nouem annorum.

R. succi apii, fœniculi, uerbenæ, chamædryos, pimpinellæ, caryophyllatæ, saluicę, chelidonix, rutę, centinodix, moris gallinæ, caryophyllorū, farinæ uolatilis, ana unc. i. piperis crassiusculi triti, nucis moscatæ, ligni aloes

*a Nec est probandum: non enim myopibus collyria oxydorci sunt prescribenda, sed in crassantia.*

*b Præsertim Narbonensis, quod thymum redolet.*



# DE MORBIS INTERNIS

aloes ana dra. iiii. Omnia immergātur in urina pueri in-  
corrupti, & sexta parte uini maluatici. Bulliant breui  
tempore: tum exprime & percola. Repone uale uitreo  
bene obturato. Hora somni singulas guttas singulis o-  
culis instilla. Dum efferuescit multum, euphrasia iniici-  
tur. Vinum repurgatum asseruatur singulari remedio.  
Eiusdem herbæ puluis sorbili ouo inspergitur, aut inde  
sal oxydorchicum paratur.

R. salis cōmunis unc. i. euphrasiæ siccæ drac. ii. macis.  
cinamomi ana. scrup. i. misce.

Flores roris marini amphora uitrea cōcluduntur: quæ  
duplicato linteo cerato obtegatur in arena, ut mos Chy-  
micis. Liqueor redditur efficacissimus oculorū claritati.  
Accipiter (*Emerillon vulgo*) unguento susino decoquitur:  
uinum absynthites, aut rhodinū, antimonium, tuthia in  
aqua fœniculi extincta. Pica auis in testaceo uase crema-  
ta, & in cinere redacta, uehemēter laudatum remedium  
à Practicis.

R. Sileris montani, maioranæ, euphrasiæ, rutæ, cheli-  
doniæ summitatū fœnic. ana unc. iiii. zinzib. spicē nardi,  
piperis lōgi, caryoph. tuthiæ extinctæ & nutritæ, sarco.  
nutritæ in lacte asinæ, ligni aloes an. unc. i. fellis aquilæ  
aut accipitris, balsami ana unc. s. mellis ros. unc. i. cōqual  
sanda conquassentur, liquabilia liquefiant: misceantur,  
& Aestate quidē, quadraginta diebus insolentur, semper  
agitando & obuertendo uas. Hyeme in cineribus mode-  
ratē calidis, similiter macerentur. Reponantur uase ui-  
treo ad usum. De esu uiperarum alio loco. Ut uis medi-  
camenti penetret, aqua tepida ē gossipio, uel molli lin-  
teolo fouebis oculos. Frequens usus tripheræ minoris,  
chebuli conditi, mytridatii & theriacē. Sed magis Hye-  
me commendatur. His autem uti oportet iam bene pur-  
gato corpore, ut etiam sinapisinis & cauteriis. Rationem  
uitæ, & reliqua remedia localia & aliis colligato.

## SCHOLIA.

**A**mblyopia, & Amaurosis morbose sunt oculorum af-  
fectiones, cum uisus uel hebetior est, uel omnino subla-  
tus, sine tamen ullo oculi manifesto affectu, aut uitio, in par-  
tibus



tibus oculi, quæ sub aspectum cadunt, nobis apparente, soli-  
 quarum intensione, & remissione differunt, quod illa imbe-  
 cilliores, hæc uehementiores, & iam confirmatas causas ha-  
 beat. myopia, uel myopiasis est, cum uisus non omnino qui-  
 dem sublatu, aut hebes & obusus, ut in superioribus, sed di-  
 minutus ita ut propius admota, etiam minima, ager cernat,  
 & exacte distinguat: ad remota tamen, & paulo longius  
 disita penitus illi caligant oculi. Malum à natura sæpe con-  
 tractum, quo laborantes Budeus Lusciosos, & Luscitiosos,  
 & Nuscutiosos uocat, quales ferè, cum paulo diutius legerint,  
 aut oculos aliquò coniectos habuerint, exhausto spiritu te-  
 nuiore cæcutiunt, aut limis, semiclusosq; oculis uolitantia  
 quedam in aere corpuscula sese intueri putant. In Nycta-  
 lope uisu, itidem diminutus est, sed symptomata diuersa,  
 quod interdum uideant, sole occidente obscurius, noctu ni-  
 hil, quasi, ὅτις νύκτος ἡλὰς, id est, noctu nihil uidet.  
 Atque hæ sunt affectiones, quæ uisum solent intercipere, nul-  
 lo manifesto affectu in oculo apparente, sed pupilla planè  
 pura, atque incolumi, si adicias quosdam, qui noctu melius  
 uident, quàm interdum, quod rarissimè contingit. Duæ prio-  
 res affectiones ferè sunt in nervis opticis, aut cerebro, poste-  
 riores in humoribus, tunicis, sed frequentius in spiritibus.  
 Verum & locum affectum, & causas affectus remota peni-  
 tus nominum ambiguitate & confusione, quod non omnes (ut  
 in ceteris ferè paulo difficilioribus) in eadem significatione  
 usurpent, ita distinguere licebit, & quasi typo, ut Aristot-  
 eles loquitur, depingere. Si ager uel nihil omnino uidet, uel  
 diminutè, sed semper æqualiter, & uno oculo clauso, alterius  
 pupilla non dilatatur, nullo, scilicet, irruente in eam spiri-  
 tu, signum est spiritum transire non posse ad oculum per  
 nervos opticos, aut si transeat aliquis, non sufficere tamen  
 ad oculum illustrandum. Idq; fiet uel uitio cerebri, uel me-  
 nyingum, uel nerui optici.

Hæc enim sunt ad spiritum uel generandum, uel dedu-  
 cendum necessaria. Si uitio cerebri spiritum non suppedi-  
 tantis, aut corrumpentis, ut post insignem euacuationem,  
 longum morbum, mærorem in senectute, in ceteris etiam sen-  
 sibus læsio aliqua percipietur. Nam cum omnes sensus inde  
 prodeant



## DE MORBIS INTERNIS

prodeant, tanquam rivuli, quomodo vni morbum, quo afficitur, communicare poterit, ceteris integris manentibus? Ergo si simul cum visu, ceteri quoque sensus afficiantur, & gravitas capitis percipiatur (additis semper causis antecedentibus & externis, observatisq; diligenter partium, quæ cum cerebro consentiunt, affectibus) de cerebro læso coniecturam certissimam habemus: si quidem quæ generali illo axioma, tanquam fundamento firmissimo, nititur, membrum esse sanum, cuius actio sana est: læsum, cuius actio læsa, Si in Menyngibus, ad oculorum radices percipitur dolor, aut gravitas: sin minus, in nervo erit, vel resolutio, vel obstructio, vel contortio. In contortione vident oblique: in obstructione, si perfecta sit, nihil: sin minus, parum, sed eodem semper modo sapitq; repente, & vno impetu incidit, aut humore, aut spiritu, ut post excrementa alui retenta, cruditates, insolationem capiti ardorem (quod in pistore vidimus iuxta furnum ignitum repente cæco facto) ictum, casum, concubitum, & similia, quæ caput replere, aut humores commovere possunt. Resolutio sit in nervis per inanitionem, aut repletionem, de qua satis in superioribus. Hæc omnia in universam causam sunt, & signa

In spiritibus affectiones ex eorundem naturali constitutione deprehenduntur. Debent enim moderati esse in subtilitate, crassitie, fulgore, obscuritate. Paucitatem & multitudinem adderem, nisi quia vix unquam sat multi esse possunt. Qui multos subtiles & lucidos habent, atque in unum coactos, nullo aliunde impedimento accedente, hi omnium vident acutissime. Ceteri sunt præter naturam. Quorum variae differentiae constitui possunt. Sed præcipuæ, quæq; occurrunt frequentius, sunt huiusmodi. Subtilis, paucus, lucidus, crassus paucus, crassus multus. Quia enim subtilis, paucus, & lucidus, subtilitate facile diffluit, paucitate resolvitur, ac luce maiore offenditur, inde hæc symptomata consequi necesse est, ut ita affecti remota intueri nequeant, propinqua exacte discernant, obscuriori paulo aere oblectentur, nec diutius legere, aut oculos in rem aliquam intentius defixos habere possint. Quibus si accedat pupillæ amplitudo paulò maior, parum aberunt à cecitate. Vi enim visio absoluta fiat, in  
firmam



firmum & densum conum spiritus coire necesse est, qui pupillae amplitudine diffunduntur ferè in meatu. Quo fit, ut ita laborantibus nullum (si ab ortu contractum sit malum) praestantius remedium afferri possit, ocularibus ad oculi formam cauis, & circumferenti à densioribus, quò spiritus in centrum, tanquam pupillam cogantur, & confertim prodeat. Quod in multis feliciter sumus experti. Atque hæc est causa propria *μωπίας*. Si verò pauci sint spiritus & crassi, paucitate hebetior visus est, crassitie obscurior, ob idq; egent lumine externo, ut illustrentur. Hinc fit, ut interdum satis acutè cernant, occidente sole obscurius, noctu nihil, aut parum. Quod de *Nyctalope* diximus. In quibus verò multi sunt spiritus & crassi, hi longius posita melius circumspiciunt, quia opus est multa luce, proindeq; intervallo longiore ad illustrationem. Crassities autem omnis aliquando à crassiore sanguine, aut alimento originem habet, sæpe à vaporibus, aut humiditate cerebri. Et si ad maiorem angulum fiat fluxio, è syncope: ad minorem, è venis post aures, & quæ in temporibus. Unde etiam efficitur, in his noctu obtusiores esse oculorum aciem duabus de causis: tum quia sufficienti lumine destituuntur spiritus: tum quia eo tempore lune influxu humor accrescit. Cui consentaneum est, quòd in plenilunio habent deterius. Quòd si qui noctu videant clariùs, quàm interdum, una ex duabus causis contingere poterit: aut quia igneos habent oculos, ut experientia in quibusdam animalibus observare licet: aut quia subtiliores spiritus, qui crassescunt nocturno aere, & coguntur, nec dissipantur. Quibus omnibus fidem facit experientia & curatio, quæ singulis causis ingeniose accommodata nunquam fallit, sed longior ac difficilior, quàm ut brevi annotatione comprehendi queat. Sunt & aliæ causæ imbecillitatis visus, in crystallino humore, rhagoide, humore, qui crystallino prætenditur, ut infringat vim splendoris externi, & maderafaciat crystallinum, cicatrix inducta cornea, & similia. Sed hæc omnia iustum commentarium desiderarent.

*Οξυδογνῆ, &c.*) Huiusmodi sunt collyria quedam apud Gal. 4. τοῦ κατὰ τοῦ πού. Similia sunt sequentia. Viperas quidam simo sepeliunt: gignuntur vermes, inde aqua distil-

G

latur



## DE MORBIS INTERNIS

latur mirabilis. Ab aliis viperinus adeps, cum viperis, the-  
riaca & rebus ocularibus distillatur. Viperarum capita cre-  
mantur olla. Cinis cum cremore lupinorum subigitur, & illi-  
nitus temporibus. Vina factitia, rebus convenientibus cum  
musto coctis & racemato. Mel anthosatum distillatum cum  
suis floribus & cacuminibus roris marini. Hyrundinis cere-  
brum ex melle tritum, vel serpentis. Nux moschata condi-  
ta diuitibus, aliis ex vino manè & hora somni odorata, in-  
spirata. In Nyctalope hepar hircinum affato, & cremorem  
fluentem illinito: ipsum verò hepar edendum præbeto. Colum-  
binum sanguinem illinito, aut sel capræ. Hepar caprinum co-  
quito: obuelato capite, & in ollam aduerso, fumus oculis  
excipitur: ipsum verò hepar assidue edendum præbeto. Aut  
idem hepar concisum pipere longo, & sale gemmæ consper-  
sum in carbonibus affato: excipitur fumus. Ex hoc cito au-  
xilium percipitur. Succus recens stercoris asini, sel vulturis  
illitum, vel cum succo porri, commixto melle. Peucedani  
succus cum succo fœniculi. Anagallidis succus tertio quoque  
die oculi iniectus idem præstat, & pannum in oculo consu-  
mit. Pulli hyrundinis acu ex ere in nido excecantur, signan-  
tur, ut internosci possint. Tertio die capita præciduntur: in-  
cendantur, puluis cum balsamo in oculum instillatur. Vasa  
anea ocularibus medicamentis probata. Apodes (vulgò Mar-  
tinets vocant) vescuntur chelidonia. Cinis rui est: aqua  
hyeme. Aqua potus. Argumento, quòd qui aquam bibunt,  
acutius vident, ut scripsit Arist. in Probl. Inspirationes,  
quàm fatus, meliores. Sed ante masticaanda sunt ocularia  
medicamenta. Lingere oculos catelli lingua, vel pueri. Scar-  
rificatio auricularum, & perforatio Barbarorum more. Pa-  
rum bibendu in humidioribus oculis & excrementitiis. Emun-  
ctioni assuescendum sine vi. Vapor è decoctione rute, mar-  
rubij fœniculi, euphrasie, chelidonie, ligni aloes, croci, co-  
ctorum in aqua & vino. Ex his cum melie distillatio. Decu-  
bitus, cum legit æger, & caput erectum, non demissum. Bu-  
zyri magna vis. Illitum mollit, lenit, polit, laxat, resoluit, co-  
quit: ideoq; hebetudini præsertim à siccitate, prodest: cica-  
trices & albugines exteri: declinationem calidarum fluxio-  
num iuuat: soluitur: & linteolo inde madefacto fit fortis. Ca-  
put



put mundum & pedes. In glaucis oculis, quiq; venas ple-  
nas & amplas habent, mitioribus pharmacis uti oportet.

Hyeracia.) ἀπὸ τοῦ ἰεράκου, idest, Accipitre. Apud Ga-  
lenum 4. τῶν καὶ ἀ τοποῦς, & Cornelium Celsum, reperitur neā & rha-  
νιάκιον κολλοῦν, ad obscurum visum & scabras affe-  
ctiones. Inde etiam nomen herbæ, quam rustici ichoream  
luteam vocant à florum colore, in pratis frequentem. Acci-  
pites autem scalpēdo eam, succoq; oculos tingendo obscurita-  
ti visus mederi, ob idq; vocant

De Catarrhacta.

Cap. XIX.

**C**atarrhacta præcipitem a decubitu humoris signi-  
ficat, hocque nomen positum à practicis, quia suffu-  
sionem existimarent fieri defluxu aquæ in oculos, unde  
& aquam descendantem in oculum appellant. Gale. 2.  
de sympt. causis, & 7. de placitis Hipp. & Plato. suffu-  
sionis causam facit crassitudinem b tenuis humoris, qui  
pupillæ meatum intercipit, ne possit communicare ra-  
dius externus cū crystallino humore. Tenuis is humor  
albugineus à quibusdam Medicis est inter rhagoidē &  
crystallinum humorem, quo crystallinus humor, præci-  
puum instrumentum visus, partim fouetur, partim mi-  
nuitur, ut lux refringatur, nec lædat crystallinum.

Pupillæ foramen via est spiritus animalis, aut etiam  
radiatorum, qui à rebus externis ad videndi facultatem  
importantur. Præclusa itaque via, quia, videlicet, humor  
ille albugineus longè crassior se ipso factus est, suffusio  
fit, quæ c ypochysis & d ypochyma dicitur à Græcis. Na-  
scitur hoc vitium sæpe consortio e stomachi: sæpe etiā  
primario f vitio cerebri. Atque priusquam ad curatio-  
nem accedas, id ipsum diligenter distinguendum, Di-  
stingues autem ex cap. 1. lib. 4. de locis affectis. Quod si  
vitio g stomachi, vomitu, purgatione ex hiera picra, fru-  
galiore vita & integra concoctione, consensu Græcorū  
& Arabum curari debet. Oportetque & vomitum &  
purgationem ex hiera sæpius reuocari.

In alia verò, quæ primario cerebri affectu fit, natu-  
ra suffusionis primū consideranda est. Nam vel inci-  
pit, vel ad statum progreditur, vel omnino confir-

G 2 mata li. 3. Progn.

bro per ner-  
num opticū,  
vel inter cor-  
neā & rha-  
goidem mē-  
branas ad  
pupillæ fo-  
ramen.

b Concre-  
scit hic humor

a pueri senio  
aut febre,  
aut epile-  
psia, aut me-  
lancholia,  
aut gravi  
aliquo affe-  
ctu, qui aut  
præcessit,  
aut commi-  
xtus est.

c Dū fugas  
est.

d Dū confir-  
mata, & tū  
gasis nuncu-  
patur.

e Ut in vo-  
mitu vis vo-  
mitione cri-  
tica, ut in  
cardiogram-  
t Ut ex epi-  
lepsia et mo-  
lancholia.

g Aut et pul-  
monum. Ex  
Hippocrate



DE MORBIS INTERNIS

*a* Nisi opẽ mata est. Et hæc *a*. quidem desperata est.  
*chirurgica* Itaque pupillam primum aspicio. Colorem suffusio  
*deturbetur,* nis, concretionem, motum, magnitudinem distinguo.  
*si modo cu-* Si quid *b* præcessit, aut adest, interrogato. Aetatis, tem-  
*rationẽ pos* poris, conditionis totius oculi rationem habeto. Despe-  
*sit recipere.* rata suffusio est, quæ pupillæ figuram commutauit. Pu-  
*Paul. Aeg.* ta atque pellucida tum pupilla, tum suffusio.  
*libr. 6.* Suffusionis color cœtuleus, aut auri similis, aut ferri  
*b* Vt si *epi* nitentis, aut aquæ maris, curabilis est. Quæ uerò gran-  
*leptia, melā* dinem refert, aut gipsum, *c* quæ nigra est: in summa,  
*cholia, car* quæ sine splendore cernitur, incurabilis est, fereque cō-  
*diognos pul* firmata ad candorem uergit *d* sine splendore.  
*monis itẽ af* Concretionem ita distingue. Oculo incūlumi clau-  
*fectio præ-* so, suffusum digito apprimes si humor ille tenuis confis-  
*cesserit.* sit, neque ampliatur, quia minimum concreuit, *e* despe-  
*c* Quæ me- ratio est: si diffluit & dissipatur, sed statim, ut prius, coit,  
*lan cholicis* desperata nondū res est. Si uerò dilatatur quidẽ, sed nō  
*cōtingit ex* dissoluĩt, maturitas est ut pũctiōe. i. acu uacuari possit.  
*mulā cholie* Catarracta, quæ locum mutat, *f* incurabilis, hoc est,  
*decubitu.* quæ hac atq; illac conuertitur. Quæ uerò compressa di-  
*d* Tū enim latur, non etiam commutat locum, melior est.  
*ipsius oculi* Exigua facilius, magna difficiliter curatur.  
*uix p̄p̄oris si-* Interrogabis aut, nū p̄cesserit grauis aliquis morbus,  
*gnificatur.* acerbior capitis dolor, uel ictus. Tum. n. ut etiā si adsūt,  
*e* Hæc despe- peior suffusio est. Aetate media facilius curatur. Prima  
*ratio est ma* & extrema, difficiliter. Cœlo sereno & tranquillo atq;  
*gnitudine* etiā temperato cōmodius curatur. Addunt Astrologi de  
*cause &* scendẽte luna: coeunte uerò, aut eadẽ plena, atq; ubi uel  
*adynamis* in ariete, uel aliis eiusmodi signis, curationes diff- runt.  
*curandi.* Nec omittẽdum, qđ Gal. g. docet, ut oculus sanus clauda-  
*f* Qđ sit p̄fe- tur atq; exprimat. Si. n. oculus suffusus inde non tumet,  
*cta cōcretio* nec pupilla ampliatur, desperatio est. Alioqui uitio suc-  
*g* Gale. lib. curritur. Phantasmatū splendorēs & idolorum, quæ suf-  
*4. de loc. af* fusis oculis obuersantur, lege 2 de sympta. causis.  
*fectis.* Principiis *h* ergo obstandum est. Demosthenes apud  
*h* Aique ad Aetium, & alii quidam Græci uenam secant in cubito.  
*eā demu ca* Cly-  
*tarrhaetā medicina instituẽda, in qua nulla desideretur ratio, neq; concre*



Clysteribus a acribus, iisdemq; purgationibus, sed ex-  
 gua quantitate, & per interualla repetitis, Cucurbitulis  
 in b occipitio cū scarificatione affixis, Apophlegmatif-  
 mis, Errhinis per interualla uti iubent. Cornel. Celsus  
 addit sectionem uenæ frontis, sanguinis detractionem è  
 naribus, ultionem e uenarum temporalium, quæ certè  
 locum habere possunt, ubi grauis capitis dolor est, atq;  
 inde defluxio in oculos. Optimus uictus, d qui pituitam  
 extenuat sine uaporibus. Vitandum uinum est, pisces, li-  
 quidiora omnia iuscula. Assa elixis meliora.

Collyriis primum leuioribus: deinde paulatim maio-  
 ribus utendū est. Clysteres è Cetaurii decocto, uel simi-  
 liū cōparādi sunt. Alioq; uel hierę picrę drac. vi. uel hie-  
 ræ diaco. semūcia, aut alia eiusmodi pharmaca in clyste-  
 ribus dissoluenda sunt. Purgatio ex hiera picra, cui ali-  
 quid hieræ diaco. admixtum sit, exempli gratia.

R. pul. hieræ picræ ℥. ij. pul. hieræ diacol. ℥. j. cum suc-  
 co fœniculi formentur pilulę. Capiat hora e somni. Hęc  
 purgatio decimo quoq; aut decimoquinto reuocanda  
 est. Per interualla mythridatii f aut theriacæ drac. s.  
 aut ℥. ii. alias ieiunis, alias hora somni, aliquando g qua-  
 tuor horis ante pastum imperanda sunt seme in hebdo-  
 mada. Poterit aliquando imperari ablutio capitis ex de-  
 cocto absynthii, bethonicæ, Itœchados maioranæ, fœni-  
 culi, in lixiuio facto è cineribus sarmentorum, adiecta  
 etiam uini portiuncula, quarta aut sexta parte.

Collyria è melle, succo fœniculi, aut herbarum supe-  
 riore capite descriptarum comparari debent. Adiciā-  
 tur quoque h fellis aliquid lenioris aut fortioris, sem-  
 per d cuiusmo-

mel simplex aut origanatū loco uini, parata iuscula ex hyssopo & saluis  
 abstinetia rerū acriū et piperatarū, deductio alterius c. bi assueti, cibi autē  
 simplicis et omnis alienæ mixturæ expertis. e Vt dormiēdo coactō calore  
 natuuo anathymasis ad cerebrū feratur, quæ incidēdo tergēdo et attenuādo  
 materiā præparet, præparatamq; ad uentriculū euehat, ut euacuari possit.

f Vt. R. conseruæ beton. & anthos an. drac. j. s. mythridatij drac. s. f. bol.

g Sunt enim alerypharmaca longè à pastu, & ante pastum imperanda.

h Vt fellis lucij, non accipiris, & rapacum auium reliquarum.



# DE MORBIS INTERNIS

phabita rōne mollitiei, duritiei, tēperamēti oculi. Alia .n. remedia pueros aut senes, rusticos & urbanos, cæru-  
leos & fuluos oculos, cæsius & nigros iuuare possunt.

In pueris lactantibus aliquando nutricis inspiratio  
satis esse potest. Nutrix itaque mandat dentibus semen  
fœniculi, sagapenum, ammoniacum, galbanum, aut eo-  
rum aliquid quæ suffusos iuuant, atq; vbi os incaluit, le-  
uiter inspiret halitum oculo lactantis. Hoc consilium  
etiam adultis prodesse potest. Secundum est, vt ex a ca-  
dem materia oculos suffumiges. Aqua è melle destilla-  
ta & suffusiones & albugines interim percurat.  
Quæ distillatur è melle rosato, lenior est. Deinde  
quæ ex melle communi. Pōst etiam è melle scyllitico.

In his aquis aliquando modicum sacchari candi li-  
quandum est. In distillatione proximo capite nume-  
rata herbæ & materia, tum etiam sagapenum, ammo-  
niacum, galbanum commisceri possunt. Aut si iam di-  
stillata aqua est, in ea macerentur. Similiter & vis aqua-  
rum, fœniculi, maioranæ, & cæterorum augeri potest.  
Collyria fortiora.

R. fellis accipitris, balsami an. ℥. ij. adde, si vis, hellebo-  
ri albi, piperis an. ℥. i. cū aqua raphani fiat collyriū. Al.

R. terebinthinæ lib. s. sulphuris viui ℥. ij. mellis  
ros. ℥. iij. plantaginis & arnoglōssæ ana M. ij. fiat distil-  
latio in alambico. A fortioribus collyriis, si mordetur  
oculus, statim oui candido, aqua ros. aut lacte muliebri  
temperandum malum est. Plura remedia ex proximo  
capite & b aliis repetes.

Punctionis verò, quæ acu fit, tempestiua occasio est,  
cum materia suffusionis mediocriter concreuit. Cuius  
formulam descriptam habes cap. 21. lib. 6. Pauli, & lib.  
7. Corneli; Celsi, & 14. Methodi ad finem, & apud Al-  
bucasis, vbi fingitur e Almagdan quod vocant.

R. frumenti crassiusculè conuassati, M. ij. sulphuris  
viui ℥. j. sagapeni drac. vj. salis, piperis, ana drac. ij. mel-  
lis lib. s. terebinthinæ ℥. ij. cum vrinæ pueri lib. ij. fiat  
distillatio in alambico.

R. fabarum fresarum M. ij. conuassentur in mellis  
lib.

a Vt ex her-  
bis, semini-  
bus, aroma-  
tis & gum-  
mi ophthal-  
micis.

b Cuiusmo-  
di est colly-  
rium Ioan-  
nis de Vigo.  
c Instrumē-  
tum est chi-  
rurgicu Cæ-  
terum dum  
pungitur o-  
culus, obli-  
quo lumine  
ager sedere  
debet, vt im-  
motus ma-  
neat.



lib. 2. terebinthinæ dra. 3. gummi elenij dra. 1. in succo  
fœniculi & marrubij an. lib. 2. fiat distillatio.

## SCHOLIA.

Distinguendum initio, si ne ὑπόσφαγμα ὑπέπυσον, ὄνυξ,  
γλαυχῶμα ἀνὸ ὑπόχυμα. Deinde si ὑπόχυμα, siue suffusio,  
an primo & per se, an per consensum. Postremò, si ne in  
principio, incrementò, statu, aut penitus confirmata. Ὑπό-  
σφαγμα, sugillatio est, sanguinis nimirum effusio per tuni-  
cas in spatia, quæ venis circumiacent. Principio rubet: pro-  
gressu temporis luescit: postremò nigrorem contrahit. Mul-  
titudine & diuturnitate temporis aliquando in pus verti-  
tur, ut sanguis omnis per grumos collectus sub cute in alijs  
corporis partibus. Tunc fit ὑπέπυσον, pus nimirum sub  
cornea, dimidium nigri occupans, aut per totam corneam  
tunicam pellucens, unde dolor pulsatorius, vehemens, rubor  
totius oculi, & temporum dolor. Fit etiam aliquando ὄνυξ,  
cum ab ulcere (ut ait Aetius) profundiore pus defluens, &  
inter tunicas delapsum, ac in circulo iridis figuratum, un-  
guis resecti imaginem refert, differuntq; fere in sola unguis  
similitudine. Ex quo intelligi potest, id symptoma, quod  
Galenus de symptomatum causis, sugillationi tribuit, ut ita  
affecti, quæcunque videant, rubra esse putent, haud quaquã  
esse perpetuum, sed in principio tantum apparet. Nam alijs  
temporibus subnigrum quid ob oculos volitare existimant,  
quod multi sæpe similitudine decepti suffusionis principium  
esse credunt. Causæ sunt, ruptio vasorum, contusio, ictus,  
plenitudo, dolor capitis, lippitudo, inflammatio prægressa: In  
Glaucmate crystallinus humor densatur & resiccatur, ne-  
que unquam curari potest. Alij putant viridem quendam  
humorem crystallino permisceri, atque inde fieri glaucum  
colorem ex viridi & albo. Ab omnibus differt. Suffusio sine  
Catarrhacta, & loco & causa. Sugillatio enim est in tuni-  
cis & à sanguine. Glaucoma in crystallino humore uniuersò,  
& à siccitate: Suffusio intra corneam & crystallinum  
humorem, ab humore potissimum aqueo ibi concrecente, præ-  
tenditurq; ille humor aliquando toti pupillæ, & visum adi-  
mit, aliquando parti tantum. Per consensum fit, cum per  
intervalla visa quadam visis propriè suffusorum similis



## DE MORBIS INTERNIS

obuersantur ob oculos. Idq; vel à bilioso humore è ventriculo, vapore ad oculos sublato: vel à cerebro, fumis ab vtro humore delatis per venas & arterias cum spiritu, vt in Phrenitide, & februm ardentium vigore: vel à toto corpore, vt instante crisi. Per consensum fieri indicant, si in altero tantum oculo incipiat, perpetua non sit, post cruditatem augeatur, pupilla non obscuretur, crisis instet, febris vigeat. Contraria oculum primario affici demonstrant, tumq; in principio veluti fumus est, quem si acu delere velis, diuisus recurret, aut in particulas tenues dissectus visum grauius offendet, multiplicia obiecta pro vno representans. Substatum concrescit in nebulam, tumq; ferè sine dolore acu dimouetur à pupilla. Vbi obduruit, acu si pungatur, tunicam simul adducit & lacerat, inde periculum cum dolore maximo consequitur.

Purgato corpore conueniunt collyria fortiora ex fellibus, ad discussionem, ruptorium, cauterium post aures, sanguisuga in temporibus, ibidem emplastra, venæ sectio: masticatoria, potiùs, quàm Errhina, pulueres à pastu, condita, fozus, acus. Post aures in ceruice cauterium, aut funiculus setaceus in occipite plurimum confert, si inter corneam & albuginem humorem intercipiatur nebula. Sed quæ inter crystallinum & pupillam heret, non ita dissolui potest sine acu. Sit acus paulò minor longitudine minimi digiti, crassitudine, vt cetera, è materia firma, ne frangatur intra oculum, manubriolo striato, ad comprehensionem firmiorem. Punctio in pleniore oculo tutior, iam contracta cataracta, sed ferè aliquid albuginei humoris dissoluitur, & manet oculus minor. Remedium à capra inuentum, quæ stipite confixa in suffusione visum recuperavit, vt Galenus docet initio Isagoges. Aliquando tunica imbibita humore exturgescit, & indurescit, vbi emolliendum, laxandum priùs quam resoluendum. Barbari ad claritatem visus aures perforant annulo inmisso, ne foramen claudatur. Fellium genera præsertim gruis, galli veteris, tauri, hirci, lac equinũ cum melle illitum, sterco lacertæ, hyrundinis. Sed acribus non vtendum, nisi paulatim assuefacto oculo, vt ærugine, cuperosa, &c. Sinapismus, è stercore colubino, hederæ terrestris decoctum, donec



donec quarta pars supersit, ad fotum per dies 25. Aqua mel-  
lis cum radice ireos, conixæ, chelidonie, triticum cum sale &  
melle in vase aneo insolutum, & liquor expressus, succus he-  
dera, cocta faba in hydromelice, deinde cum melle rosato pi-  
stata, & expressa, inde oculorum illitus, pulvis ex seminis  
raphani vnc. 1. cū ammoniaci aridi vnc. s. et balsamo. Vitrio-  
lum album in lacte aut aqua euphrasie, fœniculi, & simili-  
bus, addita aloe, saccus plenus maiorana naribus & oculis  
admotus, serpentaria descripta in Chirurgia authoris, solu-  
ta succo anagallidis rubræ, stercus corui, aut fel cum melle.  
Quidam succum rutæ, fœniculi, saluæ, vel herbas cum tri-  
tico & sale incoquunt vino albo, & ita sumunt. Decoctum  
fœniculi, guaiaci, euphrasie, rutæ, seseleos, aromat. cum ma-  
cere, ex eodem fotus & potio. Collyrium siccū ex macere, semi-  
ne fœnic. seseleos & euphrasie, aqua distillationis hyrundinis  
vel picarum. Quædam mulier Lutetie aqua è phœnicea ana-  
gallide distillata multos curauit. Potest distillari cum melle,  
sicuti & Monachus quidam salis M. 1. in vino albo nouem  
diebus agitato in vase aneo, donec virescat. Sequentia quo-  
que probantur, ad obtusum visum, & catarrhactam.

R. baccarum lauri purgatarum vnc. 4. Tere cum vrina  
pueri impubis fiat fortis expressio. Deinde cum muscilla-  
gine gummi arabici vel tragac. extracta cum aqua argen-  
tar. fiat illitus.

R. rad. ireos recentis vnc. 1. fortiter agitetur cū succo fœni-  
culi depurato per residentiam, deinde addito modico saccha-  
ri candi, & muscill fœnic. fiat linimentum.

R. frumenti crassiusculè conuas. hordei an. M. 1. lapi-  
dis calaminaris vnc. 2. sulph. vnc. 1. salis vnc. s. distēperentur  
in vase aneo cum aqua fœnic. & plantag. suc. granat. de-  
inde fiat fortis express.

R. succi chelidonia & conixæ an. vnc. 1. mellis vnc. 2. &c.

De hæmorrhagia. Cap. XX.

**H**æmorrhagia Græcis peculiariter intelligitur pro  
fluum sanguinis è naribus. Quamquam ex vocabu-  
lo, quodcunque sanguinis profluum intelligi potest. Quale est a è sede, b utero, ore. Rarum est, quod quibus-  
dam contingit peculiari natura, vt aperta è trunco cor-  
poris,

a Vt in dy-  
senteria ai-  
matodis.

b Vt purga-  
tione men-  
strua, pro-  
fluo mu-  
liebris lo-  
chys.



# DE MORBIS INTERNIS

*a* *Et in in-* poris, hypochondriis, thorace, facie, venæ clausura re-  
*uenibus in* dundantem sanguinem depleant. Quibus eadem reme-  
*febre arden* dia conueniunt, quæ in hæmorrhagia è naribus.  
*te.* Hæc autem aliàs *a* critica est: aliàs ex *b* consuetudi-  
*b* *Vi in pur* ne naturali. Nonnunquam omnino præter naturam est.  
*gatione &* In duobus primis generibus sanguis supprimi non de-  
*iuuenum hæ* bet, nisi viribus iam metuitur. Multò etiam minùs ac  
*morrhagia,* tardius ætate iuuenili, tēperamento sanguineo, aut *vbi*  
*mutilorum* cōsuetà aliqua vacuatio intermissa est. Quales sunt hæ-  
*dysenteria* *morrhoides, vomitus sanguinis, phlebotomia, & men-*  
*hæc bona* *strua in mulieribus. Vbi verò supprimendus est, remedia*  
*ut signū &* sunt e vincula, Cucurbitulæ, Phlebotomia, Sanguisugæ,  
*ut causa.* *d* Anacollemata indita naribus, aut admota reliquis cor-  
*c* *Ad reuul* poris partibus. Vincula ergò digitis pedum & manuum,  
*sionem ob-* testiculis, articulis intervallo trium digitorū, auriculis  
*surant.* iniicienda sunt. Frictiones èt deorsum ductæ, *immersio-*  
*d* *Vulgò ag* nes extremorum in aqua calida, vel frigida conueniunt.  
*glutinantia* Phlebotomia è Cephalica eiusdem lateris, aut utra-  
*appellant.* quæ, si vtrinque profluit sanguis. Idq; angustio vulnere.  
*e* *Ne san-* ( *Ne tanta fiat vacuatio* ) Tutiusq; aliquoties diuersio-  
*guis in aspe* nem repetere, quàm semel ducto sanguine animi deli-  
*ram arte-* quium excitare. Quod tamen animi deliquium Paulus  
*riam, æso-* & aliquot alij probauerunt. Gal. in Prorrhetico non ex-  
*phagum pro* pectandam animi deiectionem præcipit. Atque experi-  
*cumbat vel* mento certum est animi deliquio sanguinem non resti-  
*caput affi-* tisse. Sanguisugæ post aures, aut in sede, is maxime, qui  
*ciat & pa* bus consuetæ supprimuntur hæmorrhoides. Cucurbitu-  
*rotides ex-* læ itatim post vincula, & ante phlebotomiam hypochō-  
*citet.* dro eiusdem lateris affigendæ sunt. Affiguntur & sca-  
*f* *Ut in mu* pulis, & summæ ceruici, etiam cū scarificatione, si opus  
*lierum hæ-* fuerit, & vires tolerant. Anacollemata verò, & quæ in-  
*morrhagia.* duntur naribus, magna ex parte refrigerant: quorum  
*vsus e post alia supradicta remedia tempestiuus est, iam*  
*reuulsa in partes contrarias materia, id est, in f partes*  
*inferiores corporis, aut posteriores capitis. Alioqui*  
*vsu refrigerantium plurimi quidem deterius habuerūt:*  
*inde conuulsi, aut oborta spirandi-difficultate suffoca-*  
*ti. Et hæc remedia infirma omnia comperit Gal. præ*  
*maioribus*



maioribus & illis remediis, ex quinto Methodi, ex Prorethetico, ex lib. de sang. missione. *Anacollematis ergo, & aliis topicis post reuulsiones utendum erit, habita ratione naturæ capitis & partium, quibus admoventur.* *Anacollemata fiunt ex argilla, farina volatili, farina triticea, incorporatis cum oui albumine, addito momento aquæ rosæ & aceti. Pōt quoq; aliquid adici boli armæ, sag. drac. & rerū eiusm. quæ adstringūt, quale hoc est.*

R. b. argillæ vnc. ij. boli armæ vnc. s. acaciæ, hy-  
pocistidos an. drac. ij. cum oui albumine & modico aceti  
fiat emplastrum, applicetur fronti & temporibus. Indun-  
tur in nares, quæ refrigerant, adstringunt, inuiscant, aut  
crustam ducunt. Interim mixta e portuuncula narcoti-  
corum. Verum, & narcotica, & caustica cum periculo es-  
se solent. Sine metu sunt, d. succus plantaginis, succus ru-  
bi, mespilorum, cornorum, & alij eiusmodi. Lanugo ar-  
boris, quæ foliis infidet, aut quæ veluti nucamenta pen-  
dent e specie populi, e vel masculi salicis (quem Galli,  
Marfaut, appellant) medio mense Martio colliguntur,  
macerantur in aceto, siccantur, & vsui asseruantur, Vsus  
tempore induntur per se naribus, aut cōueniente med.  
imbuuntur, atque ita imponuntur. Aliud.  
Spongia aceto acerrimo imbuatur: imbuta pice liqui-  
da circumducitur: tum fictili vase reposita crematur.  
In puluerem redigitur. Pulvis efficacissimus est, & per  
se insufflatur naribus, vel liquidis medicamentis com-  
miscetur. Aliud.

R. thuris drac. ij. aloes drac. j. cum oui albumine incor-  
porentur. Penicillus e mollissimis pilis leporis, aut flo-  
cus e lanugine, aut nucamento supradicto. In eo medica-  
mento incoquitur, & ita naribus imponitur. Penicilli  
etiam conueniunt e tela araneorum, cui infideat fari-  
na volatilis.

R. succi basil. drac. vj. aceti drac. ij. camphoræ ꝑ. ij. draconis.  
misce. Linamenta hoc medicamento imbuta induntur  
naribus.

R. aquæ gossipio car-  
pto, & nariindantur. c. Vt hyoscyami, opij. d. Presertim lanceolæ &  
fructus rubi immaturi. e Aqua etiam stillatia ex nucamentis salicis.



# DE MORBIS INTERNIS

3

R. aquæ plantaginis, ros. an. 3. vj. aceti, vini albi adstringentis an. dra. iii. camphoræ dra. i. misce, & in miscella madefac linteamina, quæ collo inuoluas, hepatis pedibus, testiculis, & mammis.

R. aquæ panis porcini vnc. j. camphoræ ʒ. ii. attrahatur in nares. Terra sigillata, bolus, armena, sanguis draconis, Trochisci de carabe, oui albumine & aceti momento dissoluuntur.

Hinc madefactus penicillus naribus, imponitur.

a Sic equise  
ti radix tri  
ta & nari-  
bus imposi-  
ta efficacis-  
sima ad san-  
guinem si-  
stendum.

Radix æ præoniæ subiecta linguæ sanguinem sistit, herba verò fronti imposita aut naribus indita.

Fragaria herba trita similiter iuuat.

Vtile est etiam olfacere camphorâ in aceto dissolutâ.

Quidam temerario remedio, cum reliqua omnia non iuuissent, eum, cui profluebat sanguis, in balneum deduxit, atque demersit ad collum, & ita restitit sanguis, Verum ab hoc remedio certum exitium est, si vires vehementer laborent.

Vulgus vtitur corallo è collo suspenso.

Lapides, iaspis onix, id est, cornallina, hæmatites, id est, lapis sanguinarius eodem remedio esse creduntur.

Sunt, qui applicent parti, vbi debet fieri reuulsio.

## SCHOLIA.

Alenus scribit comment. i. τὸν ἐκ τῆς ἀρτηρίας, apud Hippocratem τὴν ἀρτηρίαν nomine profluvium sanguinis è naribus intelligi, si per se ponatur, non expressa particula, unde effluit. Alioqui nomen generale est in omni sanguinis uacuatione, siue per crism fiat, siue symptoma sit læsæ arteriæ, aut uenæ. Sed ex arteria exilit tenuior, flauior & cum saltu. Quatuor in uniuersum modi sunt. Reseratio oris uasorum per anastomosis ab eorundem imbecillitate, sanguinis copia, acrimonia: transcollatio, sudoris instar, per διαπνοῆς à raritate tunice, sanguinis tenuitate uel sero, gracilium uasorum apertione. Diuisio tunice, à uulnere, contusione, rupture. Postremo διαρροῆς eiusdem, id est, exulceratio aut erosio intrinsecus facta a vitioso succo & acri: extrinsecus à ualentibus medicamentis, aut igne. Vix tamen ab externis uenis sanguis profluit, nisi vel erodatur, vel rumpatur



eur ob densitatem in cute externa.

Si per diapedisin profluat, strosus humorū purgatio, venarum densitas, sanguinis crassities procuranda. Si per diabrosyn crustam inducentia erunt vsui. In ceteris vacuātia, refrigerantia, astringentia, obstruentia, resiccantia, sanguinis missio, diuersio, ligatura, cucurbitula: frigidorū perfusio, epithemata, & similia.

Laudatur sanguinis profluvium post partum, tempore mensum, in Synochis febris & alius per crism, è naribus post capitis dolores, modò affectio frigida non sit. Proinde remedia nulla postulat, nisi immoderatum sit, vires superet, & futurae hydropisis, aut cachexia minetur periculum.

Profunt succus caudæ equinae in vino, pulvis Alexandri, Trochisci Rhaæ, de terra sigillata, de carabe soluta in oui albumine, ex Heraclide, manuum, cruris articulorum ligatio, frictio, cucurbitula supra umbilicum, nisi sit imbecillior, porri succus, auxilium saepe probatum. Nonnulli accipiunt porros nouem, aut decem recentes, medios transfigunt filo, folia extrema amputant, ut odorem inspiret, circumdant a Quæ tu-  
collo obuersis solijs naribus, & deorsum uersis capitibus. Ster mor est con-  
cus asini odoratum, expertum etiā reijciētibz sanguinem, tra naturā  
urtica Græca trita, fronti alligata, cherephyllon ex oleo nucu, cū rubore,  
plantaginis, millefolij succus, herba trita, camphora aceto so- dolore colo-  
luta, sanguis egri. re & fluxu

Αἰσχρολλήματα Paulus explicat agglutinamēta. Fronti coniunctus.  
enim applicantur, habentq; agglutinandi & abstruendi fa b Quod si  
cultatem, cuiusmodi sunt tela aranearū, farina uolatilis, em quis enase-  
plastrum Comitissæ, & similia soluta oui albumine. Sed inuti rit, peripneu-  
lia, cum per uenas & arterias interiores humor decurrit. monicus fit,

De a Angina.

Cap. XXII.

Angina inflammatio est faucium, aut muscutorum 7. moritur  
qui ad fines asperæ arteriæ siti sunt. Nonnunquam Aphor. 34.  
etiam exteriorū ceruicis. Desperatio est, b cum nūquā l. 4. Aphor.  
apparet. Cū grauiissimus dolor ē, febris, cū os hiat, ligna c Obstructo  
exera est, intercepta deglutiendi uia, & potus per nares scilicet æso-  
c refluit, aut si ad initia ceruicis cauitas est, intro addu phago.  
cta uertebra. Hec ut minuuntur, ita lenior morbus est. d Ut libere  
Oportet ergò statim initio collocare agros loco satis d aerē ducat.  
amplo,



DE MORBIS INTERNIS

*a* Ne constripatur, *a* nec frigidus: ita residere in lecto, ut *b* caput altius attollatur. Liquidiora *c* sunt alimenta. *d* Parcissimi me viuant, quantum vires tolerare possint. Abstineant iis omnibus, quæ fluxiones incitant, quale vinum, ualida Nam non porosa, & calida ferè omnia. Vitent etiam f glutinosa, quæ cum etiam non detergeant, vias iam oppressas angustia intercipiunt. Primis diebus, atque adeo initio morbi *g* sanguis detrahendus est, adhibito prius hoc consilio. Mulieribus tum grauidis, tum quibus menses supprimuntur, angina sit aliquando. In grauida, sanguinem detrahes nullo metu ad tres, quatuorve uncias, plus minusve, ut scopi *h* phlebotomiæ indicabunt. Minus, si fœtus maior est, ut post septimum mensem. Quod si mulieri grauidæ etiã tum menses fluunt, & multo liberius sanguinem è cubito detrahes. Hic enim & ab angina matri, & ab abortione fœtui periculum est. In iis uerò, quæ uterum non gerunt, & menses supprimuntur, venam è crure vulnerabis, copiosiusque detrahes. Tum ad brachij uenas, quæ morbo conueniunt, phlebotomiam transferes. Hoc consilium multis aliis morbis, quibus corripuntur mulieres, commune est. In aliis, si quidem manifesta signa plenitudinis appareant, è saphe- na: si mediocria, è media cubiti. Alioqui è cephalica sanguinem detrahes mediocri vulnere, ne si amplius sit, nimium uiribus detrahatur. Si angustius, effluat tenuis sanguis, crassius relinquatur. Hyeme, ubi angina ferè phlegmatica, parciore detractio, sed foramen maius esse debet. Vere, & reliquis temporibus copiosior, vulnusque angustius imprimatur. Cucurbitula ex lib. *e* Ut omnia de concurbus collocentur.

*piperata & aromatica.* Mollis l alius esto leuibus *m* clysteribus, multo magis

*f* Hac enim homines faciunt pneumatias. *g* Ad euacuationem materiae coniunctæ & antecedentis reuulsione. *h* Ex morbi essentia, symptomatum vehementia, dignitate partis, causa materiali & effectrice desumpti. *i* Quia mulier grauida selecta vena abortui præsertim si fœtus grandior sit. *k* Quod ita comparata sit mulierum natura, ut sanguine abundet. *l* Omnis enim angina alui profluvium desiderat. *m* Ut fiat decoctio ex sero lactis, in qua dissoluantur cassia, aut catholicum pro clystere.



gis si febris est. In quibus interim dissolues cassiæ fistu  
læ vnc. i. uel unc. s. cathol. uel hieræ a picræ. Huius hie  
ræ summa uis probata. Nam cum angina multos Romæ  
suffocaret, eaque ueluti pestis tota urbe grassaretur, in  
uentum remedium à Medicis, ut post frugalem cœnam  
D. 2. pul. b hieræ in pilulas coactos exhiberent.

Quo auxilio quicumque usi sunt, periculum declina  
runt tam atrocis morbi.

Paulus c omissa phlebotomia acrioribus clysteribus  
utitur dissolutis unc. 3. hieræ diacolocynthidos. Sed qd̄  
ante dictum est, priusquam iniiciamus clysteres d acrio  
res, leuioribus uti oportet, qui inueteratum stercus  
emolliant & detrahant.

Purgationes quoque leues ex cassia, manna ad unc. i.  
aut eo plus in decocto passularum, hordei, florum cor  
dialium, tamarindorum, sebesten, prunorum.

Suspectum pharmacum, quod Asclepiades imperauit  
ex aloe & colocynth. tum quia in pilulas conformat,  
tum quia fortius est.

Dissoluta enim liquoribus, non coacta in pilulas,  
pharmaca magis conueniunt, propter difficultatem de  
glutiendi.

Atque dum hæc fiunt, gargarismis utendum est, initio  
quidem repellentibus: deinde admixta ui detergente, &  
resolvente: post etiam, si fuerit opus, maturantibus.

Atque ubi dolor grauior est, & sentitur exulceratio,  
lenientibus, quorum materiam & compositionem repe  
tes ex 6. xara' rony cap. 43. & 8. Aetii. Recentiores Me  
dici iisdem etiam utuntur, uel his.

R. decoctionis rosarum sicc. vnc. 4. cum diamor. vnc.  
2. Ex sorbis, cornis, moris rubi, aut alioqui immaturis,  
è granaris acidis poterit exprimi succus, & quarta parte  
sacchari, aut mellis rosati dulcorari. dianucum & diamo  
ron initio dissoluantur in duplo liquore adstringente,  
quales sunt supradicti succi. Decoctum rosarum, plan  
taginis, sorborum, cornorum, mespilorum, & similium  
adstringentium, uel in aquis inde distillaris. Conteruæ  
sunt cornorum, sorborum, mespilorum, mororum im

diatu-

a Non, si fe  
bris adsit.

b Simplicis,  
ad exclusio  
nē puita  
falsæ, per de

riuationem  
in aluum.

c Sed et an  
te uenæ se  
ctionem hic  
gargaris  
mus imperā

mus. R. aque  
dus. R. aque  
bord. lib. i.

aq. ros. &

plātag. an.

3. ij. succi  
granatorū.

vnc. i. f. gar

garis. Post

sectionē ve

rō venæ, ex

lacte calido

imperabit.

d Ut qui fi

unt ex deco

cto capitali

& hiera

utraq;.

e Vel in de

cocto pulli,

aut carnis

uulnæ.

f Quas ang

nosus deglu

tire nō pot.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Quo utun maturorum, quarum vncia in duplo liquore adstringen-  
tur ineunte te dissoluta reprimendum a gargarismo efficit. Et hic  
ungina, præ quoque laudatus reprimendo & leniendo.

**serum esti-** R. b lucci expressi & cassia fistul. unc. j. decocti rosarū  
**ua.** aut aquæ plantaginis unc. ij. vel decocti sebstē. unc. ii.

**b** Vel. R. de aquæ sorbis, cornis aut mespilis destillatæ. unc. ii ij  
cocti sebestē misce pro gargarismo.

**un. ij. aquæ.** Ut agatur morbus, ita repellentium & modus minuen-

**e** Sorbis aut dus, & augendus resoluentium. Itaque plus mellis ad-  
**cornis unc.** miscemus: utimurque hydromellite, plus minusve di-  
**iiij. f. garg.** luto, in quo rosæ d præbullierint, Syrupo rosato, syru-

**c** In quanti po etiam de papauere, vbi fluxio tenuior est. Vbi his re-  
**tate, quali.** mediis nihil proficimus, venæ sub lingua incidendæ sunt.  
**tate & vsu.** Alii ex Archigene & asclepiade venam frontis, & quæ

**d** Huius ad angulum oculi pertinent. Hippocrates, lib. 3. de mor-  
**hec erit cō-** bis, venā quæ sub mammis est. Nonnulli venas ceruicis.  
**ponendi ra** Verum tutius est post vniuersalem vacuationem per

**rio. R. ros.** seuerante malo cucurbitulas cum scarificatione ad initia  
**ficc. M. s. fi** ceruicis adfigere, &c. Postea venas sub lingua, vel phle-  
**at decoctio** botomo aperire, vel cultello scarificare.

**in tribus li** Sanguisugæ iisdem locis, quibus cucurbitulæ, affigi  
**bris aquæ.** possunt: quæ vbi detractæ fuerint, cucurbitulæ inducun-  
**In colatura** tur, perpetuò, habita virium ratione.

**ad lib. ij. dis** De cinere hyrundinum, humano stercore, canino, &  
**sol. mell.** aliis, quæ melli mixta aut aliter præparata anginae con-  
**unc. ij. vel** ueniunt, lege postremos lib Gal de simplicibus, ut de  
**unc. ij. f. hy** asellis & alijs remedijs, commentarios secundū locos.  
**dromel.**

**e** Lenies dolorem & asperitatem gutturis aqua, in qua  
**Vel fiet ta** mica panis albißimi coxerit. Aut e panis ita coctus ve-  
**aplasma ex** hementer exprimatur: colluatur succus. Eodem modo è  
**radicibus** li furfurum tritici pinguium cremore. Lac etiam per se,  
**liorū & al** muscillago semin. cydoniorum, lini, althææ, aut hic So-  
**thea, cari-** rani efficacissimus Gargarismus.

**cis pingui-** R. glycyrrhizæ recenter rasæ & conuassatæ unc. iiij.  
**bus, cum bu** mellis rosati unc. i. aquæ fontanæ lib. s. coquantur om-  
**tyro, farina** nia ad crassitudinem, è colatura fiat gargarismus.

**lini, oleoq;** Penidia quoq; i lacte dissoluta, Petasæ succus, hordea-  
**libaceo.** tū, lac amygdalarum dulc. similiter colluatur. Maturat.

R. ficuum



R. ficuum pinguium unc. iij. hyssopi P. j. fiat decoctio ad dimidias, colatura colluatur.

*In periculo suffocationis.*

Anginosi sæpissimè periculo suffocationis laborant.

Quòd si periculum inde natū est, quia erupit tumor, & sanies in pulmones & cor defluxit, desperatio est, nisi sūmo a beneficio naturæ adiuuet. Alioqui sæpe fit, ut a *Et expectato, aut alui profutuo, aut urine purulente exclusione.* cū nimis increuerit tumor, omnino intercipiat vias spirituales, b vbi certa mors est, nisi occurramus. Itaq; extremum malo extrema remedia tēdā sunt. Repetēda sectio venarū sub lingua. Cucurbitula magna & cum c multa flāma initio ceruicis affigēda est. Collū & torax onerē leuāda sūt, atque inūgēda oleo de liliis, aut fœnugræco. ne.

Caput his attollendū est, vt probe sedeant. Aer frigidus introducendus est. Locus sit lucidus & perspiratus. Cucurbitulæ quoque in pulpis scapularū submēto, i mēto & maxillis. Alij etiā in sutura coronali, & sub maxillis coaptant. Rhazes etiam vesicante phenigmo vtitur c vt maiorē initio ceruicis, tumque gargarismis acrioribus vtendum attrahendū est, vt hydromelite, in quo pugillus hyssopi, aut origani vim habeāt coxerit, aut radix gētianæ, cucumeris agrestis, iridis aut vacuum fuga. R seminis sinapi drac. ii. conquassentur, & in aceto acerrimo macerentur. Incorporentur cum modico melle.

Deinde dissoluantur in 3. ii. mulsæ ad gargarismum.

Quòd si his artibus nihil proficimus, vtimur d auxilio d Quod ē ex Asclepiadis. Vtēdū est tū ēt omnibus ferè medicamētis. aloe & colo

Hiantē ore lingua deprimatur: culter, ligneus acutus cynthide, indatur in guttur, vt tumor disrumpatur. Tum prono capite sanies repurgeat. Vbi in faucibus manifestus tumor cunctis meminit Actius, est, vellicandus est vnguibus, aut ferro aperiendus.

Alij e spongiæ partem ad magnitudinem auellanz e Nonnulli suspendunt ē filo, & ita ab ægro deuorari iubent. Intu etiam panis mescit spongia, atque dum vi retrahitur, tumorem ram crustam depit. Hoc alij bolo carnis falsæ semicoctæ, ita suspensio uocandam & deuorato, tum vi retracto moluntur. Alioqui scarificationes præbent.

ficandus locus est sub maxillis, sub mēto, in collo, vitatis sēper neruis & arteriis. Sic enim aliquādo sanies effluit.

Alioqui cucurbitulæ scarificatis locis apponendæ sunt.

H E nido



## DE MORBIS INTERNIS

E nido hyrundinis in aqua decocto, aut oleo communi, uel chamæmelino emplastrum faciunt, quod inducunt collo. Alij è stercore humano recenti. Quidam, quod tolerabilius est, è lana succida insuccata in oleo communi, oleo liliorum, chamæmeli, aut simili, quorù consilium est, ut foras materiam euocent.

### SCHOLIA.

Angina species quatuor à Paulo constituuntur, quibus quintam etiam recentiores addiderunt. Omnibus communis est inflammatio aliquando cum tumore, deglutiendi difficultas, impedita respiratio, dolor circa laryngem & œsophagum. Differunt parte affecta. Fiunt enim in musculis vel colli, vel gutturis, vel uia. *Συρτήριον* in musculis pharyngis: *παρὰ τοὺς ὤφθαλμους* in musculis faucium externis: *Κόρυς* in musculus internus laryngis: *παρὰ τοὺς ὤφθαλμους* in externis. Quinta fit luxatis vertebris ad anteriora. In qua locus cauus apparet cum dolore, musculorum circumiacentium tumor, respiratio difficilis, hiatus oris, lingua exerta, & à sua radice mota, solaq; veteribus *Κόρυς* dicebatur, ut scribit Aetius. Periculosissima omnium, & quæ eodem die iugulat, si neque in faucibus, neque in ceruice tumor aut rubor apparet, sed dolor vehemens, violenta inspiratio, cibi & potus refluxus per nares, & similia ab Hippocrate scripta in prognosticis. Distinguitur à Peripneumonia & Pleuritide, quia dolor in guttore maximus cum angustia, nullus in thorace. Vbi pulsus magnus & undosus, peripneumonia: durus & tensus, conuulsio metuenda est. Imminente suffocatione paucus & rarus: agentibus animum, creber & inæqualis apparet. Cuidam in musculis dextræ partis laryngis cum orta esset inflammatio, neque appareret, sed tactis duntaxat externo dolore præseferret, mors subita tribus horis à missione sanguinis consecuta est. Alius iussit sibi gurgulionis finem amputari absente Medico, cum inde suffocaretur, & seruatus est. Post febrem repente inuadens, & non apparens, lethalis. Si ad pulmonem conuertitur, septem diebus interimit.

Remedia sunt sanguinis missio è cephalica dextra, repellentia intro sumpta, gargarismata, sectio venarum sub lingua, clysteres ad reuulsionem, inunctiones, vnguenta, syrapi,  
p. 110.



potiones, lohot. Quidam butyrum mense Maio conficiebat, vi-  
ris è lacte vacca, quæ marem peperisset, mulieribus, quæ sæ-  
minam. Vrgente malo inungebat collo, cervici, partibus vici-  
nis, carpo, plurimum fricando. Atque hac ratione non pau-  
cos sanitati restituit. Datur diacodion, vbi somnus concilian-  
dus, & tenuis fluxio. Vbi educendum, magis cum melle. Po-  
test addi glycyrrhiza, interdum sapa, & mel.

De a Tusfi.

Cap. XXII.

**T**usis causa sola h interperies partium c consensus,  
ut lumbricis, vel humore acri stomachum infestanti  
bus, & quod sæpe fit, à cerebro defluxio, aliàs calida,  
aliàs frigida, tum etiam humor in pulmonibus conce-  
ptus, aliàs crassus, aliàs tenuis, interim viscidus, nōnun-  
quam etiam asperitas. d arteriæ. Ut rectè cures, causa  
cognoscenda est.

In interperie e frigida, quod fit sæpe hyeme frigen-  
te, domicilium calidum, animæ retentio, vini g dulcis &  
calidi potus, partium pectoralium munitio ex linteis  
calentibus h pedum calor & capitis sufficienti remedio  
esse possunt.

Defluxio tenuis, maximè si copiosior est, retinenda  
est incrassantibus multò magis, si acris est. Id quod in-  
telliges ex oculorum & faciei rubore, titillatione, aut  
etiam mordicatione oris interioris, sapore, vrinis mul-  
tùm coloratis, tum etiam antecedentibus causis. Hæc  
enim tusis, etiam si initio levis est, i tabem denuntiat.

Itaq; statim initio medicamentis utendum est, quæ in  
spissient & obtundāt materiā. Cōueniunt itaq; aqua hor  
dei, ca, ut in ple

uritide & bydrope. d Quæ sicca tusis causa vna existit.

e Cuius signum est tusis leuiter irritans, quæ tacehdo cesset, fiatq; à spiri-  
tu non à maligna destillatione.

f Tempestate præsertim Aquilonia repentè oborta.

g Ex lib. 3. de dieta in morb. acut.

h Nam venarum quæ ad pedes feruntur, continuitate calor superiores pe-  
tit partes.

i Quacunque enim destillationes à capite tussiculosos & raucos homines  
reddunt, nisi tempore conquiescerint, alteram faciunt tabis differentiā.

a Ex suffla-  
tione vehe-  
mentissima,  
qua spiritus  
multus ce-  
lerrimè fo-  
ras erūpit,  
ad exclusio-  
nem mate-  
rie, quæ pul-  
mones laces-  
cit & vias  
intercipit.

b Frigida  
scilicet, sect.  
2. lib. 6. rō  
ex dñp. &  
histo. 2. vni-  
uers. lib. 2.

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple

c Ut hepa-  
tis & ventri-  
culi: vcl etiā  
aliarū affe-  
ctionum me-  
thastasis &  
translatio  
symptomati  
dei, ca, ut in ple



# DE MORBIS INTERNIS

*a*Item ad si dei, syrupus uiolatus, de papauere, muscilag. psilij. sc. cy  
*stendum fe* doniorū, decoctū papauerū adiecta sapa, ut & somnū cō  
*rinū catar* cilies, & fluxionē incrassatā cohibeas, nec attenues. Meli  
*rū hoc pote* tismis plurimū vtunt Medici in tussi, qbus tamē abstinē  
*rit cōmodē* dū est, ubi fluxio ē tenuis. Mel. n. attenuat. Sed loco mel  
*prescribi r.* lis uti oportet uocato melle passulato, ficato, qđ syræū  
*syrup. ros.* nōnulli uocāt succo glycyrrhizę aut prunorū. Hęc at ita  
*q̄ siccus cum* cōparabis. Passulas, ficus, pruna, iuiubas, sebest. horū ali  
*quadrupla* quot in aqua coques ad putrilaginē: tū uehemēti expres  
*ī fusioe ros.* sione percolabis, & iterū coques ad mellis crassitudinē.  
*3. s. pilul. q̄* Hic etiā utimur muscilagine gummi tragacanthi, gum  
*cynoglossa* mi arabici extracta in aqua rosarum, & incorporata in  
*gr. iiii. aut* aliquo succorum prædictorum, ut gratia exempli.  
*v. excipia-* R. muscill. gūmi tragacāthi extractę in aqua rosarum  
*tur cochlea* dr. vi. incorporētur in mellis passulati, succi liqritię, aut  
*re unu ante* similis 3. i. s. Quod si uigilię urgēt, & dolor maior ē, mi  
*horā sōni.* sce pilularū de cynoglossa drac. ii. & affunde aliqd syru  
*b Vena se-* pi de papauere, uiolati, aut rosati. Finge pilulas pondo,  
*ctio et ad ca* unius 3. quas contineat *a* in ore. Atq; ubi maior fluxio  
*turrhi gene* est, secta *b* cephalica diuertenda erit. Deinde etiā purga  
*ronē prohi* tione ē cassia fistula, manna, aut penidiis admixtis. ut.  
*benda, et ad* R. cassię unc. i. penidiorū drac. vi. dissoluātur in aqua  
*fluētis mate* hordei, passular. decocto, aut glycyrrizę. Sæpe utēdum  
*riæ auersio* est hordeato cum saccharo uiolato. Partes quoq; colli  
*nem cōfert.* & thoracis, si iurauerint hoc illinatur, linimento.  
*c Et ea caco* R. ol. uiol. 3. ii. muscil. sem. psilii extractę ī aqua ungu  
*chymię ple* lę caballinę unc. i. cerę lotę ī aqua uiol. q. f. f. linimētū.  
*thorā pop-* Nimis urgente malo, cauteriis etiam utendum est,  
*pressionē* cum in syncipite, tum etiam in ceruice & scapulis. Multa  
*diaphrag-* repetenda ex capite de Catarrho.  
*matissatque* In materia frigida. Hic neq; phlebotomia, neq; purga  
*pulmonum* tione utendum est nisi corpus *d* admodum plenum sit,  
*morbū au-* tumq; cassia, addita terebinthina, ut sint cassię drac. vi.  
*geat.* terebinthinę drac. iiii. fiat bolus cum saccharo, uel dissol  
*d Vt. R. aga* uentur in ficuum decocto uel simili.  
*rici troch.* Possumus quoque ui *a* agarico, inde pilulis formatis  
*rhei electi,* cum  
*hieræ picræ an.* 3. i. malaxentur aqua hyssopi infusionis agari. ci. f. pilulæ.



cum rhab. cum pul. hieræ picræ, hieræ diaco. cum elephang. pil. aut etiam fortioribus.

Sed melius fuerit uti prius a melicrato, in quo uel hyssopum uel thymum, uel marrubium, aut aliquid tale incoxeris. Alioqui uti b syrupo capil. uen. de hyssopo, de marrubio & similibus. Iā purgato corpore incidendum, detergendū, siccandum. Sed in desiccantibus cautio est, ut ne nimium calfaciant, qualia sunt acria, diuretica, inimicissima c expuitionibus ē thorace. Nec statim initio utēdū est, maxime si materia crassa, aut uiscida est. Præterea utimur semine apii, urticę, nasturtii, sylle, erisimi, raphani, sceniculi, & torrefiunt, atq; in puluerem rediguntur, tum horū drac. ii. cōmiscetur drac. vi. mellis despumati.

Laudant, ut per interualla, bis aut ter in hebdomada mythridatium aut theriacam ad magnitudinē auellanæ ex uino albo.

Animaduertēdum quoq; hoc loco liquidioribus potius utēdū esse, quā crassis & solidis medicamentis, ubi re purgandi cōsiliū ē. Cōtra uerò solidis, ubi coquēdum. Deinde ēt nō utēdum esse uiscosiss, nisi habeāt d aliquid deterfionis, ubi exasperanda arteria est. Conueniunt uiscosa sine mordicatione, quale est tragacanthum, gummi arabicum, oui luteus sorbile, butyrum, muscillago sem. cydoniorum, lac per se, mel passulatum, succus iuuubarum, ficuum, dactylorum, ueterum nō recentium. Nā recentes exasperāt, hordeatum, lac amygdal. dulcium. penidia, saccharum uiolatum, alpheniæ ex dulci oleo, ubi coquēdum est aliqd croci, thuris, myrrhę, & eorum quę leniunt, medicamentis adiiciendum est. Semen irionis, urticę desiccant: mel & saccharum detergant: aroma ta, sed non nisi liquore aliquo diluta, imperanda sunt.

Plura remedia capite de asthma & pleuritide.

Suffumigia initio quidem, si modica fluxio est, nec est capitis plenitudo. In fine uerò, roborādo capiti & thoraci

Senes

drac. 6. f. decoctio: in colatum ad lib. i. dissolue sacch. albiss. quar. iii. ele  
ctari diareti simplicis vnc. ii. vel vnc. iii. f. syr.

d Ne faciant homines pneumaticos.

a Ut R. hyssop. orig. an.

M. s. coquatur in trib.

lib. aquę fōtana: i cola

tura ad lib. ii. dissolue

mellis 3. iii. f. melicratū

b vel R. oxy mell. simpli.

syr. capill. ve. et de hyssop. an. 3. i.

dissolue i decocto passu

larū & glycyrrhizę, f.

inlepus.

c Itaq; hic poterit syr

pus præscribi R. prunæ

damaśc. & iunbas ana

nu. 14. passul. m. nu.

1. s. ficus pinus. dactilos

an. nu. 14. bechy, scabio

se, an. M. s. hysso. p. i. gli

cirrhizę ras.



## DE MORBIS INTERNIS

*a Preser-  
tim rubro-  
rum: in quo  
saccharum  
sit dissolu-  
tum.*

Senes tusculosi potu uini dulcis tepido, butyro re-  
centi, addito saccharo, dulcoramentis, condimentis. At-  
que interim decocto *a* caulium, leuibusque remediis  
curandi sunt.

Narcoticis aliquando utimur, ubi tussis molestior  
est, & perpetuæ ferè uigiliæ. Illicitur ergò, syrupo de pa-  
pauere cum decocto palmularum, aut pilula de cyno-  
glossa, pondere scrupuli semisis. Aut his.

R. spicæ celticæ ℥.j. cinamomi ℥.ij. croci gr. viij. ca-  
storei gr. vj. opii in sapa macerati gr. iiii. Omnia excipia-  
tur melle, fiantque parux pilulæ pondo ℥. i. teneat  
in ore.

Tutior est usus narcoticorum iam purgato corpore,  
& thorace non ita pleno. Vehementer commendant sy-  
rupum myrtillorum sedandæ tussi. Calidæ quidem,  
cum iulepo rosato: frigidæ, cum decocto passularum aro-  
matizato modica spica.

### S C H O L I A.

*Ut in sternutatione, cerebrum, in vomitu, vètricus quod  
noxium est, concitato quodam nature impetu expellere conā-  
tur ita in tussi, partes thoracis simul insurgunt, concutiun-  
turque muscoli, ut vel quæ carni suæ molesta sunt, in pulmo-  
num arterias expellant: vel quæ in aspera arteria præter na-  
turam continentur, foras eiciant, non per contractionē, sed  
conferunt emissio per eius interiores ductus plurimo spiritu,  
haud secus ac si quis, quæ in fistula cavitare herent, afflatio-  
ne vehementi expurgare velit. Causa est, vel humor, vel cor-  
pusculum aliquod, vel inæqualitas ab intemperie liberum spi-  
rituum exitum prohibens, vel compressio diaphragmatis à  
tumore. Humor est aliquando viscidus & lentus, siue sit in-  
farctus pulmonibus, meatus expirationis & inspirationis op-  
plens: siue defluat à capite in asperam arteriam, ut in Catar-  
rho, pituita: siue è thorace educatur. Aliquando, verò tenuis  
defluxio substantiæ, quæ cum à spiritu comprehendi non pos-  
sit, sæpius reperitur tussis, ut cum serosa humiditas in hydro-  
pe, & tenuis quedam materia, aut sanies in pulmonum in-  
flammatione (presertim in principio) uel pleuritide, vel tabe  
occludat in asperam arteriam. Potest in meatu illius panis  
aut*



aut potus portiuncula aliqua illapsa contineri, vel tuberculum, vel vlcus, vel cum defluxio diutius restiterit, in pulmonibus crassior reddi & quasi lapidescere ut expurgari non possit, vel, ut in gibbosis, tuberculum in spina, quod si non ita durum sit, aliquid de iudet in arteriam. Potest nasci, materia è cerebro in spinam delapsa per tussim, aut inde augeri. In temperies vel frigida est, quæ sola interdum, si lenis fuerit, spiritus cohibitione, ore & naribus clausis supprimitur: vel sicca, ut in hecticis, aut cum columella exesa est, vel diuisa. Opprimitur diaphragma tumore, ut hepatis, in eiusdem inflammatione, quam sequitur tussicula, vel tussis sicca, quæ in schirro non ita apparet, fortasse quia nulla fit resudatio. Cognoscitur tensione ac duritie hypochondriorum, & signis ex recrementis.

Tollenda causa per contraria. Remedia sunt, sputum prouocantia, inspissantia, attenuantia, detergentia, pilule, syrapi, lohot, vel elegmata, bechica, tabellæ, trecisci, narcotica, suffumigia. Sed in his, quæ sistendis fluxionibus è capite in asperam arteriam & stomachum imperantur, videndum, ut tam naribus hauriantur, quàm ore. Non enim viam naturalem, qua diuersi debet, præcludere oportet aut astringere: sed quæ descendunt, palatum nimirum, nisi maior noxa, suppressa, quàm eunte materia, metuatur.

De a Asthmate.

Cap. XXIII.

a Pathema

**A**sthma, b suspirium Latinis, à pituita c crassa & vi- te primige-  
 Ascida, inclusa d bronchiis pulmonis. Vnde anhelio febris  
 tus molestissimus, magisque e iacentibus, quàm seden experte, nō  
 tibus. Affectus f senibus familiaris, & iis, qui metal- symptoma-  
 la te aut à pul

monis tuberculo aut etiam à labefactata vi motrice in cerebro & cer-  
 calibus nervis.

b Adest enim summa spirandi difficultas, ut nō nisi erecto corpore spirēt.

c Quæ vel localem in cerebro habuit generationem, vel è cerebro defluxit.

d Quibus aer recipitur & fuligo excluditur.

e Propter pulmonum compressionem.

f Non enim senes firmæ habent latera ad materiæ cuius fit  
 exclusionem: quia cerebro sunt humidior, excrementitio, sicciore tempe-  
 ramento, & pulmones in his infirmiore calore languent.



# DE MORBIS INTERNIS

- a Quod vene la a hydrargyrum, & arhenicū, & alia e usmodi tractār.  
nata metal Hyeme magis etiam extrema, & phlegmatica conditio  
lorum aura ne excitari solet. *Curatio.*
- pulmones et b Superiore cœnaculo, loco c lucido, & calore d plusq̃  
vim cerebri tēpato, altiorib. e mollibusq; stragulis, capite & thorace  
motricē at- subleuato, multo ēt magis, cōdormiūt, collocār oportet.  
que ceruica Frugalis fuita, potus g uini tenuis, & ueteris h dulciu  
lium neruo sculi, mellita i alimēta, uel cōdita k iis rebus, q̃ leniunt,  
ru resoluat. incidunt l tergēt. Iā liberalior potus esse debet, cum re-  
b Ad vitā purgandi consilium est. Omnino abstinendum frigidis,  
dūrheuma- adstringētibus, minusq; calfaciētibus. Phlebotomia con-  
tismum. cedi potest ætatibus mediis, si nihil est in scopis uniuersis  
c Vt focolu salibus mittēdi sanguinis, quod repugnet. Si vehemens  
culēto, aere malum est, si suppressi mēses, aut hæmorrhoides: alioqui  
tenui nō ca inedia, aut uita parcissima aliquot diebus intēperanda  
liginosa. est. Utendūq; clysteribus. Leuiter molliēda alius est.  
d Ad mun Materia in thorace concepta, incidenda, abstergēda,  
disicandam m diluēda, repurganda tum pharmacis catharticis, tum  
materiā fr- iis, q̃ sputa ducunt n. Materia repurgata, desiccantibus  
gidam, que utendum est. Roborandæ sunt partes. Peregrinatio, na-  
contumaci- uigatio o in mari, uectatio ē curru, aer maritimus, alia  
ter brōchys quoque eiusmodi, quæ calfaciunt & siccant, sunt impe-  
pulmonum randa. Clysteres primum molles sint, ex remolliētium  
adhærescit. decocto
- e Vt residendo cubet, non iaceat.
- f Qua deducitur altera pars cibi assueti, simplicis & euchymi.
- g Neque crassi, neque austeri: nam tale meatus intercipit.
- h Id enim pulmones recreabit malè affectos, alas pulmonum explicabit,  
materiāq; preparabit.
- i Modo biliosus non sit & sitibundus.
- k Cuiusmodi ex butyro medulla sapa.
- l Vt ex iuscula ex hyssopo thymo, saturia.
- m Vt ex facili expectoretur.
- n Ad hac cōferet oxymel simplex Gal. vel hyssopo cōditū, melicratū, syru-  
pus de hyssopo, de prasio. syrup. capit. vener. viol. R. syrup. viola. de hyssopo.  
oxymel. simpl. an. unc. i. Misceantur. Vtatur loco lohor.
- o Vt sine spiradi difficultate moueatur corpus. Vide tamē ne tabidus sit  
ager. Nariigatio enim vomitum inducit, pterigodi perniciosus.



decocto cum cassiæ. dra. vi. in ea dissolutis. Aliqua uerò ex parte præparata & purgata materia dissoluemus semunciam diaphænici, drac. iii. hieræ diacolocyn. drac. vi. benedictæ, in pectorali decoctione.

Leuiter aluum remolles unc. i. cassiæ, & unc. s. penidiorum dissolutis in hac decoctione.

R. glycyrrhizæ, passu. enucleatarum ana dra. 3. iuiubarū sebestæ, ana N. vi. florum anthos & borraginis an. P. i. spicæ drac. i. fiat decoctio. In col. dissol. & c. ut cassiæ, penidiorū. & cæt. Laudatur melicratū hoc modo paratum.

R. fœnugræci M. i. hyssopi P. ii. ficus N. vi. Fiat decoctio ad libr. s. In col. dissolue mellis crudi unc. iiii.

Laudatur quoque ius galli decrepiti, tū quia morbo conuenit, tum etiam quia uetrem leuiter subducit.

*ius galli*

Oribasius hoc modo incoquit. Gallum rufum & decrepitum infarcit sale: tum incoquit cum porro, anetho multo, & oleo. Loco olei, butyro utitor, aut alio pingui. Potest & concoqui cū polypodio, semine carthami, cumino, aniso, hyssopo, thymo, latureia, & aliis eiusmodi. Decoctio quoque poterit dulcorari melle albo, aut saccharo. Per interualla quoq; fortioribus purgationib. utendum est, ut pil. factis ex pul. hieræ picræ, & agarici trocisc. ana ℥. ii. aut pilulis elephanginis, mastichinis, de hiera, assaieret, cocciis, & similibus. Massa earum pilularum ℥. ii. cum ii. ℥. agarici. Ex oxymelite scyllitico formentur in pilulas.

Pulueris quoque hieræ diacol ℥. ii. agarici trochiscati drac. s. coniungitur & syrupo de hyssopo. Alioqui.

R. catholici drac. vi. diaphæ. drac. ii. cum infusione ℥. ii. agarici, modico spicæ & hydromelite quantum sufficit, fiat potus.

Iam bene purgato corpore, thorax repurgandus est, cui rei materia conuenit ex lenientibus, incidentibus, detergentibus, postremo etiam siccantibus.

Pastulæ, ficus, sebesten, iuiubæ, glycyrrhiza, penidia, saccharum, Alphenia, semen althææ, lini & similia leniunt.

Incidunt uerò & tergent. Aristolochiæ radix, gentianæ,



# DE MORBIS INTERNIS

gentianæ, enule centaurii, semen melanthii, scylle, irio-  
nis, urtica, bōbaci, origanum, thymum, satireia, calamē-  
thum, pulegium, brassica, absynthium, abrotonum, hyf-  
sopus, alium, porrum, piper, caltoreum, gutta ammoni-  
ca, serapinum, & à proprietate aselli, uermes serici, pul-  
mo uulpis & erinacii, stercus lacertæ, uermes subiecti  
urticis, interiora oculi Philomelæ cremata, & i pulue-  
rem redacta. Gaicum quoque, ceu lignum sanctum ma-  
nifesta ratione hic conueniunt.

Deficcant sulphur uinum, & arrhenicum rubrum.

His aut sic uti oportet. Nā ē radicibus, herbis, semini-  
bus decoctis melicratū parari debet: deinde reliquorū,  
quæ a proprietate iuuāt, in puluerem redactorum ℥. ij.  
plus minusve, melicrati unciz inspergi debent.

Alioqui ex aliis succus expressus melli commisce-  
tur, aut horum puluerum drac. ij. mellis unc. ij. commi-  
scentur, quale hoc erit.

R. hisopi M. j. ficus vj. fiat decoctio ad libr. s. in qua  
dissol. mellis unc. iij. aut iiij. aut ij. fiat melicratum, cui  
insperge pulueris facti ē pulmone uulpis drac. iiij. pro  
duabus dosibus. Aliud.

R. pul. gentianæ, enulæ, aliptæ moscatæ, diaireos drac.  
ij. mellis quantum sufficit.

Optimum est uti melle scyllitico per se, ut cum de-  
coctione pectorali, melicrato hyssopi, aut simili.

Per interualla quoq; theriacæ aut mythridatij drac.  
per se aut cum modico aquæ scabiosæ, ungulæ caballinæ,  
uino albo tenui, ueteri plurimum conuenit.

R. styracis pinguis terebinthinæ ana ℥. iij. spicæ. ℥. j.  
cum melle despumato fiat electuarium. Sed interim dū  
hec fiunt, thorax fricandus est atq; inungendus oleo amy-  
dalarū dulcium, chamæmelino, anethino, de keiri, iasmi-  
no, de lilio, laurino, irino, costino, de spica, ordi-  
ne ducto à leuioribus. Aut poterit ex his linimentum  
fieri cum æquali parte mucaginis seminis lini, althææ,  
fœnugræci & cæteræ quantum sufficit. Gratia exempli.

R. ol. iasmini ℥. j. s. mucag. seminis althææ unc. i. muc-  
cag. seminis fœnug. extractæ in aqua scabiosæ drac. s.  
cum



cum cera quātum sufficit, Fiat linimentum pro thorace. Post unctionem lana molli, gossipio aut lana sordida thorax contegendus est.

In periculo suffocationis & nimis oppresso spiritu, cucurbitulæ scapulis affigendæ & cruribus. Dandumq; , ut ore contineat, aquæ hordei unc. ii. sacchari unc. i. croci Gr. iiii.

R. oxymellis ℥ ii. salis ammoniaci ℥ i. croci Gr. iiii.

R. salis ammoniaci, sem. nasturtij, pulmonis uulpis ana drac. i. croci Gr. iiii. dissol. in iulepi uiolati unc. iiii. pro duabus dosibus.

Tumque frictions & uincula extremitatum conueniunt, & ea quæ in angina iam dicta sunt.

Desiccandum iam bene purgato corpore & thorace hoc modo.

R. styracis, mastichis, terebinthinæ, arrhenici rubri ana ℥. iiii. incorporentur in uitello oui. Deinde cum hoc medicamento frustula ligni iuniperi illinantur: postea siccetur: ex siccatis suffumigum, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphuris uiui & arrhenici rubri pari pondere.

In debilioribus arrhenico abstinendum est, utemurque solo sulphure incorporato in terebinthina, styrace, mastiche.

Iam bene procedente morbo, cucurbitulis sub mammis, sed breui mora utendum est, ut tantum attrahant, non etiam discutiant.

Similiter Dropaces, Sinapismi, Phenigmi, Exulcerantia, thoraci aptanda sunt.

Extremum est, cauterium in medio pectore. Crudelius est auxilium unctionis, quod ab Aetio describitur, cap. de Asthmate.

In uigiliis dabis drac. s. philonii, quod etiam anhelitum iuuabit.

In siti uehementi, aqua hordei, cum saccharo utendum. Iulepus uiolatus, liquiritia ore contenta conueniunt.



DE MORBIS INTERNIS  
SCHOLIA.

*Asthma.* *Asthma*, difficultas respirationis, qualis ijs, qui diu cucurrerunt. Ex quo asthmenin, anhelare, quod à cursu, & vehementi exercitio commouetur.

Angustia quoque fit Peripneumonicis, Suppuratis & Pleuriticis, sed cum febre. Hic autem eam spirandi difficultatem, quæ cum respiratione densa, & sine febre est, intelligimus. Cuius causa licet in multis præsens semper adsit, grauius tamen spirant commota materia, ut & in Pleuritide. Duo habet perpetua symptomata, & signa, quibus facile ab omnibus vel solo intuitu internosci potest.

Angustiam, seu arctationem partium thoracis, quæ egri sensu manifesto deprehendunt.

*Orthopnia.* *Orthopnia*, id est, rectam spirationem, quod egri non nisi recta cervice spirare queant. Cum enim aspera arteria à gutture in pulmonem porrecta, tibi scindatur in multas propagines, per quas spiritus defluit, si thorax cū collo curuetur meatus comprimi necesse est, ac spiritum magis intercipi unde capite & thorace subleuato, stare coguntur.

Causam duplicem quidam constituunt, crassum & viscosum humorem non in leuibus, sed asperis arterijs, quæ sunt respirationis instrumenta, unde fit obstructio sufficientem efflationem & inspirationem prohibens, quod fit ut parua sit, densa, & velox respiratio. Velocitate enim, & densitate compesare nititur natura, quod deest ad refrigerationem cordis, aut excrementorum fuliginosorum excretionem ob paucitatem aeris ingredientis, & expirationis. Altera causa est, tuberculum aliquod crudum in pulmonibus genitum. Causam tamen huius symptomatis, siue morbum ipsum non semper in fistulis aut cavitatibus pulmonis consistere, experientia constat. Anno 1549. mense Septembri monachus quidam in Collegio (vulgò d' Arras) breui asthmate interijt. Corpore dissecto abscessus repertus est in vena arteriosa, & sine pari, integris omnino pulmonibus. In quodam (nomine, Brutio) asthmate mortuo, pulmo, tanquam spongia, imbutus multò humore pituitoso inuentus est. Fit & à resiccatione, ut in aurificibus, chymistis, fabris ferrarijs, & similibus. Quibus ad di possunt, inunctiones & remedia à morbo gallico. Rasis lib.



4. continentis adiecit pectus strictum, & paruum pulmonē. Qui natura talem constitutionem habet, iugiter (inquit) fit asthmaticus. Galenus verò Apho. 46. lib. 6. fieri significat aliquando à tuberculo nato in spina, ut in gibbis. Quod si magnum est, & durum, siue crudum, asthma facit: si non ita durum, & aliquid desudat in arteriam, tussim. Aliquando etiā suppuratur & interimit. Si fuerit in collo, asperam arteriā contrahit: in dorso, pulmonem & vicina corpora: sub septo, renes & lumbos, urinam quoque intercipit. Huiusmodi tuberculorum materia potest cieri è cerebro in spinam per tussim. Vel causę sunt, ictus, casus, non conueniens decubitus pueris, inconcina deligatio, gestus deformis. Moriuntur ferē suffocati pure, vel cūm adolescunt, ad incrementum cordis et pulmonis non accrescente thorace, iugulantur. Philotimus ab influente sanguine, sed contra rationem fieri scribit. Sunt igitur in vniuersum Asthmatis causę, crassus humor, vel tuberculum in cavitatibus asperę arterię: bronchia intercepta multa & viscida materia: resiccatio vehemens: abscessus: strictura pectoris, & pulmonis compressio: tubercula in spina, siue sponte enata, siue à causa externa: flatus multi septum transversum distendentes, ex quibus sequitur, vis interclusis, neque expirationem, neque inspirationem satis cōuenientem fieri. Periculum autem maximum imminet, cum omnes muscoli intercostales, superiores scapula & omplate trahuntur, virium imbecillitas, vehemens calor, angustia partium spiritalium conspicitur. Vbi omnes, aut plures concurrunt, aeger mortis proximus est: vbi duę, non faciliē seruari potest.

In abscessu, totius corporis habita ratione, attenuantibus, vt aromatis & siccantibus: in crassis et viscidis humoribus, attenuantibus sine manifesto calore, & detergentibus vtendum. Syrupi, pilule, purgatiua, cōserua, eclegmata, vnguenta, apozemata, flatus discutientia. Augenda vis medicamentorum, si materia non in bronchijs pulmonis, sed in spatio thoracis, & membrana succingente heret, Suffumigia, Dropax, Sinapis mus, Phenigmus, Cucurbitule sub mammis. Quidā in medio thorace cauteriū laudant, alij vnum in brachio quatuor digitis sub osse scapulari, alterum in crure quatuor digitis supra genu inter duos musculos. Clysterum frequens vsus, potius paucior,



# DE MORBIS INTERNIS

cior, sed paulò crassior, dum materi a coquitur, largior & dilutior, dum expurgatur, phlebotomia etate media, suppressis mensibus, hemorrhoidibus, & si febris adsit.

De a Pleuritide.

Cap. XXIIII.

a De inflammatione tunicae costarum succingentis, aut etiã musculorum intercostalium quibus illa adheret tunica.

b Vehemens & intolerabilis, qui suam celeriter absoluit historiam.

c Ob membranae naturã.

d Ob cordis viciniam & pericardij.

e Est enim respiratio parua & frequens.

f Ob naturam membranae & materiae copiam.

g Pleuritis noctu magis ingrauescit, quòd in somno partes interna & viscera magis incalescunt, cum calor à superficie corporis ad cœtrum se recipit.

h Quia frigida, constringendo meatus, sanguinem in costas exprimit.

i Unde materia orgasmos, & catarrhi generatio.

k Præcipuè si Auster ante diu flauit. Nam cum Austrina tempestas bellum cerebro indicat, corpus replet humoribus, quos Aquilonia constringendo exprimit: cum verò dum frigus ipsi thoraci nocet, fluxioni excipienda fit idoneus. hinc pleuritis.

l Vt Leporis marini usus.

m Quia tunica costarum succingente quæ densa est, crassa materia subire nequeat

n Vt alui & urinarum.

o Quæ ferè funesta, quòd pepasmi expers.

Pleuritis dolor est lateris b acutus & pungens, cui d assidua febris e difficultas spiritus coniuncta sunt. Pulsus f durus & serratus, supinus ferè decubitus. Nam in latus sanum conuersis tumor suspenditur, atque ita distenditur membrana, quæ patitur, ideoque ita asperatur dolor. Vbi uerò ægro lateri incumbunt, ex eo, quòd subiecto corpore supprimitur, ampliatur doloris sensus, fusa latius materia. Tum quia pulmo lateri affecto innititur. Hic tamen decubitus altero tolerabilior est. Optimus autem, qui in Asthmate præscriptus est g. Noctu ferè exacerbatur, ac diebus imparibus. Ab exercitio, frigida h potus vini i intemperantia, inspiratio k gelida & aquilonia, multo magis, si præcessit Auster, ac de repente succedit frigus; venena l interim, concussio etiam externa huic malo occasio esse consueuerunt.

Materia ferè m biliosa, aut sanguinea, quod partim sputis, partim aliis n excretionibus & antecedente vita coniicies. Rarò pituitosa & o melancholica. Interrogandusque æger est, num suppressa sit sollemnis aliqua purgatio,



gatio, vt in mulieribus menses, in viris hæmorrhoides, aut anniuersarium profluuium, aut alioqui statum certis interuallis, vt ex aluo, naribus, vlceribus. Ex his enim vitium lateri contrahi potest, præcipuè a quibus ea pars infirma est. Quæ etiam hyeme ideo facilius patitur, quòd infirmatur frigore. Frigus enim omnibus partibus thoracis inimicissimum est. Hoc modo igitur methodum distinguendæ Pleuritidis instituito.

*Quæ pleuritidem imitantur.*

Quibusdam corporibus à natura datum est, vt c hep-  
par fibris quibusdam, costis inferioribus copuletur. Ita-  
que laborante hepate imago pleuritidis representa-  
tur. Aliis materia quædam crassa & viscida in membra-  
nis pectoris colligitur, toto etiam thorace, vnde dolor  
grauis, tussis d dispnæa & e ficta Pleuritis. Nam nec  
pungit dolor, nec febris incenditur, vt nec si flatus mē-  
branis aut intercostalibus musculis impactus est. Ali-  
quando etiam muscoli inflammantur, f sed pulsus hic  
alius, nempe mollis. Dolor grauis est, non pungens,  
& omnia ferè leuiora sunt. Membranæ quoque thora-  
cem distinguentes, si inflammantur, par negotium vitæ  
faciunt, atque verus lateris dolor. Sæpe etiam inferio-  
ribus costis inflammatis, diaphragma atque hinc stoma-  
chus grauiter laborat magno periculo. Morbus hic pro-  
ximo vere (Anno 1551. ante Pascha) plurimos, & eos  
maximè, qui vel temere, vel negligenter curati sunt,  
sustulit. Omnia ergò uia ac ratione distinguenda sunt,  
ut etiam uniuersalia g morbi tempora, è sputis maxi-  
mè, tum urinis, alui excretionibus & aliis, de quibus  
Apho. 12. lib. 1. & commentario lib. 2. Prognost. & Cri-  
seo. 1. Ex his enim tempora distingues, tempus euen-  
tumque crisis pronuntiabis, meliusque auxilia h in-  
stitues.

*mata paruus & durus.*

g *Vt principium, augmentum, status & declinatio.*

h *In diæta, pharmacia & chirurgia.*

a Nam si  
pars aliqua  
prædoluerit  
in ea se mor-  
bus obsir-  
mat, aut si  
lassitudine  
ante fuerit  
obsessa.

b Apho. 24  
lib. 5.

c Quod ani-  
maduertisse  
se literis mæ-  
dauit Syliu-  
us i latomo  
quodam cu-  
ius hepar cū  
nothis costis  
vinculis &  
fibris colliga-  
batur.

d Parua &  
frequēs spi-  
randi diffi-  
cultas.

e Neq; ma-  
teria, neque  
loco vera.

f Inflammati  
musculi ma-  
gnus est pul-  
sus & fre-  
quēs: tunica

Cu. verò inflam-



# DE MORBIS INTERNIS

a *Actionē,*

quas labefa-  
ctat pleuri-  
tis p cause  
amotionem  
restitutio.

b *Vt in eun-*

te morbo dū  
siccus ma-  
net, si vires

ualeāt sine  
infirmittatis

metu, prius  
in curā mor-

bi incumba-  
mus, quā

naturā stu-  
deamus: de-

inde uictum  
loco & iure

præscriba-  
mus tenuem

us exquisi-  
tum intelli-

gamus qui-  
bus paucis

& semel sit  
exhibendus

c *Et lib. 2.*

de uictus  
rat. i morbo.

acutis.

d *Ne pleu-  
riti cum faciant pneumatiam.*

e *Cum humescere os cœperit.*

f *Paulus A. gineia libr. 7.*

g *Vt aqua natura studeat & pugnet cum morbo.*

h *Si brevis sit morbi historia, & cum uirum integritate ad statum per-  
uenire queat.*

a *Curatio.*

Vitæ ratio, b methodo illa vniuersali, quæ ab Hip-  
pocrate primo c Aphorismorum indicatur, æstimanda  
est. Nunc etiam consuetudo adiungenda, cum ægri inæ-  
diam Hippocratis non ferant, & alijs ciborum, potusq;  
generibus assueti sint. Initio aqua hordei, ex hordeo pul-  
ticula. Principiis, d liquidior: post etiam e crassior, ac  
deinceps mixtis amygdalis, tum amygdalogala. Post e-  
tiam eadem ex pullorum iusculis dissoluta. Tenellæ  
pullorum carnes, intrita madida, quæ & infriatas car-  
nes, & synterimata appelles licet, uulgo collyria, & co-  
latilia iuscula. præter hæc, vulgi expressiones tortura  
iura, atque iis omnibus liquidiora instauratitia distilla-  
ta quæ ad προπομάτω δειν καὶ φιλμάτω f genus re-  
ferri possunt. His autem g detectis viribus, ut mos est.  
Nā integra uirtute nutries h tenuius. Synterimata ergo  
è pulpis galli decrepiti, postquam longa decoctione re-  
remolliueris, & exacte infriaueris, conficies. Atque eo  
iure, in quo gallus coxerit, dissolues. Alioqui id quod  
conficitur à natura, melius ex assis pulpis, quæ alis copu-  
lantur, & sub iis positæ sunt. In capis, perdicibus, & iuue-  
nibus gallinis detrahendum lardum est, priusquam in-  
friantur, atque dum assantur, aqua uiolarum, scabiosæ,  
borraginis. conspergi possunt. Tortura iura, id est, ex-  
pressiones ex eodem modo assis capis, perdicibus & cæ-  
teris succulentis. Ideoque priusquā legitimè coctæ sint  
carnes, etiam dum succosæ prælo bene mundo suc pri-  
mantur. Sed & exollari prius melius est: deinde ita con-  
torqueri, ut uberem succum reddant, qui interim hyo-  
sacchara, id est, saccharo uiolato dulcorari potest. Instau-  
ratitia hac conuenient formula.

R. Con-



R. Conseruæ boragi. violarum, capill. nen. an. unc. i. conseruæ enulæ unc. s. diamargariti frigidi, triasantali an. unc. s. quatuor *a* sem. frigid. excorticatorū, sem. limonum, cardui, bombacis an. unc. ii. aquarū distillatarū ex uiolis, scabiosa, borragine, buglossa, ungula caball. ana unc. iiii. aquæ decoctionis galli decrepiti, alterati cum borragine, buglossa, calēdula, & *b* modico hyssopi li. iiii. cū carnibus unius capī iuuenis bene carnosī, & *c* mica panis fiat distillatio in alambico secundum artem.

R. supradictæ distillationis lib. s. cum sacchari uiolati  $\bar{z}$ . i. s. & scrup. ii. cinamomi. Coletur p manicā Hipp. *Instauratitium pro pauperibus.*

Minori sumptu gallus decrepitus ad putrilaginem coquitur cū uitulina: expressio fortis cum iusculo desorbetur, cuius alimenti uim maiore existimant, si cum numis aureis, aliquādo etiam gemmis modulo inclusis & inditis uentre galli. Præterea uocata gelatina concreto succo carniū uires fouendæ sunt. Permulti Pleurici uinum appetunt, quo tamen *d* interdendum est, nisi uirtute collabente animi deliquiū metuatur. Tum quæ buccella panis in uino tenui, & modico aquæ uiolarum immergatur. Sæpius naribus admoueat, fugatur interuallis. Acida adstringentia, quæ refrigerāt uehementius, aut calfaciunt *e* uitanda sunt.

*f* Loco lucido, mediocriter elato, molli culcitra, capite ac thorace subleuato, collocandi sunt. Qui si decidunt *g* in pedes, lignum aliquod, aut aliud corpus pedibus obicitur, ut in ea figura persistant. Hæc ubi ita fuerint *h* prouisa, statim initio de *i* maioribus remediis cogitandum est.

Maiora remedia sunt, Purgatio & Phlebotomia. Si substitit alius, clyster mollis iniici debet, in quo drac. vi. aur. unc. s. cassiæ dissol. Purgatio interim satis esse potest. Nec perpetuo *k* phlebotomia opus est.

Placuit

*rere nequit, prius est in morbi curam incumbendum, quam nature studendum.*

*k* *Et cum expectoratum cruentum est, facileq; excutitur.*

*a Cucurbita, cucumeris, melonū & citrulle.*

*b Propter amaritudinem.*

*c Et macerata in aqua scab.*

*d Inflammatiōes metu.*

*e Hæc enim expectoratum perhibent.*

*f Ut materia foras euacetur, & refrigeretur corpus.*

*g Quod fit iactatione, vel virium infirmit.*

*h Adhibita scilicet prouisione loci, aeris & decubitus.*

*i Quia propter impedimentum partitis cuius officio vita ca-*



# DE MORBIS INTERNIS

*a Ad amo-* Placuit enim Hippocrati, cum dolor ad hypochon-  
*tionem con-* drium inclinaret, ut pharmacò *a* potius, quam phlebotò  
*iuncte cau-* mo uteremur. Pharmaca uero præcipua credidit helle-  
*se.* borum nigrum, aut peplion *b*. Gale. verò hieram diaco.  
*b Gal. com-* quæ helleborum, non scammonium, ut peplion, recipit.  
*mentario in* Posteritas Medicorum, leuioribus inuentis, veterum  
*sent. i i. lib.* pharmaca reliquit. Leuissimum ac plurimum usurpa-  
*2. de ratio-* tum cassia. Datur hæc ad unc. i. s. drac. x unc. j. drac. vj.  
*ne vict. in* eaque dissoluenda est aqua hordei, sero lactis, passula-  
*morb. acu-* rum, glycyrrhizæ, eiusmodique pectoralium decocto,  
*tis.* vel cum saccharo in bolum cogenda est.

*c Quod pur* Datur etiam, sed ferè *c* aucto modo, mel aerium, id  
*gandi vis ei* est, manna. Vbi uero obstructionis coniectura est in pri-  
*fit imbecil-* mis uenis rhabarbari dra. ij. drac. j. in aqua hordei, endi-  
*lior.* uix, aut similium infunduntur, & cum modico cinamo-  
*d Mastix* mi fit potus. Neque metuenda eius adstrictio est. Nam  
*enim ex euē* & mastiches dra. iii. mouendo uentri *d* pleuriticorum  
*tu purgat,* ueteres imperauerunt.

*um ventri* Alternis diebus, maximè paribus, in quibus ferè qui-  
*culum ad-* es est aut lenior morbus, clyster mollis iniici debet, si  
*stringit.* nō descēdit aluus. Alioqui, quod utilius est, Cassiæ un-  
*e Vt si expe* s. aut drac. 6. in bolum cū saccharo cogendæ sunt. Dan-  
*toratum* dæq; uel manè, uel uesper, horæ dimidio ante cibum.

*ephpheteos* Consilium usus pharmaci augebit, si dolor leuis est,  
*procedat, si* si natura ægri non ita eusarcos, aut aliena *e* opinio à  
*vires sint in* phlebotomo. Alioqui si *f* grande malum est, etiam si ad  
*firme, si dif* hypochondrium declinet dolor, tutius auxilium phlebo-  
*ficultas ex-* tomia est Galeno. Prius etiam quàm de pharmaco de-  
*pectorandi* cernas, interroganda ægri natura est. Alij enim *g* diffi-  
*in lateris in* cilius purgantur. Alijs *h* uel leui pharmaco immodicè  
*firmitate cō* turbatur aluus. Hi ergo à phlebotomo habere possunt  
*ssitat, si ple* commodius. Quod si incognita ægri natura est, & phar-  
*uritis mitifi* maco uti decet, medicamentum eliges tum qualitate,  
*cata fuerit* tum

*e ad coctionem perducta.*

*f Magnitudine cause & symptomatum vehementia.*

*g Vt melancholici.*

*h Vt is qui sunt leptiche picrocholi ano.*



tum quantitate medium, ne vel nō purges, vel supra modum vacues.

Tempestiua purgatio turgente a materia, prima die, aut non vltra secundam. Nec omnino agarico, aut etiā hiera diacol. interdicitur, quin vti licet dolore in uentrem declinante, non ita vehementi affectione, atque vbi à pituita malum est.

Imperabis ergò b catholici drac. vi. rhab. & agar. infusorum, vti decet, an. drac. ii. Cum hydromel. quantum sufficit fiet potus. Eodem modo c & cathol. 3. iiii. pul. diacol. misceri possunt. Diaphœnicon quoque & diaprunum pauperibus imperari possunt.

Phlebotomia remissionis tempore, & eo die quo leuior est paroxysmus, commodior est. Itaque etiā uespere & nocte media, urgēte malo, & oblata occasione sanguinem detrahes. Nec perpetuo semel is ducendus est. Nam suspectis uiribus, uacuationē partiri melius est, ut mane 3. vi. uesperti, uncie sex depleantur. Est præterea, cum de repente noua sit affluxio, ut inde omnia symptomata recrudescāt, supra quoq; uel cruda sint, uel retineantur. Tumque & sexto die & octauo, ut d. Anaxioni, aut etiam tardius sanguinem mittimus. Hocq; remedium secundo a tertio reuocamus, siquidē nō repugnāt uires. In quo tamē cautio esse debet. Nā aliquando ubi antea signa omnia salutē pronunciauerint, crisis tēpore, quæ ferè fit ad septimū, aut aliā diē criticā, uehementē Pleuritis exacerbatur, symptomata omnia crescunt, tū nihil mouēdū est. Sēd omnia naturæ e committenda sunt.

Desperatis rebus, nihil quoque mouendum est.

In pueris et binis, senibus octogenariis, mulieribus grauidis fr̄mediū hoc tēperari debet, nō oīno phiberi.

i. vel scrup. iij. f. bolus.

d Hippocra. sect. 3. lib. 3. Ton epidim.

e Vt si humoris corruptione phlegmone in gangrenam abierit, si vires effæte langueant, si expectorandi difficultas in lateris infirmitate consistat, & renchos siue stertor adsit. Tunc enim de salute est desperandum.

f Præsertim si grandis sit sætus.

a Effera sci  
licet & qua

nullo consi-  
stet loco, di-

uersaq; exci-  
tat sympto-

mata prova

ria parte in

quā influit.

b Vel R. ex

pressionem

drac. ij. rhei

electi, &

drach. s. vel

scrupu. iij.

agarici in

hydromeli-

te cocto opti-

mè infuso-

rum cū seruo-

pu. i. cina-

moni. In

qua dissol-

ue catholi-

ci, syrupi

viol. an. dr.

vi. f. potio.

c Vt R. ca-

tholici dra-

vi. pulueris

hier. diacolo

In cynib. drac.



# DE MORBIS INTERNIS

a Ut tantū

effluat san

guinis, quā

tum hyrudo

suxerit.

b Quandiū

fit palyndro

me: nāsi ma

lum iam fa

ctum sit cu

biti venam

secare est sa

tius.

c In ictu,

motu, & di

latatione.

d Si atropos

sine confer

tim fertur

sanguis aut

pigro lapsu

fluat pp ple

thoram.

e Si ruber

fluxerit

mox niger,

ultimo loco

melior: prae

sertim si

pleuritis in

superiorib.

fit costis.

f Ne quid

capite dif-

fluat.

g Quia sanguis

h Imo probat hanc sententiam Gal. commentar. in librum de humoribus.

i Liquidis, siccis, mistis, suavis, acerbis curandi & explorandi gratia.

In pueris uenae interim angustiores non apparent, idque magis in pinguiculis. Qua in re sanguisugis uti licet, a decurtata harum cauda, ut uacuationis modus certo finiatur.

Suppressa aliqua p partes inferiores uacuatione, ubi malum inde ortū est, in insigni plenitudine, in materia uirulenta, cumq; statim initio materia in caput rapitur, ac mentem commouet, e b uenis cruris eiusdem lateris sanguis trahendus est. Alioqui e basilica eiusdem lateris.

Vacuationis modus e c pulsu, d sanguinis motu, e co lore, & corpore praescribendus est. Si initio purus ac rubens effluit, uacuationis modus est, cum iam liuidus ex cernitur. Si aquosus & crudus initio, claudenda uena est,

cum iam rubentior & flauior apparebit. Si basilica non apparet, media uulneretur. Atque cum iam uulnerata est f pollex ramo cephalicae imprimatur.

Animaduertendum. Pleuriticis iuuari phlebotomia, locis perflatis ab Aquilonibus: ledi uero regionibus, quae obuertuntur Austris. Hic ergo uel purgatione utendum est, temperanda sanguinis detractio.

In biliosa Pleuritide Arabes phlebotomia g interdunt. Hippocrates quoque hac sententia prohibuisse uisus est. Sanguinem, inquit, non detrahes, ubi expuitur sanguis, si regio repugnat, si aeger Pleuriticus est, si natu ra eius admodum biliosa.

Galenus sententiam Hippocratis recipit, nisi quod h non probat sanguinem non detrahi, spuentibus sanguinem pleuriticis. Hippocrates priusquam ueniat ad maiora remedia, i fomentis utitur, quae aliquando satis esse possunt, aliquando morbum indicant.

Itaque si sputa biliosa, uesica suis ex aqua calida ad di midium implenda est, ad mouendaq; lateri. Alioqui cot tum, uel lana mollis infusa in aqua tepida & expressa subinde apprimatur lateri. In ea aqua, si uis, incoques ulolas,

g Quia sanguis frantum est bilis.

h Imo probat hanc sententiam Gal. commentar. in librum de humoribus.

i Liquidis, siccis, mistis, suavis, acerbis curandi & explorandi gratia.



uiolas, melilotum, chamæmelum. Fouebis quoque oleo a Ne sua a  
uiolato & chamæmelino, si crassa & uiscida sputa sunt. qualitate p

R. milii frixi M. i. furfuris frixi P. ii. salis torrefacti tē offendāt. si crassa  
z. i. interim dū friguntur, uino tenui cōspergi possunt, & b Valet ine  
si perfrixi: latus, aqua uitæ uel hyssopi, aceto etiā, si cor unte morbo  
pus carnosum est & calidum, neq; uehemēter urgeat tū ad materie  
sis. Inde fiunt sacculi, qui calidi lateri applicantur. Pos- orgasmū, pa  
sunt hi sacculi in uino aut aceto immergi, in quibus uel lyndromen,  
hyssopum, uel origanum, uel thymū, aut aliquid tale co aut fluxio-  
xerit. Inūges tū ex anethino & rutaceo. Eiusmodi quoq; nē prohibē-  
sacculis cumini semen, baccæ lauri, sicca hyssopus, origa dam. Habet  
num, rosmarinus, & similia immisceri possunt. n. dens apri

In tenui & cruento sputo sacculus ex milio, furfure, vi adstringē  
& sale descriptus, sed siccus & calefactus applicari de di maxima.  
bet, inunctio ex chamæmelino & amygdalino. c Commēda

Oportet autem omnia, quæ lateri admouentur, esse tur mirificē  
a leuia, mollia, calida, uidendumque, ne quæ calida pudendū b  
admota sint, tempore refrigescant, calorq; linteis calen bulū aut cer  
ribus, aut alia arte fouendus est. Sunt, qui nullis eiusmodi uinū, tostū  
di remediis usi, neq; fomentis, neque maioribus illis au et in tenuis  
xiliis certas antidotos commendant. Quales sunt. simū pulue-

b Dens apri in scobem comminuitur, dantur drac. ii. rem redactū  
ex uino albo tenui. Aliud. datur ad dr.

Radiciis lappæ siccæ, quæ purpureum florem gerit, i. cū oxyme-  
aut floris eius drac. ii. è mulsâ propinantur. Aliud. line, aut ui-

Coralli rubri & teste auellanarum rubrarū ana drac. no albo.  
i. datur è mulsâ. c Possunt hæc quidem tentari, non ne d Ad reuel-  
glectis aliis remediis. lendū & na

Cucurbitularum in Pleuritide d plurimus usus est, cuandum.  
de quo in lib. de Cucurb. Vtimur quoque plurimum e Simplici  
aqua hordei, saccari, syrupo uiolato, de iuiubis, e oxyme aut scyll ti-  
lite, hydromelite, decoctione pectorali, syrup. capil. co si mate-  
uen. & de liquiritia. ria sit lenta

Aqua hordei, si quidem detergendum est siccandum nec alui ibe  
ex integro hordeo parari debet. cillitas, nec

Si leniendum, si extinguenda sitis est, fricanda aspe- melācholia  
riore linteo, & exteriori tunica spolianda est. hypochon-

Si nutriendum magis, proportio hordei ad aquam au driaca.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** *Leuiter* : genda est, magisque coquendum est, dum disfringatur non coctio- hordeum. Ferè parant aquam hordei, ut sit aqua uigecu ne longiore pla, idest, ut sint xx. partes aquæ & una hordei. amarescit. Sæpe etiam quartam partem syr. uiol. commiscemus  
**b** *Vt 3. iiij.* aut modicum sacchari uiolati, uel, ut in ptisana vulgari ad libr. i. glycyrrhizam rasam a concoquimus. Aqua sacchari de- c *fenestibus*, terget, coquit, lenit, nutrit.  
*qui alio sunt* Sit autem sacchari unc. i. in uiginti partibus aquæ. Co infirmiore, quantur ad dimidium. Potest tamen sacchari modus au et mulieri- geri, ut etiam aliquando sub b quadruplum saccharum bus hysteri sit, quale hoc est.  
*cis & me-* R. aquæ coctæ, uel aquæ hordei lib. j. sacchari cõmu- lãcholicis. nis uel uiolati unc. iij. atq; aliquando colatur aqua illa d *Cũ exclu-* cum dicto saccharo & modico cinamomi. Cũ uidelicet sio fit à capi nutriendũ magis, coquendum, detergendũ, repurgandũ te in fauces. & roboradum. Iulepi uiolati usus est, ut leniamus sitim e *Vel R. ver* & calorẽ temperemur, leuiter concoquamus & facilius nicis, ma- sputum reddamus. Syr. de iuiubis lenit, maturat, tẽpera stich. nigel- tus est, conuenit quoque ut uiolatus incrassando sputo. la romana Oxymelitis suspectus usus in pueris c macilentis, iis an. 3. i. fur quibus genus neruolum infirmum. Quibus asperior tus furis macri sis, uigiliæ maiores, sputa quoq; tam crassa, ut propè sic- unc. i. pulue ca sint, similiter & si æger debilior est. Tẽpestiuus autẽ ris rosarum usus fuerit, si nihil horum repugnat, si fluxio tenuis non rubrarum. est, si sputa mediocriter crassa, hoc est, non ita resiccata. drach. ij. fi. Hydromelite, ut aqua sacchari utendum est, nisi quod puluis pro calefacit magis & omnino maiore uĩ præditum est quã suffitu. Ex- aqua saccharata. Decoctione pectorali ad sitim, ad co- cipitur pi- quendũ, leuiter detergendum & incidendum uti, licet. leo noctur- Syrupus capill. uen. incidit, deterget sine manifesto no. Huc et calore syrup. de liquiritia ad omnia supradicta utilis est spectant sac & pectus roborat. Itaque ut postulabit usus, modo his, culi & mar modo illis utẽdum est. Veteribus quoq; melicrata pro supra ex mi bata sunt ex aqua, in qua radix uiolæ purpureæ, stẽchas, lio, sale & chamædris, chamæpythis, horum unum coxerit. Atque fursure ca- d initio supprimendæ fluxionis suffitu utimur. puti admonẽ R. e uernicis unc. i. mastichis, ros. ana drac. ii. fiat pul. da manẽ. pro suffitu cum stupis cannabinis. Item.

R. dia-



R. diatragacant. frigidi unc. s. teneat alternatim in a Si nulla  
ore. Plura in cap. de catarrho. ad sit cari-

In coquendo uerò quod influxit, utendum est a lacte uaria, ac  
amygdalino, butyro per se. Coquit enim, lenit modice, non sit eger  
educit. dipsodis.

Poteritq; modicum sacchari uiolati commisceri, ut b Hæc in pi  
paulò plenius educas, postea uerò aliquid mellis. Ita tuitosa pleu  
magis repurgabis. Magis etiam, si ad unc. ii. butyri scru ritide, affe-  
pu. ii. diareos simplicis admisceas, uel amygdalas ama cto & decli  
ras, persicorum nucleos, aut b similia amara torrefacta, nante mor-  
& in puluerem reducta. bo.

Butyro quoq; quarta pars terebinthinæ lotæ in aqua c Ut R sal-  
maluæ commisceri potest. se parilla

Parabilia quoq; remedia sunt c melicrata, in quibus unc. ij.  
radix althææ coquendo, hyssopus, thymum, & similia in radic. enu-  
cidendo & repurgando coxerint. In eandem rem compa le cāpane  
rant lohot, initio quidem cum multo d diatragacantho: & ireos an.  
postea uerò cum e multo diaireos. Fereque in remediis un. i. saluæ  
Pleuriticis lenientia, detergentia, incidentia, repurgan & betonica  
tia commiscantur, quale hoc est. M. i. fi. de-

R. electuarii diatragacant. frigidi drac. vi. sacchari cā coct. In co-  
di, penidiarum, pilularum albarum ana drach. iii. diai- latura dis-  
reos simplicis drach. ii. syrupi uiolati & iuiubarum an. solue mellis  
quantum sufficit, fiat lohot. lib. i. fi. hy-

Vbi uerò magis repurgandum & extenuandum, auge dromel, qd  
bimus diaireos, minuemus diatragacanthum. Loco peni maximchye  
diarum, mel album: loco syrup. prædicti f syrupum cap. me usum ha  
uen. & aliquid oxymel. miscebimus. beat.

Iam aucto morbo, ad hos usus uinum album tenue, & d Ad fluxio  
aquosum concedi pōt. Inunctiones lateris sunt ex oleo nem sisten-  
uiolarum & aliis, ut supradictum est, oleo de Keiry, de dam.  
lilio, mucaginis cemin. cydoniorum, althææ, lini, scœnu c Ad expe-  
græ. extractis in aqua uiolatum, ungulæ cabal. scabiosæ, cto ratu pro  
hyssopi, butyro, sordibus lanarum, terebinthina, axun- mouendum.  
gia gallinæ, anseris, anatis, suis, & quæ plurimum lauda f Vel R. uo-  
tur, ursæ. Adduntur pulueres, ireos, thymi, hyssopi, mar iubas, pru-  
rubii, gentianæ, sinapi, cnici, brasicæ & sarmentorum na damasc.  
uitis, non initio quidem, sed iam progressu morbo. Sic an. num. 20  
enim



# DE MORBIS INTERNIS

passul. mun enim serè posteriorum Medicorum vsus. Veteres autem datar.  $\bar{z}$ . s. vehementioribus remediis vsi sunt. Latus lana sordida dactylos, si leniente & concoquente integitur: postea etiam in fine cus pingu. morbi lana sulphurata. Formulæ sunt.

an. num. 3. R. ol. violarum, amygdalarum dulcium ana  $\bar{z}$ . s. mi- ungul. caba sce. Cui adde post initia, mucilagin. sem. cydoniorum linæ an. M. excorticorum dra. vj. muccag. scm. lini unc. s. caræ mo s. hyssop. P. dicum, fiat linimentum pro latere. Postea.

1. glycyrrhi R. muccag. sem. althææ, & cydoniorum. ana drac. vj.  $\bar{z}$ æ rasæ  $\bar{z}$ . sem. muccaginis sem. lini & fænugræci ana vnc. s. ol. de s. f. decoctio keiry, adipis vrsi an. drac. iij. æsopi drac. ii. ceræ modi- in colatura cum, fiat linimentum.

ad lib. i. dis R. a dialthææ unc. ii. cum oleo amygdalarum dul- solue saccha cium, fiat vnguentum molle. Atque ubi iam resoluen- ri quart. 3. dum est, adde pul. ireos aut similis drac. ij. tumque bo- electarij dia num fuerit, folium brassicæ ad ignem tabefactum, & bu ireos simpli tyro illitum superponere lateri.

cis unc 3. f. Atque ubi ad suppurationem vergit, semen nasturtij syrupus. & sinapi cerato commisceri possunt. Quo tempore.

R. rad. althææ & liliorū repurgatorum ana  $\bar{z}$ . j. ficus a Hæc ex pingues N. ii. Coquantur omnia in vino albo. Deinde Paulo Aegi cum axungia & oleo de liliis pinfentur in mortario. Fiat neta desum emplastrum molle, cui insperge semen nasturtij & sina pta, ad plu pi in puluerem redacti ana drac. i. Tentatis omnibus his ritidem no- remediis, si quidem desperatio est, & vires tolerare pos- sunt, enterium actuale aut potentiale (quod vocant) la- tham. teri inferendum est.

Scarificatio quoque cum cucurbitula, eo modo, quo in libello de cucurbitula dictum est.

## SCHOLI A.

Musa in Aphorismos, ita Pleuritidem distinguit, ut no- tha sit in superiore parte tunicæ tegente costas, aut inter co- stas: vera, in mediastino. Quod & rationis, & experientiæ repugnat, quibus perspicuum est in succingente costas aut pe- riorio, aut saltem in musculis intercostalibus veram cum ve- ris propriisque symptomatis excitari: notham in musculis ex- ternis. Licet haudquaquã negandum intra thoracem speciem quandam Pleuritidis non veræ fieri posse. Multis enim ex ra- sione

quæda spet  
pleuritidis non veræ intra thoracem:



zione vite, quæ crassa & viscida gignat, multus humor eiusmodi in corpore cummulatur, qui in vacuum spatium thoracis & pulmonem latus, membranisque hærens dolorem pleuritico similem affert, sed sine febre, vel certè febri-  
cula, aut etiã in frigidior corpore, quàm antiè, respiratione quasi in collo suffocante pulsu difficili, tardo, minimo, ubi neque phlebotomia, neque similibus remedijs ad Pleuritidem accommodatis: sed his, quæ humorem illum incidunt, tenuet, & educant, semper est utendum. Signa autem certissima, quibus in ceteris, & pars affecta, & materia affectus internoscuntur, huiusmodi sunt. Si æger in partem lateri dolenti oppositam decumbere non potest, in membrana costas succingente affectio est, quæ suspensa pondere concepto gravatur. Si in partem affectam: digito leuiter premenda pars exterior cutis. Nam si æger dolorem inde percipit, in musculis externis: sin minus, nisi costa grauius tractetur, vel in periostio, vel in musculis intercostalibus subsistit. Tum notanda erit pulsatio ad distinctionem vtriusque. Nam in musculis intercostalibus comprimitur arteria, unde pulsabilis dolor. Omnibus eadem ferè sunt alia symptomata, exceptis fibre & sputo. Spuria in musculis externis à materia frigida vel flatulenta, sine febre est. Sputum in inflammatione intercostalium ob minorem resudationem, paucum: in periostio, fere nullum, tum ob materiæ paucitatem, tum quòd sudore sæpe & insensili transpiratione resoluatur. Sanguinem indicant (ceteris signis non pretermis-  
sis) sputum cruentum: Biliosam, ex rubro flauiscentem. Pituitosam tardè apparens subalbidum. A melancholia, rarissime fit, et si fiat, vix curatur. Cum autem morbus indicetur, vel excretionem, vel coctionem, vel abscessum, nisi solvatur celeriter in Sanguinea, missione sanguinis: in Biliosa, vel eodem modò, vel sæpius sudore, aut hemorrhagia è narib. saltem intra diem septimum, in Peripneumoniam degenerat: aut post 14. in empyema. Peripneumonicus est æger, si dolor punctorius imminutus fibris est spiritus difficultas aucta, sputum spumosum, rubentes genæ, morsq; est ferè semper in propinquo. In hac dolor fit aliquando, nõ ratione pulmonis, sed mediastini & membranarum. Quod si non repurgetur materia, cocta in pus vertitur. fitq; Empyema, sanie, quæ per sputum educi debuit, in spa-



# DE MORBIS INTERNIS

rio thoracis collecta. Terminus autem indicande Pleuritidis per expuitiones, decimus quartus. Non, ut Fuchsius, & alij, ab eo die numerando, quo cœpit ager expuere. Nam id falsum esse, & ea quæ sæpius accidunt, & Anaxionis hyst. 3. Epid. demonstrant. Si enim ita numeres, non 14. diebus eo modo indicatus fuisset, sed ferè 24. quia cœpit 11. Reclè igitur Hipp. Quicunq; morbo laterali laborates, in quatuordecim diebus nō repurgantur, ij ad suppurationem veruntur.

Phlebotomia & purgatio.) Ex eodem latere fit, dextro quidem ob venā vulgò (Azygos) dictā, quæ è directo est: sinistro verò, tum ob intercostalē, quæ osculis ramorū venæ azygos in sinistrū latus perreptantiū copulatur: tum ob naturæ conatū, quæ sese ita exonerat. In quibus secari vena tutò nō potest, cucurbitula in principio inguinibus affiguntur ad diversionē. Purgantia multis de causis reijciuntur. Primum, quia cum sputa prodeunt, eorū prohibent motū. 3. de morbis. Deinde in inflammationibus internis nihil è parte inflāmata educunt, & partes sanas colliquant. Postremò, quia in Pleuritide & Peripneumonia habitis profluviiū vētris metuēdū.

Quæ omnia docet Hipp. Sed hæc postrema ratio infirmior. Addit enim Gal. in cocto morbo, & mediocri nō mutiliter aliquādo alui profluere, licet in maligno malū, & ut causā, et ut signū. Causā quidē, quia vires exolvit. Signū, quia attractricis epatis, & alteratricis, vētriculi imbecillitatem significat. Quòd autē Hipp. cū dolor ad hypochondriū extēditur, laxantia præscribit, Galenus cōcedit, sed tantū ad materiæ antecedentis educationem siue è splene, siue è caua hepatis, non è thorace, aut latere. Rarò igitur utendū purgantibus, usq; leuibus, in principio morbo pituitoso per defluxionē, & si materia fluat ab hepate. Sed tutius adhuc clysteribus agitur. In Peripneumonia etiam de venæ sectione dubitari potest. Primum, quia ex Anatomia non satis perspicuum, quā via materia inflammationis in venam sectam veniat, cū nullus ramus à vena caua pulmonibus distribuatur, & per venam cōmunem phlebotomia fieri debeat. Deinde quia post Pleuritidem, asthma, aut Anginam ferè lethalis, & iam afflictas vires occupat. At si suppressis mensibus, hæmorrhoidibus, aut solenni aliqua euacuatione vteri, & similibus oborta sit, in quibus



quibus hepar in thoracem & pulmonem sanguinem reijcit, si a Sympto  
sputa rubra, plenitudo, & quæ sanguinem indicant nondum mate tñ sim  
degenerasse in melancholiam, aut bilem, de venæ sectione nō plici, tñ cū  
dubitandum, alioqui abstinendum. In cæteris curatur Perip phlegmone  
neumonia ferè vt Pleuritis, ob id hoc loco omittitur. Sunt aut coniuñcto.  
tem remedia Pleuritidis, Clysteres, sanguinis misio, Syrupi, b Quia cras  
decocta, vnguenta, sacculi, elegmata, condita, frontalia, em sus, & non  
plastra, linimenta, cerata, pasta regalis & similia. arteriosus.

Locis perflatis ab Aquilonibus.) 3. Epid. scribitur in c Quod in  
Pleuritide Romanos & Athenienses obiectos ventis calidis capacitatē  
male ferre sectionem venæ. Perios & Hellepontios melius. cōfluxerit.  
Ceterū, non omni Pleuritico conuenit necessariò, etsi expuat d Quando  
concocta. Lege. 6. Epid. & historiam Pithyonis initio tertij. quidem sit  
De a sputo sanguinis. Cap. XXV. corruptus.

Anguis expuitur à thoracis uenis, b niger, c grumo- e Refert e-  
sus, d fetidus, cum doloris sensu. A pulmonibus, e nim partis  
flauus, tenuis, f spumofus, sine g doloris sensu. Atque vnde manet  
hincrupta, exesa, aut aperta vena. Rupta affatim erum ideam.  
pit ex clamore, casu, concussione pectoris, perfrictione f Crebro pul  
plenitudine. Plenitudo ex ratione uitæ, suppressis mēsi monis mo-  
bus, aut solemni aliqua uacuatione. Exesis, h sensim & tu.  
per interualla ab humore acri, quem uel caput demittit g Pulmones  
uel ratio i uitæ, aliquādo etiā inedia x collegit. Aperti namq; sen-  
ex l calidiore & humidior ratione uitæ. Ruptis gluti sus sunt ex-  
nātia, quæ citra morsum siccāt: exesis, m cibi boni succi, pertes.  
pharmaca, sarcotica: Apertis, adstringentia cōueniunt. h Quia di-

Expuitur sanguis ab arteria aspera, tumq; dolor sen stillationes  
titur. Omnino paucus sanguis expuitur ex faucibus, & è capite,  
ore cū screatione, non tussis. Tussis enim excitatur, cū quæ tussicio  
ab arteria, pulmone, thorace, n sanguis excernit. Exgin losos & rau  
guis cos homines

reddūt, per exesionem vasis talem afferunt.

i Cuiusmodi est vsus casei putris, & leporis marini.

k Presertim in biliosis.

l Vt vini generosioris vsu.

m Ad si sarcosim faciendam.

n Thorax enim tussi se expedire contendit omni molestia, & ventriculus  
vomitu, & cerebrum sternutamento.



## DE MORBIS INTERNIS

giuis tantum leui sputatione eiicitur. Aliis à capite defluit, non adeò paucus, niger, leuis, linguam & palatum commaculans, titillans, ad nares grumos relinquens, ex vulnere, frigore ebrietate, & capitis plenitudine. Qui si parte aliqua in arteria defluit, tusses irritat leues, facileq; gargarismis *a* adstringentibus supprimitur. Sanguis quoque aliquando euomitur à ventre, liene, hepate, proximisque venis niger, grumosus, multus. E stomacho vero aut œsophago admodum *b* exiguis eiicitur. Hæc omnia igit, priusquam remedia instituas, distinguenda sunt.

*Curatio sputi sanguinis è pulmonibus.*

*a* Ut ex decocto plantag. balau-  
sty. centino-  
dy, succo  
granatorum  
& aqua ro-  
sacea.

*b* Quia par-  
uas habet  
venas.

componenda

Inedia, silentium, leuis respiratio, ueneris & uini abstinentia, quies tum animi, tum corporis imperanda sunt. Medicatis alimentis utendum est, quæ morbo conueniunt.

Si à capite defluxio, supprimentia ex iis, quæ cap. de catharro dicta sunt. Componenda tussis, quæ vexat grauius. Sanguis viribus integris ex interna brachii, angusto vulnere, modica quantitate, sed bis aut ter una die, aut duabus detrahi debet: Si plenitudo in causa est, largius. Si suppressis mensibus vena cruris aperienda est, & aliis artibus mensis irritandus. Inicienda vincula coxii, & brachii, ad articulos & in eisdem locis adhibenda frictio. Cucurbitulae hypocondriis, ilibus, atque inguinibus affigenda. Sanguisugæ in pectore affigendæ sunt: tum remediis, qui intro assumuntur, & topicis utendum est.

Comparentur illa ex adstringentibus, portulaca, plantagine, poligone, omphacio, sumach, galla, cortice glandii; radice, rubis consolidæ, althææ, centauriæ maioris. hæmatite, electro, corallo, balauistiis rosis. Alius ordo. Bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, gummi arabico, tragacantha, thure, mastiche, uirrha, melle cocto. Hæc postrema ruptis venis magis conueniunt, ut illa apertis. Oportet autem vitare omnino, quæ nimium adstringunt. Propterea medicamenta hæc ex glutinantibus, adstringentibusque mixtis componuntur, ut si aperta vena est, adstringentia: si rupta, glutinantia superent. Sed quia horum vis non facile penetrat, necesse est aliquid admiscere eorum, quæ tenuium sunt partium, quæ

lia



sunt aromata, spica, cinamomum, santali, doricum, & similia ex 7. particularium compositi. Gal.

Atque ubi commodicè perturbat tussis, etiam narcotica misceri debent, opium, semen papaveris albi, semē hyosciami albi, & cicutæ, cortex radice mandragoræ, philonium, theriaca unius anni.

*Particularia remedia.*

Xenocrates apud Gal. hædi sanguinem nondum concretum cum pari mensura aceti elixabat, dabatq; tribus deinceps diebus. Dosis unc. 3.

Frequens usus antiquis, maximè initio, atque ubi grumorum suspitio, oxycrati diluti, idest, aceti ita commixti aquæ, ut bibi possit. Acetum quoque in usu fuit, sed animaduertenda sunt, quæ de oxymelite proximo capite annotauimus.

Coagulum cerui, hædi, leporis, Græcis & Arabibus hac in re commendatur, quod mirum esse possit, cum natura sit acri, digerente, & exiccante.

Auerroes, & Arabum familiæ parte aliqua refrigerare, adstringere, & reprimere scribunt, aut elementari qualitate, aut proprietate quadam. Certum est experimento, quod & Dioscorides scripsit, & in lacte probari potest, dissoluta coagulare, coagulata dissolvere. Deinde modica quantitate exhibetur, & ex iis, quæ vim acrimonie refrigerant.

Dosis ciceris magnitudo ex oxymelite, vel posca: si grumi dissoluendi sunt. Alioqui ex aqua ferrata, plantaginis, & similibus.

R. corrali rub. torrefacti, & in aceto extincti, terre sigillatæ, ana drac. s. spicæ C. s. cū 3. ii. succi portulacæ, aut poligoni, vini granatorum, lactis vstulati, fiat potus. Al.

R. carniū limacum coctarum in vini austeri, & aqua plantag. lib. ii. conseruæ consolidæ maioris & ros. ana lib. i. Cum decoctione limacum fiat distillatio in alambico.

R. supradicti distillati lib. i. coletur per manicā Hippocratis, cum sacchari dissoluti in aqua plantaginis unc. ii. santali, spicæ ana 3. s.

Vbi

*imodice*



# DE MORBIS INTERNIS

Vbi uiribus metuitur, expressioibus utendum est ē perdicibus, turturibus, quarum uentres adstringente materia sarciātur. Aut distillata hoc modo imperāda sunt.

R. conseruæ ros. cornorum, symphiti ana unc. ii. electarii diarhod. abbatis, diamargar. frigidi, triasantali, aromatici rosati ana drac. ii. spicæ, cornu cerui, coralli rubri puluerisatorum ana drac. i. s. trocisco. de terra sigillata, de carabe, de spodio ana ℥. iii. seminis acetosæ, portulacæ, plantaginis ana drac. i. aquarum portulacæ, rosarum, plantaginis, uini granatorum ana unc. iii. decoctionis duarum turturum, & unius perdicis lib. iii. cum mica panis albissimi infusi in uino granatorum, & carnis unius capi fiat distill. Coletur per manīcam Hippocratis, ut prius.

R. testarum oui, detracta mēbrana interiore drac. ii. pulueriscentur. Dentur ex aquæ plantaginis unc. iii. succi saluiæ unc. ii. sacchari rosati unc. s. detur ieiunis.

R. gummi arabici, tragacāthi assi, boli armenæ ana ℥. i. coralli torrefacti, cinamoni ana ℥. s. ex lacte cocto eodem modo succi ex supradicta materia ad unc. ii. aut iii. per se exhiberi possunt. Poterit inspergi drac. i. eorum, quæ comminui possunt, aut decoquuntur in aqua pluuiali, in lacte, in aqua ferrata, aut simili.

Similiter hordeata, lac amygdalinū ex eiusmodi liquoribus parari debent, idemq; pulueres inspergi possunt.

Admouenda thoraci, non quæ adstringunt uehementer (Horum enim uis ad pulmonem non penetrat, cogit quæ sanguinem in pulmones.) Sed iam uacuata copia, sedato motu, uinum adstringens cum oleo rosato, myrthino, cydoniorum. Hyeme etiam nardinum conuenit cum lana sordida in eo madefacta, & appressa pectori. Loco uini, aceti usus est Aestate bene carnosio corpore, robusto genere neruoso, nec urgente tussi.

*cataplasma* Ethure, terra sigill. bolo armena, oui albumine incorporatis cataplasmata sunt adiungenda thoraci, adiungunturque post usum lanæ sordidæ prædictæ. Quod si malum ex perfrictione ortum est, tapfia, sinapi, & quæ ex his conficiuntur medicamenta ex usu sunt. Oportet autem

tem



tem hæc permittere, dum calor medicamenti penetret. In grauiore tussi philonii aliquid imperabis, quod aliter Græcis, aliter Arabibus describitur.

*Philonium Græcorum.*

R. piperis albi drac. xx. opii drac. x. croci drac. v. sem. hyoscyami albi drac. xx. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri ana drac. j. excipiantur melle cocto.

*Philonium Arabum.*

R. papaueris albi, hyoscyami ana drac. xx. opii, terræ sigillatæ ana drac. x. hæmatitis lapidis, croci ana drac. v. castorei, spicæ, euphorbij, pyrethri, margaritarum non perforatarum, carabe, zedoariæ, doronici, galliæ moschatæ ana drac. i. camphoræ 3 i. cum melle ros. colato incorporentur. Dosis est à drac. s. ad drac. i. cum succo arnoglossæ aut uino diluto modica aqua rosarum.

Memnisse tamen oportet nunquam utendum esse eiusmodi narcoticis recens paratis, sed semestri spacium esse expectandum, aut eo plus.

Nec statim his utendum est, sed tentatis prius leuioribus remediis, & ubi natura robusta est. Multa ex quinto methodi colligenda sunt, quæ ad sputum sanguinis pertinent.

SCHOLI A.

Αναφορκοί, quasi ἀναφέροντες, sursum ferentes, & ἀιμοποιοί Græcis dicuntur, qui ex inferioribus partibus per os sanguinem reijciunt. Ex ore quidem & gingiuis si expuitione procedat sine tussi & paucus: è gutture, si cū sreatu: ex aspera arteria, si cum tussi leui: ex pulmone & torace, si cū tussi uehementi. Sed uehementior adhuc tussis est, cum è thora ce reijcitur, quia primū ad pulmonem trahitur, et inde per asperam arteriam deturbatur. Vomitu redditur è uentriculo, siue è cerebro defluxerit, siue ibi concreuerit, aut casu, uel percussione uel erosione cumulatus fuerit. Interpres tamen Coacorum præfagiorū ita habet. Qui spumosa sanguinē euomit dolore infra septū trāuersū nō existente, de pulmone uomūt. Et quibus quidem magna in ipso uena rūpitur, multū uomūt et in periculo uersantur. Quibus uerò minor, minus educūt, et securiores sunt. Quāquā Galenus refert quendam in palestra

grauis



## DE MORBIS INTERNIS

gravi plaga accepta, ferè duas cotylas sāguinis tussiendo expuisse, qui statim secta uena, & adhibitis iustis remediis conualuit, & in posterum superuixit. Ergo ab apertitione uenæ aut ruptione in maiore quantitate reijcitur, idq; tutius est, licet non sine periculo. Ab erosione uerò, in exigua. Hoc deterius, sereq; primum iussim siccam excitat & magnam: aliquando copiosior, cum uas insigne exesum cum ulc re pulmo-  
nis, & lateris sinistri dolore, unde sequitur tabes. Distingue-  
dum etiam diligenter an acrior sanguis & uitiosior distilla-  
tionem excitet, & in pulmonem confluat, unde fiat erosio: an uitio pulmonis & imbecillitate excrementum ibi colliga-  
tur, quod putrescat: an suppressi menses, aut consueta ali-  
qua uacuatio. Cum reijcitur niger & concretus, & ante flu-  
xit è naribus, indicium est è cerebro in pulmonem profluxis-  
se aut asperam arteriam. Cognoscitur autem à carne seu pro-  
pria substantia pulmonis ulcerata exire, duobus signis cer-  
tissimis. Vno si sit spumofus, ut scribit Gal. Apho. 13. lib. 5.  
& 30. lib. 7. modo tamen spuma firma maneat. Nam aliquā-  
do uenis ruptis, aut thorace ulcerato licet rarò, & non neces-  
sariò, spumofus expuitur sanguis, si agitatio quedam ac-  
motus accedat, unde spuma illi inducatur. Sed hæc cuiò cua-  
nescit. In Pleuritide etiam rarò spumofus, licet id aliquando  
contingat. Alium est, si caruncula & ramenta uasorum si-  
militer excreta, & propriam uisceris substantiam referentia  
simul appareant. Spumofus autem est, quia leuis, tenuis, ae-  
rius & spirituosus sanguis, quo nutritur pulmo, quibus acce-  
dit motus, & aeris inspirati commotio. Lege cap. 6. lib. 4. de  
locis affectis, signa, Math. 5. Particularia remedia. 7.

Remedia sunt Phlebotomia, potus aquæ, silentium, parcis-  
sima uita, exigua respiratio, frictio & uincula extremorum  
Potiones ad reprimendum sanguinem, Cucurbitula in regio-  
ne hepatis, epithemata, unguenta, condita, linimenta, syru-  
pi incrassantes, ligatura, coctio materia, Purgatio, dissoluen-  
tia sanguinem coagulatum, cientia spuii. In erosione prius-  
quam sanguinem expuant, ad diuersionem angusto forami-  
ne uena secunda, purgandum, diuertendus catarrhus, caput  
& pulmones confirmandi. In multitudine humorum è thora-  
ce expurganda habeatur rō, ne materia supprimatur, neve  
sanguis



sanguis irritetur. Et si usu adstringentium supprimatur spu a Quæ sit p  
tum, fiatq; difficultas spirandi, statim ad lenientia redeun- anastomo-  
dum. Oxyml & aceti suspecta, si puer, aut mollis æger, maci sim, est quæ  
lentus, nervoso genere imbecilliore, asperiore tu, si, sputis cras funest a ma  
sioribus, aut liquidioribus, ægro debili, & sene. Frequenter re gnitudine  
petenda phlebotomia, si ulcus non est, si recens malum & non causa, ut di  
inueratū, si vires firmæ. Galenus enim 4. Methodi post qua stillationi  
tuor dies à sputo sanguinis, hoc remedium prætermisit. E fau catarrhi è  
cibus & tonsillis, minus periculi: ab arteria plus: à pulmone capite, ulce  
plurimum. Inde enim suppuratio, & tabes. re pulmonis

De a Phthisi.

Cap. XXVI.

**P**hthisis ulcus b est pulmonis, quod ferè c sputum san tu calamito  
guinis sequitur, aut tussiculam d ex acriore defluxio sa ui, ob  
ne. Aliquando etiā ruptos abscessus thoracis, cum, uide marcorè to  
licet effuso pure in spatiū thoracis atq; ita putrescente, tius corpo-  
nec in tempore repurgato, pulmones exulcerantur. ris: difficul

Signa phthisis cum ex aliis, tum ex Hippoc. & Gal. tate curadi  
Apho. 60. 2. in Prognosticis, & cap. 14. lib. 2. cronion quod ulcus  
Aureliani. pulmonis e

Phthisim sequitur totius corporis e languor atque rarineq; at  
extenuatio, f curuantur ungues, cauantur oculi, succe- pp ppetuū  
dit mortifera g illa fascies, h capilli defluuium sequitur, eoru motū,  
alui profluuium, & mors. nec sarcoti

Hoc malum, ut incurabile, maxima pars ueterum ca eo integris  
Medicorum in nulla spe habuerunt. uiribus pdu

Itaque initio abstergendum atque i resiccandum. ci possunt.  
Vbi iam satis detersum est, atque iam nihil saniosum b Solutio cō  
repur- timu cu sor

dibus et ichore coniuncta. c Rupta in pulmonibus uena.

d Per theorema illud. Quæcūque distillationes à capite tussiculos & rau-  
cos homines reddūt, nisi temporis progressu conquiescant, alteram fa-  
ciunt tabis differentiam.

e Quia aer qui inspirando ducitur tabificā acquirit in pulmonibus quali-  
tatem, & quod ulcus ptirion a sit, febrisq; in corde accendatur.

f Exhausta digitorum carne.

g Hippocratica uulgo dicta, depicta lib. 1. Progn. h A siccitate  
partis exhausto alimēto, aut cibi uitio naturali facultate labefactata.

i Ichorem & saniem.

K



DE MORBIS INTERNIS

**a** *Quæ fit  
ptirriomate  
febre & æ-  
ris infectioe.  
b Si picro-  
cholos non  
sit ager.  
c Venæ se-  
ctio, si ægri  
vires ferāt  
celebrari po-  
test ad ardo-  
ris febrilis  
extinctionē  
et catharri  
auersionē.  
Interī cibū  
dus sit ager  
hordeato,  
detergendū  
ulcus: si qui-  
dē ager fue-  
rit tempera-  
mento frigi-  
dior & si sit  
hyems, hy-  
dromelite  
simplici aut  
cōposito ex  
bechio, sca-  
biofa si aut  
fuerit biliosi-  
or, aqua sac-  
charata aut  
hydromeli-  
te dilutiori*

**d** *Vel ex electario diaireos, saccharo cando penidys.  
Et rutulina carne, pullis gallinaceis.*  
**c**

repurgatur, glutinare oportet. Sed dum hæc fiunt, **a** ex-  
tenuatio corporis instauranda est. Vtemur ergò mulsa  
**b** initio ex aquæ potabilis lib. i.  $\frac{3}{4}$ . i. s. mellis. Per omnia  
ubi detergendum, melle crudo utendum est: ubi gluti-  
nandum, melle cocto. **c**

Postea uerò sœnugræci loti, subinde abiecta priore  
aqua, decoct. utemur, in qua octaua pars uel sacchari, in  
calidiorē conditione: uel alioqui mellis dissoluitur.

Similiter **d** frictio lini semine, è ciceribus rubiis, è  
nuce pinea resinosa, ex iride illirica, aristolochia, porrò  
& similibus descriptis in cap. de asthmate. Alioqui cum  
quadruplo melle elegmata fient, tritis atque in pulue-  
rem redactis, quæ comminui possunt. Cicer rubrum in  
aqua madeat, atque ita tumebit: tum siccari debet, tor-  
refieri in latere calente, teri subtilissimè. Eius pulueris  
drac. ii. insperguntur mulsa, aut concorporantur melle.

Marrubii M. j. decoquitur in libr. vj. aquæ ad dimi-  
dias. Colaturæ addi debet lib. j. mellis, plus minusve,  
idque totum decoquitur ad crassitudinem.

Et succi marrubii  $\frac{3}{4}$ . ii. succi caulium, scyllæ, hyssopi,  
& similibus, & mellis lib. i. Coctis fiunt elegmata, quo-  
rum vim augeri uolunt, si drac. ii. pulmonis uulpis ad  $\frac{3}{4}$   
elegmatis admisceas. Nucē pineā, resinosa cum unc.  
i. glycyrrhizæ decoques in lib. vi. aquæ. Col. addes peni-  
diorū un. iiii. rursus coques ad crassitudinē. Conuenit,  
ubi tenuis sputatio est, cūq; lenire & coquere oportet.

Similiter è butyro, melle & terebinthina, duobus ho-  
rum, aut tribus mistis.

Variandaq; remedia eiusdem generis, ne fiat satietas.

Diuersi uerò generis, cum mutantur indicationes.

Atq; dum hæc fiunt, hordeatis cū saccharo, aut mel-  
le, lacte amygdalino, uino albo, tenui, & subdulci, la-  
cte aliisque rebus, quæ vires resouent, utendum est.

Iam purgato ulcere, instauratis uiribus, alimentis  
e partim mediæ materiæ, partim resiccantibus & gluti-  
nantibus



nantibus utendum est.

Gestatio mollis conuenit, aer siccus, balneum dulce, inunctio, theriaca, mithridatium, emplastra siccantia adiuncta pectori. Dropaces atq; et a Sinapismi conueniunt b bolus armena, terra sigillata & similia i peranda sunt. Hæc ferè placuerunt ueteri Medicinæ. Polteritas Medicorum eadem obseruauit: qdam et addidit. Lacte c plurimum usa est asinino, & caprino: in summa serosum cum detergendum est. Ouito, uaccino, muliebri, cum refouendum est: ustilato uaccino, aut et cum aqua pluuiali cocto, cum glutinandum. Itaq; initio asinino & caprino cum modico mellis, ne cogatur aut acescat in uentri culo, modico quoque salis utendum est. Refouentur uires lacte muliebri, quod exugat æger è mamma mulieris. Alioqui uaccinum bibat recens emulctum, cum modico sacchari. Hordeata quoque, & lac amygdalarum ex lacte, uel pullorum decocto confici debent.

Refouendis uiribus lactis cremor cum multo saccharo conuenit. Vbi glutinandum est.

R. lactis lib. i. aquæ pluuiialis, in qua rosæ maduerint unc. iii. Simul bulliant, subinde ferro candente aut calibe intincto. Alioqui.

R. lactis à quo butyrum extractum sit, lib. s. teneatur nocte una sub dio Fortiter agitur & despumetur, cui adde sacchari rosati unc. s. boli armenæ drac. i. sæpe utatur. Hoc modo igitur uteris lacte. Saccharum rosatum maximè cõmendatur initiis recens. Cum glutinandum est, ueteri potius utemur. Similiter conserua rosarum & syrup. ros. Cõserua datur per se, aut cum syrupo myrtillorum, aut aqua hordei, in qua cancri fluuiatiles coxerint. Cancrini crudi feruefacti prius in aqua, & repurgati in quadruplo lacte uaccino, aut conuenienti concoqui debent ad dimidias. Deinde caudæ de squammatis, uel per se comeduntur, uel integrè contunduntur, & inde succus in lac, in quo coxerint, exprimitur. Bibitur lac hoc, aut inde amygdaloga, uel hordeatum. Comparatur maximè, ubi uiribus consulendum est.

Tumque aliquando uitellum oui una dissoluimus.

K 2 Coqui

a Ad mouē  
di capiti  
ad exhaui-  
riendū for-  
tem catar-  
rhi.

b Hæc ad si-  
stendam flu-  
xionem.

c Lactis vi-  
sus concede-  
tur, si nulla  
sit febris ex-  
cusatio, si  
non sit hor-  
borygmos,  
idest, si non  
sint flatu vi-  
scera distē-  
ta, & sit æ-  
ger ventri-  
culo frigi-  
diore, nec  
sit cephalal-  
gicus.



## DE MORBIS INTERNIS

Coqui possunt ex aqua hordei. Testæ uerò cancrorum in fictili uasē cremari debent, & glutinando asseruātur.

Eodem modo limaces & testudines præparant. Verū oportet diligentius multò repurgari.

Pulmo uulpis in frustula diuiditur, abluatur ex uino, incoquitur leuiter in aqua rosarum, decocto sumach, aut simili. Rursus lauatur, siccatur. Vfus tempore in puluerem redigitur. 3. ii. cum syrupo myrtillorum exhibentur. Vel hoc modo.

R. pul. pulmonis uulpis, capill. ven. sem. fœnic. an. 3. ij. incorporentur cum succi liquiritiæ 3. ij. mellis. coct. quantū sufficit, cū affusione modici syrupi de myrtillis.

Consolidant hæc. Caseus recens, lac ustulatum, testæ cancrorum, bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, olibanum, mastix, carabe, gūmi arab. corallus, rosæ, balauſtia, myrtha, & alia eiusmodi. Dantur ex uitellis onorum, & alia quædā ex lacte ustulato, succo cydoniorum, rosarū, granatorum, syrup. myrtillorum rosato de siccis. Est quoque hic Philonij persici usus, quod proxime descripsimus. Nutriendū aliquando iure galli decrepiti, alterati cum herbis, & cæteris rebus quæ cōueniēt.

Conueniunt fructus, ficus, uuæ passæ pistacia, nuclei, pinei, dactili dulces, pira cocta, & sacchi. cospersa.

Videndumque maximè circa initia, ne nimium siccantibus utimur, quibus cum uolemus uti, lenientibus commiscebimus, aut multo liquore diluemus. Distillatum refouendis uiribus conuenit.

R. conseruæ borrag. uiolarum, ros. an. unc. j. s. conseruæ ireos, enulæ an. unc. s. elect. de gēmis sine speciebus, diarhodō abbatis, triasantali sine camphora, diamarg. frigidi an. 3. ij. margaritarum perforatarum, coralli, ambræ citrinæ an. 3. j. passularum, ficuum, sebestem, liquiritiæ an. 3. vj. nucleorum pini, amyg. an. unc. s. gummi tragacanthi, gummi arabici, an. 3. ii. sem. anisi, fœniculi, urticæ, quatuor sem. frig. communium, sem. papaue-rit albi an. drac. j. terræ sigillatæ, boli armeni, rosarum siccarum an. drac. iij. aquarū Pimpinellæ, vngulæ cabalini an. unc. iij. decoctionis limacum, cancrorum, duarū  
iuuenum



iuuenum gallinarum an lib. i. cum carnibus unius capī iuuenis bene pinguis, unius perdicis, mica panis in uino odorifero infusi, & lib. j. sacchari albisimi fiat distillatio. Desperatos urunt, aut relegant ad mare.

## S C H O L I A.

Phthisis, pro tabe & atrophia qualibet aliquādo sumitur. Significat enim syderationem quandā & marcorem, siue extenuationem, apotū phthimin, ita ut nōnunquā etiā ad oculi affectus traducatur, praesertim pupillae. Quatuor tamē praecipuae species reperiuntur apud Hippo. & Galen. Renalis. lib. de Morbis internis. Dorsalis, 2. de Morbis Extenuatio sine pulmonis ulcere, ab eius tamen calida & sicca intemperie, aut febre hectica, quarta, quae omnium maximē propriē phthisis dicitur, Atheniensibus Phthoe, ab ulcere pulmonis. Haec, duo perpetua habet symptomata. Febrē lentā, paruā, putrē, quotidianā, noctu magis, quā interdiu affligentē, quae oritur à putredine humoris, aut propriae substantiae pulmonis, unde calor ob uiciniam cordi necessario cōmunicatur. Deinde extenuationem totius corporis, colliquatis nimirū, & cōsumptis carnibus, ac solidis partibus supramodū re siccatis, tū ob febrē, quae corpus perpetuo depascitur: tū ob deiectiones humidiores, et crebros sudores, qui inde cōsequuntur. Exulceratiōis pulmonū causae multae esse possunt, sed duae praecipuae, & frequentissimae, sputū sanguinis repressum nec expurgatū, & defluxus pituitae falsae a cerebro calefacto. Praecedit tussicula, pūctura quaedā ad latus, mammillas, scapulas, titillatio faucium, praeter cetera signa superiore capite explicata. Familiaris est quibus oblongū collū, angustus thorax, caput infirmū sublimes scapulae, & aquā alae, unde phthinodis et pterygodis. quasi alati nominantur. Apud Hippo. & Galenū tria in hoc affecta reperiuntur mortis certissima signa, Sputū grauiter olēs: capilli defluentes, alui profluiuiū. Quae tamen tū ad curationem, tū ad praedictionem diligenti egent distinctione. Primum in tabescentibus aliquādo gingiuae, & os exulceratur fluxione, & pituita grauis defluit à cerebro, unde sputa grauiter olent, quae tamen mortem proximam non indicant. Deinde alui profluiui quibudam accidit deficiente natura: alijs conuersa distillatione in stomachu, quibus solet tussis immi-

Apho. II.  
12. 14 lib.  
5. & 167.



# DE MORBIS INTERNIS

nui: ceteris alia occasione, atque id nō semper lethale. Idē in iudicium de capillorum defluuio, quod humorū vitio, & capitis cachexia fieri potest. Ita igitur accipiendum. Si sputum e pulmone educatur, & vel carbonibus inductum, ut vult Hipp. in Aph. uel, ut Philot. exceptum uitro et impositum prunis, ut incallescens vaporem edat, egro & assidentibus manifesta grauitatem et cōtagiosum halitum inspiret, lethale est. Ostendit enim putredinem, & κακὸν θάλασσαν. Deinde grauis halitus cor vicinum ledit, unde mors celerior, siquē malum est, & ut causa, & vi signū. In Coactis præsagis inde etiā mortis aliud signum colligitur. Si, videlicet, sputum iniectum aqua marina & neo uasi inclusa, in fundum mergatur. Idem demonstrāt capilli defluentes ob siccitatem, uel uirium imbecillitatem, & humida deiectio, ob potentie debilitatem, ut ait Galenus. Ad dicitur in Præsagis, si suppresso sputo mens ad nugas et delirata uerba commoueatur. Formula enim mortis in Tabidis est, cum sputo retento uel ob copiam, uel uirium imbecillitatem, uel astringentium usum, obserantur uiae spiritus, unde agri strangulantur. Tandiu enim uiuunt, quandiu pulmonem per sputa expurgant. Atque etiam hinc efficitur, ut Autumnus, Ver humores fundendo, & omnes conuersiones insignes Tabidis infestissimae sint, adeo ut his uulgus ipsum saepe mortem denunciet, solis arborum cadentibus aut renascentibus.

Coquere oportet, tenuare, diluere, expurgare, detergere, siccare, glutinare, instaurare corpus, catarrhum auertere, confirmare cerebrum et pulmones, uitare, quae deorsum purgant (nisi materia fluente) quia sic sputum & pus retinetur, materia motu alio reuocato, & corpus magis consumitur. Phle-

a Palpitatio botomia non conuenit ulcere facto, nisi noua fiat expuitio, cordis, quae aut uenae alicuius recens apertio metuatur, & uires ferant. adfert frequēte syn- Remedia sunt Syrupi, Potiones, linimenta in pectore, conser- uae, fumigia pulueres, lohot, hordeum mundatum, lac asini- copem est in num, Balneum, & similia.

sanabilis, et  
quae fit ex  
cōmisione  
pericardij  
cum corde.

De a cordis tremore seu palpitatione. Cap. XXVII.

Almos, quem formidinem quidam ueterum appel-  
lār, motus est praeter naturā ab excretrice incitatur,  
cum id quod nocet, aut nocere uidetur, expellere contē-  
dit.



dit. Idipsum uerò aliquando aqua est concepta cordis a *ut in gallo*  
 panniculo præter modum aucta. Aliquando uapor qui- *dissecto ob-*  
 dam crassus cordi inclusus : alias etiam aliunde importa *seruasse se*  
 tus, ut è matrice, uentre, & proximis uisceribus. Interdū *tradit Gal.*  
 uenenosus per arterias & uenas illatus. Inflammatio *cap. i lib. 5.*  
 quoq; & a tuberculum palpitacionis causse esse possunt, b *Cuius si-*  
 ut & intemperies. Quæ omnia ex cordis b *temperamen*  
 to, totiusq; corporis antecedente uita, & aliis signis con *gna pete ex*  
 iectura artificiali c distingues. *Gale. micro*  
*tegni.*

Curatio.

c *Ut ritè cu*

Si sanguinis d copia in causa est, si aqua concepta pan *rationē in-*  
 niculis, si e inflammatio, aperienda est uena f dextra ba *stituas. Nā*  
 silica. Auicennas & Arabes dextram, si sanguis causa est *ut sūt causæ*  
 sinistram basilicam, si g uapor, aperiunt. Sinistra quoq; *sic & mor-*  
 aperiri potest, si materia non uentriculis cordis, sed cor *horū ideæ et*  
 pore concepta est. Quod si malum ab inferioribus par- *ut morbo-*  
 tibus inuehitur, aut insignis plenitudo est, uenæ crurum *rū ideæ, sic*  
 secari debent. *uaria reme*

Gal. quinto de locis affectis omnes adiutos phlebo- *diorū gene-*  
 tomia scribit, & extenuate uictu, quibus cor palpitabat. *ra instituē-*  
 Id at quia uerisimile sit uaporem esse crassum, unde cor *da sunt.*  
 palpitat. Neq; inutilis est purgatio, si cacochymū corpus d *ut in iuue*  
 est. Si quidē ex uitiosa materia excitatus uapor palpita- *nibus q ex*  
 tionem inuehit. Quod ad reliqua attinet, distinguendū *ephebis ex-*  
 est, sitne causa frigida, an calida, (ut inde ratio uitę insti *cessere ob hæ*  
 tuatur, quæ uim medicatam habeat, & malum corrigat. *morrhag.*

Materia itaque calida, ambra, storax, calamintha *naturalem*  
 moschus lignum aloes, cariophyllum, cinamomum, cor- *suppressam*  
 tex citri h citrangelorum crotus, nux moschata, macis aut i *mulie*  
*sem. ribus, qbus*

mensēs nō respondet, aut q̄s qui hemorrhoidibus laborarūt aut qui uino se  
 & carnibus inuitarunt multis. e Quæ pulsu duro & febre dignoscitur.  
 f Ut reuelatur sanguis xat' uētr. g Qui ducitur per os secundū arteriā  
 uenosam parte sinistra, aut hypochondrio sinistro per arteriam celiacā.  
 h Ut R. corticis citri conditi, myrobolan. cond. stor. orengiæ cond. nuc s  
 moscata cond. conseruæ anth uol. bugloss' an. drac. ij specierum diamarga  
 riti calid. aromatici rosati, leuitie Galen. an. ʒ s. sacchari rosati ad pon-  
 dus omnium. f. trochisci Dentur bis in die e cochleari.

K 4



# DE MORBIS INTERNIS

*a Vel R. cor* sem. maiora, basilici, uinum aromaticum, odoriferum, *nic. citri con* enula, fœniculus, petroselinum, galanga, zedoaria, amo  
*dit, cōf. bor* mum cardamomum, cubebē, rosmarinus, mentha, po-  
*rag. melissē* linum, calendula, teriaca, mytridatium *a* potio moscha-  
*an. drach. s.* ta, electarium lœtificans Galeni, diambra, diamargaritō  
*confect. al-* calidum, diarhodon cum speciebus, alipta moschata, gal-  
*chermes, my* lia moschata, pliris sartoricū, capus, perdix, & uolatilia.  
*thridatij ve* Eiusmodi, confixa lardo, consperso prius cinamomo as-  
*ter. an. 3. i.* sa cum aspersione uini aromatici.  
*f. bolus de-*  
*tur sub ho-* *Frigida meteria.*  
*ram somni.* Violē, nenuphar, rosē, santali, camphora, acetum, om-  
*b* phacium, berbetis, cerata, & pruna acidula, acetosa, suc-  
*et R. suc* cus malorum granatorum, pomorum odoriferorum, ace-  
*corum depu* tofitas citri, limonum, citrangelorum, persica, carabe co-  
*ratorum bo* riandrum præparatum, cydonia, pira lac acetosum, dia-  
*rag. acetosē* rhodon abbatis sine speciebus, diamarg. frigidum, tria-  
*endiuia, ci* santali. Condita ex his, ut conseruæ & b syrapi. Ambī-  
*tri, pomorū* gua, aurum, argentum, margaritę, coralli, os de corde  
*odorise. an.* cerui, rasura, eboris, cornu cerui, unicornis, fragmenta  
*vi. 3. sacca.* hyacinthi, sinaragdorum, blattæ bizantię, sodium, doro-  
*q. f. f. syrup.* nicum, melissa, borrago, buglossum. Sed horum quæ-  
*ritatur bis i* dam ad frigida, quædam ad calida referri possunt. Ex his  
*die cū aqua* trochisci comparantur, sunt & epithemata, poma odori-  
*de coctionis* fera, itragulæ & uestes suauī odore imbuuntur. Portio  
*acetoselle.* nes conficiuntur, quæ & palpitationi cordis, & syncopæ  
*c ut R aqua* conueniunt.  
*rū scabios.* Auro & argento sic utēdum est. Calefiāt in medijs car-  
*acetos. bugl.* bonibus: deinde quadragesies recalsacta extinguantur  
*ros. meliss.* in vino aut liquore conuenienti. Liqueor postea bibitur.  
*ana vnc. 3.* Horum quoque uim relinqui uolunt, si conseruantur in  
*santal. om-* uetere uolatilium, dum elixantur aut assantur. Retinen-  
*niū, trochis.* tur, & salina deglutitur. Hoc modo argentum sitim le-  
*de cāphora* nit. Alii tenuissimis bracteolis, quę folia uocant, & inde  
*serup. ij. f.* condita electaria uegetiora reddunt. Rursus alii in pul-  
*Epithema* uisculum tenuissimum comminuunt, & ita cum iusculo  
*pro corde.* gall. decrepti, cū collatitiis expressionibus distillatis ex-  
*d Hoc com-* hibent. Sed hæc metalla uenena credita sunt antiquis.  
*mētum est.* Est & aurum d potabile in eundem usum.

Omni-



Omnibus partibus uim quandam naturam insitam esse, quæ quo offendit, quod ad fieri potest, à se propellat, haud dubium est. Omnium tamen non eadem ratio. In epilepsia, ster-  
nutatione, uomitu, id contractione efficitur: in tussi, efflatio-  
ne. In cordis autem palpitatione fieri suspicari licet. Concuti-  
tur enim cor, & ueluti tremulo quodam motu afficitur ob  
causam noxiam tanquam ingressum repente hostem formi-  
dins, aut superaturum, aut præ imbecillitate languescentem  
sibi cessurum. Neq; tamen negamus uera & propriè dicta pal-  
pitatione, de qua Gale. agit, cor affici, idest, dilatarì & infla-  
ri præter naturam à substantia halituoſa & copiosa, cū per-  
spirare non potest: subsidere autem, ubi foras extrusa fuerit,  
aut ut alij uolunt, palpitationem cordis in diu quandam  
esse dispositionem inter pulsum & imbecillitatem. Sed non  
ideo dilatatur, quia impletur: aut subdit, quia uapor foras  
truditur. Verum cum uaporem aliunde irruentem, uel in se  
genitum præ imbecillitate dissoluere, aut arcere nequeat, mo-  
do dilatatur, modo contrahitur in se, quia stimulat, &  
palpitatione excutere nititur quod nocet, donec liberum ha-  
beat motum, uel omnino deficiat. Vnde sæpe syncope, aut mors  
repentina consequitur, præsertim si causam intra se præsen-  
tem semper habeat. Inde enim cū & frequentius, & uehemen-  
tius irritetur, tandem repente succumbit. Ob id optime Hipp.  
Qui frequenter ac fortiter absque causa manifesta deficiunt  
animo, de repente moriuntur. Quod ad cordis palpitationem  
etiam, quæ sæpe syncopem antecedit, iure accommodare uide-  
tur Galenus. Excitari autem potest à tuberculo, abscessu,  
multo sanguine obstructionem faciente, intemperie calida,  
uermbus cor uellicantibus, ut uult Mesue, subita uacuatio-  
ne, impregnatione, inflammatione, aqua, tunica inclusa & hu-  
more putri ac malè olente plena, lapillis, uenenosa qualitate  
spirituoso halitu, siue ab externis, siue ab internis, siue in uen-  
triculis cordis siue in substantia, siue in pericardio, siue in ar-  
terijs causa subsistat, siue accidat extrinsecus ut utero, liene,  
hepate, uentriculo. Quæ oia diligentissime ab authore obser-  
uata sunt. Archidiaconi cuiusdam, hoc malo interempti cor-  
pore dissecto abscessus in substantia cordis inuentus. In al-  
terius



## DE MORBIS INTERNIS

terius pericardio, aqua. In Britone quodam, inflammatio cordis. In alio, abscessus in vena arteriosa. In multis, pericardium flatu distentum, qui tandem solet in aquam concrecere, nisi cordis calore dissoluatur. In muliere, quæ quatuor menses spatio incredibili urinae cruciatu laborauerat, duo calculi reperti in corde cum multis abscessibus, integris renibus & vesica. Sed notatu dignissima historia Præsidis primarij Rhotomagensis, nomine (Remon) Ab ineunte ætate ad annum quinquagesimum quintum, quo obiit, cordis palpitatio ne corripere solebat, præsertim à somno meridiano, & ubi arctius tibiae constrictas habebat. Sensus quidam tremulus erat ad carotidas hinc pulsus vel nullus, vel parvus, & sine ordine. Soluebatur paroxysmus edito crepitu, ructu, clystere dolore in medijs claviculis excitato, deinde in fronte, vel iussu satis violenta sponte mota. Relictis tibiæ vinculis, & somno melius habebat. Eadem symptomata in muliere nobili apparuerunt. Vtrisque hepar calidius, ventriculus frigidior. Hinc multa fuliginosa excrementa, spirituosusque vapor & crassus in arterijs, interceptus continebatur, qui in cor exhalans, incutiebat tremorem & palpitationem, donec metu, attritu, aut calore (quod ad id non sufficeret facultas vitalis) dissolueretur, aut alicunde exitum haberet. Ob eandem causam Ictericis, Splenicis, Melancholicis ferè omnibus, cachexia laborantibus, puellis & similibus solet contingere, vapore flatuoso educto ex vitioso humore. Eodem modo Galenus refert ex balneo & vitiosis lignis succensis mulierem solitam animo deficere. Alteram ab vteri affectibus idem pati. Cuidam, si vel per horam lauaretur, idem accidere, nisi prius panis aliquid assumpsisset. Hominem, dum exoluere-tur, & cor fortiter palpitaret, repente interisse. Sed omnibus neq; eadem causa, neq; eadem pars affecta. Modo enim in ore stomachi, modo in corde fit principium defectionis animi. Palpitatio quoq; non semper causam habet in corde, sed pars aliqua affecta est, cum qua mutuum habet consensum, ut pericardium, & arterie, præsertim maiores & viciniores, inde vterus & similia. Causa autem modo per se morbum efficit, ut tuberculum, aqua, inflammatio; modo aliquid commo-net, quod morbum efficiat, ut balneum & ligna succensa in muliere,



muliere, cuius meminit Galenus, & hepar ac ventriculus in Præsidi Rhotomagensi. Quam causam Hippocrates manifestam appellat, Aphorismo adducto, sicut priorem non manifestam, à qua periculum mortis repentinæ imminet, non ab altera, licet tandem quoque interficiat. Ob idque vitam Præsides ad 55. annum produxit, cum ceteri eodem morbo, sed causa dissimili, brevi perierint. Frequenter hoc modo fit, Sympthia aliarum partium, præsertim quibus arteria magna insidet, decubitu in dorsum & renes, usu vaporosarum rerum, animi vehementi perturbatione, accedente cordis promptitudine per intemperiem calidam, pestilentiali acre, sætido halitu & venenoso, venenis, tumore vehementi & similibus. Pulsus & in morbo, & in valetudine evarians, ut è magno in paruum, veloci in tardum, raro in frequentem, affectum cordis indicat, tantò periculosiorem, quanto vel frequentius corripit, vel magis continuus. A flatu fieri indicant repentina accessio, asthma, motus tremulus in genis, aut alia parte, dolor subito accedens, & desinens, obtenebratio in oculis sibilus aurium. Ab alijs causis, intemperies corporis, symptomata, & similia.

Remedia sunt victus attenuans, exiccans, medicamenta alterantia, cordialia, purgatio, phlebotomia, pilule, opiate, condita siccioribus naturis: humidioribus trochisci & arida, epithemata, vel potius sacculi, syrupi, clysterum usus præsertim in paroxysmo. Celerius enim vapores renocant. Frictio è linteis, quæ conceperint odorem pulveris violati, sortis inspiratio, ut gementium, contentis in ore cordialibus antidotis, quò magis penetraret qualitas, illitus arteriarum, ubi magis pulsant, & affricatio per medicamenta cordialia, vaporatio. Phlebotomia & victu attenuante curabat Galenus. Quod optimum est in crassiore sanguine & uapore. Omnes tamen scribit ante senectutem mortuos, vel syncope, vel alio genere morbi. Vitentur vincula extra accessionem, astrictio à uestibus in uentre, thorace, iugulo, alis, inguinibus, & ubicuq; in signia vasa, præsertim arterie. Si in febrē acutā incidat, corripuntur syncope, ut in vacuationibus imperādis & balneis maxima cautio esse debeat. Ob idq; ad periculi prædictionē, ut in Medici culpā mors reyciat, interrogandus ager in morbis.

Nam



## DE MORBIS INTERNIS

**a** Ex spiri- Num per sanitatem aliquando soleat exolui aut palpitare  
 tuū & par cor. Sæpe etenim, dū sanguis mutitur, purgatur, & ea fiunt,  
 tium solida quæ ex ratione morbi oportet, syncope intercepti moriuntur.  
 rū corru-

De Syncope. Cap. 28.

**S**yncope est a præceptis uirium lapsus ex insigni b spiri-  
 alteratione tus euacuatione, alteratione, c interceptione. Euacua  
 in quorū cō tur spiritus, quia subtilior factus est, quia corpus rarius  
 moderata q̄ est, in acri uehementique calore. In d uehementi animi  
 titate & motu, cum iis e quæ excernuntur immodice, doloris  
 qualitate ui grauitate, morbi magnitudine, fame, abscessus f subi-  
 rium robur ta eruptione, & maxime in parte principe, aut quæ arte  
 consistit. rijs plena est; neruo, aut neruosa parte, affectis longo la  
 b Tum etiā bore, ore uentriculi insigniter affecto, uel ab humorum  
 generatio - frigidorum copia, uel ab humorum acrimonia, lentore,  
 nis priva- crassitie. Aliquādo etiam intemperie. In cruditate, quā  
 tione, yper- sequitur alui solutio, intemperie partium principum &  
 catharsi. consentientium. Vteri affectibus, intemperie calida &  
 c Vt animi sicca nimis attenuatis humoribus, uitalis uirtutis imbe-  
 perturbatio cillitate Alteratione uerò, intemperie totius corporis,  
 ne, respira principiorum, & earum partium, quæ consentiunt, cor-  
 tionis diffi ruptione, uel ab aere pestilente, uel à uenenis externis,  
 cultate, in- ab internis humoribus uenenosis, à materia putri reten-  
 signum ua ta in uentre, & intestinis interclusione: ab humorum co-  
 forū ebstru pia, à crassitie & lentore humorum, qui uias spirituales  
 ctione. intercipiunt. Distinctis causis curationem institues, col-  
 d Vnde re- ligesq; ex primo ad Glauconem, quæ ad hanc rem per-  
 pētinus na- tinent. Similiter & ex 12. Methodi medendi.

riui caloris

Curatio.

**In** euacuatione, refouendæ sunt uires, pauco alimen-  
 to dato interuallis, g distillatis, expressionibus, gelati-  
 e Vt deie- na, h iusculis, uino, aromaticis.

Etioribus,

Pului-

uomitationibus, cholera morbo, sudoribus magnis. f Vt pulmonis vomica  
 aneurismate rupto: hepatis quoq; vomica: vacuatione repentina hy-  
 dropis aut empyematis. g Ex conseruis cardiacis, pulueribus, seminibus,  
 floribus, fructibus. Vt ex conseruis horrag. bugloss. anth. nuce moscata & id  
 genus reliqua. h Diffecatur in frusta capus aut coxa arctima, et coquitur  
 in phiala bulliēte in uase magno aquæ pleno, datur cu amphallio limonū.



*Pulvisculus cordialis.*

R. marg. splēdidatū ℥ ii. rasuræ eboris, ossis de corde cerui an. ℥ i. unicornis G. iiii. sacchari uiol. drac. ii. Vtāt medio cochleari cum syrupo de acerositate citri. Alius.

R corticis citri drac. i. margarit. splēdidarum ℥. ii. sem. citri conditi, sem. melosium, & acetosæ ana ℥. ii. limaturæ auri, fragmētorum smaragdi, hyacinthi, saphiri an. ℥ i. sacch. ros. drac. iiii. misce, detur mediū cochleare cum uino albo, tenui, odorifero, & parum uinoso diluto cum aqua, in que aurum sēpius extinctum sit.

*Pulvisculus calidus.*

R mastichis, spicæ, ligni aloë, cinamomi caryophyllorum, galinæ moschata, nucis moschate, cubebæ, cardamomi maioris, granorum paradisi, corticis citri an. ℥. ii. molchi Hr. vi. Cum uino odorifero Sant trochisci, pondere drac. i. aut scrup. iiii. Alius.

R electarii de gemmis, confectiouis alkermes, aromatici rosati ana ℥. ii. macis, cinamomi ana ℥. s. sacchari in aqua borrag. dissoluti & ficcati drac. 3. misce, fiat pulvis.

*Epithema frigidum.*

R. aquæ distillationis rosarum & uiolatū, borrag. ana. unc. iii. uini tenuis odoriferi unc. i. specierum diamarg. frigidi drac. i s. misce. Pannus purpureus his his calidis imbutus cordi admoendus.

*Epithema calidum.*

R. uini quartaria tria a quæ melissæ Gr. ii. misce unc. a *Vel aceto*  
iii. mosci. *inunctiones* *sa, scabiosa*

R. ol. de costo. & iasmino an. ℥. i. ambra Gr. iiii. Alio. *tātundem.*

R. b olei uiol. unc. ii. cum duobus grauis cachuræ mi b *Vel olei*  
misce, fies inunctio. *rosati et cy*

Inunctiones, & epithemasa sub sinistra māmā fiunt. *doniorum*

Potiones fiunt in frigida, ex uino tenui odorifero, ana unc. s. *ana unc. s.*  
ex syrupo de corticibus citri cum aquis melissæ, borra- *his imbutū*  
ginis, calendulæ. *gossipium*

In calida, cum syrupo de limonibus, de persitis, oxy- *carptū cor-*  
sacchara simplici, syrupo acetoso, uiolato, de acetositae *di admoen-*  
citri & similibus. Maximè commendatur syrupus de po *tur.*  
tis, qui ita parari debet.

R. a succi



DE MORBIS INTERNIS

**a** Vel R. suc R. a succi pomorum odoriferorum cocti & depurati  
corum depu libr. j. colletur per manicam Hippocratis cum sacchari  
ratorū ace- uiolati drac. iij. cinamomi ꝑ. ij. Vel Recentiorum more,  
tose agrest. cum equa portione, aut paulominus saccari, fiat syru-  
endiuiæ, bo pus. Eliguntur poma omnino odorifera, partim acidula,  
rag. limonū partim dulciuscula. Alioquin pomatio optimo uten-  
prunorū o- dum est, ex quo uel iulep, uel syrupus parari potest.

SCHOLIA.

an. vnc. 3. Eclysis leue animi deliquium: *λεποθυχία* anime defectio  
sacchari ro grauior, nondum tamen ad sudorem usque: Syncope, graui-  
sati. q. s. fiat sima & mortis finitima, quasi concisio, quod spiritus, et vires  
syrup. concidant. Philoteus loco *λεποθυχίας*, in *Apl. λεποθυμίας*

**b** Modo id *καλυσιν*, & *λεποθυμίας* pro eodem sumpsit. Distinctio faci-  
abradēdo et lior hac methodo, cum causarum varietate innotescet. Ani-  
exasperādo mi defectiōem nihil aliud esse, quā precipitem virium la-  
non sit inte psim communi omnium notione perspicuum. Vires autem  
stinis mole. sunt, in spiritu calori nativo iuncto, & temperamento solida-  
rum.

rum partium calore insito & humore primogenio siue radi-  
cali constante. Ergo in tam præcepti virium lapsu, uel spiri-  
tus, uel temperamentum, uel utrunq; collabitur. Spiritus au-  
tem vitalis cum sit in corde, duplicemq; motum habeat, uel  
intro, foras: uel foris, intro: deficit, uel quia non generatur,  
uel corrumpitur, uel alteratur, uel non mouetur, uel dissipat-  
tur. Non generatur uel corrumpitur à proprio receptaculo,  
propter intemperiem sortem cordis, ut scribit Gal. i. lib. 5.  
de locis affectis, uel defectu alimenti. Corrumpitur, uel alte-  
ratur, à uenēnata qualitate siue interna sit ab aliquo mēbro  
siue externa, ut ab ambiēte aere. Non mouetur ad externa,  
sed intro cogitur & suffocatur, uel ab affectionibus animi  
u. hēmiōribus, ut ingēti tristitia, anxietate, mœrore, dolore,  
cura & similibus, unde sæpe syncope et interitū, ut Galenus  
docet de symptomatum causis: uel à corpore, ut respiratione  
prohibita, multitudine & crassitie crudoru humorū exiguos  
meatus obstruētium, unde Syncope, aut si nō obstruāt neque  
onerent, *λεποθυχία* oritur, ut Galenus docet 12. Methodi.  
Huc referri possunt tumor aliquis præter naturam in cor-  
de, uel pericardio, ut in dissecto, cuius ex Galeno meminit  
Philoteus,



Philoteus, tunica inclusa in uentriculo cordis plena humore putri male olente, vermes & similia, de quibus dictum est superiore capite, quæ aliquando obstruunt, aliquando aura uenosa spiritus inficiunt & cor uellicant, sicuti & humor è uentriculo, aut utero, aut hepate, aut cerebro, aut etiam pulmone. Motu aut è corde affatim & repente aliquando foras dissipatur spiritus, & euanescit eodem modo, quo intro cogitur, uel ab affectu animi uehementiore, ut in gaudio, uoluptate, ira, uigilijs, risu: uel causa in corpore contenta, ut insigni euacuatione, purgatione per medicamenta, resolutione spirituum concurrentium ad aliquam partem dolore affectam uehementi, aut erosam, ut os uentriculi ualde sensile, suppuratione, aut ruptione apostematis, uel tuberculi, siue introrsum facta, ut in uentriculum, siue extrorsum, ut in aqua in hydropicis educenda. Simul enim exhauritur spiritus, & una cum ruptione euanescit. Quod Hipp. multis locis significat, ut Aphor. 27. lib. 6. & 8. lib. 7. In partibus quoque exolutionem fieri, ut uacuatione sanguinis, ita & puris, 2. Epid. Et author testatur se uidisse syncope mortuos in huiusmodi ruptione è liene. Dissipatur etiã spiritus, pluribus motibus, tenuitate, raritate corporum ipsos cõtinentium, tenui humore & calido, sudore nimio. Atque hæ sunt ferè cause, quibus leduntur spiritus, qui si suam affectionem communicent partibus solidis, ita ut incipiant resolui, quod sudore cognoscitur, erit Syncope ualde periculosa, imò uerius mors ipsa. Neque enim ferè moritur humo, nisi quadam syncopis specie. Sin in spiritibus tantum sit, nec facultas uitalis omnino dissoluta, Lipothymia propriè dicitur, cuius terminis sudor est. Ob id Galenus scribit 1. ad Glauconem Lipothymiam syncopis principium esse. Solidarum autem partium temperamentum multis quoque modis labefactatur, ob defectum alimentum, consumptionem propij humidi, refrigerationem calidi innati, in longissimis morbis ex atrophia, in febribus acutis à colliuatione, & similibus. Hinc efficitur duo propria et perpetua esse symptomata in Syncope, frigus totius corporis à calore exoluto, & sudorem diaphoreticum, siue syncopiticum, à dissolutione solidæ substantiæ. Est enim sudor hic pessimus, & ut causa, & ut signum. Causa, quia solidas partes spoliatur humido



## DE MORBIS INTERNIS

humido & uirum substantiam dissipat. Signum, quia imbecillitatem naturæ non amplius humores continentis indicat. Sed in Lipothymia tantum frigus apparet, sic dicta, quod sit in instrumento animi, idest, spiritu. In utraque tamē sensus & motus priuatio est, & pulsus defectio. Causa ex proprijs signis cognoscenda: remedia, unicuique causæ accommodanda.

Confirmanda facultas uitalis, si ab intemperie: à tuberculo & similibus difficilis curatio. In aspera arteria dyspnoeam efficit, in tenuibus, spirituum alterationem. Iisdem remedijs, quibus Asthmatici curantur. Filio procuratoris Regij febricitanti in pulsu deficiente & intercidente animi deliquium accidit. Asthmaticis remedijs euasit. In euacuatione nimia reficiendus aeger, uino diluto, theriaca recenti, irrigatione aquæ frigide, uentriculi linimento, frictione partiū superiorum, excretio retinenda. In ueneno, uomitus, theriaca, mylhid. propria antidotus, pulueres cordiales conueniunt. In alicuius partis sympathia, topica, suffitus, unctiones, cordis roboratio, partis affectæ curatio. In resolutione spirituum, alimenta optimi succi, facile & cuius nutrientia, humectantia. Diogenes Laertius sc. ibit Democritum multos annos effluentem spiritum retinuisse medulla panis albi intincta uino optimo, ut cretico, & conspersa puluere menthe, appositaeque stomacho, & naribus.

De cholera.

Cap. XXIX.

**C**holera morbus est acutissimus, sine febre ferè, quæ uel uno die, uel altero, uel certe paucis diebus hominem rapit, substantia corporis effusa, partim assidujs uomitionibus, partim iisdem deiectionibus.

Hippocrates cholerae siccae meminit Cōmentario 4. de ratione uictus in acutis, cuius naturā & curationem, ex eo loco intelliges. In humida uerò animaduertendū in primis est, ut si fieri potest, uomitus componatur, & relinquatur motus, qui ad intestinum est, corrupta ferè ac exitiosa materia, quæ excernitur. Itaque initio retinenda non est, sed tum primum, cum uires inde concidere uidentur. Itaque initio aquæ tepidæ, aquæ hordei aliquando etiam adiecto momento sacchari, aut mellis,

ubi



ubi frigida materia est, imperandus est potus ad unc. vi. Quod si aeger borborigmis & flatibus sollicitatur, cochleare remediū se cumini poterit aqua incoqui. Hac arte fluctuans materia, & ad uomitum incitata, repurgatur, ex quo sistendo uomitus intendendum est.

R. iulep. ros. ꝑ. iii. succi granatorum ꝑ. i. s. misce, utatur breuibz interuallis, duobus aut tribus cochlearibus. Conueniunt & syrapi, Rosatus, Myrthinus, de cydoniis, de granatis, & similes. In causa frigida, iidemque in causa calida; sed cōspersis pulueribus spicæ, cinamomi, nucis moscatæ, & similibus. Alioqui syrupus de mentha, de absynthio & similes, qui in textu sunt.

Oportet autem assumi cochleari, breuibz interuallis, & sine aquis. Largior enim potus hic non conuenit.

Laudatur remedium ab antiquis ex uinis granatorū unc. ii. succi méthę depurati ꝑ. s. & utatur cū cochleari, ut prius dictum est. In causa frigida, uinum optimum, tenue, & odoriferum aliquando satis esse potest. Imperabis quoque, ut granatum integrum, acidum, dulcoratum cum saccharo rosato odoretur. Aeger sugat interim: eiusdem quoque grana commanducet. Conspergenda facies aqua frigida, aqua rosarum per se, uel in frigore adiecto uini odoriferi momento, uel moschi modico. Utendum quoque iis, quæ exterius admouentur stomacho, qualia sunt hæc.

R. santallorum rubor. ros. an. drac. ii. galliæ moscatæ drac. s. camphoræ Gr v. Madeāt in aquæ ros unc. iiii. acetii unc. i. s. Pāniculi in hac miscella merfi & expressi, quātum fieri porest, frigidi toti uentriculo applicentur.

Potest inungi stomachus oleo rosato de cydoniis, de spica, de absynthio, ut res exigit. Quod si timetur nimia refrigeratio, miscellæ supradictæ succus menthæ, absynthii, aliquid quoque cinamomi aut uini austeri odoriferi cōmisceri potest. Mastice unc. ii. aut iii. cū oui albumine, cum oleo cydoniorum, aut cōuenienti dissoluitur. Inde fit emplastrum quod extendi debet in aluta formata ad modum scuti.

Vulgi experientia est eboris tabella admota uentri

L uomitus



# DE MORBIS INTERNIS

uomitibus compesci. Sed interim dum hæc fiunt, somnus & quies quantum fieri potest, concilianda sunt. Consulendum uiribus, partim odoribus, partim alimentis.

Perdulas ergo, aut iuuenes pullos columbarum confixos baculis myrthi, rubi, cinamomi, ut res exigit, conspersos interim, dum assantur, aqua rosuino granatorum uino aultero, odorifero, primum quidem calidos & plenos fumo naribus ægri admouebis. Ex eo tortino prælo succum inde exprimes: expressam materiam naribus ægri admouebis: succum sorbendum exhibebis. Dabis gelatinam cum succo granatorum distillatam, qualem in sputo sangu.

Quod si nihil continet æger, prius data aqua tepida, cucurbitulam magnam affiges uentri, & interim dum ea cucurbitula fixa est, cibum exhibebis. Breuibis intervallis cucurbitulam figes & refiges, & ita nutries.

Consensus est ueterum Medicorum, dropacismum impositum uentri singulare esse remedium assidue uomitibus. Parabis dropacem ex quatuor partibus picis & olei una cydoniorum, una liquatis, deinde extensis in aluta. Postremo medicamentum calidum uentri applicabis.

Laudantur uincula articularum, frictiones mediocres frotus ex oleo multo, magis ubi conuulsio est, uel imminet. Fouetur spina musculi conuulsi articuli. Cucurbitula quoque & uentri & scapulis affigi possunt. Quod si refrigeratur, externa linteis calentibus inuoluenda sunt.

Si spasmus accidit, redeundum ad curationem spasmi. Si urget sitis, semina cucumeris in aqua temperati debent, donec intumeant: tum cortex exterior detrahatur: quod est reliquum, aqua incoquitur: aqua refrigerata bibitur. Contra syncopen cum aliis remediis supradictis, tum bucella imbuta uino admota naribus, cõtenta ore utendum est.

## Trochisci Rhabarberi.

R. mastice, boli arm. thuris an. drac 2. s. carabe, cardamomi scrup. 2. caphoræ. galliæ moschatae, caryophyllo an. gr. v. cum succo granat. fiat trochisci potere scrup. iij. Detur unus, superbibatur 3. j. succi granat. iulep, granati, syrup. cydoniorum, aut similis. Clysterum hic duplex est usus. Initio reuocandis uomitionibus, & hi simplices



ces esse debent. Postea uero collabentibus uiribus, qui & leuiter reprimant, & adstringant.

## SCHOLIA.

Hippocrates quarto de ratione victus in acutis, & Galenus in Com. & Isagoge, duplicis cholerae meminerunt, Arida & Humida. In utraq; perturbatio est ventriculi immodica infra, supraq; Differunt causa, & symptomate. Arida enim fit ex spiritu flatuoso, acris, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat & mordicat partes ventris nervosas. Venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus, & lumbis, alius nihil deiecit, sed astringitur. Humida gignitur, vel ab alimentis, vel medicamentis. Alimenta in causa sunt, quae succum crudum, flatuosum, aerem procreant, ærè coquuntur, tardè permeant, ut intestina suilla infarcta sanguine, capis, pipere, pinguedine, quibus nihil difficilius coquitur, laferpitij succus, caseus suilla caro, bubula, caprina, uentres animalium infarcti. In summa, quaecunque vel flatuosum succum generant, vel aerem, vel facillè putrescentem, vel humiditatem acrimoniam iunctam habent. Corruptuntur enim facile, & acrimoniam fluxiones irritant ex toto corpore, mordicantes orificia vasorum, quae ad ventrem pertinent, unde vomitus, & deiectio. Medicamenta sunt, ut Elleborus, apud Galen. Com. Apho. i. lib. 5. Sed hoc nomine reliqua quoq; violenta pharmaca intelligenda, ut Colocynthis, Scammonium. Ex his enim aliquando generatur conuulsio, aut immoderata purgatione, aut neruorum substantia resiccata, aut demorso ore ventriculi neruis laborantibus per consensum, ab aeruginosa bile, ut in adolescente cuius meminit Galenus, & in negotiatore quodam Rhemensis, cui vomitu citato desit conuulsio. Aliquando uero Cholera sequitur. Mordentur enim, ut de alimentis dictum est, partes nervosae vi medicamenti, & acrimoniam humoris attracti, à cuius etiam quantitate potest ventriculus comprimi, idq; praesertim fit, cum humores non sunt ad purgationem parati. Fit aliquando è toto corpore, aliquando ex quibusdam partibus, ut hepate. Huic maximè proprium est symptoma, de quo Galenus agit in eundem Apho. Contractio, uidelicet, in musculis, & puppis tibiae (quam vulgo, Gouttes crampes, nominant.) Quod in duabus illustri-



# DE MORBIS INTERNIS

a Alui siue bus mulieribus obseruauit aulior. Morbus est peracutus, ut  
 vetriculi in qui quarto ad summum die finiatur. Alia symptomata sunt et  
 coquendo et signa, Vomitus, Deiectiones, bilis frequentissima, deliquia  
 appellendo, animi, sudores exigui, sitis, pulsus uermiculantes, ructus nido  
 que due sunt rosi. Quibusdam accidit certis interuallis, natura sese exone-  
 actiones ven rante, sed ob impetum humoris biliosi erumpentis, salubri  
 triculi coctio humore simul cum uitioso foras expulso. Huiusmodi homines  
 et appetitio. Græcis *χολεικοί*, & *χολεικώτες*, dicuntur: Plinio, Biliosi.

b Morbo de Curatio perficitur sublata causa, conuulsione, syncope, tremu  
 functis, col- lo motu singultu, si adsint. Decoctione, si facile soluatur al-  
 lapso habi- uis, prouocatione uomitus, qui prohibetur injecto clystere ca-  
 tu, alienato lido, ut prouocet, pingui, ut leniat. Hydrelæo calido partes  
 temperamēto, corporis fonentur. Subducto uentre, & eò conuersa materia,  
 ei mutatavē sanitas. Dormiat, ut coquat. Finum sit tenue, ad penetratio-  
 triculi actio nem, uetus, meracum ad coctionem, modò à cruditate morbus  
 ne, lāguida. sit. Paucissimo utatur cibo, lacte asinino, ut purget et leniat.

c Superstite Neq; simul deiectionem, & vomitum prouocare licet. Quæ  
 morbi mate .n. in ventre continentur, subducenda, & vomitus prohiben-  
 ria, aut em- dus, Hipp. 4. Acu. Venterculus roborandus ad motis. Conue-  
 pyemate. niunt adstringentia, emplastra, sacculi, linimenta, unguen-  
 d Quod s. sit ta, cerata, epithemata, sed celerius agunt fotus. Cucurbitulæ  
 infirmus vè inter umbilicum & stomachum, purgatio, pillule, condita.

triculus, & De imbecillitate a stomachi. Cap. XXX.

morbi diu- I Imbecillitas stomachi frequens b conualescentibus:  
 turnitate co Imagis etiam c ab imperfecta crisi, in quo reuocanda  
 lapso habi- sententia Hippocratis. Si à morbo cibum assumēs quis,  
 ta, ab aliena non corroboratur, largiori d alimento corpus uti signi-  
 toq; tempe- ficatur. Quòd si non assumenti cibum hoc accadat, scire  
 ramento ne oportet e quòd indiget euocatione.

cesitati cor In conualescentibus ergo, quibus reddita est appeten-  
 poris satis- tia, imbecillitas uentriculi non potest tantum confice-  
 facere ne- re, quantum appetit. Modica itaque quantitate, sed bre-  
 queat. uibus interuallis, cibis boni succi, & qui facile coquan-  
 c Ad exclu- tur, reficiendi sunt. In aliis, quibus appetentia non red-  
 dendas mor- ditur, reliquæ morbi in causa sunt, quæ optimè uel rha-  
 bi reliquias barbaro, uel hiera picra ex decocto cicerum, aut absyn-  
 quæ suetio- thij repurgantur.

nis sensu im In sanis uerò debilitas est, uel à sola intemperie. Cu-  
 pediunt. ius



ius indicia sunt, calidæ quidem, æstus in a medio corpo-  
re, sitis assidua, & lingua arida, iactatio corporis, aliquan-  
do etiam extrema, uel frigida, uel temperata, nec pro ra-  
tione æstus calentia, à cibo nidorosi ructus. Frigidæ ue-  
rò frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, b saluatio  
aliquando multa, ructus acidi. Alia ex arte medica Gale-  
ni require. Causa quoque nonnunquam materia est, ea-  
que uel c quantitate peccat, uel qualitate. Rursus uel  
corpori stomachi, uel uentriculi imbibita est, uel in ca-  
pacitate fluitat.

Intemperies quoque aliquando complicantur, qua-  
rum omnium signa colliges ex arte medica.

Intemperies contrariis, calida quidem frigidis, ut po-  
tu frigidæ, frictione articulorum, cerato Galeni, cuius  
hæc est descriptio. d

R. ceræ lotæ in aqua rosarum vnc. s. olei rosacei in  
aqua rosarum similiter loti unc. 2. liquefiant in uase du-  
plici. Quod cum fuerit refrigeratum, diu malaxetur cū  
aqua frigidissima, uel succo plantaginis.

Imperanda ratio uitæ, quæ refrigeret. Et e contra  
æstum ac sitim.

R. sem. cucumeris in aqua macerati, & excorticati  
unc. s. tragacanthi dissol. in oui albumine drach. 2. lique-  
fiant in vase duplici cum eodem oui albumine. fiant hy-  
poglottia, id est, pillulæ, quæ teneantur sub lingua.

Quod si syrupis utimur, iis omnino abstinendum est,  
qui f acetum recipiunt, nisi humiditas coniuncta sit.

In frigida, volatiliū carnes confixæ cinamomo, aut  
lardo consperso puluere cinamomi, & ita g assatæ Ali-  
menta omnino calida, vinum odoriferum, aut etiam co-  
latum cum saccharo, cinamomo, granis paradisi, modico  
zinziberis, & similibus. b

thematē ex aqua rosarū & buglos. hapsus verò cydoniorū oleo imbuatur.  
f Cuiusmodi est syrū. acetatus. Et tamen oxisacchari loco præscribi pōt ob  
succū mali punici. g Ut cōd. ex puluerib. caryo. nuc. mosc. & cina. cū sapa.  
h Aut sūt cōditia, opiata, nuce moschata, myrabolanis cōditis, cortic. citr.  
cond. flore. Augen. cond.



# DE MORBIS INTERNIS

*a Fiunt sac* Fetus è a sacculo mollissimus plumis anseris pleno,  
*culi ex radi* & aliis, quæ postea de siccitate in hectica febre dicetur.  
*ce cyperi* Humiditas, si fluitat, uomitu elicienda est. Vbi imbi-  
*cal. arom.* bita est, & qualitate peccat, pharmaco repurganda est. Si  
*schænatho,* tantum quantitate peccat, & præter modum stomachum  
*caryophyl.* ac uentriculum remollit, adstringentibus medicamen-  
*absyntho* tis, admixta aromatum parte ad resiccandum, utendum  
*roman. men* erit. Si crassus & uiscidus humor est, incidendus oxymeli  
*th. orig. cha* te, aut aliis eiusmodi, tum pharmaco deiciendus est. Ma-  
*mamelo, ro* teria eorum quæ infirmum stomachum è frigore confir-  
*sis. Coquun-* mant, cinamomum, cortex citri, caryophyllum, mastix,  
*tur in aquis* lignum aloes, zinziber, & chebuli cōditi, macis, mētha,  
*partibus a-* absynthium galanga, scœnāth. carui, ani, flores anthos,  
*quæ & uini* uinum aromaticum, nux moscata, piper, aromaticum ro-  
*rubri: deco-* satum, diagalāga, diacuminum, diatrium pipereum, dia-  
*cto madesa* cydonium cum aromatibus, theriaca, mythrīdatium, Sy-  
*cta spongia* rupus de mentha, de corticibus citri, mel anthosatum,  
*admoneitur* oleum nardinum, de spica, de mentha, in quo aromata  
*stomacho.* calida coxerint, ut piper, cinamomum.

*A fotu aut* Frigida. Coralli, santali, ambra citrina, coriadrū præ-  
*illatur* paratū, ebur, cornu cerui, & unicornis, cydoniū, pira ad-  
*oleis absyn-* stringētia, rosæ, diarhod. abbat. myrrha, acetosa, diacydo-  
*th. menth. et* niō sine speciebus, scorīa ferri, limatura chalybis, ceratū  
*nuc. mojscha* santal. oleum rosarum, & de cydoniis, syrup. rosat. & de  
*re.* cydoniis, aliaq; eiusmodi, quorum pars in controuersia  
 tēperamenti uenire potest. Cæterum calidā temperiem  
 corrigere possunt. Horū omniū usus, uel quia inde pul-  
 uisculi & electaria, potiones quoq; confici possunt, aut  
 topica quæ exterius applicentur. Per omnia tamen ui-  
 dendum est, ne adstringamus nimium, ex quo siccitas  
 immodica contrahitur, ne nimium humectemus. Hinc  
 enim uirtus harum partium dissoluitur.

Tepidis utendum nō est, sed uel frigidis, uel calidis,  
 quia tepore uirtus stomachi relaxatur.

Remedia externa anteriore parte ad sterni initiū sub  
 pectore aptāda sunt, quāquā & posteriore parte ad duo  
 decimam uertebra probato remedio applicari possunt.  
 Vtraq; parte posita magis iuuabūt. Sed oportet ea, quæ  
 poste-



posterius ponuntur, habere aliquid tenuium partium, quò per difficiliore uia penetrare possint. Humidiori uentri culo conuenit. R. ambreg. citr. masticis, iridis, an. drac. iiii. ros. siccar. drach. i. s. f. pul. de drac. cum magno cochleari succi granatorum, uel sero lactis. Quòd si frigiditas adiuncta est, addes cinamomi, scenathii, maceris an. 3. i. Humiditate quoque; resiccant ferè omnia in frigidis numerata, & uino incocta, quòd adstringat. Sed ubi frigiditas coniuncta est aromata commiscenda. Ad frigidam dispositionem.

R. corticis rad. feniculi drac. ii. coquantur in uini optimi unc. iiii. ad dimidias. Quòd si maior refrigeratio est, coletur uinum per manicam Hippocratis cum drac. i. cinamomi. Diatrium pipereò, diacydonium Galeni cum aromatibus conueniunt.

Quòd si flatus adsunt, galanga, grana paradyfi, cuminum, libisticum, carui, baccæ lauri, iuniperi & similia uino odorifero incoquenda sunt, aut in pul. redacta, mare & cinamomo adiectis incorporetur melle anthosato. Theriaca & mythridatio hic utendum est.

Calorem resouent catuli, cati, caniculæ, pulli, pullæ, manus admota uentri, rasura dibaphi, quæ plurimum conuenit, ubi èt frigiditas est, cottum, Sacculus è mollissima pluma anseris, pellis leporis. Cottum in uino odorifero, de coctione methæ immersum, expressum, siccatur, & ita impositum. Ceratum stomachicum Galeni, uel hoc.

R. ol. de spica unc. iiii. ceræ unc. i. masticis unc. s. liquefiant in uase duplici. Deinde adde cyperi, macis, cinamomi an. drac. i. commisce diligenter, & rasura dibaphi excipe, quantum satis est, calidumque appone.

R. dialthææ unc. i. masticis dissol. in oleo de spica 3. s. croci drac. s. misce, extendatur in aluta pro stomacho. Hoc & dolorem lenit, & stomachum roborat.

Masticis grana præmansa & deglutita. Ceratum stomachicum Galeni. Cõcalfacto uerò stomacho utendum est cerati santalini 3. ii. malaxatis cum oleo de cydoniis rosarum, deinde extensis in aluta. Iulepus rosarum, uinum granatorum, syrupus acetosus simplex, & similes syrupi. Quòd si humiditas calori coniuncta est, aut ali-



## DE MORBIS INTERNIS

quis humor biliosus, uel in uentre collectus, uel alium de inuictus, absinthio, hiera picra, rhabarbaro, cassia, & similibus hac ratione utendum est.

Absynthii decoctum biliosa deterget & subducit, si quidem altius non fuerint imbibita: & hoc magis meliratum ex absinthio aut decoctum absynthii cum octaua parte mellis rosa. dulcoratum. Infestissimum uero absinthium, quibus pituita uentriculo inhæsit. Hieræ peræ, & rhabarbari usus est, ubi imbibitus humor est biliosus tunicis uentriculi. Vtriusq; drach. aut scrup. iiii. ex decocto absynthij, cicerum ruborum, sero lactis, aqua endiuæ, satis esse possunt. Alioqui unc. Cassiæ, aut catholicum imperandum est. Sed ab his roborandus erit stomachus: nec enim, ut hiera & rhabarbarum, confirmare possunt.

Vinum absynthites descriptum à Dioscoride deterget, roborat, appetentiâ reddit. Quod si deest, molliores absynthij cauliculos recentes leuiter conquassabis, uino odoro, alteriusculo macerabis, & leuiter feruefacies, uel siccos eosdem cauliculos uino infriabis.

In imbecillitate stomachi plurimus olim usus medicamenti e cotoneis. Syrupus acetosus e cotoneis. Succi cotoneorum per residentiâ depuratorum, sacchari ana libr. i. aceti unc. iiii. coque ad spissitudinem. Conuenit calfacto stomacho, & inde infirmato. Poteris tamen imminuere modum sacchari, ut erit auctus calor: aceti ut erit sensus stomachi.

### *Mina Rafis.*

R. succi cydoniorum maturorum per residentiam depurati libr. i. sacchari libr. s. uini ueteris libr. s. coquantur, & despumentur. Tum.

R. zinziberis, spicæ, cinamomi, cariophyllana drac. ii. masticeis ℥ iiii. Omnia puluerisata nodulo includuntur, & in prædicta mina calida macerentur: deinde refrigerat, & nodulus exprimatur.

### *Gracorum.*

R. succi cotoneorū, mellis optimi an. libr. i. aceti acris libr. s. aut non ita acris unc. ix. zinziberis drac. v. piperis albi



albi drac. ii. Succus cū aceto & melle modicè coquatur, despumetur, tū inde pulueres, & coque ad crassitudinē.

Moderatis omnibus oris uentriculi affectionibus, præterquam quæ æstu uehementi oriuntur, proxima duo medicamenta conueniunt. Aliud.

R. carnis cydoniorū, mellis ana libr. i. aceri albi libr. i. simul bulliant, & agitentur tum adice piperis  $\mathfrak{z}$  i. zinziberis tantundem, petroselini macedonici  $\mathfrak{z}$  viii. hoc magis adstringit. Ventri calida intemperie affecto, aut bilioso piper & zinziber subtrahuntur. Ventri temperato, tantum dimidium piperis & zinziberis subtrahitur. Aliquando mixta aromaticæ unc. i. theriacæ aut myrridatii drac. i. commiscantur. Daturque ex uino odorifero. Quod si etiam dolor coniunctus est, in primis phlebotomia ex interna brachii conuenit. Perseuerante malo, ex utraque basilica, & hoc magis si grauis dolor est. Si repentinus, si difficilis ructus, & spiritus, si febris est, si dolor in dorsum & scapulas extenditur.

Historia est s. Epidimion, de uiro quodam, qui in uehementissimo dolore stomachi, nullis aliis adiuta remediis, sauata est ducto ex utraque manu sanguine.

Postea uero leniendus dolor est, & si quidem uenter æstuat, cucumeris semen, & hordei in aqua frigidissima macerari debet, & decorticari: cum adiecta parte glycyrrhizæ rasæ & recentis, coquatur aqua despumetur. Refrigerata uero, uel niue, uel aliis modis supradictis propinetur. Vesica ea aqua uel alioqui frigida ex dimidio plena sæpius admoueatur.

Quod si materia aliqua concepta uentriculo dolorem faciat, ea, ut prius, commodè repurganda est.

Cucurbitulæ umbilico, aut ad latera umbilici affigendæ sunt. Dextrum quidem, si ab hepate: sinistrum, si à liene in uentrem fluxio est. Suntque omnino tria genera eorum quæ dolorem leniunt: Primum, quod rescindit causam, ut pharmacum, & medicamentum quod intemperiem corrigit. Secundum uero eorum, quæ reuera anodina sunt, qualia sunt chamæmel. melilotum, anethum, flores rosarum, croci, rosarum, uiolarum: quibus



# DE MORBIS INTERNIS

quibus aliquid menthæ, absynthii, & eorum, quæ stomachum roborant, adiciendum est. Similiter & furfures, milium, sal dolorem leniunt: sed frigi debent, & sacculo includi.

R. furfurum M. i. milii conquassati P. ii. salis drac. i. frigantur in sartagine: deinde includantur: perfumetur sacculus uino diluto aqua rosacea, & effuso in laterem candentem. Aliud.

R. florū anthos, rosarū, uiolearū, chamæmeli, anethi, meliloti an. P. i. summitatū absynthii P. s. f. sacculi: perfumentur, ut prius, & applicentur calidi. Alioqui.

R. menthæ, absynthii an. P. ii. chamæmeli, florū anthos ana P. i. calami aromatici, schœnanti, masticis ana drac. i. Fiat decoctio in uino odorifero. In decoctione gossipiū aut rasura scarlattæ immergatur: exprimatur, & identidē calida applicentur. Materia quoque expressa uentriculo toti applicetur. Sed uidendum, ne refrigescat, statimq; oleo conuenienti ungere oportebit.

Vbi supradictis remediis non concedit dolor, narcoticis utendum est. Primum quidem leuioribus, quales sunt syrupi rosarum, papaueris, mirti: syrupus uiolatus, de nenuphare cum ꝑ. i. Philonii.

R. syrup. ros. & de absynthio ana. unc. i. opii. Gr. i. bulliant una leui ebullitione, deinde cum unc. iiii. iuris pulli detur in potu.

R. philonii in causa frigida: in calida uerò, requiei descriptione Nicolai, unius dra. s. in uino tenui odorifero.

R. pilul. de cynoglossa ꝑ. i. dissol. in syrupi rosati, & de papauere ana unc. s.

Trochisci stellæ, spicæ, masticis, cinamomi, schœnanti, castorei, myrrhæ, olibani, piperis, aloes, absynthii, sem. hyosciami albi, & mēdragoræ, opii an. partes equales, ut drac. s. Fiant trochisci cum uino dulci, pondere drac. ii. Detur unus cum uino odorifero.

*Albucasis non reuelandum remedium.*

R. opii unc. i. cum aliorum capitibus duobus. Conquassentur, fiat distillatio in alambico: eius aquæ modicum bibatur. Eadem arte poteris opium commiscere rebus



bus stomachicis suprâ enumeratis, & inde aquam elice-  
re. Alia narcotica superius descripta, remedia quoque  
plurima ex 8. libro de compositione medicamentorum  
κατὰ τὸ πρῶτον.

## S C H O L I A.

Affectus ventriculi in œsophago, stomacho, siue orificio,  
fundo, tunicis, piloro, infiniti propè reperiuntur, tantò peri-  
culosiores, quantò coctio & distributio cibi magis necessaria  
est uniuerso corpori. Quales sunt, intemperies omnis generis,  
tumores præter naturâ, obstructions, defluxiones, excreme-  
ta illic collecta, uel nata, uel aliunde immissa, cibus intèpesti-  
uus, nimius, vitiosus, deiecta appetentia, nausea, uomitus, hu-  
mores in tunicis infarcti, aut in fundo fluitantes, inflamma-  
tio, inflatio, dolor, exulceratio à causa interna, ut humore a-  
cri, pharmaco, cibo, osse acuto, præcedente abscessu, erosio, fa-  
mes canina, immoderata sitis, & similes, quorum signa, cau-  
sas, remedia explicare maioris est operis. Multa ex Gale. col-  
ligi possunt 3. & 6. de Morb. & Sympt. 5. de locis affec. 6. de  
de sanit. tuenda. 7. Methodi. Signa ex Microtegni. 8. κατὰ  
τὸ πρῶτον ita describit, stomachicos contra Andromachum, qui  
stomachicas confectiones siue discrimine scripserat prodesse  
stomachicis. Quod & vulgò hodie etiam Empyrici faciunt.

Pleriq; (inquit) vulgò homines eos, qui appetentiam per-  
diderunt, ita vocant, & quibus post acceptum cibum, uentris  
os grauaturs atq; opprimitur, & quandam egrè tolerabilem  
anxietatem habet. Appellant eodem modo etiam illos, qui-  
bus nausea contingit, & maximè si ad vomitum impellat,  
& adhuc magis si cibi corrumpantur, quandoque uidorosi  
facti, quandoque etiam aliam vitiatam qualitatem adepti.  
Et præ his omnibus adhuc magis illos stomachicos nominât,  
quibus ructus eiusmodi cum molestia quadam & anxietate  
ac subuersione contingunt, sæpe cum nondum cibum accepe-  
runt. Quinetiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris  
morentur grauantur & vix descendentes, hos itidem stoma-  
chicos appellant. Alios item appetitum caninum appellatum  
habentes, ut & plurima edant, & maximè grauari paulò  
post reuomant, similiter vocant. Alios rursus, qui fortiter  
exoluntur, ubi diutius mediam perinulerint, & si non ci-



## DE MORBIS INTERNIS

ius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, eodem modo stomachicos uocant. Haftenus Galenus, ciliaci autem sunt, qui cibum non continent. Ante cibum, ab humore confluente: post cibum, ab imbecillitate: utroque tempore, ab utraque causa dolor commouetur. Nonnunquam à cibo cessat, quia cibus naturam colligit, temperat, calfacit. Ulcus esse conijciendum ex dolore, ardore, deglutito synapi, & similibus rebus calidioribus, aut frigidioribus, pure apparente in uomitu uel deiectione. Non tamen ciendus uomitus, ne inde ulcus lacretur, & materia aliunde trahatur. Eodem modo neque sternutatio, neque tussis. Ab humore acuto, lingua infecta, sapor redit in os, & in uomitu, secessuq; cum ardore, calore, siti, angustia. Si in orificio uentriculi, grauiora symptomata, frigiditas extremorum, syncope, dolor grauior, &c. Ex uarietate causarum indicationes curationis sumenda.

Si à morbo cibum) Conualescentes à morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, nō solum ab inanitione spiritus & humoris, Balneo, profluuiis, sudoribus, insensibili perspiratione, colliquatione, & similibus, sed etiam à ieiunio, inopia alimenti, calore languescente, ut flamma, quae in elychnio insita ab oleo & aere somitem & pabulum sumit. Aliquando uerò appetentiam habent deiectam, ob uitiosos humores relictos. Vtrique sepe, nisi accurate tractentur, in reciduum incidunt: Priores quidem, quia cum extenuata membra multum appetant, non tamen sumpta conficere potest imbecillus calor. Constat enim historia multorum, qui à longa inedia sese repleant inde suffocari. Posteriores uerò, quia reliquias morbi tandem natura stimulata aggredi cogitur. Quanto enim plus nutriuntur, tanto magis leduntur, donec accrescente malo, morbus repetat. Hi igitur curantur uacuatione, ut docet Galenus, de sanguinis missione contra Erasist. & hystor. 6. Epid. Illis uero remedio sunt, rerum non naturalium commoderatio, labor, cibus, potus, somnus, uenus, omnia mediocria: deinde longo tempore substantiae reparatio per alimenta pauca, bene nutrientia, facilia coctu, saepius exhibita. Nam pauca non sufficienti nimia non coquantur.

De



**S**ingultus a conuulsio quædam est, & prauus motus *li motus &*  
 oris uentriculi, uel ipsius etiam uentriculi *bui reten* contra nati-  
 trice officium negligente, & robustiore expultrice. *ram, qui cõ-*

Singultus causæ Inanitiõ & Repletio. Qui ab inani- *uulsiois mo-*  
 tione, ferè lethalis est, sequiturq; insignes euacuatio- *do fit, cum*  
 nes, ut sanguinis è uulnere, è locis muliebribus, aut aliũ *tamen con-*  
 de. Sequitur dysenterias, diarrhæas, & cetera eiusmodi. *uulsio non*

Ardores quoque & graues inflammationes uiscerũ, *fit. Conuul-*  
 de quo priusquam præsagium instituas, uide num sit à *sio enim tan-*  
 repletione. Minus enim periculosus est, sæpeque cum *tum cadit*  
 multa, per uentrem euacuantur, singultus à repletione *in partem*  
 est, quia pars materiæ, quæ à reliquo corpore confluit *quæ mouen-*  
 in uentrem, tunicis uentriculi imbibitur. *tur præteri-*

Singultu cõcluduntur nõ solum quæ in corpore uen- *cos: & om-*  
 triculi. sed etiã quæ stomachi & esophagi cõtinentur. *nis conuul-*  
 Sunt qui ad inanitionem adiungant causam singultus, *sio sympto-*  
 perfrictione oris uentriculi, de quo 8. de compositione *ma est cau-*  
 medicamentorum particularium, & Apho. 13. & 39. li. 6. *sa morbi si*

In inanitione etiam si desperata res est, iuuandus *ca singultus*  
 tamen æger id distillatis, collatitiis, iusculis & expres- *autẽ & ster-*  
 sionibus, cibis humectantibus, inunctione dorsi & uen- *nutatio nõ*  
 triculi ex oleo uiolarum, & hydreleo quoque. *item.*

Ex aquæ & olei partibus æqualibus adhibendus est *b Gal. li. 8.*  
 fofus. *de compos.*

Si perfrixit, calfaciendum est per ea, quæ non tã ad *phar. local.*  
 stringant, quàm rarefaciant. In perfrictione enim sto- *c Vti in cõ*  
 machus, neruofum corpus, condensatus est, ideoq; non *uulsione ab*  
 transpirat: ex quo repletio fit, à qua singultus. Viso ita *inanitione*  
 que odorifero cum tantillo cinamomi & galangæ malo *ab exhau-*  
 occurrendum est. *sto humido*

Stoma- primigenio.

**d** Hæc distillata restauratiua conficiuntur ex conseruis bugloss. uol. borra- *distil-*  
 gi. nenupharis aquis scabiosæ, bugloss. endiuia. Hæc oĩa in alambico re- *lata re-*  
 ponuntur simul cum seminibus frigidis, cordiacis, cũ decocto capi, car- *stoma-*  
 nibus perdicum mica panis albisimi. Stillat humor cui misceri potest *stoma-*  
 saccharum & cinamomum tenuissime pulueratum, exhibetur agro.

**e** Fiatq; hapsus ex gossipio carpto illis imbuto oleis, qui perpetuo uentri- *stoma-*  
 lo & dorso infideat.



# DE MORBIS INTERNIS

**a** *Quæ distē* Stomachus & spina oleo de castoreo, de piperibus  
tione & op inūgēda sunt, aut inde cerata cōficiēda, ppetuo seruata  
pressione al ratione ne adstringamus, donec aquieuerit singultus.

*ni cernitur.* Vbi flatuū a multitudo, iisdē ferē remediis sedatur.

**b** *Vinu aro* Vino quoque, in quo ruta, rosamarinus, semen dauci, cu  
matites, aut mini, carui, eubebæ, bacca lauri, aut iuniperi, galanga,  
absynthites libillicum b & alia eiusmodi coxerint. Aut eadem cum  
Carthusia- vino odorifero maluatico, aut simili colabimus per ma  
norum, aut nicam Hippocratis e aqua uitæ cum tâtillo cinamomi,  
etiā hydro- anethum quoque quadam proprietate, ut uolunt, sin-  
melvulgo di gultum sedat. Electaria sunt ex nardo gallica, zinzibe-  
ctum mal- re, seseli, & proximē enumeratis remedijs cum melle.

*uaticū, aut* Mel anthosatum hic conuenit, vt d confectio de baccis  
vinum mul lauri e theriaca uetus, & mythridaticum.

*uaticum ho* Quod si materia est aliqua continens causa singul-  
rum omniū tus, ea uel calida, uel frigida f Calida vacuetur uomi-  
instar esse tu, si fieri potest g Alioqui 3. iij. rhab. h uel tantundē  
poterunt. pul. hieræ picræ in sero lactis, uino granatorum acido-

*c* Aut aqua rum, & maturorum, aqua endiuæ, decocto cicerum ru-  
in qua ma- brorum infunde, expressionem exhibe. Tum si perseue-  
derit coma rat singultus i aqua frigida proponitur. Subinde hæ pi-  
anethi ethi lulæ imperentur.

*opici, qd re* k R. spodij, sem. endiuæ, portulacæ, ligni aloes ana  
gin appellat 3. i. pulpæ tamarindorum 3. i. rhab. elect. 3. ii. confice cū  
d Hæc con- oxycrato, aut uino granatorum. Aliud.

*fectio est a-* R. syrupi ros. acetosi, oxysaccharæ simplicis ana unc.  
rior. ij. In quibus infunde summitatum absynthii 3. s. fiat in-

*e* Hæc miri fusio in calidis cineribus, tū duobus aut tribus cochlea-  
ficē flatus ribus refrigerati remedii per internalla utatur. l Cera-  
discutiunt. ti santalini unc. iiii. cum oleo rosato malaxentur: dein-

*f* Per apho. de commisce spodii, rosarum ana 3. i. cum succo sem-  
17. lib. 4. peruiui

**g** Si peculiaris natura à vomitu te auocet.

**h** Vel R. rhe elect. scrup. iiii. infunde in aqua endiuæ sero lactis, decocto  
cicer. rub. In express. infunde hieræ picræ drach. s. f. poi.

**i** Ad temperationem humoris acrioris.

**k** Hæ pilula simul vacuandi & temperandi vi pollent.

**l** Hoc remedijs genus valet ad inflammationem hepatis & ventriculi.



peruini agita: inde finges duo scuta in alata. Alterum a stomacho ad sternum: alterum ad duodecimam & tertiamdecimam uertebrae dorsi applicabis.

*In causa frigida.*

Vbi crassa & uiscida arteria, melicrato hyssopi, uel oxymelite simplici materiam præparabis. Tum, ut mouebitur, per uomitum aut uentrem repurgabis ex hiera picra dissoluta in decocto cicerum rubrorum. Dabis autem hieræ modum a semuncia ad unicum. Cõuenit in hoc singultu acerum scylliticum, oxymel cum cinamomo, aromatizatum a melicratum ex rebus incidetibus, hyssopo, thymo pulegio, satureia, & simil. Maxime probant galangam.

R. uini albi tenuis odoriferi un. iiii. in quo leuiter ferueant galangæ 3. i. cinamomi, sem. aneth. an. 3. s. Conuenit & castoreum in uino odor. ad 3. ii. Sed quia fædo est odore, cinamomo, semine apii temperari potest. Cõueniunt & hæc schænantum, asarum, maiorana, aristolochia, enula, zinziber conditum, acorus conditus, diatrium piperon, diacuminum, diagalanga, theriaca uetus. Exterius uero oleum de liliis, de amygdalis dulcibus. Et iam sedato singultu, atque uacuata materia, ea, quæ roborant adstringendo. Fit aliquando, ut materia quædam uenena sit, cui hoc puluere occurrendum sit.

c R. sem. anethi, cardui, bened. citri. ana 3. i. melissæ, corticum citri. ana 3. s. coralli rubri, galangæ, macis, cinamomi ana scrup. s. margaritarum, fragmentorum smaragdi an. Gra. viii. cornu cerui, & unicornis an. Gra. iiii. cum saccharo borraginato, & uino albo tenui odorifero fiant lozengæ uel puluis.

Quod ad cucurbitulam attinet, iam uacuata materia primum scapulis, tum pectori & umbilico, postremo uentriculo & xiii. uertebrae affigi debet.

Quod si nec his quidem resistit singultus, his locis phenigmi aptari debent. Alii in malo cõtumaciori imperant d. ellebori 3. i. galangæ, cinamomi ana 3. i. maccarentur p noctem in uini maluatici unc. iiii. colatura bibatur. Alii etiã stupefacientibus utuntur, de quibus proxime. Nec omittenda sternutatio, clamor, & c. eiusmodi.

SCHO.

a Tale melicratum uinum vulgò dicitur.

b Quinetiam fotus ex ca-

lamo aromatico schæ-

nuatho, origano, absyuthio, metha-

c Hoc electarium non mo-

do ventriculo singultui

sed uarijs, alijs affectibus cõ-

ferit facit ad omnem re-

nenatam au-

ram eluendã, & effæ-

tam vim excitandam.

d Huius remedij nullus est usus.



# DE MORBIS INTERNIS

## SCHOLIA.

*singultus qd*

Dynx, et lygmos Hippocrati & Galeno, Latinis singul-  
tus. Motus est eiusdem generis cum vomitu, sed fortior et ve-  
hementior. Deinde per vomitum natura tantum, que in ven-  
triculi spatio sunt, expellere conatur. In singultu vero non so-  
lum hac, sed multo magis, que in ipso ventriculi corpore he-  
rent, aliusq; & penitus impacta sunt, atque ob id uehemen-  
tiori motu est opus. Id experientia perspicuum. Si quis enim  
acre aliquid, ut piper deglutiat, siue cum melle, siue cum ali-  
quo olio postea unum bibat aqua calida temperatum, calo-  
re potius ad interiora piper deducitur, & sua acrimonia ven-  
triculum stimulat. Inde ut in iussu thorax, ita hic punctus  
aliunde ventriculus primum dilatat sese, quo ualentius excu-  
riat quod nocet. deinde, quasi collectis uiribus, sese adstringit  
& compressione edit singultum. Sonat autem, quod aer ali-  
quis in uacuo ventriculi spatio comprehensus prematur, &  
per angustiore uiam redditur. Quia ergo multa concurrunt  
in singultu, pro eorum uarietate ad diuersas facultates locis  
diuersis refertur à Galeno, motricem uidelicet, expultricem,  
naturam solam, retentricem, quod dum dilatatur, cibos com-  
plecti nequeat. Philoi. psychicon pathos facit Convulsionem.  
Singultum uero, somaticon. Musa inepte uertit frigidum,  
pro animali. Quamquam non minus corporata passio uide-  
tur in Convulsione, quam Singultu. Hinc etiam duplex diffi-  
cultas. An sit Convulsio: & an præter inanitionem & reple-  
tionem, que sunt Convulsione proprie dictæ causa, à tertio  
quodam causarum genere fieri possit. Qui Convulsionem esse  
aiunt, primum Hippo. & Galeni autoritate muniunt. Sic  
enim Apho. 4. lib. 5. Galenus scribit. Quod autem (inquit) sin-  
gultus Convulsio sit stomachi secundum Hippoc. nos utique  
nonimus. Deinde ratione. Quia nervi satis insignes, sed bre-  
ues à sexta coniugatione in ventriculum perreptantes, ad  
suum principium contrahuntur. & partim, cui inseruntur  
simul adducunt. Alij negant primum, quia Convulsio muscu-  
li propria est affectio. At neque ventriculus, neque ipse os  
musculus est. Deinde dilatatur, antequam contrahatur, po-  
stea redit in naturalem suum. Quod in Convulsione non fit.  
Præterea Hippo. in Apho. postquam de Convulsione loqu-  
tus

*duplex dif-  
ficultas:*



ius est, singulum adicit, tanquam tertium quid. Sed hac disputatione nominis tantum uidetur esse. Proinde utrisque respondemus ex Galeno Aph. 39. lib. 6. Singulus uero concedatur (inquit) Conuulsio stomachi, nominari, quando aliud fuerit sermonis propositum, Quanda uero hoc solum studuerimus ut passionis substantiam cognoscamus, melius fortassis fuerit non Conuulsionem nominare, sed quendam motum eiusdem cum nominibus generis, sed fortiolem, & uehementiorem. Hec Galenus, cui addimus ἐν πρῶτῳ ποτῶ πρὸς αἰτρίαν Conuulsionem fieri, ut ait Philoth. Vbi Musa inepte uertit πρὸς αἰτρίαν, propositum, cum significet partem, que pro arbitrio mouetur. Est enim Conuulsio proprie dicta, inuoluntarius motus, in parte, que uoluntate mouetur. Singultus autem, fit in uentriculo, & sepius in ipsius orificio. Differt ergo à Conuulsione proprie dicta, motus formula, & partis affecta natura. Latius tamen sumpto nomine, Conuulsio rectè dicitur Hippocrati. In altera difficultate argumenta, quoque afferuntur in utramque partem Galenus 8. κατὰ τὸ πρῶτον se non reperisse scribit in Conuulsione tertiam causam supra euacuationem & repletionem. In singultu maxime, acres nimirum humores stomachum mordentes. In quo inconstantie notatur, ut qui toties dixerit conuulsiones sepe fieri dimorso ore uentriculi ab acri humore, ab aura ascendente, humore aut semine putri in utero, ueneno, que cause eadem sunt cum tertia, quam affert Galenus. Hinc efficiunt Singultum & Conuulsionem esse, & à duabus tantum causis, ut ceteras omnes Conuulsiones, fieri, in anitione nempe, id est, summa siccitate, & repletionem per humiditatem superflua, siue replendo nervos contrahat, siue grauet, siue qualitate aliqua uuliosa pungat. Videntur autem rursus homonymia decipi. Nam κατὰ τὸ πρῶτον singultum distinguit à proprie dicta Conuulsione. In ceteris locis generalis uocabuli acceptio. Cum enim Conuulsio fiat in musculis, & nervoso genere: nervi autem alij potissimum motui, alij insigniori cuidam et exactiori sensui destinati sint, ad uoluptuosa retinenda, & noxia reicienda, ut qui ad orificium uentriculi mittuntur, in illis acris humor pungens, aut uenenoza quadam qualitate, uel aura, conuulsionem non efficit nisi per accidens,

ut



## DE MORBIS INTERNIS

ut in Arthritide, in qua punguntur nervi, neque tamen conuelliuntur, & in aura è crure ascendente, quæ non musculos cruris, sed uentriculos conuellit, & ad contractionem excitat. In posteriore genere contra fit. Cum enim mordentur partes, quibus nervi illi insignes inseruntur, peculiari quodam motu, ut in tusi sternutatione, Epilepsia, uomitu, & singultu, expellunt causam noxiam. In quibus certè Gal. tertiam quandam causam agnoscere nobis uidetur: in cæteris minimè. Ac proinde conuenienter rerum naturæ scripsit  $\kappa\alpha\tau\alpha\ \tau\omicron\ \pi\omicron\upsilon\varsigma$ , se non reperire in Conuulsione tertiam causam, ut in singultu. Quod etiam intellexit de alijs Conuulsionibus, quæ eodem naturæ conatu fiunt, quo singultus, nec sibi hac in re contradicit.

Et reuera qualitas quadam in pipere uidetur aut à sanie, aut corruptela, quæ neque inanitio neque repletio dici potest, nisi minus propriè sumptis huiusmodi uocabulis. Sic, n. ut capite de Conuulsione dictum est, aliquando referuntur omnia ad inanitionem & repletionem.

Fit hic affectus in uentriculo, stomacho, & œsophago, id quæ uel per  $\iota\delta\iota\omicron\ \pi\alpha\tau\iota\alpha\varsigma$ , uel sympathiam à menyngebis, intestinis, utero, neruosis partibus, hepate inflammato.

*cæ singultus.* Cause sunt inanitio, repletio, qualitas humoris, frigiditas, febris singultuosa, de qua lege Com. Gal. 4. Acu. inflammatio menyngeum, uentriculi, hepatis, mesenterij, humor acris infarctus tunicis, punctio acrim humorum, pituita tunicis herens, rigor, unde nervosa corpora duriora effecta coguntur, & proinde replentur, quia diffilari non possunt, sanguinis eruptio, longa inedia, temere adhibita neruis topica, materia, quæ euomitur, orificium uentriculi irritans, uel in eo imbibita, aut abscessum efficiens. In inflammatione hepatis aut alterius partis communicatur affectio per neruos & feruor stomacho, uel resudat bilis & regurgitat, uel comprimitur uentriculus. In inflammatione cerebri robur oculorum permanens perspicitur, & qui non euanescit post uomitum, licet aliquando etiam sequatur stomachi inflammationem, sed rarius. Ab ile uel corruptis cibis cognoscetur ex præcedere uictus ratione, ructu, uomitionis sapore, colore flauo, calore. Ab inanitione sere fit cum uehementissima siti.

Ut pars & occasio, ita grauius periculum. Nam in febre periculosus



periculosus est singultus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifesto appareant. Sic enim sepe indicat crisin uomitione futuram. In hystericis ab utero non ita periculosus. Ab inflammatione uteri, deterior. A musculis & ossibus temporum, lethalis. A sanguinis fluxu, malum, ut ait Hipp. Sed Galenus rectè addit, ut plurimum. Quod auctor se uidisse annotauit in nobili quodam quinquagenario, uel seniore è familia D. D'Antrargues, cuius ille erat æconomus. Effusa enim incredibili sanguinis copia, euasit à conuulsione, deliquis animi, singultu, adhibita cucurbitula, & sanus superuixit. A uomitu quoque malum. Cum enim uomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri uel stomachi metuendum.

Erysimachus Medicus in conuiuio Platonis Aristophanem singultientem docet tria remedia singultus. Continere spiritum (de quo lege Gal. de difficultat. spirandi 3.) Colluere fauces frigida (contracto ad interiora calore, uel obtuso sensu.) Irritare sternutamentum in uehementi, nec alijs auxilij cedente: Id (inquit) si bis, aut semel feceris, etiam si frequentissimus est, tollitur. Respondet Aristoph. non prius cessasse singultum, quam sternutamento represserit. Gal. in Aph. distinguit. Id prodesse, si singultus fit à conclusis humiditatib. Eos enim, qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariiores, non sanat sternutatio. Alios maxime. Concusso enim capite: & uentre, tum reliquo corpore, maxime nervoso, excutitur materia, quæ singultum facit. Sicuti eadem calfacta succussione, tenuataq; partim uacuata & discussa, partim translata in partes ignobiles, ut scribitur 4. de rat. uict. in acu. In pituita tunicis herente incidendum, detergendum, uacuandum uomitu, pilulis, coquendum, roborandum, fortius ex oleis calfacientibus, uel sicci foci, humidis meliores, conspersa tamen aqua uite, uel simili, cucurbitule primum scapulis affixæ, deinde ad 12. uertebra & uentrem. In biliosis humoribus uomitus, detergentia in sanie acri, aromatica omnia, discutientia odorata. Odora enim stomachum colligunt, grauius olentia dissoluunt. In inflammatione uentriculi, cauenda, quæ in inflammatione hepatis dicuntur. In omnibus causis, clysteres ad humoris deriuationem. Ligatus

*de singul  
ne & febrib*

*curo in sin  
gulta pitui  
tosa:  
in humori  
bus biliosis.*



# DE MORBIS INTERNIS

a Phagede ris inducendo dolorem, singultum sedant, per fasciam cōpres-  
na nomē ca sio, phenigmi perseverante malo. In omni affectione ventri-  
tacrificos culi, leui purgatione utendum, nisi à toto corpore humor con-  
pro canina fluat. In vacuatione, nisi lethalis fuerit, lactis potus, optima  
appetentia in scula, cucurbitula. Ab alimentis acribus, aut medicamen-  
sumitur. Cō tis, oleum amygd. dulc. oliuarum, butyrum, ptisana cremor,  
mē. in sent. aqua frigida. Sunt quedam vulg. ria; vt experimentum,  
37. sect. 3. quod probari vidimus, compresso virinque ad latera medi-  
lib. 6. ton co digito dextro, rei tristis narratio, aut insolite timor, alio  
epidimion. videlicet, seducta virtute animali, quæ respirationem facit.  
b Quoniam Cuidam nullis remedijs c. debat singultus, nisi vino Hippocra-  
aqua uo- tico albo. Cui refrigeratum fuisse ventriculum par est. In  
rax, uigilia herniosis semibus saepe fiunt singultuose febres. In quibus  
itē uorax. singultus non curatur, nisi reposito intestino. At si reponas  
lib. 6. epid. vi, paulo post moriuntur. Itaque desperatio. Annos 1547.  
c Vetriculi iuxta adēm Sancti Stephani de saxis. Puella assidue singul  
scilicet orifi tiebat, nihil deglutiebat, dolore facto in œsophago. Antea  
cio: unde la pulmonibus bubulis largiter r̄sa fuerat. Hinc grauitas in sto-  
befactatur macho, nausea, vomitus. Frustulum tamen pulmonis, quem  
uis ciborum ederat, in œsophago restiterat. Cucurbitulus & idoneis reme-  
appetens. dijs tandem reiectum frustulum; sicq; liberata est.

d Gal lib. 1.

ad Glanc.

De Bulino & Canina appetentia. Cap. XXXII.

bulimū iter

syncopes cās

enumerat.

e Singula-

rib. quæ Gre

ci termas-

mata a ppl

lant. Dum

enim synco-

pes meus in

gruit; uni-

uersalia mi

nimē sunt

prescriben-

da.

**B**ulimos vnum famis genus est, a Phagedena alterū.  
Ingens atque insatiabilis appetentia. Vtriusq; multę  
sunt differentię, & causę euariāt. Aliis longum iter per  
e Singula- b frigora & niues, aut alioqui externum frigus inde af-  
rib. quæ Gre fecto c stomacho bulimi causa est. Sed initio quidē mul-  
ci termas- ta appetunt: postea uerò concidit appetentia. Propte-  
mata a ppl rea hoc genus ita definit Galenus d Bulimos casus est ap-  
lant. Dum petentia a frigiditate exteriorē, ex indigentia totius cor-  
enim synco- poris, & imbecillitate stomachi, qui & refrigeratus ni-  
pes meus in mium & resiccatus est. Propterea vniuersalis curatio in-  
gruit; uni- calefacientibus & humectantibus, tū e balneis, tum fo-  
uersalia mi mentis & eduliis posita est. Appetunt ergo hi initio qui  
nimē sunt dē uehementius, sed tēpore nihil appetunt. Alia quoq;  
prescriben- Species est, cū acris & mordax humor inhæsit tunicis sto-  
da. machi, ut nulla iam sit appetentia, atque ita contabescat

cor-



corpus. Meminit & alterius generis in lib. de Theriaca. a Aristotel.

Quibusdam nascitur in intestinis latus uermis. Iis si diuturnius ieiunium est, lancinat intestinum, & uentre. 5. de histor. Vbi uero cibus ingestus est, exugit atque depascitur, ex animal.

quo destitutum corpus alimento emarescit. Aliud quoque indicium est illius uermis proditum ab a Aristote. b praesertim theriaca. vi le, quod in egestionibus albi similia seminibus cucurbi de Gal. lib. tulæ, aut cucumeris apparent. Excludendus is b uermis de theriaca

eo modo, quo dicitur cap. de uermibus. Rursus c frequētissimus est Bulimus in his, qui cōualescunt: magis c Perapho. etiam si fuerit morbus longior. In his enim non solum 8. lib. 2.

humor & spiritus, sed & solidæ partes detrimentum acceperunt. Quæ in re utendum erit præcepto Hippocratis d Quæ longo tempore extenuantur corpora e lentè d Aph. 7. resiccare oportet. Quæ uero f breui, breuiter. lib. 2. In quibus nimirò perfecta ex

In breui enim morbo, humoribus quidem, & spiritibus aliquid detractum est. Integræ uero atque incolu- tenuationis nec inchoa-  
mes solidæ partes. ta signa ap

Quorum instauratio partim g odoribus propter spiritus partim odoratis alimētis, & iis liquidioribus pro parent, ab  
pter spiritus & humores, partim etiam solidis, si quidē exhausto  
partes elemētares attenuatæ sunt. Ad hæc leges Apho. partiū soli  
Facilius est impleri potu, quàm cibus, Quartum de sani darn, nec so  
tate tuenda, 7. methodi, & finem microtegnis. lū spiritui  
& humorū

[Sūma est, ut alimentis boni succi, qui facilè coquantur, distribuuntur, & nutriant modica quantitate. Breui partibus nu  
bus interuallis reficias, qui propterea quòd sæpe sitiūt, tritioni di-  
uino refouendi sunt hoc modo. catis, in ha

h Lædit uinum uacuo stomacho ante cibum. Statim bitu tēpera  
enim differtur in corpus: neruos lædit. Vnde tremor, mento et a-  
conuulsio, delirium. ctione.

Ex e Cibus liqui

dis imbecillimis, concoctu facilimis & minimè sitiferis: quòd partes solide  
(quantū propriū munus est concoctio) ab exhausto laborent, nec tã facilè  
partes nutritioni dicatæ à diuturno negotio ad otium se conuertant.

f Dissipatis scilicet tantum spiritibus atque humoribus, superstitæ partiū  
solidarum integritate, & non labefactata naturali æconomia.

g Hippoc. lib. de alimento. h Galen. comment. in aphor. 2. 1. lib. 2.



## DE MORBIS INTERNIS<sup>4</sup>

Ex immodica uerò quantitate, aut non conuenienti qualitate ciborum recidiuæ fiunt. Tempestius est uini potus in medio cibo.

Post cibum interim dum alimentum conficitur, abstinendū uino, tum quia inde fluitat cibus, aut priusquā fuerit confectus, in corpus rapitur. Quo tamen tempore si uehementer sitiant, tantum exhibendum est potus, q. s. ut desiderium obtundatur.

Iam confecto cibo, & ut distribuatur, comparato, abunde bibant. Postremum uerò genus canina, appetentia est. Contumax atq; insatiabilis, in qua multos cibos ingurgitant, sed eosdem statim mora canum reuomunt, quia, uide licet, natura multitudinem non sustinet. Nasci tur fere à frigido, acidoque humore tunicis stomachi imbibito, quomodo spongia liquorem aliquem exsorbet. Nonnunquam etiam à sola intemperie nasci uolunt. In temperies contrariis corrigenda est.

In uitioso humore conueniunt, quæ incidunt, detergent, calefaciunt. Diuretica quoq; , eaque pani, uino, edulis mixta aut aliter exhibita, qualia sunt melicrata è thymi, origani, hyssopi, satureia, pulegi, allij, porri, & similia decocto, aut qui his respondet *a* syrui.

*a* **Ut syrui**  
**pus de men**  
**tha aut de**  
**hyssopo, de**  
**absynthio.**

Purgandus quoque humor est drac. ij. hieræ picræ ex conuenienti melicrato. Alioqui conficiendæ pilulæ ex pul. hieræ & agarici trochiscati an. ʒ. ii. Quod si amaro-rem aloes non ferant, hieræ puluis est melle incorporandus, aut unc. s. electarii de hiera imperanda est.

Alioqui pilulæ fiant, quæ illinantur melle, aut puluis ex ouo sorbili exhibeatur. Potus multus uini, etiam si non sitierint, conuenit, sed in medio cibo aut pleno uentre uerisimilius, quàm uacuo: uel etiam uacuo.

*b* **Ne assi-**  
**duitate e-**  
**dendi fran-**  
**gatur vis**  
**uentriculi,**  
**& ex cani-**  
**na appeten-**  
**tia fiat bu-**  
**limus.**

Vinum giluum ut aut uermiculum, nulla præditum adstrictione, uetus, dulce, uel acriusculum. Hæc & cōtra causam faciunt. Contra uerò symptomata *b* edulia pingua, oleaginosa, quæ relaxant corpus uentriculi, quod acido humore adstrictum est, et uehementius appetit. Omnia frigida, & quæ adstringunt, uitanda sunt.

Stomachus oleo fouendus est, in quo thymum, & proximè



proximè dicta materia coxerit. Sed quia aliquando cō-  
suetudo fit uomitus, nihil retinetur, atque ideo incale-  
scit corpus. Modica quantitas alimenti semel exhiben-  
da est, quam etiam si non retinet uentriculus, cucurbi-  
tula uentri infigenda est eo modo, quo capite de chole-  
ra diximus.

## SCHOLIA.

Βούλιμος, & κυνώδης ὀρίξις nomina sunt ingentem fa-  
mem & omnino preter naturam significantia. Plutarchus  
in Sympoticis βούλινος scribit idem significare, quod πολὺ, qua-  
si sit πολὺ λιμός, multa fames. Non eadem tamen huius no-  
cis apud omnes acceptio. Aristoteles in Probl. generalius  
sumpsit pro fame à frigore, intrò compulso calore, quæ leui ci-  
bo acquiescit. Γάζα βουλιμὸν uertit caninam appetentiam.  
Aphrodisiens in Problematicis confundit cum Pica, quia  
multa, sed absurda appetuntur. Quam etiam fieri scribit à  
Colico morbo refluyente uitio in stomachum. Sed Medicis in  
usu esse solet pro ea duntaxat fame, quæ contrahitur refri-  
gerato & excitato ore uentriculi à frigore externo, qualis  
per niues iter facientibus contingere aliquando solet. Initio  
multa appetunt, cum nondum excessit modus refrigeratio-  
nis, neq; uomitionibus à cibo sumpto facillè corripuntur. At  
ubi excessit frigus, ac robur stomachi resoluti, in appetētia cō-  
sequitur, & cibi fastidium, etiam si corpus nutritione egeat.  
Hinc imbecillitas uentriculi, animi deliquia, uirium exolu-  
tio, color fædus, torsio stomachi, cordis & extremarum par-  
tium frigus, pulsus obscuri. Suidas fieri ait Hieme iter agen-  
tibus per summum frigus, & niues, cum corpore densato, in-  
tro pulsus calor alimentum depascitur. Liquatis niuibus,  
& calore aeris redeunte, exiguum calorem solui, ita egros  
hoc morbo corripit. Galenus uidetur Aph. 2. lib. 2. à Cani-  
na appetentia hoc solo distinxisse, quod famem non habeat  
amplius adiunctam, licet ab ea inchoauerit. Caussamq; uni-  
cam affert, frigus externum. In libro tamen de Theriaca  
alterius speciei meminit, à latis uermibus & pregrandibus,  
qui chylum depascuntur. Sed hanc Auicenna, Serapio, Tra-  
lianus ad Caninam appetentiam referunt. Huic similis est  
κυνώδης ὀρίξις, id est, Canina appetentia, quod neutra uacua



## DE MORBIS INTERNIS

to corpore ex inopia alimenti, aut calamitate frugis populo inuehatur, sed utraque oriatur ab affecto ore uentriculi & puncto à caussa præter naturam. Distinguntur causis & symptomatis. Nam Canina fames causas in uniuersum duas habet, Refrigerationem simplicem, & siccitatem oris uentriculi, ut superior, & acidum humorem ori uentriculi impactum, & pungentem. Acidus autem humor duplex, pituita & melancholia. Deinde symptomata sunt diuersa. Nam hic à cibo perpetuus uomitus, & perpetuus cibi appetitus more canum. Cum enim caussa, quæ pungendo famem excitat, semper presens adsit, & imbecillior uirtus cibi copiam non sustineat, necessario sequitur uomitus. Hinc perseverante malo tanta imbecillitas, ut nihil amplius uenter continet, alui profluvium cæliacæ, dysenteriacæ affectiones, hydrops. Nulla, ut in superiore, animi defectio, nisi diuturnitate mali robur oris uentriculi dissoluatur. Atque ex propria essentia Caninæ appetentiæ. Galenus tamen uocabuli significationem sæpe traduxit ad alia sanis genera, quæ oris uentriculi uitio non fiunt: sed uel ab inanitionibus corporis, ut 4. de sympt. causis: uel imbecillitate retentricis, ut primo eiusdem operis: uel refrigeratis partibus thoracis & respirationis, libro de Usu resp. Aetius addit, à raritate totius corporis, & occulta perspiratione. Sicque in uniuersum Causas in facie canina constituere licebit, intemperiem solam frigidam, ubique sit, modo ad uenter perueniat, ut à niuib, & potu aquæ frigidissime, deinde pituitam acidam uel melancholiam tertio dissolutionem totius corporis, siue exhauriatur insigni aliqua uacuatione, siue alimentis exigui nutrimenti, aut usu assiduo detergentium, siue nimium transpiret. Quæ species ab alijs facile distinguitur, quia alui deiectiones parciores & sicciores, quam pro cibi ingesti modo & qualitate. Ceteræ autem internoscentur ex relatu ægri, excrementis, ructibus acidis, sapore oris acido.

Remedia sunt, Vomitus, Deiectio, Pilule, clysmata, iteratae purgationes, opiate, linimenta. In resolutione optime alentia: in refrigeratione, calfacientia, humectantia, balnea, fotus, medicamenta, alimenta. Sed Hippocratis singulare remedium, uni potio. Galenus pinguius primum dari iubet,



bet, ut obtundatur fames: deinde uinum ex eorum genere, quæ calfaciunt, fulua sunt, rubea, tenuium partium sine astrictione, idque in magna copia, licet non sitiant, siue ab intemperie frigida sit, siue ab acido humore. Aetius quoque uinum exhibet & ieiunis & pransis. Sed in fame naturali admodum noxium, ieiunis uinum dare, quin conuulsionibus & delirijs confestim corripuntur. Quod si uini potione non remittatur ob materiam coniunctam, purgato & uentriculi os roborato. In ijs qui per frigora & nives morbum contraxerunt, uidendum, ne subita fiat mutatio subito, multum calefaciendo, quia sic calor exiguus & languidus dissoluitur: aut subito nutriendo, quia suffocantur. Si in deliquiis animi inciderint, Archius reuocari docet odoramentis aceti, pulegijs panis intincti, malis, pyris aut alijs fructibus, qui ad manum sint. Extremæ partes constringantur, pungantur a

Humoris  
maxillæ, uellantur capilli & aures Reuocatis damus panem morbisfici et  
uino intinctum, deinde carnem suillam, & quæ multum exi partis obfes  
gua mole nutriunt, oua sorbilia, bullos, cochleas, aromatica. sæ proprijs.

De iecoris inflammatione. Cap. XXXIII.

**I**Nflamatur iecur gibbis & cauis partibus. Vtrunque propriis a iudicijs distingues, ex cap. 6. lib. 5. de locis affectis.

b In inflam  
matione he  
patis, si etas  
et uires per  
ferant sine

Curatio alia Græcorum, alia Arabum b Conuenit tamē de phlebotomia. Statim ergo clysterem mollem iniice ex lib. j. decoct. communis. unc. iij. olei uiolati. In quo dissoluantur drach. 6. cassie, mellis ros. & sacchari rub. an. unc. s. Reddito clystere eo tpe, quo eger minus calere uidebitur, declinatione accessionis uenā basilicam diuidito. Quæ si non apparet, media aut etiam cephalica uulneranda est. Probatum quoque antiquis Medicis, ut uenæ extremæ manus aperirentur. Gal. eam elegit, quæ ad pollucem uergit. Paulus, quæ ad minimum. Rasis, quæ ad medium. Sed ex his parum sanguinis effluit. Grauis autem inflammatio est, & febris, quæ uacuationem desiderat & subitam & copiosam, etiam ad animi deliquium, nisi partis nobilitas repugnaret, quæ tanē graui detrimento subitam plurimamque uacuationem

infirmittatis  
metu, recte  
celebratur  
phlebotome  
cū ad de-  
clinationē  
cassie ante  
cedentis, &  
amotionem  
coniunctæ,  
tum ad pro  
curationem  
pepasmī, &  
materie ex  
clusionem.

nem



# DE MORBIS INTERNIS

*a* Vel *R. a-* nem non sustinet: ex quo téperanda est uacuatio. Quod  
*quar. end.* attinet ad topica, Arabes refrigerantibus utuntur, qua-  
*cich. agrim.* le hoc est.  
*ro. an. unc.* R. succi solatri tepidi ℥.iiii. cum linteolo, aut stupis  
*iq. aceti 3.* cannabinis fiat *a* epithema. Aliud.  
*vi. santal.* R. aquæ ros. unc. iiii. aceti unc. s. santalorum rubrorū  
*rub. & citr.* & citrinorum ana 3. i. camphoræ 3. i.  
*an. 3. i. ca-* *b* Græci relaxantibus utuntur, quibus aliquid aroma-  
*phura seru-* tum admixtum sit, quod adstringendo roboret. Vtrisq;  
*p. s. f. epibe* scopus est ut refrigeretur hepar. Græcis præterea, ut  
*ma pro ieco* uis eius conseruetur. Arabum remedia qualitate pro-  
*re dum ex-* pria refrigerant. Græcorum uero per accidens. Nam  
*candescit.* apertis poris resoluta in fumos mate ria calorem hepa-  
*b* Potior est tis euacuant. Græcorum.  
*Græcorum* R. summitatum absynthii, carnis cydoniorum conci-  
*sententia in* foruū ana unc. iiii. Decoquantur in aqua & oleo ad con-  
*per se, tum* sumptionem aquæ. cum stupis cannabinis aut linteolis  
*ex enentu.* in expresso oleo mersis. Foucat regio hepatis. Alioqui.  
*Per se qui-* R. ol. de absynthio, & cydoniorū an. unc. i. ceræ unc.  
*dē, quoddro* s. liquefiant in uase duplici. Refrigerata malaxentur cū  
*bur seruet:* succo endiuie, cichorii, aut simili. Olea cōueniant *c* ro  
*ex enentu,* satum, de cydoniis, de mastice, absynthio, spica, schē-  
*quia scir-* nantho, in quo santala coxerint, quæ adstringendo ro-  
*ris ut int.* borant. Relaxant uero oleum de amygdalis dulcibus.  
*c* Hæc olea de chamæmelo, anetho, meliloto, in quo althææ radix  
*simul confir* coxerit, oleum lini.  
*māt & intē* Vbi fluxio maior est, maior quoque infirmitas uisce-  
*perie sedāt.* ris, plus adstringentium, alioqui plus relaxantium mi-  
*d* Ut *iulepus* scendum est. In summa lenientibus, resoluentibus, rela-  
*rosatus sy-* xantibus, roborantibus usi sunt ueteres: aliquando etiā  
*rup. malor.* remollientibus, ubi iam durities suspecta esset. Mucila-  
*granatorū.* gines conueniunt cum semine cydoniorum, althææ, li-  
*c* Ut *aqua* ni, senugraci. Quod ad potiones attinet, uitanda sunt  
*hord. cum* quæ *d* refrigerant & adstringūt, nisi *e* aliquid cōmixtū  
*iulepo rosa-* sit, quod detergeat & aperiat. Propterea aromata anti-  
*cio, aut sy-* quis probata sunt. Vti licet schēnantho, spica nardi, ca-  
*rup. mal.* lamo aromatico, cinamomo, folio, asaro, santalis, cam-  
*gran.* phora. Materia uero potionum ex hordeo. Syrupus ace-  
tosus,



tosus, iulep factū ex aqua uel decocto capill. uen. cicho  
rii, endiuix, sumariæ, cuscute, glycyrrhiæ, hepaticæ,  
quatuor sem. maioribus & minoribus cum octaua parte  
sacchari, & momento cinamomi, spicæ & similitum. a Sy  
rupi de cichorio, endiuia, capil. uen. de fumaria, sed plu  
rimum diluti non cum dupla aut tripla aqua, sed potius  
sexdupla aut octaua. Diluendi uero supradictis aquis.

Electuaria b quibus confirmatur hepar, proximo ca  
pite dicentur. Probatum est hoc oleum antiquis, etiam  
inflammato hepate.

R. rutæ P. ii. Ichthyanthi unc. i. sem. lini 3. ii. medium  
capitis papaueris. Coquantur omnia in oleo. Ceratum  
santalinum cum oleo conuenienti malaxatur, capian  
tur unc. iii. cerati. Malaxentur, extendantur in aluta, fiat  
scutum ad formam crescentis.

Emplastrum d de meliloto, de althea, ubi maturan  
dum est apostema. Malaxentur cum oleo de liliis, aut in  
quo radices altheæ coxerint, emplastrum factum ex cō  
tulis foliis brassicæ, & melle, emplastrum ex ficibus pin  
guibus, altheæ radice, coctis in oleo. Quod si suspitio  
est infirmitatis, aliquid olei de absynthio & aromatum  
commiscendum est.

Reliquiæ clysteribus & leuibus pharmacis subducē  
dæ sunt, e si quidem malum est in cauis hepatis. Quod  
si in gibbis & copiosior materia est, primū quidē easdē  
remediis, f deinde etiā diureticis utendum erit, radice  
graminis, cichorii, endiuix, acetosæ, apii, petroselini, sc  
nic, rusci, asparagi, & aliis, quæ postea plenius dicentur.

Laudata herba eupatorium ab antiquis & maiorana.  
Cucurbitulæ g usus tum initiis, tum inueterato morbo.  
Quidam enim ē ueteribus, postridie quā missus fue  
rat sanguis, cum scarificatione affigebant dextro hypo  
chondrio Relinquebant uulnus in crastinum, atq; ite  
rum affigebant. Alii uero iam inclinato morbo, ut reli  
quias uacuarent, similiter applicabant.

## S C H O L I A .

Ut Pleuriticis, & Peripneumonicis, qui lateris aut pul  
monis inflammatione vexantur, ita ip aticus, à iecore inflam

que horde

unc. 8. syru.

capil. uene.

3. i. f. potio.

b Ut diarho

dū albatis,

diamargarā

tum frigid.

electarium

triasatalis.

c Ut cū oleo

cydoniorū,

aut cū oleo

absynthite.

d Ad dige

stionē subla

to inflama

tionis meo

e Nā causa

hepatis per

desectiones,

cōnexa per

urinas ex

purgantur.

f Nā quonā

tura uia af

fectat, eo die

cere oportet

p loca lege

nature ido

nea.

g Si hepar

non sit infir

mū, si fera.

enocida ma

teria, si non

sit flatio pe

rennis.



## DE MORBIS INTERNIS

*mato veteres appellarunt. Recentioribus alia huius uocis significatio, de qua dicitur capite sequente. Funt autem sæpius in hepate inflammatio, abscessus, scirrhus, imbecillitas, obstructio, vesicæ aqua plenæ in membrana externa, quæ si rumpantur, hydropisim generant. Cauendum imprimis ne fallamur, si quando tumor apparet in medio ventre. Nã quibusdam, ut quotidianis anatomiis cernitur, hepar extenditur ad sinistras partes. Deinde diligenter distinguendum, num in musculis sit inflammatio internis, externis, aut in gibba parte, vel caua, & ne pro Phlegmone hepatis, Pleuritidem iudicemus. Cõmunia & necessaria signa sunt in inflammatione iecoris tumor, dolor, febris, et ex his spirandi difficultas, ac tussicula inanis. Aliquando hepar ob pondus deorsum inclinans tendit diaphragma, unde mēbrana succingens cõstas diuellitur, siq; dolor ascendit ad clauiculas. Febris ardens est, lingua arida, rubens initio, deinde nigra et aspera, sitis inexhausta, nausea, tibi fastidiũ, singultus. Distinguntur partes gibbæ à cauis hoc mō. In parte caua dolor grauis singultus, nausea magis torquẽt. Fluxus vētris adest, vomitio biliosa, maior sitis, lingue ariditas et asperitas. In gibba, dolor pūctorius ob ligamentũ cū diaphragmate, urine magis ruffe, partes vicine ut septum magis opprimuntur, unde difficilior respiratio, tussicula manifestior, dolor ad dorsum acutior ob ligamēta, tumor tactu deprehenditur. Inflammatio inter cutē cognoscitur tactu ob tumorem, visu, quia calida rubescit: frigida sine febre, uel dura, uel laxa. In medio uentre, retinet figuram musculorũ tumor externus maior, dolor acerbior. Sed ad exactiorem digressionem lege caput 6. & 7. lib. 5. de locis affectis. Si in abscessum uertitur, lethale, cum ad carnem usque hepatis corruptio pertingit, & pus simile apparet feci olei, ex incocta putredine propriæ illius substantiæ. At si pus intra tunicas contineatur, nihil patiente substantia hepatis, uacua to pure liberatur omnes. Neque enim necessarium est, hepate suppurato hominem interire, nisi magnum sit uitium. Vnde de 2. de Morb. Pulmone suppurato, si album & purũ pus effluat, fibris etiã cruentis intermissis, egrũ conualescere: si uittello oui simile, et subaride pus crassum ac fetidũ mori. Nã pus album altera uitæ robur ostendit, & uictoriam nature.*

*Reme-*



Remedia sunt, ex eodem latere sanguinis missio, cucurbitula in coxis, clyisma, syrupi, olea, unguenta, cataplasmata. Gal. 7. Meth. in alteratione uidendum precipit, ne dum calorem extinguimus temperiem naturalem labefacemus: & 13 topica initio nunquam adhibenda esse frigida. Magna ex parte bilis crassior fit in calore hepatis, sed tenuanda, temperanda, et si in cauis, declinante morbo per aluum purganda: in gibbis prenes, sed primo lenioribus utendum. Neque tamē, si contra fiat, tantus error est, quantum Auicenna scripsit. Nam si uenosum genus per medicamenta purgari potest, gibba quoque poterunt. Sed eo commodius quod natura reperit. In cauis, clysteribus, deiectione ijs, cnico polypodio, epithymo, mercuriali in ptisana, uel in sculis primurrimur, deinde fortioribus, centauro, colocynthide. in gibbis à diureticis lenioribus ad fortiora paulatim transeundum, ne materia concreascit in scirrhum. In duritie uidendum præter ceteras partes, ut moderatè molliamus. Vincant incidentia & tenuantia, aromata misceantur. Seruandum enim robur partis.

De debilitate hepatis. Cap. XXXIIII.

**D**ebilitatis hepatis intemperies causa est, tum substantiæ uisceris, tum humorum, qui uenis & arteriis continentur. Atque imbecillis est attractrix, retentrix, alteratrix, & excretrix.

Attractrice infirma liquida deiciuntur per aluum, ut alteratrice uentriculi infirma: sed hic cruda & incocta. Infirma attractrice hepatis, non ita cruda, sed ad chyli formam accedentia. Hepate uero attrahente, sed non alterante chylum, simile quid loturæ carniū aut sanguinis, quem aqua diluerit, excernitur. Postea uero non rudimenta sanguinis, sed deteriore qualitate excrementa effluunt. Cuius rei causa hæc est. Frigidior hepate alteratrix infirma est. Itaque rudiores sanguinem, quem à mesenterio accepit, non conficit. Itaque per interualla excernitur & loturam carniū representat. Vbi uero resistit, crassescit, tempore angustias hepatis intercipit.

Cum



# DE MORBIS INTERNIS

*a* Nā color Cum non perspirat, suboritur febricula. Interceptus hu-  
 humorū, si mor putrescit, atq; aduritur, quo tempore non iam dilu-  
 non sint re- tus sanguis, sed ueluti fex sanguinis excernitur. Excre-  
 flui, similis tio illa lucet, atq; aliquando in atram bilem cōuertitur.

*sig. de*  
*ilitatig*  
*hepatig*  
*frig*  
*intepn*  
*sig. si*  
*a rata*  
*itēpn*

est more flo-  
 rum.

*b* Pigro mo-  
 audilatatur  
 arteria.

*c* Hec cru-

*d* itatis idex  
*e* ex a-pepsia  
 et cruditate  
 in venis.

*f* Ex ptur-  
 batōe à fla-  
 zulentō spi-  
 ritu.

*g* Quale. n.  
 est alimen-  
 tum, talis et  
 elucet calor  
*f* Quā ca-  
 lor resoluit.

*g* A calore,  
*h* bilis in  
 ventriculū  
 affluxu.

*h* Ex motu  
 putredinem  
 humoris, &

In frigida intemperie *a* color faciei pallidus *b* pul-  
 sus tardus *c* vrina alba, aliās tenuis, *d* aliās crassa, non  
 ita frequens neq; copiosa deiectio, neq; grauiter olens  
 nisi cum iam corrumpitur. Appetentia aliquando cor-  
 rumpitur, aliquando intenditur: multa sitis.

Calidam verò intemperiem sequitur *e* color faciei fla-  
 uus, celerior pulsus, vrina flauo calore saturata, *f* pro-  
 strata appetentia *g* sitis vehemens, fastidium graue, agi-  
 tatioq; corporis, *h* insignis febris, excrementa alui oli-  
 da, biliosa admodum, crassa, crocea, mordacia, uomitus  
 quoque virulenti, æruginosi, ex 8. de cōpositione parti-  
 cularium medicamentorum, 7. cap. lib. 5. de loc. affectis.

In calida dispositione fotu atq; *i* irrigatione primum  
 vtendum est, è cham. ros. mastichino oleo, in quo absyn-  
 thii comæ vel dactyli incoxerint. Laudatum remedium  
 Græcis & Arabibus, frequēs usus *k* cichorij, end. Opor-  
 tet autem hæc vel resiccata infriare aqua hordei, uel in-  
 coquere aqua purissima, & adiecta sexta uel octaua par-  
 te sacch. potiones conficere. Augebitur autem sacchar.  
 modus vel minuetur pro ratione. Hæc eadem in frigi-  
 da cōueniunt, sed loco sacch. diluemus mel, aut utemur  
 syrupo de cichorio simplici cum aqua absynthij, cuscu-  
 tæ, & simil. Optimumq; fuerit eas aquas prius condire  
 modico cina. aut adicere aliquid eorum quæ aperiunt,  
 quale hoc est.

R. endiu. cich. sicc. & pul. an. ʒ. ii. sem. securidaca  
 ʒ. i.

Synatrismo, quem hepar gignit.

*i* Fiat embroche ex oleo cydon. & rosaceo: linimentum, ex cerato santali-  
 no in oleo cydon. dissoluto. Admoneatur etiam ceratum santalinum toti  
 hypochondrio dextro in formam lunæ crescentis. Immisceri poterit puluis  
 coralli rub. aut res. rub. *k* Vt conficietur potio quotidie manè ex deco-  
 cto radic. cichorij, in quo sub finem decoctionis absynthij romani coma-  
 maduerit. Exhibetur iusta dosi cum tabella electarij santalini.



℞. i. cina. ℞. s. fiat pulvis detur ē uino albo tenui.

Laudant ueteres a melicratum ē silicis radice deter-  
gendo & liberando, sine calfactione manifesta, aut refri-  
geratione.

R. rad. chamæpytheos ℞. ii. rad. cichorii dr. i. schœ-  
nanthi drac. ii. coquātur in quartariis tribus aquæ puris  
simæ ad dimidias. Colaturā percola per manicam. Hip-  
pocratis cum sacchari albi ℞. i. cinamomi ℞. s. in frigi-  
da & imbecilli retentrice atque concoctrice.

R. nardi celticę drac. vi. absynthii drac. ii. cinamomi  
drac. s. cribrata melle excipe b Fiat electarium, aut de-  
coque in aqua, atque inde melicratum compara.

In frigore & inde obstructionibus olea conueniunt,  
in quibus elenii, iridis, gētianæ, costi radices coxerint.  
Eademque quoque radices infriantur, & insperguntur  
melicrato, uel excepta melle exhibentur. Cochleæ & lu-  
pinum iecur trita, & in puluerem redacta ex uino im-  
perantur.

*Electarium de uino Arabum quod Cyphoides ab An-  
dromacho, & alijs Græcis appellatum.*

R. e passu! mundatarum ℞. iii. croci drac. i. calami aro-  
mat. dr. ii. s. bdellii ℞. s. cassię drac. ii. s. cinamomi drac. s.  
spicæ dr. 3. myrrhæ electę dr. 4. terebinth. dr. 4. schœnan-  
thi drac. 2. s. siliquarum drac. 2. mellis ℞. 2. uini subtilis,  
quod sufficit. Fiat electarium. Addebant alii in calidio  
re hepate seminis hyosciami albi opii ana drac. i.

Materia ferè conuenit, quæ penetrat, aperit, lenit, ad  
stringendo roborat, absterget, incidit, putredinem pro-  
hibet, exiccat.

Vtuntur ergo ad penetrationem ciperi, schœnantho,  
croco, iride, aromatibus. Eadem quoque aperiunt, cui  
rei etiam pistacia, marrubium, absynthium, & alia, quæ  
capite de obstructione hepatis dicuntur. Leniunt ficus,  
passulæ, uinum granatorum dulcium, uinum subdulce  
& tenue.

Passentur. In cola. dissol. conser. anthos, cortic. citr. cond. cinam.  
in uic. i. spec. aromat. ros. diamar. cal. an. drach. s. uel s. op. q. f. opia-  
ta, detur quotidie mane & sub horam somni ad uic. i. f. uel s. uel s. uel s.

a Melicrati  
usus in cali-  
da hepatis  
intemperie  
uitandus.

b Præter ea  
laudatur  
electarium  
santalini

simplex ex  
triplicato  
rheo. ut. R.

specierum  
triansanta  
li scrup. ij.  
rhe. elect.  
drac. ij. sac-  
chari in a-

qua absyn-  
thij dissolu-  
ti uic. ij. f.  
electarium  
per tabellas  
pōd. uic. s.  
Detur alter  
nis diebus.

c vel sic cōfi-  
cies R. pas-  
sul. d. masce.

mundatarū  
i b. s. Coquā-  
tur ad pul-  
verem in uino  
ueteri & ge-



## DE MORBIS INTERNIS

& tenue. Abstergent mel, aqua mellis, terebinthina, & quæ inde distillantur aquæ, aqua quoque hordei.

Incidit acetum, uinum granatorum maturorum, & acidorum.

Roborat schœnanthum, absynthium, eupatorium, rosa, spica. Præseruant a putredine, & si quid est uirulentum, corrigunt in primis cinamomum, deinde cassia lignea, nardus, iuncus odoratus, schœnanthum, calamus aromaticus, crocus, myrrha electa, aspalthum, passulæ, rasura eboris, cornu cerui, unicornu, uinum, mel, terebinthina, aromata omnia. In exiccando utuntur spodio, cuius loco uti licet saccharo rosato, admixto cinere, facto ex ossibus elephantis.

A proprietate conuenire uolunt rhabarbarum, spicam, passulas, iecur lupinum, carnes cochlearum.

### S C H O L I A.

*Epatici dicuntur, non ut veteribus, qui hepatis inflammatione laborant: sed cum citra manifestum aliquem illius affectum imbecillitas sola acciderit ex intemperie. Cum autem intemperies omnis nata sit, ut ait Galenus, actionem ledere, non tamen omnis imbecillitatem hanc efficit, quam hepaticis tribuunt, cuius proprium est sanguinem probe non conficere, sed crudum semicoctum, & aquæ modo liquidum generari, siue calida sit intemperies, siue frigida. Sed & in calida sæpe adurit sanguis, tantum abest, ut semicoctus maneat. Facilius ergo doctrinæ gratia duplicem intemperiem constituere licebit. Vnam, quæ iam ad iecinoris substantiam peruenit, illiusque vires & harmoniam dissoluere, ita ut imbecillitate contracta suum officium non faciat, nisi diminutè. Alteram, citra imbecillitatē, intensa videlicet, aut remissa qualitate aliqua, ut calore & frigore, quæ tamen nondum naturalem constitutionem ita labi factarunt, ut facultatis vires sint imminutæ, sed potius corruptæ. In priora perpetuum est excretio sanguinis aquosi & semicocti, siue à calore sit, siue à frigore. Distinctio ex effectibus causarum. A calore. n. cibi fastidium sitis febris, viciolorum humorum vomitus. A frigore, contraria. In posteriore, si calida sit assatur chylus in bilem vertitur, urina ruffa, alui excrementa crassa, biliosa, fetida*



fatida, acrida, uentris astrictio ob vehementem attractionem a nimio calore, oris amaritudo, sitis, interna manuum caliditas, pedum pulsus celer. In ambitu corporis pruritus calidifumi. Et si bilis in uentriculum fluat nausea, biliosa uomitio, & similia. Sanguis autem non crudus ut in superiore, sed adustus potius cernitur. In frigida contraria omnia apparent, pituita, frigus totius corporis, color faciei albus, habitus corporis tumescens, nisi calor cordis impediat, excrementa pauca, parum olentia ob cruditatem, uentris profluvium certis temporibus. In sicca, corpus siccius, squalidius, sanguis paucus crassus, uenae duriores, In humida contra fit. Causse externa, interna, quaecunque immodicè refrigerant, calfaciunt, siccant, humectant. Partium item cōsensus, intestinorū gracilium, uenarum mesaraicarū, epiplois splenis, folliculi fellis, renum, uesicae, uenarum, quae omnes partes hepatis inseruiunt ad preparationem alimenti, excrementa recipienda, sanguinis delationem, uel coctionem iuuendam.

Ab intēperie cum imbecillitate uix curatur. Sed in eo elaborandum ne augeatur, occurrendo causse, & roborando. In calore remedia sunt aquae potus, alimenta refrigerantia, Syrupi, tabellae, conseruae, epuhemata, unguenta, cerata. In frigore, eadem sed contrariis qualitatibus. In siccitate, humiditatem instaurantia, potus lactis balnea, proprietatem occultum habentia, & quae heceticis conueniunt. In humiditate contrariis occurrendum. Valent, hepar piscium, anserum, animalculorum, capreolorum, agnorum, terebinthus, pruna, passule acetosae. Possunt macerari in sero lactis, aqua hordei, lacte, uino decocto cinamomi, & alijs, ut res postulat, dum turgeant: limaces, cocleae, decoctu hepatica. Uua passa tantum astringit, quantum opus habet viscus affectum. Neque enim aget magna astrictione, neque tanta, quanta uentriculus, tota substantia hepatis familiaris. In calore usus mollis casei, cremoris lactis similium. Optima sunt, inquit Gal. quae una cum hoc, quod intemperiem curant, etiā alunt, familiaria, scilicet, parti laboranti, uinū, mastiche, confectiones Andromachi. Hepar humidiores habet compagem. Itaque non fert remollientia, nisi moderata, oportetque in indurato hepate calfacientium & attenuantium modum statuere praeter morem alio-

N

rum



# DE MORBIS INTERNIS

rum uiscerum. Bubula, & uini potus nimius Aestate hepatis infestissima sunt, & bilem ad hepar multam colligunt. Hepatica sunt Agrimonia in tybi species, senec. pele. chamapithis, radix filicis, acetosa, asparagi plantago, cupatorium, absythyum, sonchus etc.

a A bile to corpore suffusa.

b Ea q; uesiculae fellis.

c In quo est interdū impressa uenena quadā qualitas.

d Imò multi persæpe.

e Quæ uenis rarefactis rapiuntur.

f Naturalē, criticā, aut symptomatiscam.

g Et sit hypochondriū laparon & omnino æquale.

h Vnde nec ullam subesse perēnem icteri generationem.

i Ut agrimonia, sumaria, melilotum, furfur.

De a morbo regio.

R Egius est uerò signatus nomine morbus. Molliter hic quoniam celsa curetur in aula. Inquit Serenus. Hoc idem Cornelius Celsus.

Debet enim omnibus curis esse uacuus ac solutus icterorum animus, quin & splendido conclauis, lasciuia, cantu, iucundis quoque sermonibus laxandus est. Varro quia curetur mulla, morbum regium dictum existimat. Vocatur & hic morbus arquatius uel arquatius icterus, quia icterida, id est, uiuerrā, animalculū, quo cuniculos excludunt, (Vel mustellam colore oculorum aureo) uel Galbulā autē colore representet. Qua ratione & aurigo dicitur.

Causa fere b obstructio, nonnunquam inflammatio, aut intemperies e hepatis. Et obstructio quidem uel hepatis, uel pororum bilis: d Tapillus aliquando concretus in folliculo fellis, aut adnatum tuberculum. Nonnunquam quia cystis fellis multitudine intercipitur, uel quia uis eius excretrix infirma est. Venena quoque aut bibita e pharmaca, nec per alium reddita huius uitii causæ aliquando extiterunt.

Primum itaq; est, ut f causam agnoscas. Deinde ut eā dē tollas. Postremò Ictericū curabis. Interrogabis ægrum num sentiat grauitatem, tensionē, dolorem in dextro hypochondrio. Manum quoque admonebis, ut intelligas, num tumor & durities aliqua subsistat. Quæ omnia si g absunt & excrementa alui, urinæ similiter naturaliter habent, iudicabis h incolume iecur esse, ceterum effusam in corpus bilem, quæ colorē cutis defædat, & quia crassior est, exhalare ac resolui non potest. His ergo uictum liquidiores atque humidiores imperabis.

Balnea aquæ dulcis, in quibus quæ i detergent, atq; resoluunt, decoxerint. Si uerò adsunt, uenterque subsistit. Albida excrementa sunt cineritia & argillofa, urinæ

sig. obstructio



æ uerò spissæ, colore croceo saturatæ, aut etiam nigre, tum obstructionis certum indicium est. Inflammatio per petuò cum febre est, de qua prius. Obstructio ergò prius turetur deinde delebitur icterus.

Primum itaque aperientibus & detergentibus insigniter liberanda est a obstructio. Verum si suspitio aliqua est excrementi in uentre & primis uenis, cassiæ aut catholici b ʒ.i. ex sero lactis imperabis. Et quia in hoc morbo aluus c ferè adstricta est utilissimus est clyster, cuius materia sit ex iis, quæ sterçus durius emolliant, quæ resistenter bilem irritant, quæ musculos & instrumenta excretionis incitent. Sic enim placuisse ueteribus Aphrodiseus scriptum reliquit.

R. maluæ, bismaluæ, uiolaria an. M.i. furfurum pinguium M.s. fiat decoctio ad libr. i. plus minusve. In qua dissolue mellis communis, sacchar. rubr. ana unc. i. salis communis drac. ii. olei communis unc. iii. Hæc est formula, qua per interuallâ uti oportebit, ubi diutius uenter resisterit.

Postea si sanguis multus est, basilicam aperies, ac pro ratione sanguinem educes.

Solitæ quoque hæmorroides incitandæ sunt, & mentes in mulieribus, uenæ sub lingua, non nisi inclinante morbo aperiri debent. Tum enim ea phlebotomia tempestiua est. Tum de d purgatione agendum est. Meminisse autem oportet nunquam utendum purgationibus obstructo hepate insigni ter, nisi prius feceris uiam aperientibus & detergentibus.

Aperiunt autem oxalis, cichorium, endiuia, apium, adianthum, calamintha, foeniculum, gentiana, anchusa, aristolochia, melanthium, securidaca, chamæpythis, ros marinus, serpillū, hypericum, marrubium, asarum, anisum, petroselinum, amara omnia, aromata, terreni uermes, cornu cerui, ebur, cornu unicornis. Quorum omnium herbas, radices, aqua incoques aut uino tenui, atque inde cum saccharo aut melle potiones comparabis, aut redacta in puluerem ad drac. ii. mulsæ aut uini albi tenui & similia unc. iii. aut. iiii. insperges.

N 2 Symp

sig. istonig:  
cura obstruc-  
tionis

a Vesicula  
fellis, & uenarū hepa-  
tis. Tali. n.  
obstructio-  
ne exitu &  
aditu pro-  
hibetur bi-

lis in fellis  
uesiculam.  
b Vel drac.  
c. ne illud  
excrementū  
ui aperien-

tiū in uenas  
feratur, ob-  
structionēq;  
pariat.

c Quod na-  
tura clyster  
naturalis  
denegetur,  
ex eo quod

bilis exitum  
nō habet in  
intestina.

d Quæ sit  
huiusmodi,  
ut materiā  
morbum fa-  
cientē radi-  
cus extir-  
pet.



# DE MORBIS INTERNIS

Syrupi in usu sunt de cichorio, endiuia, capil. uen. de bysantiis, de duabus, & quinque radici. syrup. acetosus, de acetositate citri, oxymel simplex. Aquæ uerò endiuix, cichorix, lupulorum, cuscute, fumariæ, capil. uen. acetosæ, scolopendrii raphani, apii, fœniculi, lappæ rubæ, libistici, eryngii, rusci, asparagi, & similia. Oportetque initio primum uti leuioribus, idque per interualla.

Assiduus enim aperientium usus uehementer lædit atque ubi his usus fueris, purgationes imperabis ex seris factis unc. iiii. in quibus per noctem maduerint drac. ii. carthami conquassati, cinamomi, uel ireos florentinæ ꝓ. s. Alioqui rhab. drac. ii. infusas in aqua endiuix cum modico cinamomi. Idem ꝓdus a hieræ picræ, hieræ diaco. conuenire potest. Alioqui.

*a Si pituita obstru-  
ctio-  
nem faciat  
hieræ picræ  
comode sur-  
pabis.*

R. pul. hieræ diaco. ꝓ. iiii. rhab. electi drac. i. cornu cerui, rasuræ eboris, cinamomi ana scrup. s. Dabis hæc ex sero lactis aut aqua hordei. Tum ad aperientia redeundum est, & iterum purgandum interuallis. Quod si his malum non cedit, medicamentis utendum erit, quæ fortius aperiunt & detergent. Atque iam dacridio & colocythide catharica acuenda, ut proximis Gr. viii. vi. iiii. dacridii admiscenda sunt. Alioqui.

R. dacridii scrup. i. florum anthos, borraginis, & uio- larum ana ꝓ. s. cinamomi, asari, rad. gentianæ ana Gr. viii. Fiat infusio in sero lactis. In col. unc. iiii. dissolue sacchari unc. s. fiat potus.

Vomitibus quoque etiam cum elleboro, de quibus antea, probari sunt. Ita curato uiscere color fœdus delendus est thermis siccis: deinde balneo ex chamæmelo, anetho, calamento, fœniculo, rosmarino, parietaria, & furfuribus. Statimque a balneo, linteis asperis & materia balnei perfricandum corpus est.

Potiones ex supradictis aperientibus & detergentibus exhibendæ.

Sternutamenta & errhina, qualia prius descripta conueniunt.

Oculi & facies aceto albo, aqua hordei, succo granatorum,



natorum, oxy sacchara succo coriandri, acetosæ, acetositate citri. His quidem repidis fouenda sunt & continenda. Nunquam autem uenies ad fœditatem coloris, nisi sublata causa, & curato uiscere. Quod si durum est, fovebis ex aceto, in quo altheæ & lilii radices, ficus, passulæ, coxerint, tum unc. iiii. emplastri de meliloto, uel dialtheæ malaxatis cum oleo amygdalarum dulcium induces, uel ammoniaci unc. ii. in aceto dissolutas applicabis. Superioribus remediis uteris, sed admixtis iis, quæ leniunt & emolliunt.

In materia uenenosa initio quidem uomitus, si eo materia uertitur. Si ad intestina, clyster acris. Si in habitum corporis, cucurbitulæ cum multa flamma conueniunt, & ea omnia, quæ foras materiam attrahunt. Ex quo syrupo acetoso, de limonibus, oxy sacchara, de acetositate citri, cum aquis acetosæ, endiuæ, calendulæ, papaueris rubri, dictamni, tormentillæ, succo granatorum, berberorum, limonum, citri, lacte acetoso in quo flores cordiales leuiter bullierint, rasura cornu unicornis, cornu cerui, eboris, electuarius de uino, & paulò ante descriptum capite de debilitate hepat.

Theriaceæ & mitridatii usus. Dantur quotidie ℥. ii. aut drac. i. cum ℥. acetositatis citri, aut liquore conuenienti.

Virginibus, quas hoc uitium defœdat, purgatio ex hiera imperatur dr. i. s. ex aqua halicacabi (uulgo Alcechengi) cuscute, endiuæ, oxymelite. Alioqui.

R. hieræ picræ scrup. iiii. rhab. electi, agarici trochiscati, ana drac. s. rasuræ eboris, & cornu cerui ana scrup. s. cinamomi Gr. viii. croci Gr. iiii. incorporètur omnia in unc. s. catho. Deinde dissolue in sero lactis, aqua cuscute, aut liquore simili.

Imperetur quoq; hoc elect. triasantali, diarhod. abb. ana drac. s. utriusque diamarg. an. scrup. i. rasuræ eboris, cornu cerui ana ℥. s. sacchari in aqua cuscute & rosmarini, quantum sufficit. Fiat elect. per lozengas pondere drac. i. d. Dentur manè & uesperis per se, uel cum liquore conuenienti in cochleari. Alioqui.

R. rad gétianæ in pulu. redactæ scrup. iiii. cornu cerui

N 3

& rasuræ

14.  
folius et rami  
plasti in duto  
uiscere:

cura uenenosa  
a, rha uenenosa

a Melissæ  
quoq; mor-  
sus diaboli,  
cardui bene-  
dicti.

b De huius  
curatiõe fu-  
sus in sple-  
nicis affecti-  
bus.

c Vel dr. 6.  
exhibebitur  
aut ijs præ-  
missis, quæ  
ad obstru-  
cta liberan-  
da præscri-  
pta fuere.

d Diacurcu-  
ma etiã, &  
confectio al-  
chermes mi-  
rificè pro-  
sunt.



# DE MORBIS INTERNIS

& rasuræ eboris ana ꝑ. ii. cinamomi ꝑ. i. sacchari unc. s. detur sæpe medium cochlear ex uino albo, tenui.

Vtatur quoque per interualla decocto cicerū rubro- rum, in quo radices petroselini & cichorii coxerint.

## SCHOLIA.

Icterus iecinoris vitio flauus: lienis, niger: utriusque, mix- tus & uirescens, & puellis quibusdam. In omnibus effundi- tur bilis & in uniuersum corporis habitum. Differentia ex- causarū uarietate & modo sumuntur. Si obstruatur meatus à iecore in folliculum fellis, quia plena adhuc est uesicula, ex- crementa alui utique colorata erunt: Sin alter à follicu- lo in Ephysim, alba & cineritia, quia bili præclusus est adi- tus ad intestina. In utroque affectu, bilis non secernitur: re- gurgitat in iecur & uenas: sanguini permiscetur: effunditur in totum corpus, unde aureus color præcipue oculorum ob can- dorē. Pars per renes expulsa urinas aureas, crassas impuras efficit. Si calida sit & sicca intemperies hepatis, multitudo bilis inde procreata icteru generabit. Sed excrementa quoq; alui, ut cætera partes, bile perfusa apparebunt. Idem præstat imbecillitas secreticis, quæ genitam bilem non separata sanguine, ut in obstructione, schirro, inflammatione, uel im- becillitate hepatis. Idē quoque facultas expultrix in morbis acutis per crism, uel lesa retentrix, & superata humoris co- pia, multitudine, malignitate. Sed quò distinctius & exa- ctius cause omnes discernantur, imprimis uideto, an cū mor- bo acuto sit, an per se. Si cum morbo acuto, an die critico fa- ctus fuerit apparentibus coctionis signis, iecore nō indurato. Sic. n. optima crisis indicium, superante expultrice facultate. Contra, malum, præcipue ante diem decretorium, superata re- tentrice. Anceps tamen præsagium, ut dicitur. Quòd si sine morbo acuto sit, imprimis excrementa inspicio. Nam si al- ba, uel parum colorata, obstructio est. Si deiectio alba, uri- na flaua, nullus tumor in hypochondrys, neque tensio, et do- lor qua parte porus cholagogus declinuis, obstructus est ille meatus. Si colorata deiectio, uel est imbecillitas iecoris, uel intemperies calida, uel morsus uenenatorum animalium, uel pharmacorum deleteriorum potus, uel aqua corrupta, ut in expeditione Neapolitana. Duo priora distinguo ex pro- prijs

in uictum nunc  
coitit epay del  
litat, et sit  
icteritia

sig. icterit  
prouenit  
in crisi:

sig. obstructio  
nis pori folli-

sig. icterit  
prouenit  
icteris icterit



præ caputibus, in quibus agitur de imbecillitate, inflammatione, scirrhus, obstructione hepatis. Nam ab his etiam tribus postremis fiunt icteri, anthore Galeno Aphor. 62. lib. 4. Verum scirrhus diuturnus morbus existit. Inflammatio & obstructio repente fieri possunt. Adde signum ex flatu in intestinis. Nam pneumatodis, id est, flatuosi fiunt, qui ex imbecillitate ictero vexantur. Contrario modo afficiuntur, qui ex calida intemperie. Non ignoro Hippocratem scripsisse ultimo Aph. 2. Regio morbo laborantes non multum ventosos esse. Quod cum experientie repugnet, qua flatibus icteros abundare constat, interpretes in varias sententias distraxit. Sed flatus in uentre fieri certum est caloris nativi imbecillitate, uel multitudine & qualitate materie. Ergo cum ferè morbus regius apud nos ex multitudine crudi humoris ortu habeat, qui imbecillitate caloris colligitur & obstruit, nec detergitur influente bile, necessario ita affecti erunt pneumatodis. Quibus uero temperantior uictus, multum exercitium, calidior morbus, uel hepar, crassior bilis, intemperies calida, nisi accesserit imbecillitate, flatuosos non esse consentaneum est, quod Hipp. significat. Proinde non ineptè hoc signum adiecimus. Morsum uenenatorum, aut pharmaci delecterij potum ex relatu ægri, uita antecedente conuicito.

In morbis acutis presagium quam sit fallax ex ictero superueniente, historie multa in Epid. demonstrant. Quibus adduntur quadam anthoris observationes. Inter ceteras, anno 1545. quidam sexto factus icterus commota alio biliosa deiecit, urinis nigris & multo felle tinctis. Febris expers iam ambulabat, quasi omnino liberatus. 14. recidua. 17. obiit. Alijs duobus idem accidit. Quidam admodum robustus ante 7. icterus factus, ægerrime & cum recidua euasit. Annos 1549. mense Aprili & Maio (quo ferè tempore Lutetia febres tertiana exoritur) multis aurea urine, & morbus regius primis diebus. Cuius nobili ita affecto detractus sanguis ter ad octo ferè uascula iteratis uicibus. Sanguis totus & spuma & consistentia flavus. Visus est conualuisse. 17. recidua, alui profluvium, bilis crassa & meracior, singultus lenis. 21. obiit. Laborauerat aliquando lue uenerea. Multos in Epid. ante septimum icteros factos, euasisse legimus.



## DE MORBIS INTERNIS

In coacis Hipp. ἢ δὲ μὴ σαλῆς ἢ ὑποχόρδου, salutarē esse, 7.9.11.14. Si induretur, ambiguum, endiastron Gal. de rat. mēt. in morbis acutis, in biliosa febre, ante 7. Ictero cum rigore uel horrore morbum solus uoluit. Si uero absque rigore ἢ τῶν καὶ πῶν lethale. Vbi criticū icticum sine tumore, aut inflammatione hepatis, & excretionem consequentem horro- ris uel rigoris noīe intellexisse uidetur. Sed de his alio loco.

Criticus non curandus. in febrem inflammationē, schir- rum, obstructionem hepatis intentum esse oportet. In ceteris biliosa purganda sine attractione uehementi per aluum, re- nei, uomitum. Suppressa uacuatione, & in plenitudine, uena- sectio, à basilica. sub lingua. Hinc balnea. sudore mouentia, masticatoria errhina, regia uita, topicum. Deniq; omne pur- gationis genus, quia in totum corpus malum sparsum est, ut scribitur in lib. Quos purgare oporteat. Multos se curasse Ro- ma Galenus testatur antea preparados incidentibus, aperien- tibus, deinde medicamentis cholagogis lege cap. 7. lib. 5. de lo- cis affectis, et de purgantium medicamentorum facultate. Con- ueniunt aperientia, detergentia, cuscuta, errinaceus, ammo- niacum in mellito uino, uel aromatico, oleum inde distillatū, uermes terreni triti in melicrato, aqua raphani eupatorium gentiana, aptum, asarum, absinthium, amygdala amara, ra- dix capparis, triasant. triplicato rhab. Charadrion à uora- gine, uel uoracitate uilis auis, quæ credebatur uisa, icticum soluere. Propterea uenditores occultabant, ne emptores con-

**a** Quæna- specta aut curarentur, priusquā emissent. Inde nomen ei, quī riorum mor- re uilem quasi magni pretij occultat & dissimulat. Succus borū soboles fumiterre, cichorij, inde syrupi cū sero lactis, lac, cremor la- & parēs est ctis cū fragis, caseus mollis, horrei fructus, inscula ex hord. agros alimē acetosa, lactuca, cichoreo, scariola, ius prunorum, ex oleri- so defrau- bus conuenientibus acetaria ius pullastri alteratum cum ole- dat, & ana- ribus conuenientibus; calidā hepatis intemperiem corrigunt. dosim impe- Si sola intemperies, tantū alterandū. In quibusdam oxymel- dit. cū decocto gaiaci. Viscū collectum in alba spina, lintheis cō-

**b** Sacculis, futis includitur, cingitur nouem diebus, exprimento vulgi. De a oppilatione hepatis. Cap. XXXVI. Ppilatur hepar à crassis flatibus, sed facile **b** discu- tiuntur.

Non



Non ita facile a a crassis uiscidisque humoribus se a Hi enim  
reque sentitur lancinans b dolor aut c grauis, aliquā nō facile pe  
do d tensio, facies e male colorata est, squalor f cu pasmum re  
tis, pulsus g inæqualis, spiratio h ēt aliquādo difficilis, cipiunt.

excremēta : à natura enariāt, fereque liquidiora sunt. b Ab humo

Curatio magna ex pte ex pximo capite repetēda est. ris acrimo-  
k Incidendum, l aperiendum m detegendum, à n nia tunicaq  
quo purgandum est. si o cætera consentiunt, e basili- uellicantis.

ca, aut uenis extrēmæ manus sanguis educi debet, nisi c Ab humo  
suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus p malum na- ribas lentis,  
tū est. Tum enim uenæ cruris potius q incidēdæ sunt. d A flatu.

Materia incidentium, aperiendum, & detergentium e Ob inter-  
proximo cap. descripta est. Peculiariter conueniunt sy- ceptam ana  
rupus acetosus, oxysacchara, syrup. capill. uen. de cicho dosim. t pra  
rio, de indiuiā, oxymel simplex, quibus initio & ubi ca uorū humo  
loris suspitio, utendum est. Item oxymelite scyllitico, rum pleone  
syrupo de bisantiis, de duabus & quinque radicibus, cū xiam.

aquis cuscute, fumarix, & aliis supra descriptis. Proba- f Prauitate  
tum hoc est à r multis.

R. f aquæ decoctionis hordei lib. viii. aceti lib. s. lore diffuso  
uini granatorum unc. iiii. sacchari, mellis albi ana lib. i. contranatu  
Fiat iulep, clarificatum & aromatizatum cum modico ram in pra  
cinamomi, utatur unc. iii. t mane & uesperis. ui excremen

Purgatio ex hieræ 3. ii. cū oxymelite, aut quæ in fœ ti suffusioe.  
dis uirginū coloribus scripta est, ex rhabarbaro & agar. g Motu qe  
additio aliqn diacridii momēto, quales hē erūt pilulæ. te, dilatione

R. rha- arteria.

h Cōpressione diaphragmatis, aut symphathia tunica costas succingētis.

i Non sunt enim deiectiones figuratæ, sed molles, ex feri copia et præcla  
sa anadosi. k Si lenta, fit materia. l Quod obstructu. m Quod adheret.

n Vbi illis remedijs factum fuerit corpus supos, excitata naturæ ui est  
preparata materia. o Aetas, robur ægri, magnitudo morbi, symptoma

tum uehementia. p Per palyndromen & refluxum humoris eō unde uene  
rat. q Nisi uehementia præsentium symptomatum & grauiorū metus

axillaris uenæ sectionem suadeat. r Si carolis est suspitio. s Vel R.  
aquæ decoctionis hord. lib. viii. uini granatorum unc. iij. mellis lib. i. ace

ti ad gustum f. Iulepus. t Horis duob. ante cibum mane, itemque uespe  
ri duabus horis post cibum.



# DE MORBIS INTERNIS

*a* Horis duo

bus ante ci-  
bum mane,

itemq; vespere

vi duabus

horis post ci-

bum.

*b* Vt aqua

fumaria, a-

grimonie,

cuscuta,

vel decocto

radicū ape-

riensium.

*a* R. rhabarbari 3. i. agar. 3. ii. diacridii Gran. iiii. cum oxymelite formetur pilulæ, uel dissoluantur in liquore b conuenienti.

Contra obstructions certissimum remedium esse uolunt frequentem usum huius pulueris.

R. electarii diarhod. abba. triasantali, rosatæ nouellæ an. 3. ii. detur 3. i. in cochleari cū sex granis mali granat.

R. succi granati acidi & dulcis an. 3. i. s. resideant per noctem in salubri loco: postridie addatur oxymelitis 3. i. fiat potus.

R. succi end. cocti & depurati 3. i. oxyfacc. simplicis 3. iiii. Liberabis obstructionem, calorem temperabis, uiscus roborabis, putrida excludes.

Filicis radix & semen securidacæ plurimum probantur antiquis.

Ad hæc præscribenda erit diæta acrius & schethra, quæ æquæ naturæ studeat, & pugnet cum morbo.

## SCHOLIA.

Obstructio fit in venis capillaribus hepatis per caua et gibba disseminatis à vena porta, vel caua, ob earum angustiam, flatus, vel crassi & lenti humoris copiam, ut pituita in frigidiore temperamento. Biliosis etiam temperaturis praua victus ratione utentibus sæpe crudus humor in ventriculo & primis venis colligitur qui calore hepatis attractus obstructions parit. Vnde aliquando lenta febris, morbus regius, inflammatio, atrophia, calor præter naturam, sine quo raro fit obstructio in hepate, nisi sit scirrhus. Causæ sunt frequentissima, victus ratio ex crassis & viscidis, exercitium à cibo, crassiora alimenta prima mensa assumpta, succedentibus calidis & ieiunium partium. Nam ex his crudus humor intra venas rapitur, sicuti plerumque medicamentorum aperientium usu, ventriculo crudis humoribus referto. Ex dolore, timore calore, victu antecedente deprehenditur. Dolor hepatis ab obstructione mediocris cū quodam pondere. Ab inflammatione magna flatus, suppuratione fortis. Qui fit à flatibus interclusis & crassioribus febre superueniente soluitur quia tenuat, coquit, resoluit. Inflammatione febris necessario comitatur. Dum pus conficitur, dolor & febris. Certissima signa ob-

stru-



structionis, tēſio vel tumor in hypochondrio dextro. Adde pul a Sympto-  
sum frequentē calidius corpus, colorem flauum, vel pallidū. matis illius,

Remedia ferē eadem cum Ictero & Lienis obstructione. quod à ni-

Optima victus ratio, detergentia, alimenta medicamentosa mia humo-  
iuscula ex decocto aperientium, pilula, syrupi, oxymele pur ris abundā  
gatio, Opiata, vnguenta, pulueres, frictio leuis dextri hypo tia nomē ha  
chondry. In Scirrho & à crassis & frigidis humoribus, calfa bet.

cientia, tenuantia, tergentia, mollientia, quæ illa temperent, b Materia  
sed moderata sint, excellant reliquæ. Periculum enim, ne ni & loco di-  
mum tenuando & siccando aliquid insanabile relinquatur structa.

& nimium mollientibus fundentibusq; materiam, substātia c Exudate

visceris relaxetur. Itaq; moderate mollientibus præter cete in spatium

ras partes obnoxias scirrro, in hac excellere debet attenuan epiploi, peri

tium, calfacientiumq; mixtio. Fodus ex oleis, mixtis pulueri tonei & in-

bus aromatum, aceto & c. Emplastra de meliloto, cerata, am- iest inorum,

moniacum, decoctum ficuum, passularum recentium, chama tu ab infir-

pytheos, alimenta saccharo condita & aceto diu insolato, quo mitate fa-

passula, ficus caryoph. etc. maderint aliquoties commutata. culialis ex-

Laxatur aliquando hepar articulorum modo solutum nimia pultriciis, tū

humiditate. signa ex arte medica petenda. Hic vinum plurs ab hepatis

mum conuenit, aromaticum rosatum, diambra, dianison, dia contumaci-

galanga & similia, quæ ventriculo prosunt, nisi quod minus obstructio-

astringendum in hepate. Astringendum tamen hic magis, ne, tū à la-

quàm in aliis affectibus hepatis, mixtis calidis, si frigiditas xuante vena

coniuncta est: frigidis, si calida. Fodus ex oleis astringenti- rum et renū

bus, emplastrum de meliloto, diachylon commune, ireatum, infirmitate

additis aromatibus & astringentibus. In calida causa cera- aut eorum-

tum santalinum cum cydonio teratum Galeni refrigerans. dem obstru-

Rhabarbarum aium hepatis vitam esse. Calidiorē tamen & Etione atq;

sicciorē hepate, mors potius dici debet. tuberculo.

d Tūc enim

adeſt san-

guificatio-

nis priuatis

Si g. ascitis.

Alterum

De Hydrope.

Cap. XXXVII.

**H**Ydropis b tria genera. A scites ab utre, quia uen-  
ter aqueo c humore & d seroſo plenus utrem re-  
præſentat. Commotus his uenter fluctuat, quomodo ue-  
ſica ex dimidio plena. Continetur aqua inter epiploon  
& peritoneon, quāquā & portio excurrit in ſpatiū epi-  
ploi & inteſtini, cum à liene, colo, tenuiq; inteſtino, uel  
iis partibus, unde epiploon enaſcitur, malum ortū eſt.

Alterum



DE MORBIS INTERNIS

**a** Proprie Alterum genus hydropis; Aqua **a** inter cutem, quæ & dicta: quæ **b** Leucophlegmatia, & **c** Anasarca. Huius materia iam crassior est effusa in cutem atque carnosum genus totius corporis. Hic si digitum imprimas, uestigium fit cauū. **d** Tertium genus Tympanites dicitur in quo plurimus flatus humori commixtus est, unde uentris distentio, qui percussus instar tympani sonitum reddit.

Causa. Hepar est omnino refrigeratum, uel primario, uel per consensum cum uentriculo, liene, lateribus, tenui intestino, colo, frenibus, g utero, **h** pulmone.

Nascitur hæc affectio ex **i** immodica uacuatione, aut eadem longius **k** suppressa. Communis serè l curatio medicamentis **m** hydragogis, quæ aquas uel pituitam ducant. **n** Diureticis, **o** Topicis & **p** externis remediis, quæ humorem siccent ac resoluant, quibus si nihil proficitur, **p** ferro & igne utendum est.

Leucophlegmatia peculiariter conuenit q phleboto- mia, & ea quæ magis incidant. Ut tympaniti, quæ flatus disc-

datur, sitq; assimilationis priuatio.

**d** A tympano nomen dicens, et vocatur ab Hipp siccus hydrops, apho. **i** **i**. lib. 4. Aphor.

**e** Simplici intemperie, primaria, secundaria, uel tumore scirrhuso.

**f** Labefactata uel secretrice feri, aut etiam uasis obstructis.

**g** Per suppressionem menstruum eorumq; palindromen aut per frequentes hystericas affectiones **a** venenata aura ex seminis suppressione.

**h** Per translationem materie in pulmonibus conceptæ ad ventrem.

**i** Per hemorrhoidas, menstr. dysenteriam.

**k** Per scirrhu in hepate generationem, aut eius intemperiem frigidam.

**l** Quæ à symptomatis correctiōe auspiciāda est, qd ipsum symptoma sit calamitosius cā ipsa. Et ppea hydropicos statim secādos esse monet Hippo.

**m** Ut decocto rad. verbasci, sœmna, succi ireos, syr. ros. pall. lax. gra. ebulli diachartamo, nō itē antimo. qd veneficis epyricis et piclitorib. vsitatis.

**n** Ut syrupo de radicibus de raphano.

**o** Ut sudorificis, materiam digerentibus, ut emplastro de baccis lauri.

**p** Paracætesis locū habet, si tatiū in nimia humoris abundantia cōsistat hydrops siue penni generatiōe, cuius pennitas posita sit i hepatis uitio isā.

**q** Hipp. lib. 4. de dieta in morb. acut.



discutiant. Phlebotomia igitur in solo hoc genere aque inter cutem locum habet. Nec hoc quidem perpetuo, sed si otio & antea acta uita, si suppressa aliqua solemnitate uacuatione id uitium ortum est.

Morbi initio priusquam in cachexiam abeat morbus, integris uiribus, quod Hipp. Asclepiadi, & Galeno uisum est. Oportet autem neque semel, neque copiose detrudere, sed modice atque interuallis. Fereque placuit, ut è malleolis detraheretur sanguis.

Purgatio leuibus pharmacis & per c interualla datis, ut octauo quoque die, uel duodecimo, ut uires tolerat.

R. benedictæ 3. s. dissolue in sero lactis. Pilu. de rhab. maxime laudant, q̄ aliter à Rhaze, aliter à Mesue describunt. Præferendæ sunt Rhazæ, d q̄ recipiunt rhab. succi agrimonix, sem. endiuix an. 3. iii. agar. 3. v. foliorū laureolæ infusorū in aceto, & siccorū 3. x. Fiant pilulæ. De dit Rhaze 3. ii. s. sed 3. i. satis esse pōt. Leuiiores fient, si sine foliis laureolæ forment è succo ireos, in quo mesc

reon, laureola, uel euphorbiū maduerit. Similiter e pul. hieræ 3. i. agarici troc. 3. i. cū oxymelite forment pilu. Quod si i oxymeli, pxime dicta maduerit fortiores fiet

Aliquando uti licet puluere hieræ diacol. scrup. iiii. aut 3. ii. Leue est hoc pharmacum. R. sem. carthami cōquassati 3. ii. aut iii. Ireos florentiæ scrup. i. cinamomi scrup. s. infundantur per noctē in unc. iiii. seri caprini. Frequentissimus usus est succi radicis ireos per residuam deparati, & eius quod supernat capiantur 3. ii. unc. s. aut 3. vi. cum æquali mensura aquæ mellis, aquæ distillatæ è terebinthina, seri lactis. Quod si ab hepate metus, ne pharmaco lædatur, admiscendum aliquid, ut scrupu. elect. triasantali, uel diarhod. abbatis. Et hoc quoque laudatum est.

R. polypodii quercini unc. ii. sem. carthami unc. s. se. anisi & fœniculi an. 3. i. conquassata omnia in nodum lin teolo cōstringantur, & una cum gallo decrepito coquantur. Ius galli forbeatur. Aqua extillata è purpureis floribus ireos data 3. vi. uel un. i. quātitate cū 3. i. electarii triasantali, & Gra. viii. cinamomi efficacissime aquam

Hydro-

a Priusquā materia facta sit natura potens, & habitū corporis immutarit. b Ut par hydropicimorbi & causæ ratio habeatur.

c Nam ut sūt gradus coctionis, ita quoque & purgationis. d Rhaz. ad Almasorē, capite de hydropē.

e Vel R. hieræ picr. rheielect. agar. tro. ana 3. i. macerentur in oxymelite, in quo prius infusa fuerit laureola aut turbidum & formentur pilule.

*purgatio*



DE MORBIS INTERNIS

a Si metus Hydropicorū ducit. Laudant aquæ alkekengi, medii cor-  
ab hepate ticis sambuci, eiusdē radicis, ebuli, aut eorūdē floribus,  
sit, ne phar similacis hortēsis, iuniperi, raphani, cuscutz. Cæterum  
maco leda- catharticas eiusmodi aquas electuariis triasantali, diar-  
tur. rho. abbatis, schenāi ho, spica, sātalī & meliores reddes

b Huius au Cucumer agrestis in frequenti usu fuit & Græcis &  
thor fuisse Arabibus, quo sic utendum.

dicatur Gor R. corticis rad. cucumeris agrestis ʒ. i. infriatum in-  
donius, vt sperge mulsæ. Sine molestia pituitam ducit, nec stoma-  
sentit Vale chum lædit.

scus dē Tha

Secretum b non reuelandum.

ranta.

c Valescus R. succi cucumeris alnini & radicis eius, succi lau-  
reolæ, succi ireos purpurei, succi absynthii & eupatorii  
legit dra. i. ana unc. iii. Resideant, quæ supernatat aqua, abiciatur.

Quæ lectio Crassiori uero parti insperge Rhabarbari, agarici ana  
magis arri- unc. s. spicæ nardi, sem. endiuix, scariolæ, portulacæ, ma-  
det. sticis, lappæ, tragacanthi, salis gemmæ ana c unc. i. mel-

d Hæc Cel- lis col. unc. s. In uase uitreo reposita agitentur in sole,  
sus pluri- ut fiat ueluti conserua. Detur ʒ. i. per interualla.

bus pstrin- Optimum est uti sero lactis caprini, in quo maduerit  
xit cap. 21. cacumen absynthii, cuscutz: Gr. x. alkekengi, fumaria,  
lib. 3. semina maiora, schenanthum, spica. Non habet par re-

e Nulla. n. medium Rhazes. Syrupus acetosus cum aqua cuscutz,  
radix hume ubi & sitis extinguenda est.

Etandi fa- Nec calfaciendum d hepar, ubi obstructio liberāda,  
cultate gly- & urinæ deduci debent. Grauius sitiunt hydropici, qui  
cyrrhizæ bus tamen potio danda est non ultra, quam quod uitam  
superat. sustineat. Vinum album, tenue, subausterum, in quo diu  
retica prius concocta fuerint.

Oxycrati usus est, cum calor uehemens accessit. Gly-  
cyrrhiza e adipso appellata, quod prohibeat siti hy-  
dropicos. Probatum aliis Metrodori qui hydropicus plu-  
rimum quidem bibebat, sed statim remouebat. In iis igi-  
tur, qui facile & sine molestia uomunt, probari potest.

Nam & uomitus utilis est hydropicis. Clysteribus quo-  
que acribus & glandulis materia minuenda est. Diureti-  
ca conueniunt, berula, lauer, uulgo iuncus odoratus, spi-  
ca nardi, asarum, phu, meum, carpobalsamum, cassia, ra-  
dix

re uomēbat

diuretica.

*Laurcola, vide daphnoides,*



dix dulcis, rosa, semen hyperici, dauci, smyrnii, petrose lini, calamus aromaticus, seseli, cancrorum fluuiatilium a siccatorum puluis, cum æquali parte asari. Ita etiã erinacei siccati in sole 3. i. mel scylliticum, cantharides integre, & aliis diureticis commixte, sed b minima quantitate ut ad Gr. v. Hæc autem uel in puluerem redacta, uel concocta dantur ex uino, oxymelite, mulsa, aquis c conuenientibus, quales prius enumeratæ sunt, & capite de oppilatione hepatis.

Abominabilis urinæ potus, sed maxime probatus Medicis: Tolerabilior, si ex puero impube distilletur cum melle & aliis diureticis.

Nec satis est phlebotomo, catharticis, diureticis uomitibus, clysteribus & glandibus uacuare materiam: sed loca tumentia sacculis, unctionibus, fricationibus, balneis emplastris, aliisq; eiusmodi rebus resoluenda sunt.

Sacculi fiunt e macribus furfuribus, milio, panico, sale, sulphure calidis, & ita appositis.

Materia balneorum & uaporationum in thermis sicis; Aquæ naturales salte, sulphuree, & eiusmodi reliquæ q; si desint, arte comparant liquefacto sale sub quadruplo, eoq; plus minusue, uel sulphure in aqua dulci. Possunt quoq; incoqui anethum, ruta, chamæmelum, calamentum, maiorana, rosmarin. pulegium, feniculus, satureia, hyssopus, schenanthum, stechas & d similia.

Sunt qui ueluti arcanum probant lapidem serpentis. Coluber aquaticus à cauda funiculo constringatur, atque ita suspendatur, ut sit subiectum uas aqua plenum. Euomet coluber lapidem, qui totam illam aquam consumet. Lapis è uinculo alligetur, & apprimatur uentri hydropici, paulatim aquam consumet.

Sacculi quoque ex arena & sabulo, uel cineribus calfactis sæpius apprimantur. Laudatur oleum f scylliticum, uel in quo decima pars euphorbii, meserei, uel laureolæ coxerit. Sit autem oleum anethinum, aut simile.

R. terebinthinæ lib. i. thuris, mastichis, myrrhæ ana unc. s. ladanii, nucis moschatæ, caryophyllorum, galangæ, zedoariæ, cubebæ ana unc. s. foliorum laureolæ P. i. succi

a Ac præfer-  
tim lapillo-  
rum, qui in  
capitibus cæ-  
rorum re-  
periuntur.  
b Ne vesicæ  
exulcerent.  
c Ut ireos,  
enula cæpa-  
na, sambu-  
ci, ebuli, ra-  
phani.

d Vt folia  
lauri item  
bacca laur.  
iuniperi, ra-  
dices cucu-  
meris asini,  
ni, bryonia  
ireos.

e Quinetiã  
in arena se-  
peliendus hy-  
dropicus.  
Vide Gale.  
lib. 9. Sim-  
plic. cap. de  
Pyrite.

f Efficacis-  
simu erit ole-  
um anethi-  
num in quo  
maduerit  
cuminum.



a Hæc vul-

DE MORBIS INTERNIS

gō dicitur i. succi ebuli, & cucumeris asinini an. unc. iii. Redigantur balsamum. in puluerem, quæ redigi possunt. Misceantur, Fiat distil  
b Hoc è pla latio a in alambico, qua inungantur loca tumentia.

stru validis Cochleis tritis uti licet, & emplastri modo affixis.

simu & fre Mirabile uolunt hoc emplastrum.

quæti i usu. R. b thuris, masticis, myrthæ ana unc. i. granorum  
c Vel, radi lauri unc. ii. c costi unc. s. cyperi unc. i. s. stercoris capri-  
cis angelicæ ni triti unc. iii. mellis quantum sufficit, ad congregan-  
tantundū. dum emplastrum.

d De his vi Sinapismi d diaspiratum prius descripta. Stercora  
de cap. de at animalium calida conueniunt. e Fricationes ex sale &  
trahentibus hydrexlo dissolutis, uel ex medicamentis calidis subti-  
in materia liter comminutis.

chirurgica. Perseuerate malo, Phlegmi ex radice scrophulariæ,  
e Fiant quo ranunculorum, & similibus emplastri modo impositis  
que malag- ad decem horas præscribendi sunt.

mata ex ra Oportetq; uescas configi, ulcera aperta conseruari,  
di. cucume- superposito folio brassicæ uncto è butyro uel oleo, gra-  
ris asinini, no ciceris, aut ceræ momento. Permittetur aqua fluere  
bryoniæ, i- ad sexaginta dies. Alioqui cauteria inducenda uentri in  
reos costis ambitu umbilici, & quibus partibus tumor est. Scarifica  
sub cineri- tiones quoq; conueniunt, sed si nihil proficitur his, re-  
bus, deinde mediis, extremum est f paracentesis.

mistis cum De Paracentesi magna olim controuersia, aliis Medi-  
stercore ca cis omnino reprobantibus: aliis approbantibus. Vtriuf-  
prino, bac- que sectæ argumenta colligit Aurelianus 3. Cronicon  
cis lauri & capite de hydropæ.

melle. Præte Illos enim deterrebat, quod ferè moriuntur omnes,  
rea ex can qui puncti fuerint.

tharidibus Hi uero remedium temperabant, neque in omnibus  
ipsis cu fer- utebantur, atque ita seruabāt aliquos. Galenus, Paulus  
mēto admo Albucasis, Mesue in Ascite pungunt ad latera umbilici,  
tus sunt re qua parte illa uacua & inania sunt, & propemodum ex-  
ficule. carnes musculi. Alii quidē dextra parte, si lien: Sinistra,  
f Copunctio si hepar in uitio est.

ab dominis Alii uero ex eadem parte, qua uiscus est, à quo ma-  
e peritonei lum primum ortum est. Si uero intestina in causā sunt,  
sectio. quatuor digitis, sub umbilico. Sed paululum reducto  
phle-



phlebotomo i latus. Hippocrates intercutaneos pueros incidit de locis in homine. Aurelianus consensu ueterum in Intercute magis, quam Ascite paracentesim probauit. In aqua intercutem Asclepiades quatuor digitis supra talum, tibiam compungit, interiori parte ea profunditate, qua uena inciditur. Qui locus compunctus si parum aquæ reddit, femora, scrotum, pudenda, si quid intumuerint, loca etiam supra manum, articulos, incidenda sunt ex Leonide & Hippocrate. Formulam uero punctationis ex 6. Pauli & aliis collige.

Tempestiua autem est punctio, priusquam in cachexiam morbus abierit, firmis uiribus, corpore iuuenili, si atra bilis hydropē non contraxit, si ualidus stomachus, si æger nō febrit, aut si febrit, remissionis tempore. Hæc omnia prouidenda sunt priusquam de paracentesi decernas. Alioqui temeraria uia est, quæ etiam si adsunt, præmonendi tamen amici ægri quanto cum periculo remedium tenerur. Tentari quæ debet, ubi aliis remediis nihil profectum est.

## SCHOLIA.

Hydrops tumor est, vel totius corporis ab humore: vel uentris tu ab humore, tum à flatu. In toto corpore et uentris, à

σάρκα, υποσάρκιδος, σαρκίτης λευκοφλεγματίας dicitur. In uentre aqua collecta, non tamen penitus sine flatu, ἀσκιτης.

In eodem, flatu plurimo intercluso cum pauca aqua, tympanias vel tympanitis, Hippocrati Hydrops siccus nominatur.

In omnibus causis antecedens, calor est, uel frigus. Coniuncta uero, semper est frigus. Refrigeratur. n. hepar, sanguificatio deprauatur, siue proprio ipsius iecoris uitio, vi phleg-

mone, scirrho, hydatidibus, intemperie: siue per consensum, ut folliculi fellis, lienis, uentriculi refrigerati, mesenterij, intestinorum gracilium, ieiuni, pulmonis, renum, septi transuersi. Ex his. n. omnibus malum communicatur hepati. Vt si splen ob scirrhum non purget sanguinem, renes obstructi, aut imbecilliores serum non trahant, aut emulgentes, menses suppressi sint, aut immodicè fluant, aut hemorrhoides, cor non diffletur. In immodica enim vacuatione spiritu cui sanguine exhausto calor extinguatur: in suppressione, sanguis,

anascita.

ascitis.

tympanitis.

ca antecedens  
diu hydropu.

vel



## DE MORBIS INTERNIS

vel excrementa reflaunt in hepar, unde suffocatur. Aliquan-  
do contactu chyli frigidioris leditur, ut aquae frigidae potio  
à calore & exercitio. Sic intemperie hepatis à Pulmone, aut  
alia parte communicata, Phthisici & Hectici hydropem magna  
ex parte corripuntur, nisi ventris fluxu intereant. Eodem

*comitatus hydropis*

*ca. sitis i hydropis*

*hydrops ex re-*

*tentione urinae*

*subito fit:*

*Anasarca:*

*ascites*

*ca. ascitis*

modo Asthmatici aqua in spatio thoracis collecta, & in ven-  
tre tandem effusa. Comitatur febricula, assidua, lenta,  
cum pulsu paruo, sitis, humore circum viscera torpesciente,  
salsedinemque & putredinem colligente, spirandi difficul-  
tas à cibo etiam pauco ob plenitudinem & venarum disten-  
tionem, tumor, grauitas, color vitiosus, cibi fastidium. Ex re-  
tentione urinae (si uerus Hydrops dici debeat) subito fit, &  
repente. Saepe enim pus vel crassamentum urinae, quod mete-  
batur, retentum, speciem quandam hydropis adfert, quae  
apertis uis, est prioribus urinis crassis cumilibus sanatur.  
In ceteris sensim generatur.

Anasarca fit ex humore aquoso partim à iecinore, par-  
tim à tota carne corporis, ueluti in aquam resoluta, saepius  
post morbos diuturnos & febres pituitosas. Symptomata, tu-  
mor non ex aquo in toto corpore, sed partibus inferioribus ma-  
gis ob humoris grauitatem, est partium frigus, corpus laxum,  
pallidum, emortuo simile. Initio dignoscitur partium extrema-  
rum perpetuo frigore, facie intumesciente post maciem, palpebris  
& pedibus crassioribus est calidioribus. Si fluxus immodera-  
tus praecesserit, aquae frigidissima potio, pedes intumuerint  
non a uigilijs, impregnatione, nocturna statione. Si cauitas  
remaneat impresso altius digito. A causa calida difficilior  
curatio, quia calidis ducitur aqua, siccatur, & status absumun-  
tur. In Asene humor aquosus uel potius serum inter perito-  
neum est intestina colligitur tanquam in utro, unde morbo no-  
mine. Spiritus aliquid admiscetur. Causa, maius frigus, quam  
in Tympanite succedit cachexia, morbis hepatis calidis, ob-  
structionibus, morbis lumborum, renum, vesicae. Symptomata,  
tumor ventris, reliqui corporis alimentum non sentientis con-  
sumptio, inualescete morbo tumor ad femora, pedes, scrotum  
sensim quasi cuniculis factis, maxime post inambulationem  
humore defluente. Aliquando thoracem, occupat. Exudat  
serum è iecore, intestinis, omento, & similibus. Initio fie-



si intelligemus, si multum urina generetur, & reddatur, paulo post in renis remaneat sitiunt, corpus contabescit. Signum certissimum, si cum è latere in latus mouentur percipiatur sonus aquae defluentis. Vitio hepatis ortum cognoscimus ex dolore & distensione partis, & si nullus ex morbis superius enumeratis praecesserit.

In Tympanite abdomen distenditur flatu. Causa, minor caloris mutatio. Succedit cruditatibus, flatibus ventris non discussis, distentioni venarum, dolori circa umbilicum, qui nullis medicamentis cesserit. Initio veluti inflatio. Hinc flatus spissiores effecti in nubem, tandem in aquam, ut pluuiam, cōcrescunt aucto frigore: vel aqua è uenis in spatium ventris, veluti per diapedesim effluit. Cognoscitur, quia venter tympani modo sonat. Facies minus recedit à naturali habitu, maior ventris distentio.

Non admodum formidabilis est aqua intercus, quae nullo antecedente morbo; deinde quae longo. Omnium periculosissima, quae ex acuto nascitur. A Scirrho confirmato, nō curatur, vix à resiccato nimis hepate: ab hydatidib. maximè. Signum pessimum, ubi vacuata, vel sponte vel arte, materia malū redit. Causa enim pertinax. Ergo quod scribitur Aph. 14. libri sexti, Hydroke correpto, si aqua è uenis in ventrem defluerit, morbum solui, non est perpetuum. Multis enim sponte vel arte commoto ventre & aquosis multis inde expurgatis non super fuit salus, quomodo sectis mors contingit, siue aqua fuerit in ventre, siue in thorace. Hoc in thorace annotauit Hipp. lib. de morbis, quod & experientia confirmat. Nam etiam si expurgetur aqua naturae sponte, vel arte, si viscera vel corrupta, uel syderata, celerius moriuntur. Multos obseruauit auctor, qui ex alui profluuio melius habuerunt, sed paulo post manente causa morbus rediens interitum attulit. Aliquando etiā in nimia effusione humoris una spiritus effunditur, quod Hipp. monet in his, qui secantur & vruntur. Ob idque oportet integris viribus, est priusquam viscera corrumpantur, remedijs uti primū purgantibus, deinde alijs. Lib. de Ind. In Hydroke detento, si aqua ad ventrem aut vesicam fluat, solutio. In Leucophlegmatia alui profluumium rehemens, solutio. Sed in Predictionibus robusta

O 2 viscera

tympanites.

prophosica;  
ascite:

prophosica;  
anagarsa:



## D E M O R B I S I N T E R N I S

viscera esse vult, si quis liberetur. Ex quo loco videndum, an  
tequam curationem aggrediamur, an sit spes salutis, necne.  
Addit Oribasius tussim signum esse mortis in hydropicis. Et  
Aph. 35 lib. 6. Aqua inter cute laborantibus tussis superue-  
niens, malum. Sed hoc distinctione quoque eget. Si videlicet  
id fiat adaucto morbo, & aque ratione, quæ iam pulmonum  
arterias asperas occupet, unde tussis. Nam si aliunde, non ita  
mala. Ex observationibus authoris hæc notatu digna. Ioanni  
Blanche negotiatori Parisiensi in Angliam profecto Hyeme  
tumor cum miraculo quodam subsedit, euauitque morbus, nec  
rediit. An quod integro, aut non ita leso viscere aqua partim  
calore nativo excitato, partim aere marino resoluta fuerit?  
Cuidam per sudores sponte excitatos & quasi distillantem  
aquam, curatio. Alteri mors, cum multo alui profluio tumor  
subsedit, redeunte morbo. Cuidam ad vinum resectis ungui-  
bus pedum, exercitio & frictionibus paulatim humor illic  
defluxit & conualuit.

Remedia sunt syrapi, opiate, clysteres, admota, pulueres,  
phlegmi, vesicatoria, cauteria, punctio, scarificatio cutis ad  
aponeuroses musculorum, dieta, digerentia, epipastica, cata-  
plasmata, unguenta, pilule, diuretica, apozemata, aqua di-  
stillata ob tenuitatem vtiliores, decocta herbarum convenien-  
tium, sanguinis missio suppressis mensibus aut hemorrhoidi-  
bus, viæ ratio exsecans, abstinentia a iussulis, potu, fructi-  
bus, exceptis passulis. In Lencophlegmatia resolutis partibus  
in puritatem purgantia, vomitus, errhina, masticatoria, & si-  
milis. In Ascite aquam ducentia. Illigandus lino venter, &  
ita quotidie mutari conueniet, ut intelligatur quid medicamen-  
ta profecerint. Cochlearum usus, thetica, iris siluestris, solda-  
nella, unguentum arthanite, emplastrum ceroneum auctum  
sulphure, succi ireos & ebali crudi potius, quam cocti, aqua  
sulphurata, oleum de sulphure, decoctum garaci cum aqua re-  
bebinthina, rasura pergamene, pilosella, aqua distillationis li-  
macum, testudinum, cum alia materia. Sed mirum in modum  
potus abstinentia, ut & in ventriculo humidior. Celsus lau-  
dat potum medium, qui vitam sustinet, & urinas moueat.  
Metrodorus Epicuri discipulus coactus siti, bibere solebat,  
deinde vomere. Notanda hystoria Celsi. Apud Antigonom  
regem

*Notatu digna*

*viæ ratio*

*remedia iussu*

*abstinentia potus*



regem ex duobus Medicis unus quendam eo morbo mediocriter implicatum negavit posse sanari. Alter se sanaturum pollicitus est. Prior respondit se respicere ad animum, alterum uero ad morbum aegri. Neque res fefellit. Cum enim posset optima uictus ratione seruata curari, ob intemperantiam periret.

Paracentesis) Erasistratus apud Celsum cap. 21. libr. 3. reprobatur sectionem hydropicorum, quia semel effusa aqua, et affecto hepate postea regeneratur. Si tamen priusquam putreat materia, & uires concidant, grauiusq; affectum hepar & partes alie fuerint, adhibeatur, optime nutrito prius aegro, & confirmato, nihil peccatur. Sed extremum remedium est, & non nisi urgente necessitate usurpandum, & cum magna Medici prudentia. Hippocrates non solum paracentesim seu sectionem, sed uisionem etiam probat, puto uel pulmone affecto, ut in suppuratis, uel ut paretur uia scalpello, quem idmodum deinceps docebimus. In eo igitur libro, cuius initium est, *ἢ ἢ τὸ πλεονέκτος ἀρτηρίῃ*, Suppuratos, qua parte prius se prodit, in dorso & pectore urit aut secat, alioqui enutritos prius lacte. In hydropicis uero uenas in scroto crassissimas secat: paulo post in scroto, femoribus, ac tibys frequentia ulciosa scalpello incutit. Deinde qua parte magis fluctuat aqua, aut tertia costam ab ultima ad os, ex quo terebra caua *τροπήν τροπλητήν* perforat, donec exeat aliquid aquae, ex quo linamentum indit ē lino crudo, spongiamq; mollem alligat, ne excidat linamentum. Quotidie semel aliquid expurgat ad dies duodecim, 13. die reliquum aquae emittitur, uia relinquuntur, ut quod supernascur, effluat, uenter cibus resiccatur. Si femur & scrotum intumuerint, uulnusculis audacter configito. Sepe hepate maximo, & prius lacte nutrito aegro, non metallo, sed alia materia inurit octo inde crustis factis. Non nulli id faciendum censent bruceis fufis feruenti oleo tinctis. Libro de locis in homine, tenuissimis ferramentis circa umbilicum urit, ac tantum aquae quotidie trahit, quantum uires ferant. Hoc semper obseruato, urendum aut secandum prius, quam pituita corrumpatur, viscera grauius ledantur, & uires concidant. Deinde uacuatione paulatim, idest 12. diebus, ut prius, faciendā. Galenus Paracentesim in hydrope laudat,



**a** Qui ex

DE MORBIS INTERNIS

splene labo ystionem in suppuratis, duplicēq; affert rationē, cur pericu-  
rant lib. 6. losa sit vniuersa vacuatio in Hydropicis. Extinctionē, scilicet  
de locis ma cet, caloris natini, simul cum humore effluente spiritu, et pon-  
le affect. et dus visceris, quod cū nō amplius sustentatur ab aqua, septū,  
9. cata top' & reliqua thoracis viscera trahit deorsum. Plura sunt apud  
b A tumor. Albucasim, Aurelianū, Paulū lib. 6. cap. 44. Recentiores tu-  
re cōtra natius progrediuntur. Nam parant cauterio potenciali, deinde  
turam, prae actuali. Hinc scalpello perforant, & canula caua commodio  
sertim scir- re, quā linum crudum Hippocratis, sensim educunt aquam  
rhofo. Aculeato scalpello vtuntur, vt minor fiat perforatio, locūq;  
c Dolor gra eligunt, vbi aqua deorsum in imum ventrem tendit relicto  
nis, ex ma- hepate & hypochondrys, in medio musculorum obliquo-  
teriei copia epigastriū. Partem materiae medicamentis purgant, topicis di-  
et partis ob scutiunt, siccante victu absumunt, vires diligenter souent.  
tuso sensu. Minus metuent à peritoneo perforato, quā à mēbrana suc-  
d Per op- cingente costas. Diligenter cauent, ne purgantur intestina, ne  
pressionem facultas hepatis sit emortua, scirrhu aut splenis tumore, aut  
diaphrag- vlcere pulmonis, aut infirmis viribus, aut etate senili ager la-  
matis, cui bolet. His demptis minus esse periculi, cum natura sepe viā  
subiacet liē aque molitur per umbilicum, & quibus vulneratus est  
e Ex corru ren- si vulnus ad gracilia intestina penetret, omnes qua  
pti humoris dant. Longò tamen tutior scarificatio cutis totius ventris ad  
in altū efflu aponouroses musculorum, paruis scissuris, quibus per ventrē  
xu, & ois serui refudet.

humoris ex

Curatio lienis.

Cap. XXXVIII.

hausto.

**S**plenicos a appellāt, quibus induruit b lien c grauitas  
f Cum hy- sinistra parte sentitur. Difficultas est d anhelitus e h-  
drops est in tis, oris siccitas f pedum inflatio g color plumbeus, de-  
ppinquoet cubitus in b sinistrum latus grauis, extat durities i oblō-  
lien est ca- ga, dolor ad k iugulū sinistrum tēdit, pediculi scatēt, no-  
tarropos.

Ac

g Color enim similis efflorescit humori, cuius dominatu corpus tenetur. vñ  
de sepe icterus niger, elephantiasis.

h Et in dextrum molestius, ob meteorismon & suspensionem.

i Quae prae se fert ideam partis obsessae. Sed tamen existit. anarropos &  
catarropos lien, atque tum rotundus est tumor.

K Ad claviculam diaphragmatis sympathia, quae tunicei costas succingēt  
communicatur.



ste a sudor grauis, foetet b anima, pudēda c turgēt, erum a Ex prauo  
pit d sanguis, gingiuae e corrumuntur, uenae ad lienem rum succo-  
nigricant, & squalescit cutis. Vlcera maligna in tibiis na rum pleone-  
scuntur, quorum aliqua uel omnia lienosos produnt. xia: unde

## Curatio.

Initio molliendus fuēter cassia uel catholico. Quod necessariae  
si inferiori parte visceris scirrhus est, clysteribus uten- significatio  
dum erit. Post hanc phlebotomia conuenit ē basilica si- b Humoris  
nistra, in duos dies diuisa vacuatione, amplo foramine. in aluo cor-  
Quod si vires suspectae sunt, uena quae ad medium digi ruptione.  
tum, uel minimum uenit, incidenda est. Alii uenā post c Ex flatu  
aures g diuidunt, & sanguine qui effluit, lienē inungūt. lento spiri-  
Veteres enim naturali quadam ratione atque beneficio tu.  
constare crediderunt superfusum sanguinem languenti d Criticus  
membro praestare medicinam. Quod & ueterinarii reti aut sympto-  
nent. Constat quoq; certo experimento uenas apertas, maticus.  
quae ad lienem nigricant, uehementer profuisse, ut inde e Ex tran-  
inueteratum malum & contumax omnino curatum sit. slatione ma-  
Iisdem uenis sanguisugae & cucurbitulae cum scarificatio teriae, siue  
ne affigi possunt. Sed haec localia remedia lienī, uacuato acerbi va-  
iam corpore conueniunt. poris, per

Purgādū quoq; corpus est, idq; interuallis, pharma- continuita-  
co qdē p os sumpto, si quidē magnus tumor est, aut su- tem interio-  
riori parte visceris collocatus. Diuretica nō ita plunt ris tunica,  
qa a liene ad renes nō h ita cōparata uia est. Ceterū iu- que palato  
uare possunt alia rōne, qa uidelicet incidūt & aperiunt. & stoma-  
cho commu-

Potiones & melicrata ex cortice radicis i capparis, sco- nus est.  
lolo-

f Expurganda prima regio corporis, ut splenica medicamenta ad lienem  
adiutum habeant. ut R. cass. recens extract. 3 vi. cum saccharo fingatur  
bolus. Deinde R. folior sennae mundat. 3. ij. vel vnc. s. m acerentur in de-  
cocto prun. damasc. & statim dilutum superbibatur.

g Et quidem sine ratione, nec sine periculo.

h Tamē secūdo iudicio liē p rinas iter diuacuat. Hip. li. de iternis affect.

i Nam quale est hepati absynthium, talis est lienī cortex capparis: &  
quale est hepati eupatorium, tale ē lienī, scolopendrium. Sic itaq; fiat  
melicratū. R. cort. rad. cappa. vnc. ij. polypod. tatundē. f. decoct sufficiens:  
colatura dissolue mellis 3. ij. f. hydromel utat horis duabus ante pastū.



DE MORBIS INTERNIS

a Presertim scolopendria, capillaribus, roremarino, radice tamari-  
ex descrip- sci, semine agni casti, endiuæ, scariolæ, porulacæ, semi-  
tione. Pa nibus illis maioribus & minoribus, cortice & radice sali-  
schy apud cis, fraxini, genistæ. & aliis, quæ capite de oppilatione  
Scribo. Lar hepatis scripta sunt.

gum. Purgationes ex epithymo, foliis sennæ, puluere hie-  
b Cappariæ a diacolocynthidos, & aliis, quæ cap. de melancholia  
us, sine de descripta sunt. Ex sero caprino, aqua fabrorum, aut ea,  
le. In mini in qua chalybem candentem sæpius extinxeris.

m. est ad. Laudatur aqua depurata, quæ e coribus defluit, cum  
mutendus. acuntur enses. Lixiuum, oxymel, acetum scylliticum,  
Dum enim syrupus acetosus, syrupus capill. uener. de pomis, aquæ  
ex aceto su- & cetera, quæ partim capite de oppilatione hepatis,  
manur, o- partim cap. de hydropisi dicta sunt.

radix  
Acidum

Adde quod

humor me-

gal. i. lancholicus

ab aceto ser-

uatur meptetur.

Hipp. lib. 3.

de uict. rat.

in morb. ac.

Sed tales ex

usu esse po-

terunt appa-

res. R. cap.

par. lib. iij.

passis. coryn-

thiac. lib. i.

reponantur

in lib. i. sacchar. sili cum unc. s. cinamomi in uase, & affundatur ali-

quid aceti he uentritulo non oberunt.

c Communi enim officio fungitur.

d Vel R medulle cerui aut cruris uiculi, butyri recitis, olei de capp. an. li.

i. ammo. in aceto dissol. un. q. aqua ros. li. s. coquantur ad consumptione pdi-

ctæ aqua in balneo maria, quo linat lienis regio leuiter fricanda manu.

quo. an. debemus cappariis i. lienis.

Capparum b. usus ex oleo & aceto plurimum lauda-  
tur. Laudatur uas e ligno fraxini, quo utantur dum bi-  
bunt. Corallus quoque tritus ex syrupo acetoso.

Durities uero, quod attinet ad topica, mollientibus  
incidentibus, resoluentibus curanda est. Adstringentia  
quoque commiscenda, ut inde roboretur uiscus, plus  
minusve pro ratione fluxionis & infirmitatis uisceris.

Mollies hoc unguento, incides ac resolues.  
R. d. olei de cappariibus 3. vi. medullæ uituli, pingue  
dinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti ana 3. ii. aceti  
3. i. ceræ quantum sufficit, fiat emplastrum molle ad for-  
mam linguæ bubulæ.

Remollit butyrum, adipex ex cap. 7. lib. 5. de simpl. &  
lib. 5. secundum genera.

Radix lilii, maluæ, bis maluæ, brancæ ursinæ siue a-  
chanti Scylla quodque & radices in oleo & uino austero  
coquantur, ad consumptionem uini. Deinde ad formam  
emplastrum

in lib. i. sacchar. sili cum unc. s. cinamomi in uase, & affundatur ali-

quid aceti he uentritulo non oberunt.

c Communi enim officio fungitur.

d Vel R medulle cerui aut cruris uiculi, butyri recitis, olei de capp. an. li.

i. ammo. in aceto dissol. un. q. aqua ros. li. s. coquantur ad consumptione pdi-

ctæ aqua in balneo maria, quo linat lienis regio leuiter fricanda manu.



emplastri imponuntur. Ficus pingues similiter prepara-  
 te; ammoniacum in aceto dissolutum, & ex oleo rosa-  
 ceo, oleo in quo scolopendrium coxerit, oleo amygd. dul-  
 ciū, de liliis, de cucumere asinino, de hyperico, de ben,  
 de capparibus. Conuenit & emplastrum de meliloto,  
dialtheas, cerotum hyssopi, diachylon hęc gummi, cum  
muccaginibus radicis altheę, lini, scēnugręci. Vbi iam  
 remollita durities est, lapis molaris, pyrites, aut a lapis  
 alioqui durissimus aceto acerrimo candens extinguitur  
 linteis inuoluitur, & sæpe apponitur. Alioqui fomes  
 excipitur. Sed his utendum est solum, cum iam aliqua  
 ex parte remollitus tumor est. A quorum usu ad remol-  
lientia redeundum est, oportetq. per interualla alterna  
tim uti his remediis. Postea uero fortioribus utendum  
 erit, ac primum quidem ammoniaci unc. i. s. opopana-  
 cis unc. s. dissol. gummi in aceto. Deinde malaxentur cū  
 oleo de cucumere asinino. Iam quoque miscebitur em-  
 plastrum Agrippę, & ut minuetur tumor, ueniemus ad  
 emplastrū de fermento, ad dropaces, ad sinapilinos, ad  
 cauteria tum potentialia (ut uocant) tum actualia. Saccu-  
 lis quoque uti oportebit resiccantibus ac resoluētibus,  
 nunquam tamen neg. esto remollientium usu. Sacculi.

R. milii parum conuassati P. ii. salis P. s. torrefiant in  
 tegula calida. Fiant duo sacculi longitudine dimidii pal-  
 mi interpuncti in linteo trito & raro, & perfumigati cū  
 aceto acerrimo, in quo lapis durissimus & igne candens  
 extinctus sit.

Contra rugitus & fluctuantem h. aquam ē regione lie-  
 nis. Frequens hoc malum est ortum a frigore, quod post  
 plenilunia frigidiori cęlo, post usum aque & frigidorū  
 magis apparet. In quo purgandum corpus est per inter-  
 ualla ex hiera aliquando simplici, aliquando diacolo-  
 cynthidos, uel

R. aloes succorini 3. iii. rhab. electi, agar. tro. ana 3.  
 s. ceterach, scolopendrii, sem. agni calti, & endiuie ana  
 3. s. cinamomi, asari, spicę, rasurę cornu cęri, rasurę  
 eboris, coralli ana Gran. viii. cum aceto scyllitico for-  
 mentur pilulę, utatur 3. i. singulis hebdomadibus. Ex  
 siccanda

a Aut etiā  
 lateres can-  
 dentes aceto  
 extincti par-  
 ti ad nonen-  
 tur ad discis-  
 tiendum.  
 b Frequens  
 clyster ex  
 decocto ca-  
 pitis uerne-  
 cinus mi-  
 risce cōfert  
 ad rugitus  
 & fluctuan-  
 tem aquam  
 ē lenis re-  
 gione.



# DE MORBIS INTERNIS

siccanda quoque aqua sacculis.

R. cumini P. ij. sem. agni casti, sem. rutæ an.  $\bar{z}$ . i. cras-  
siusculè conuassata & in tegula siccata duobus sacculis  
(ut priùs) includantur, & calidi sacculi alternatim ap-  
ponantur.

Vaporatio quoque cōuenit ex durissimo lapide can-  
dente extincto in aceto, in quo ebulus, folia salicis &  
scolopendrium toxerint.

Vnctiones, quæ in Ascite, radix acori in acri aceto  
cocta, tum addita octaua parte sem. nasturtii, emplastri  
modo imponitur.

Lepidum quoque per se tritum, & calido aceto mer-  
sum. Videndum tamen ne refrigescant.

Conueniunt spleni à proprietate splenis asini domesti-  
ci, & syluestris pulli equini, uespertilionis decolati cor-  
pus. Premantur hæc in uase testaceo. drac. i. pulueris,  
uel eo plus, ex oxymelite imperatur.

## SCHOLIA.

*conuenientia ipsi  
spleni, a  
proprietate:  
  
Sig<sup>a</sup> lienosi  
iterna et  
externa:*

Σπληνὸς Hipp. dicuntur, quibus diu obduruit lien Sed  
& multi alij sunt lienis tumores, quorum sua signa sunt. De  
externis & internis Lienosi describuntur, si biliosi male co-  
lorantur, halitus sætet, aluus astringitur, & met lien, sem-  
per equaliter emaciantur, vlcera mala cōtrahunt. Pituitosi  
minus hæc patiuntur. Tumor modo decrescit. Obdurefcit au-  
tem ab humore melancholico, uel phlegmone nec concocta,  
nec digesta. Sequiturq; sepe humoris melancholici per inte-  
stina profusio. Lienem enim catarropon vocat Hipp. 6. Epid.  
quia uel tumore durus deorsum vergit: uel eò sua excremēta  
abijcit. Purgatur. n. per intestina et hemorrhoidas, à quibus  
etiam lienem durum sanari scripsit in eundem librum Gale.  
cōm. 5. Vnde Medicus naturalem curationem sequutus, uia  
& rationem purgandi lienis instituire debet. Neque tamen  
negamus industria naturæ aliquando humorem melancholi-  
cum per renes & uescicam expurgari, & Peri pathon id doce-  
tur. Sed capite de doloribus capitis annotauimus nullam es-  
se uiam communem, ex Galeno in Metodo medendi, & ana-  
thomia, nisi multiplici anfractu in venam canam regurgitās  
humor eò perueniat. Hic affectus longus est & periculosus  
præ-



praesertim superueniente intestinorum difficultate, tum quia  
intestina leduntur humoris transitu, et vires labefactantur:  
tum quia hepar simul, cum omni venoso genere compatitur,  
unde vel refrigerato calore nativo sequitur hydrops, uel in-  
teritus. Nā quod Hipp. 48. Aph. lib. 6. scribit, Lienosis super  
uenire dysenteriam, bonum, Intelligendum ratione uacuatio  
nis, quæ modum non excedit. In rugitu splenis aliquando im-  
pletur colum flatu: aliquando vas, quod à medio ascendit.  
Sed distinguitur, quia in splene dolor grauis, in una parte fi-  
xus, & sinistra. In colo, acutus, mobilis & uagus.

Eadem, quæ in hepate, remedia, sed ualētiora conueniūt,  
incidentia, status discutientia, mollienti, aperientia, tamari-  
scus, ebuli radix vel ireos, puluis scolopēdria, ceterach, brio-  
nia, cortex hederæ, radix capparis, diacapparon, olibanum,  
ammoniacum, oxymel de radicibus, trochisci de eupatorio, ce-  
rata, oleum laurinum, emplastra de meliloto, diachylon, lien-  
bubulus, onagri, vespertilio siccatus capite detracto, limatu-  
ra chalybis, & similia. Aegri cum sumunt medicamenta, in  
latus sinistrum decumbant.

De Colico a dolore. Cap. XXXIX.

**H**uius multiplex causa est, ac primum de b phlegma  
tico. Itaque colligitur pituita crassa & frigida, atq;  
aliquando uitrea, otio, intemperante c uita, obstructis  
uiis d per quas bilis in intestinum defluit. Hinc dolor  
excitatur e quasi infixi pali, certoq; loco insistit: sed ut  
plurimum ad inguem sinistrum, & utrunque renem, sur-  
sumq; aliquando reuoluitur, & locū mutat, ut sunt flu-  
xus coli intestini, quod relicto intestino recto in sini-  
strum inguen diuerit. Ad sinistrum renē ascendit, ubi  
angustius est. Quæ angustia efficiunt aliquando ut hac  
parte dolor f colicus grauis intendatur. Hinc ad sple-  
nem & uentriculū iam laxius extēditur, subitq; hepar,  
hæretq; aliquādo cysti fellis: Postremò in dextrū iliū  
descendit, ubi desinit in cæcū, quod ad renē dextrū po-  
sitū est. Dolor hic fixus, ut in angustis, quæ ad sinistrū  
renem sunt nephriticum dolorem representat, ut etiam  
peritos affect.

f Vnde similitudine symptomatum in incerto est, utra pars efficiatur.

a Qui ab in-  
testino colo-  
nomen ha-  
bet, estq; do-  
lorū omniū  
seuissimus.

Cuius dolo-  
ris Multi-  
plex causa  
est: materia  
crassa et lē-  
ta, flatu,  
humorū a-  
crimonia et  
in flāmatio.

b Qui à pi-  
tuita uitrea  
intestina af-  
fixa ortum  
ducit.

c ut largior  
potu & fru-  
ctuum usu.  
d Desidera-  
to natura-  
li clystere,  
quæ bilis  
est, quo pi-  
tuita uacua-  
tur.

e Gal. libr.  
2. & 6. de  
locis malè  
affect.

o. limatura chalybis et pta:



**a** *Abstru* peritos Medicos fallat. Sed in Nephritide urinae *a* re-  
*Etione.* nues, albae, postea etiam cum aspero atque sabuloso se-  
**b** *Obliquo* dimento Dolor ad coxas *b* extenditur: fomentis & ca-  
*n. ductu se* taplasmatibus mitigatur: inde laxatis uis non commutat  
*ad pubem* locum: aut si commutat, perinæum & uiae ureterum affli-  
*fertur.* gitur. In colico hoc dolore urinae tinctæ & ignis, quæq;  
**c** *Qui autē* bilis, quæ ad intestinum defluebat, interceptis uis ad  
*illic genera* renes diuertit. Præclusæ uis sunt, ut neque ructus, neq;  
*tionem ha-* strepitus uentris exire possit. Stercora sine succo, plena  
*buit localē,* flatibus, similia bubulis, quæ iniecta aquæ consistant, ne  
*aut aliunde* que in fundum demergantur.  
*affluxit,*  
*aut continen-*  
*ter affluit.*  
**d** *Nihil. n.* *Curatio.* Causa mali humor ille frigidus affixus *c* intestino.  
*equè facit* Symptomata uero dolor, qui si urget uehementius prius  
*infirmi cor* quidem *d* leniendus est, quam affectui conuulsas.  
*pus, ac do* At quæ doloris gratia imperantur, ea prodesse solent,  
*lor. Hippo.* uel quia intemperiem e corrigunt, uel causam auferunt,  
*lib. 3. de fra* uel leniunt atque contemperant, aut stupefaciunt.  
*ctur.* Narcoticorum usus in hoc genere colici doloris om-  
*e Partē* nino suspectus *f* Græcis, permissus Arabibus. Optimū  
*humorē ad* genus est, quod simul & causam *g* tollit, & dolorem at-  
*equalitatē* temperat Secundum, quod solum temperat.  
*adducendo.* Remedia uero multiplicia *h* Phlebotomia, purga-  
*f Hi tamen* tio, balnea, exterius *i* admotæ medicamentæ cucurbi-  
*Philonium* tulae, potiones amuleta, quæque proprietate *k* quadam  
*prescribūt.* colicos curant.  
*g Purgādo* Phlebotomia *l* omnibus ferè relictæ est. Octauius  
*digerendo* approbat. Et nostra *m* memoria, efficaci admodum re-  
*temperamentū partis et habitū restituēdo.* medio interim usurpatur: multo magis, si dolor grauius  
*antecedentem, si phlegmone adsit, si humores doloris vi aestu incāduerint.* urit:  
*i Quæ dolorē leniant, status discutiant, materiā coquant.* *k* *Ut intestinū*  
*lupinum.* *l* Quod nihil conferre posse uidetur, neq; ad affectum, neq;  
*ad symptomatis correctionē, præsertim cum materia sit vitrea pituita.*  
*m Cum doloris acerbitas causæ magnitudinem superat, succeditq; causæ*  
*coniuictæ antecedentis perennis affluxio ex vtro aliquo.*



urit: si bene carnosum corpus est: si uires, ætas & cætera permittunt. Remissionis tempore e basilica dextra, auer-  
sionis gratia, angusto foramine & modica uacuatione,  
nisi febris adsit. Tum enim multò liberius, atque etiam  
copiosius sanguis depleri potest.

Quod ad purgationem attinet, quia materia contu-  
max est, incidentibus primùm, concoquentibus atque  
detergentibus utendum est: tum a ratione uitæ, tum iis  
quæ clysteribus iniiciuntur, atque etiam exterius admo-  
uentur. Conueniunt ergo origanum, mentha, pulegium  
marrubium, hyssopus, thymum, maiorana, ammi, beta,  
rosmarinus, enula, radix pconix, scordion, seselli, Ruta,  
libistichum, anethum, chamamelum, asparagus, anisum  
carui & dauci semina, uinum tenue, odoriferum, zedo-  
laria, galanga, castoreum, gallia, aromaticum rosatum  
puluis ducis, mythridatium, theriaca, confectio de bac-  
cis lauri, mel anthosatum. Secunda classis. Centaurea  
maior, urticæ semen, asarum, betæ succus, mercurialis,  
sal, sulphur, ius galli antiqui, ficus sicca, carthamus.  
Sed hæc classis posterior simplicium deterget magis.  
Iisdem quoque scopis hieram, polypodium, & serapinū  
commiscemus.

Olea conueniunt anethinum, rutaceum, b & in qui-  
bus superiora coxerint. Fortius est c petrolcū, oleum de  
castoreo, euphorbio, piperibus, sæpeq; gummi in oleo  
dissoluimus ut galbanum, serapinum, quale hoc est.

R. galbani unc. s. dissolue in olei rutacei 3. iii. aut cir-  
citer. Aliquando etiam & muschum, & algaliam, & ci-  
uetam, sed minori modo in oleo dissoluimus, Quale  
hoc est.

R. ciuetæ Gr. iiii. aut vi. dissolue in oleo rutaceo. Di-  
nitibus muschus & algalia eodem modo dissoluantur.  
Eiusmodi olea uel cum d clysteribus iniiciuntur, aliquā  
do quidem per se, aliquādo cum decoctione conuenien-  
ti. Iisdem ea pars, in qua e dolor est, inungitur.

Cæterū oportet hoc in primis animaduertere, ut &  
incidamus & concoquamus citra calorem uehementem  
& iis quæ minimè inflant. Calidiora uerò conuenient

a *Quæ sit  
cruditis  
expers ni-  
mieq; humo-  
ris abundā-  
tiæ, quæq; te-  
nuis sit &  
exquisita.*

b *Olū etiā  
nucum.*

c *Vulgò di-  
citur oleum  
Philosopho-  
rum.*

d *Ex deco-  
cto rerū in-  
cidentium,  
extenuan-  
tium, deter-  
gentium.*

e *Præfir-  
tim circum  
umbilicum  
& utrunq;  
renem.*

iam



# DE MORBIS INTERNIS

**a** *Vt car-*  
*dui bened.*  
*morsus dia-*  
*boli, & si-*  
*mil.*  
**b** *Ad resti-*  
*tuendum in-*  
*testini habi-*  
*tum et dolo-*  
*rem lenien-*  
*dum. Sed ta-*  
*mē cucurbi-*  
*tula nō nisi*  
*ceteris ad-*  
*ministratis*  
*adhibenda.*  
**c** *Sed multò*  
*magis clyste-*  
*ribus.*  
**d** *Vt R. oleo*  
*rutæ, nucū,*  
*anethi. uini*  
*maluatici*  
*an. quarta*  
*i. confectio*  
*nis de baccis*  
*lauri unc. s.*  
*hieræ picræ*  
*tātundē, f.*  
*clyster.*  
**e** *Vel sine*  
*auro cū pul-*  
*uere glycyrr-*  
*izæ. Aurū*  
*enim uentri-*  
*culo nego-*  
*tiū faciesit.*

iam purgata materia, ut inde relictæ intemperies corri-  
gatur. Melicrata ex supradicta materia comparari pos-  
sunt. Et hæc potiones plurimum laudantur.  
**R.** summitatum absynthii uulg. P. i. sem. cumini. drac.  
ii. ferueant in uino tenui odorifero: expressio bibatur.  
Aliud.  
**R.** aquarum a cordialium ꝑ. ii. aquæ nepetæ. unc. i. In  
quibus dissolue theriacæ aut mythridatii ꝑ. ii. Aliud.  
**R.** uini maluatici. unc. ii. calami aromatici. dr. s. croci  
Gr. iiii. ferueant leuiter in calidis cineribus: colatura bi-  
batur. Similiter ex galangæ & cumini an. dr. i. feruefacti,  
cum uino albo tenui: uinum absynthites ab Actio pluri-  
mum commendatur. Alii & recte quidem adiciunt cu-  
mini momentum, ut drac. i. quæ ferueat in eo uino.  
Cucurbitula ampla, & cum multò igne medio **b** um-  
bilico affigi debet. Coquit enim. Sed utilior usus eius  
futurus est, si primum impleatur uino calido, in quo ali-  
quid ex supradicta materia coxerit, & ita calida affiga-  
tur. Utile quoque fuerit aliorum succo, aut re simili  
inungere parte interiori.  
Vbi materia iam attenuata, & ex parte cocta partim  
clysteribus, partim **c** catharticis subducenda est. In clyste-  
ribus ex supradicta materia **d** comparatis mellis antho-  
razati. ꝑ. i. olei cōuenientis, ut anethini uel rutacei. unc.  
iii. dissolui debent. Aliquid quoq; salis, ut dr. ii. potius-  
quam nitrū, quod uentrem subuertit, dissoluendum est.  
Procedete etiam malo drac. ii. iiii. aut iiii. pul. hieræ  
picræ, aut unc. i. uel dr. vi. hieræ, diaphænici quoq; unc.  
s. aut tantundē terebinthinæ adici potest. Veteres Cly-  
steres imperabant crassiore substantia, ex solo interim  
oleo, modumq; faciebāt ad heminas duas, id est, ad duas  
libras, aut nostro more ad quartaria sex. Purgatio per os  
leuis esse debet, quales sunt hæc pilulæ frequentatæ.  
**R.** hieræ picræ. drac. s. cum uino albo tenui formentur  
tres pilulæ coopertæ **e** foliis auri. Paulò fortiores, si  
tātum addas rhabbari, oportetque à leuioribus ad for-  
tiores progredi.  
Terebinthina quoque plurimum laudatur. Datur ab  
unc. s.



unc.s. ad unc.i. inuoluta nebulis, ut fiant, quod aiunt, morfelli.

Nonnunquā terebinthinæ a dimidium dr. hieræ aut a *Ut R. terebinth. unc.*

Fortioribus purgationibus utendum non est, nisi ubi *s.hieræ picræ ʒ.ij. Mi*  
contumacius malum est. Tumque uti licebit. dr.i. pulue *sce, & si. bo*  
ris hieræ diacolo. cocta in pilulas. Aliquādo etiam adii *lus cum ne-*  
ci possunt dacridii Gr.iii. plus minusve. *buli exhibē*

Laudantur purgationes, quæ præterquam quod pur- *gans.*  
gant, etiam dolorem stupefaciunt. Quibus utendum erit  
nimum seuiente malo, qualia sunt.

R. pul. hieræ picræ. scrup. iiii. opii, croci an. Gr. i. uel  
ii. pro uiribus. Cogantur pilulæ cum uino. Similiter &  
supradictis catharticis. scrup. i. philonii commiscebis.

Post purgationes clysteribus, fomentis, balneis uten-  
dum est, usque maximè, quæ dolorem leniant, qualia  
sunt chamamelum, melilotum, anethum, althea, semen  
lini, fœnugræci.

Tuncque utendum erit amuletis, quæ à tota substan-  
tia conueniunt. Intestinum lupi siccatum tritum datum  
drac. pondere aut ʒ. iiii. cum uino albo tenui, in quo cha-  
mæmeli flos, uel anethi efferbuerit. Utuntur uariè pelle  
lupi. Alii cubilium stragulas contra hoc malum inde  
comparant. Alii cingulum gestant, aut partem pellis uē-  
tri admouent. Nonnulli sterco lupinum album tritum  
ex uino albo tenui propinant. Meliora putant, si ossa in  
stercore inuenta, una conterantur. Idem sterco nucula  
includunt, perforata: suspendunt è collo, ut ad uentrem  
perueniat. Atque in id utuntur ligula è corio ceruino,  
aut filo lanæ ouillæ, quæ à lupo interfecta sit, uel ut alii  
uolunt, quæ à lupo euaserit.

Laudant & anguillæ sanguinem. A laudæ genus cri-  
statum (quod Galerita dicitur) ustum aut elixum cum  
iure galli. Sterco gallinæ, quæ exercetur & nutritur sic  
ciore pabulo ex oxycrato. Tunica interiores uentriculi  
erinacei, masculi quidem, in uiris: fœminæ, in mulieri-  
bus adiecta tertia parte eorū quæ incidunt, detergent &  
alioqui colicæ conueniunt. Hæc probantur Græcis &  
Arabibus

*Amuletis*  
*Ex Galeno*  
*lib. 10. Sim-*  
*plic.*



# DE MORBIS INTERNIS

Arabibus. Acerbius uero uexante malo, neque cedente aliis remediis narcotica permittunt Arabes mixta phar-  
 macis, ut prius, uel aliter. Ac primum quidem in clysteri-  
 bus ex leniente materia capita papaueris cōcoquemus,  
 a vel potius scrup. s. uel gran. v. qbus si nihil efficitur, utemur flocculis, qualis hic est.  
 b Ne longa R. ol. anethini. ℥ i. castorei. drac. s. opii. ℥ i. misce, &  
 mora inte- in eo madefac flocculū lanæ, quē ē filo suspendes: suspē-  
 stinu labefa sum impelles in sedem, ac simul atq; aquieuerit dolor,  
 etet opiu at b retrahes: uel clystere uteris, cuiusmodi est ueterum.  
 que adeo stu R. ol. rutacei. lib. i. opii, castorei ana. scrup. i. Sed poste-  
 poris loco ritas Medicorū oleo admisce, castorei drac. s. opii. Gr.  
 necrosu in v. Per os uero conuenit Philonium Rhazes, cuius hæc  
 ducat, Phi- descriptio.  
 longi descri R. piperis, ameos, foliorū rutæ siccorum, methuistri,  
 ptio alia est castorei, baccarum lauri, cumini ana drac. i. opii, man-  
 i cap. de spu dragoræ, seminis hyosciami ana drac. s. mellis. ℥ i. in  
 to sanguinis. quo cætera incorporentur. datat. dra. i. Quod si cathartici  
 c Nulla nō cum uoles efficere, adicies dacridii scrup. i.  
 potest esse Al. Andromachi. admirabile, libra. 9. de comp. med.  
 colici dolo κατὰ τὸν νοῦν.  
 ris materia, R. piperis albi dr. i. opii dr. s. croci Gr. xviii. seminis  
 quandoque hyosciami albi Gr. xv. spica nardi, piretri, castorei eu-  
 dem flatus phorbii ana. scrup. i. uel dr. s. excipe melle cocto. Dosis  
 suas in hu. est scrup. i. aut dimidium scrup. cum aqua frigida.  
 morbu ba Eadem fere curatio doloris colici nati e flatibus.  
 seis habeat Nam non alia re differt, quam quod in primo genere,  
 constumias. plus est materiæ, uentorum minus. Hic uero intestina  
 d Ut gene- plurimis flatibus conturbantur, & uel e nulla, uel exi-  
 roso uino, gua materia est.  
 maluatico, Propterea minor grauitas, distentio maior, ut ali-  
 decocto fo- quando parte aliqua uenter in gibbum extuberet. Sin-  
 liorū et bac- galare remedium hic est. Cucurbitula ampla imbuta, ut  
 caris lauri. prius dictum est, d medicamentis, quæ flatus discutiant  
 Vel allio po- cum multa flamma medio umbilico affixa. Clysteribus  
 terit illini- primum utendum est, e qui sterCUS emolliant. Qualis  
 ri. ex hy-  
 e Ut R. aque decoctionis summitatum anethi quartar. 3. olei communis  
 vel violari quartar. i. ex hydreleo. f. clyster.



ex hydrelæo, melle & sale modico. Sed melius fuerit in a Tunc nim  
ea aqua, unde hydrelæum paratur, prius fuisse incocta, utanda ni-  
quæ flatus discutiunt. Sunt autem cuminum, ammi, amo mia humo-  
rum, fœfeli, daucus, anisum, fœniculus, petroselinum, ris abundā  
carum, nigella, baccæ iuniperi, lauri, urticæ semen, ru- tia, & ca-  
ta, calamentum, pulegium, zinziber, caryophylli, cala lor natiuus  
mus aromaticus, cinamomum, piger, galanga. Hæc aro excitandus,  
mata uino tenui incocta, uel cum uino percolata pluri qui effectus  
mum conueniunt. His autem colicis uina optima, quæ languet.  
quæ tenui sunt substantia & odorifera, non solum ægris, b Quod me-  
sed sanis etiam conueniunt. dia crudi-

Abstineant aqua, diluto uino, a fructibus humidis, tas tollatur  
& oleribus, quæ ratio vitæ imperatur & uiris & mulie cuius dolor  
ribus frigidioribus, quibus plurimi flatus toto uentre colicus sobo  
colligi solent. Hic etiā aristolochia, castoreo, euphorbio, les existit.  
quæ fortiora sunt, uti licet. Ex his omnibus & melicrata c Quoniam  
cõponi possunt, uina quoq; reddi efficaciora, condium acrior fit bi-  
tur cibi. Olea unguendo fiunt sacculi & fometa. Sed hic lis quæ pro-  
ut & in reliquis generibus colici doloris ratio habenda creata est.  
est mulierum grauidarum, ne quid iniiciamus aut etiā Vnde sym-  
applicemus uel aliter imperemus, quod abortum faciat. ptomatus an-  
Quale est castoreum, euphorbium, amara omnia. getur ægri:

Videndum rursus ne nimium aperientibus utamur. tu uero me-  
Sic enim fit, ut apertis orificiis uteri sanguis esluat, & dia perennē  
sequatur abortus. affert gene-  
rationem in-

*Curatio colica biliosa.*

Præterea neq; remolliendum, neque relaxandum ni biliosis na-  
tis. Hinc enim dissolutis uteri uinculis abortio fit. turis.

Inedia b colicos iuuat à frigida, lædit e uero à cali- d Vi dolo-  
da. A materia acri uehementissime cruciantur, uomitus ris, ex pun-  
biliosi, æruginosi, motus d conuulsionis & animi e deli- Etis mēbra-  
quia, sudores f interim frigidi, & febris, quibus phlebo nis.  
tomia exiguo g detracto sanguine conuenire potest. e Syncope  
Multo magis, si febris adest aut inflammatio orta in in- stomachica  
testino. Sed aliquando hic & in aliis generibus urinaria per cardior  
supp- - mum.

f Raptoseroso humore in uenas.

g Ad prohibendam bilis generationem & extinguendam in ediam.

P



# DE MORBIS INTERNIS

- a** *A suppressione* et *suppressione* malleolo uena *b* secunda est. Læduntur hi omnibus acris  
eius ad nobis & calidis, egētq; temperatis, deinde etiam frigidis.  
*les partes pa-* bus & calidis, egētq; temperatis, deinde etiam frigidis.  
*lyndrome.* Purgatio c conuenit non molesta, nec acruatim fa-  
*b* *Ad amo-* eta, sed interuallis ex 3. s. pul. hierę pīcrę 3. ii. ad sum-  
*tionem cau-* mum 3. i. rhabarbari.  
*se cōiuncta* Cassia, catholicon ad 3. x. d māna ad unc. ii. eaq; dis-  
*et materia,* soluere oportet in aqua hordei, pūfana uulgarī, sero la-  
*que in vitio* etis, decocto passularum, prunorum, sebesten, uiolearum.  
*est, vacua-* Clysteres e ex radice & foliis altheę, maluę, uiola-  
*tionem tūve* cię, muscillagine seminis lini, altheę, psilii, cydoniorū,  
*ro ad rina* adiecto interim capite papaueris cum uittello oui, oleo  
*catarropin.* uiolato, butyro recēti, adipe anseris, gallinę, anatis, sac-  
*c* *Ad colle-* charo uiolato, aut melle uiolato.  
*ctioni bilio-* Atq; interim suspitio est exulcerationis. tūq; plāta-  
*si humoris* go, rose, sumac, & similia decocto clysterū miscēda sūt.  
*quā coli in-* Plurimum laudantur clysteres ex liquidiore hordea-  
*testini diste-* to, aut lacte amygdalarum dulcium ad quartaria quinq;  
*tio sequitur* in quibus dissolue butyri recētis 3. iii. sacchari uiolati 3.  
*distentionē* i. qui clysteres, quia leues sunt, si diutius retinent, mel  
*dolor.* *Et R.* uiolatum loco sacchari, aut etiā cōmune miscēdum erit.  
*tamarind.* Eadem e quoque alimenta sint. Panis ex gaustero ui-  
*ping. passu.* no, aquę frigidę potus, inūctio ex oleo uiolato, butyro  
*mand. ana* *recenti*  
3. i. prun. damasc. n. xij. fol. end. scar. iol. borag. flor. viol. recent. summit.  
lupuli an. p. i. seminis end. melon. anisi sennę. glycyrr. ros. an. 3. i. s. fi. de-  
coct. in qua dissolue syrup. violac. multarūq; expressionū unc. i. fi. potio.  
**d** *Manna tuto exhiberi nequit, quod huiusmodi colici fere sint pīcrę ocho*  
*li & megaloplanchni.*  
**e** *Ut R. rad. altheę unc. i. sol. uiolear. mal. alth. pariet. lactuc. ana M. s. se-*  
*minis psilij, cydoniorum, altheę ana 3. ij. surfur. matr. hord. integ. ana*  
*p. i. prun. x. fi. decoct. In colatura ad lib. i. dissolue cathol. unc. i. uel 3.*  
*vi. mell. viola. sacchar. rub. unc. i. s. olei uiol. unc. ij. uel olei uiolati & ne*  
*nupharini unc. i. s. fi. clyster.*  
**f** *Primis tēperamēto frigida: ut tūsula ex decocto pullorū, cū lactuca por-*  
*til. oxalyde. pūfana seu hordeatum, prunorum damoscenorū usus, uini*  
*abstinetia, syru. uiolaceus. Per die comedat. Nā media talibus inimica*  
**g** *Ut uentriculus confirmetur.*



recēti, oleo chamæmelino atq; ēt anethino. Sacculi & fo a Ex deco-  
mēra ex proxime dicta materia, chamæmelo, anetho &c. Et o uol. a-

Balnea a quæ dulcis, Narcotica in hoc genere ferē ne grimon. pa  
cellaria. Verum Ambes corrigunt non castoreo, pipere rietar. fol.  
& similibus, sed croco b stercore lupi. Quæ si medi- vitis.

camentis miscenda sunt, miscebuntur, ut prius, hieræ, b Vel con-  
rhabarbaro, catholico, cetera quoque & eadem ratione. dito borag.

Sunt & alia genera colici doloris, ut ab apostemate, cur. myra-  
uermibus, intestini descensu, indurata fœce. De quibus bolani.  
alio loco.

## SCHOLIA.

Primum cum de dolore ventris ager conqueritur, an sit su-  
blimis, necne, considerato Gal. Aph. 7. lib. 6. sublimē & non  
sublimem distinguit peritoneo, ita ut sublimis sit in membra-  
na & musculis abdominis. Hic dolores leuiore sunt, & mi-  
nus periculosi, facileq; ex proprietate doloris, & differentijs  
causa discernitur, addito partiū consensu. Quare cū mēbrana  
& musculi uiliores sint partes, & facilius remediōrū uim sen-  
tiant, de salute & remediōrū inuentione minus dubitandum.  
Sin intra peritonæū, maior periculū. Primoq; num ab utero,  
an renibus distinguo. Solēt enim mulieres à partu, aut quo  
tēpore fluxuri sunt menses, dolore colico simili torqueri. Sed  
uero affecto, dolor magis est in ligamentis, ad inguina descē-  
dit, coxendicus uidetur. Quibus adde partiū antecedentem. Si  
ob difficultatem mensiu fluētiū, dolor magis circum renes, quā  
in penitioribus partibus, qua parte uena & uasa spermatica  
ad uterū tendunt. In his enim distentio est ob plenitudinem.  
unde dolor, qui magis torquet cū menstrū tempus appetit.  
Si à renibus ibi dolor incipit, fixus est, diuturnus, in uesicam  
porrigitur, urinis aquosa, tenuis ī principio, uel turbida, aut  
suppressa, et similia. Sic de calculo, aut pituita in renibus su-  
spitio est: de inflāmatione uero, si febris iuncta, & magna re-  
nū caliditas sentitur. Alioqui in intestinis affectio est. Mor-  
dentur, distenduntur flatu, abscessum patiuntur, supr. umbili-  
cū periculosius: infra, minus. Morsus ab ītemperie, inflāma-  
tione, pituita vitrea, materia calida. In inflāmatione febris et  
calor. In ītemperie cū pituita vitrea, dolor fixus in una par-  
te, intestinum pforari uidetur. A materia calida, dolor acris



## DE MORBIS INTERNIS

*moridicans, post morbum biliosum, retentā bilem, ut in ictero calidis irritatur, signa bilis adsunt. A flatu, aut alterius pituitæ multitudine, dolor nō ita fixus in una parte. Illic magis fixus, magisq; in circuitu umbilici. Colicus in lateribus potius iuxta fundum ventriculi, siue crassus aut viscosus humor sit, siue flatuosus spiritus interclusus, nec habens exitū. Symptomata sunt, nausea, vomitus pituitosi atque corrupti humoris multo graviores, quā per nephriticos affectus, ob recursum flatuum & materie sursum ab intestinis, qui aliquando biliosi sunt, tametsi materia pituitosa, excrementorum retentio, ut ne flatus quidē aut ructus extat. Sæpe vagus est dolor, modoq; hanc, modo illā partem gravius torquet. Circa umbilicum aliquādo sūt gravissima tormina, propter anfractus tenuis intestini sensus vegetioris, in quibus interclusus spiritus dolores facit circa lumbos propter cæcum & colū, quod illic sæpe angustius. Deinde quia illic vincula nervacea sunt, quibus colū & renes inter se alligantur, & renes lumbis. Hoc malū si diuturnum sit, & perseveret, nec remedijs cedat, ut fomentis, clysteribus sacculis, unguentis & similibus, cōfirmata est intemperies, & veluti hectica, quæ difficillime remoueri potest, unde imminet periculum Hydropis siccī. Si à uacuatione critica, aut sola refrigeratione nondum confirmata, adhibitis remedijs facile sedatur. Si hæc non adsunt, non flatus, sed cæcer, aut abscessus aliquis dolorificus metuendus, periculūq; imminet, ne marcor hominem è medio tollat. Quod observatū est ab authore in D. Zolin Medico, & Advocato Gilot, cui colū, qua parte uicinum est reni sinistro, collecta ueluti cartilagine dura in scirrhus obduruerat interiore cavitāte eo tumore intercepta, ut nihil trāscurreret. Itaque neq; clysteribus, neq; medicamentis iuuabatur, etiā fortibus. Parte dextra colū ad instar magnæ uesicæ dilatatū & extensum medicamentis datis & potionibus plenum. Superiecti, uiciniq; musculi abdominis, & peritoneum, saniosa. Post longa, & multorum annorū tormina, è quibus tamen non decumbebat, sexto à quo decubuit, die mortuus est siue febre, nisi quo die obiit, nimirum 5. Martij 1555. Magister Hieronymus Germanus interna inflammatione, & purilagine, colico morbum similem passus est 4. die obiit extremis ante frigescentibus lægu-  
scente*



sciente pulsu, & sanguineis spectris ob oculos obuersantibus. Quod autem à veteribus scriptum est colicum dolorem transferre in Paralytim, id rarum apud nos familiare quibusdam populis, vt Britonibus. Sacerdoti cuidam annorum 40. ex assiduo prope dolore colico Paralytis nata, dolorem soluit, sed mansit Paralytis annis aliquot. Vires ex pulsu non colligende, quia in dolore grani pulsus fore paucus.

In uitrea pituita, uomitus, clysmata initio fortiora, pilula, unguenta, syrapi. A uiscido humore, & flatu eadem remedia conueniunt, sed imbecilliora, clyster emolliens, discutiens, relaxans. Ab ile aut influxu acris humoris purgatio ex hiera clysteres detergentes, fotus, aliquando balneum, pulueres à pastu. In Phlegmone metuenda cathartica, quæ humores irahunt ad partem affectam. In flatu cucurbitula repente dolorem aliquando tollit. Rhubar. myrab. ob astrictiorem: senna, cassia, pruna, manna, dulcia, ob flatum minus conueniunt, balneum quoque, quibus ad conuulsionem Paralytim, arthrididem natura propensior. A nimium uolentis, inflammationis periculum imminet. Senibus, pueris, mulieribus grauidis, imbecillo calore & uiribus, narcotica non exhibenda. In crassis & uiscidis humoribus, inimicissima: in acris & calidis, apta: in crassis spiritibus conceduntur. Phlebotomia si febris, & sine hac, ubi acutissimus dolor & omnia consentiunt, sed angusto foramine, pauca uacuat. Veronica, alauda cristata, cortex mali granati, capita uerum, surfures frixi, cingula è corio lupi, allia distillata, tunica interior uentriculi erinacei, membrana inuoluta in capite pueri, anguilla sanguis, ossa & sterces lupi, castoreum, amicula (uulgo Mesange) lenticula plena decoctione conuenienti, coralli incisi, cornu cerui, umbilicus incisus, cortex mali aurei Phytica quadam ratione mirum in modum persunt. si suo modo et tempore præparentur.

De alui fluxionibus.

Cap. XLI.

**F**luxiones alui partim uitio a uentriculi & intestino rum, partim uitio materiae excitari solent. Ea uero materia uel in uentre est concepta, uel aliunde b trās-  
ta, ut à cerebro influxu c cerebrali. Eiusmodi fluxus solet  
cuenire

a Intempe-  
rie, uitata  
conforma-  
tione, solu-  
tione conti-  
nui.

b Critice,  
uel sympto-  
matice.

c Per Aph.  
30. lib. 7.

P 3



# DE MORBIS INTERNIS

a *Suppressa* euenire otiosis, intemperatis, iis qui somno nimium indulgent, qui que a humidioribus sunt cerebro, modo inundantia frigidityte, aliquando etiā caliditate. Humida aeris constitutione, aultrina, & maximē cum sequuntur Aquilones, qui per austrum & coelum pluuium collectam materiam exprimunt in uentrem. Commouetur fluxio ex pergefactis, & periodica est. Ex ratione materiae curatio instituenta est. Nam aliquando pituita dulcis est, aut ex pers qualitatis: aliquando salsa, aeris & mordax, quae distinguenda sunt, & curanda ex iis, quae cap. de Catarrho descripta sunt. Nam sistendus est catarrhus, roborandum caput & uenter. Roborabitur uenter ea ratione, quae praescripta est cap. de debilitate stomachi. Influit aliquando ab hepate, liene, atque etiam uniuerso corpore, de quibus postea.

*de lienteria.*  
 Quae uero lienteria appellatur, multas causas habet, infirmitatem cōtentricis non solum uentriculi, sed etiā primorum intestinorum, ē quibus fit alimenti distributio. Infirmitas ex intemperie nascitur: intemperies alias

b *Vel etiā* simplex & sine materia. Aliquando uero cum materia. Quae ut plurimum accidit, salsa b pituita est. *acida, eaq;* Fit lienteria & ab acri humore, aut re alia eiusmodi uim expultricem irritante, ut abiiciat cibum, priusquam coactus sit.

c *Facit acrior ille humor quasdam* Res autem eiusmodi ulcera sunt saniosa, quae ab alimento uellicantur, quibus aliquando occasio est phar-maci portiuncula retenta in rugis & asperitate uentriculi. Quod ab agarico, colocynthide, metallicis, & rebus quibusdam uenenatis, uel nō satis comminutis, uel maligna qualitate inferri solet. Duo haec genera causarum Gal. annotauit 12. Aphor. lib. 4. 23. lib. 3. & aliis quoque locis. Magna pars Graecorum, qui que Arabes sequuntur, uenterculum putant uiscida interim pituita illumi-atque ita lubricari, ut inde districta asperitate & rugis uentriculi laeuer quidam sit & uia lubrica, unde celeriter cibus defluat, nec possit contineri, ex qua ratione Lienteria nomen factum est, quod non ita approbat Galenus comm. in Aph. 1. lib. 6.

Est &



Est & alia Lienteria causa. Post dysenterias & ulcera a Antece-  
intestinarum, cicatrices sunt, quæ si obducantur osculis dens et con-  
uasorum, per quæ a tenui intestino ad portas hepatis in- uicta, pitui-  
uehitur chylus, defluit alimentum aliqua quidem ex par- ta acida,  
te, sed non omnino confectum. qua resol-

Est autem in genere Lienteria coctionis priuatio, cū uitur facul-  
celeriter alimenta excernuntur, neque consilientia, ne- tas resen-  
que colore, neque odore, neque alia qualitate immuta- trix: aut se-  
ta: sed subalbida, maxime aquosa & liquida, nulla com- rum acre et  
mixta bile, aut sanguine. pituita sal-

Alimenti nomine non solum cibus, sed & potus au- sa, quæ al-  
diendum est. In ea, quæ ab acri humore, doloris sensus um facit  
est: qui si perseverat, Dysenteria fit. In imbecillitate nul aphasiam.  
lus doloris sensus, & melius eunte morbo, acidi ructus b Vi R. ra-  
commouentur. dic. cicherij  
unc. i. absyn-

#### Curatio Lienteria.

Curatio tota in duobus est. Materia a uitiosa pri- th. i. fine de  
mum est uacuanda. Deinde roborandus uenter. coctionis po-  
Itaque si materia acris est, infarcta tunicis uentriculi & sui p. i. f. de  
intestini, purgatione ex hiera, rhab. utendum est. Dissol coct. in qua  
uantur itaq; b dr. ii. aut dr. iii. hieræ aut drac. i. eius pul ifunde rhet  
ueris in sero caprino, decocto cicerū rub. uel absynthii, electi dr. ij.  
& quia puluis amarior est, adicietur purgationi ex eo In expres-  
pulvere unc. i. oxyfaccharē simplicis; aut drac. vi. syrupi sione dissol-  
de absynthio: rhabarbari dr. i. aut 3. 4. infusi in aqua ab ue syrup. de  
synthii, aut liquoribus supradictis. Veteres dissoluunt absynth. dr.  
in mulla, cui & uis est detergendi, & leniendæ amaritu- vi. aut de  
dinis pharmacorum. mentha tan

In crassiore bile & contumaciùs hærente ueteres ad- tundē; f. po-  
debant scrup. scamoneæ. c Nunc uero satis fuerit, si Gr. tio.  
iiii. dactidii misceantur. c Nūquam

d Vacuata cacochymia adstringentibus utendum, sed tamen ad-  
modicè, multo etiam minùs, si qua febris suspitio est. duci debes

Probatum remedium antiquis ex tribus partibus ut ad liente  
succu granatorum acidorum, & una succu menthæ si- riam scamo  
mul coctis: deinde adiecto melle, ut fieret eclegma. No- n. h. præscri  
stro b. d. u. putes.

d Nā adstringentibus uenæ obstruuntur et humores tenaciùs adherescunt.



DE MORBIS INTERNIS

**a** *Vt Ros-* stro more uteremur nnc. i. oxyfaccharæ simpl. dr. iiii. sy-  
*xyfaucha-* rup. de mentha, ut per intervalla ii. aut iii. cochlearibus  
*re simpli-* uteretur, aut ut esset liquidius medicamentum, unc. i. iu-  
*cis unc. i.* lep. ros. admisceretur.

*syrup de* Laudatum & aliud remedium è cydoniis & malis gra-  
*metha unc.* natis, ut esset utriusq; æqualis modus, tum coquerentur  
*s. utatur* ad putrilaginem, atque expresso succo tantum mellis  
*ex cochlea* misceretur, quantum satis esset ad eclegma. Nostro mo-  
*ri, si febris* re licebit uti syrup. de cidoniis, & oxyfacchara simplici,  
*absit.* a utroque ad drac. vi. cum unc. i. lep. ros. exterius cata-

**b** *Gal. lib.* His remediis celeriter curari dixi **b Gal.**

**8. method.** In pituita eadem genere cōveniunt, quæ si crassa est,  
*et 9. de cōp.* oxymelite & similibus primū incidenda: tum ex hiera  
*med. local.* repurganda. Si uerò tantum conspersa tunicis uētriculi,

**c** *Vt fetus* nibus è succo cydoniorum cum aromatibus, quas prius  
*linimenta,* ex Græcis & Arabibus descripsimus, uino forti antiquo,  
*hapti, em-* stiptico, sed modica quantitate. Modus enim potus est,  
*plastra.* ne fluitet in uentriculo. Quòd si consuetudo est, dilua-  
 tur uinum aqua ferrata, in qua uel cinamomum, uel ma-  
 stiche, aut utrunque coxerit.

Mastichis Gr. ii. uel. iii. per intervalla deuorantur,  
 chebuli conditi, zinziber conditum, & alia in debilita-  
 te stomachi à frigore enumerata. Similiter & quæ exte-  
 rius **c** applicantur.

Laudatur uomitus à cœna; & quia cibos non conti-  
 nent. fixa ingenti cucurbitula eo modo, quo cap. *pe cho de*  
 lera diximus, ut contineatur cibus, procurandum est.  
 Quòd si nihil iis remediis proficimus, dropace atque si-  
 napismo utendum est.

SCHOLIA.

Lienteria, Cæliaca affectio, Diarrhæa, Dysenteria, immo-  
 deratas alui fluxiones significant, sed ut nominibus, ita na-  
 tura & causis distinctas. *Li* uerò Græcis leue significat, seu  
 continuum, & nulla ex parte diuulsum, sed sibi undique  
 coherens, æquabili superficie. Vnde lienteria, quasi lio-  
 tis ton enteron, leuitas intestinorum. est, de tachia  
 die xodos



diexodos ton prospheomenon siton ametableton ecchrino-  
 menon cum cibis & potus, qualia sumpta sunt, celeriter &  
 ante coctionem ullam, aut exiguam, elabuntur à uentriculo  
 & intestinis. Huic igitur duo propria sunt, quibus facile di-  
 scernitur ab alijs. Nempe alimenta celeriter postquam sum-  
 pta sunt, per aluum reddi, & mutationem ferè nullam co-  
 ctione adeptam esse. Id necesse est fieri, uel ob imbecillitatem  
 retentricis ab intemperie, uel irritationem excreticis. Intem-  
 peries siue sit in uentriculo, siue in intestinis, quæ anadosi in-  
 seruiunt, siue in utrisq;, aliquando hectica est & in habitu.  
 quæ scilicet in ipso corporum habitu firmata est, sic ut ca-  
 lore suppresso coctionem prohibeat, & cibum diluat humi-  
 ditate: aliquando propter acidam pituitam diutius inhareren-  
 tem, uel, ut uult Oribasius, frigidam, crassam & lentam,  
 quæ replet rugosas & sinuosas partes, unde inducta leuita-  
 te cibus effluit. Nonnunquam quoque à medicamento lu-  
 bricante, aut alimentis pinguibus. Irritatur autem facultas  
 expultrix multitudine materia & acrimonia. Multitudi-  
 ne quidem, ut alimentorum multorum, aut propter uena-  
 rum mesaraicarum obstructionem non distributorum, aut  
 humiditate aliunde confluyente dilutorum. Acrimonia uerò  
 humoris tenuis, aut alimenti corrupti, aut exulceratione ali-  
 qua. Partes enim exulceratae ex permeante cibo dolorem per-  
 cipientes, eum à se propellunt.

Sequitur sæpe alios fluxus, Diarrhæam, Dysenteriam, aut  
 longum morbum, tuncque ferè lethalis est. Quod si excremen-  
 ta non egerantur cruda, & imputrefacta, sed semicocta, fæti-  
 da, neque statim post cibi assumptionem, Cæliaca affectio di-  
 citur, sitq; ab iisdem causis, sed præcipuè à cibi corruptione ac  
 cacochymia, & intemperie uentriculi siue frigida, siue calida.  
 Vnde Paulus scripsit Cæliacæ confundi, cum Lienteria, quæ fit  
 ab imbecillitate uentriculi. Merito ergo Gal. reprehendit ueti-  
 res, qui in his affectibus cibos effluere ob leuitatem intestinorum  
 existimarent. Et si. n. hæc quoq; cā est, non tamē præcipua, &  
 propria, sed imbecillitas potius, ob quā uentriculus & intestina  
 grauata à cibis assuptis, ipsos cōfestim excernūt. In medicina  
 faciēda, tria imprimis cognito morbo spectāda sūt, An sit ob-  
 structio in uenis mesaraicis, an humor acris aut pituitosus,



## DE MORBIS INTERNIS

et an à capite fluat. Obstructionem indicabunt præter cætera gravitas in hypochondrijs, excrementa chylosa, urinae tenues. In acrimonia & exulceratione seu abrasa superficie partium, eiusdem morbus inerit sensui. In imbecillitate, deiectione nullum dolorem efficit. Humorem autem à capite defluere Hippocrates colligi vult ex spumosis excrementis. Quibus (inquit Aph. 30. lib. 7.) in alui profluvio excrementa spumosa sunt, quæ ex capite pituita defluit. Sed hoc non est necessarium, ut Galenus monet. Nam cum cause continentes spume sint spiritus humori mixtus et motus inæqualitas, unde frangitur humor in multas partes, siue ob multitudinem caloris, ut in quæ elixantur, siue agitationem, ut in mari, potest à venis proximis, aut ventriculo, aucto feruore, aut agitatione humor cum spiritu mixtus excrementa reddere spumosa. Et in dysenterijs materia commota, & calore aestuante agitata videmus spumosas deiectiones fieri. Alia igitur signa adiicienda sunt ex his, quæ circa caput apparent, ut gravitas, multitudo sputi, quod manè & noctu vehementius fluat, agri somnolenti sint, pituita defluente ad ventriculum molestiam quandam sentiunt, & similia. Solent autem, quasi periodicis quibusdam, à somno nocturno spumosa excrementa deicere, quibus facile cerebrum repletur, & ventriculus humidior est. Est. n. ut Hipp. scribit 4. de morb. cerebrum pituita veluti fons quidam. Quod velut cucurbitula incumbens corpori, ex universo corpore attrahat, ex quo fluxiones fiunt. Acidi ructus in principio demonstrant pituitam in ventriculo, aut frigidam intemperiem, nec dum prostratas esse vires, sed aliquo tempore cibos retineri, et veluti initium quoddam coctionis fieri. Sed aucta passione cessant, quod malum est. Bonum vero, cum post longum tempus superueniant, ob eandem causam. Hæc igitur propria natura est, & essentia Lienæ & Cæliacæ fluxionis. A quibus Diarrhæa distinguitur, quia non alimenta, sed humores pravi, multa liquida excrementa pituita, vel bilis altera, sicciora vel mixta, vacuantur, siue ex toto corpore, siue ex aliqua parte.

Natura enim sese exonerante, si orificium supremæque partes valentiores sint, pylorus autem languidior, excrementa deorsum abijciuntur. Sin contra, sursum repunt, & pro diar-



diarrhæa vomitiones excitant. Modus autem propulsionis eodem modo fit, quo in superiore, irritata excretrice, aut re-  
 tritice imbecilla. Symptoma est multorum morborum. Fit  
 enim sæpe in declinatione alicuius morbi acuti, vel post mor-  
 bos diuturnos, cū varij et diuersi humores purgantur, vel à cu-  
 te astricta, à medicamentis construngentibus, aere, si post me-  
 dicamentum purgans æger aeri se exponat, uel medicamentū  
 sit violentius, aut si singulis annis bis aut ter ita soleat expur-  
 gari. Ab intemperie certe frigidiorē ventriculi multitudi-  
 nem cibi non coquente, lienteriam creari potius quā diar-  
 rhæam, consentaneum est. De dysenteria dicitur sequenti capi-  
 te. Fiunt & multæ aliæ fluxiones, vitio alicuius visceris, ut  
 inflammatione hepatis, tumore lienis, & similibus, quæ ad alia  
 capita referri debent. Author annotauit se fluxum quendam  
 diuturnum in multis obseruasse, in quo uaria, opima, nigra,  
 cœrulea, viridia, satis corpulenta excernebantur. Ex quo alios  
 euasisse, ut Aduocatū (De la Vergine) Anglum Pædago-  
 gū, &c. Alios interisse, ut ducem celebrem peditatus in exer-  
 citu, fabrum argentarium, & similes. Omnibus ferè vitium  
 in visceribus, & vlcus in pōstremo intestino. Quidam in vico  
 Templi post sextum annum, quo eo morbo laborauerat, inte-  
 rūt obfesso hepate multis uomicis, syderata parte mesenterij.  
 His, qui conualuerunt, interuallis idem morbus redijt, uel dy-  
 senterica excrementa. Anno 1558. Autumno dysentericæ sa-  
 lutares ijsdem excrementis. In fine purulenta egerebant, de  
 quibus sequente capite. In omnibus certe Aphorismus Hipp.  
 notandus, Si qualia purgari, &c. Et cum duobus modis uac-  
 uatio moueatur in nobis: Primum beneficio natura, ut, in  
 acutis morbis, diebus criticis: in longis autem & hominibus  
 sanis, statis temporibus & periodis: deinde à qualitate qua-  
 dam morbosa, & vi morbi, inordinate & sine periodis: Me-  
 dicus his fluxionibus obsistere debet: illas sequi, & tardiores  
 iuuare, materiamq; naturæ comparare, & comparatam, si na-  
 tura cessit, uacuare: Si uacuatione nimia offendatur, compe-  
 scere, ut & si sit periculum uel ex transitu humoris, uel lesio-  
 ne alicuius partis, ut in Phibificis, Pulmonum inflammatio-  
 ne & costarum, longa difficultate intestinorum ex scirrho lie-  
 nis, & similibus.

In



a Qua tem

pestate hu-

mor qui in

peculiari

cuiusq; na-

tura redun

dare consue

nit, exitum

non habet.

b Que tēpe

stas pituita

falsa ē pro-

creatrix, et

procreate

corruptrix.

c vi vires et

muliers

bus prehū-

midis, qbus

nō ē pspira

bile corpus.

d Cū pitui-

ta uiscida

ad sphyncte

rem adhere

scit, et rectū

intestinum

exulcerat.

e A tenui-

bus quidē,

sāguis fæci

oī ex parte

pmissus: à

crassis, nul

lo modo, aut

inaqualiter

f Vnde deie

ctiones opi

na, pauca

e alba.

## DE MORBIS INTERNIS

In diarrhæa, leniora initio, ne quid in gracilioribus in  
testinis retineatur, lac, topica, sacculi, unguenta, fofus, cata  
plasmata, purgatio, clysteres, opiata, cucurbitula, fumigia,  
pulueres. In lienteria, purgantia, confectiones emplastra,  
unguenta, pilula, inunctiones, in aluo iusto humidior, par  
cior potus, isque ad uesciam diuertendus. Vbi aluus siccior,  
largior potus, isque ab anadofi prohibendus. Vinum tenue  
& calidum, medicamenta, diuretica, motus criticus, multas  
vrinas faciunt, unde parua deiectione, quia materie pars, que  
per aluum flucet, ad urinas diuertitur. Sicuti multa enim  
te deiectione urina pauca, aquosa, humore ad intestina con  
uerso. Sudor & deiectionem & urinam.

### De Dysenteria

### Cap. XL.

H Yeme a aquilonia, Vere b australi & pluuioso,  
calida Aestate, Aestatis fine & autumno Dysente  
riae fiunt. Otiosis, intemperatis, & quibusdam c naturis  
peculiariter, ut lentiginosis.

Nam antecedentibus anni partibus pituita crassa &  
uiscida in intestinis colligitur. Quod si bilis non pro ra  
tione e cysti fellis in intestinum defluit, nec eam pitui  
tam pro consuetudine deterget, multo copiosior pituita  
in intestino, & bilis toto corpore aceruat, accedit que  
cruditas. Hæc omnia æstiuo calore putrescunt. Primum  
que illa pituita acris euadit: intestinum uellicat: fit dei  
ciendi d appetentia, inanis aliquando, at interim pau  
ca, uel cum maximo conatu mucosa, & similia albumi  
nibus ouorum egeruntur.

Fit etiam aliquando, ut acrimonia eius humoris clau  
sulæ uenarum intestini referentur, & ita aliquid sangui  
nis una cum mucosis illis excrementis e deiecitur. Hoc  
malum non Dysenteriam, sed tenesimum appellari uo  
lunt. Tum Dysenteria est, cum bilis illa putris magno  
impetu in intestinum confluit, & grauius exulcerat. Ra  
dit primum f pingua, que intestino adnata sunt. De  
inde ramenta: postremo etiam sanies effluit. Excremēta  
illa ferè spumosa sunt. Quia in Dysenteria & febris &  
inflammatio est. Itaq; motu & calore spuma excitatur.

Omnis



Omnis *a* Dysenteria exulceratio est intestini, aliquando totius quidem: aliquando huius uel illius, quod ad curationem distingui oportet, ex ea. 43. lib. 9. Aetii.

Curatio est in Phlebotomia, purgatione, Clysteribus, *b* Potionibus, & externis remediis.

Corpore bene carnosio, graui febre atque inflammatione, suppressa aliqua solenni *c* uacuatione, sanguine multo *d* cum excrementis abeunte, consentiente ætate & uiribus, uena secari potest, etiam si Gal. in comment. ad Glauco. & lib. 4. de ratione uictus in acutis repugnare *e* uideatur. Verum quia assidua egestione, perpetua *f* uigilia, febre atq; inflammatione uires maximè laborant, temperandum uacuandi consiliū est. Itaq; alii humeralem, alii uenas extremæ manus aperiri uolūt, quia hinc minus uirium cum sanguine effunditur. Potest & basilica aperiri, sed angusto foramine & paulatim reuulsa atque etiam uacuata materia. In suppressis purgationibus inferioribus *g* uenas maleoli aperiri iubēt. Quod si sit, eo magis temperanda uacuatio, quod hinc ductus sanguis *h* plus uirium, quàm e manu exhaurit.

Eadē quoque cōtrouersia de Purgatione. Sed iam indubitatum est, ubi & morbi magnitudo & *i* cætera non repugnant. Nullum autē præstantius phamacum *k* rhabarbaro, à quo purgatio non solum semel conuenit, sed si res exigit & uires permittūt, sæpius *l* reperenda est.

In purgatione consilium esse debet, ut obstructions liberentur, & uia facta redundans materia uacuetur.

Nec *m* de adstrictione initio cogitandum est. Itaque scrup. iiii. plus aut minus rhabbarari imperentur. In-

cupiditatē & anathymias eos somnifera inopiā. *g* *Vt* fiat humor catarrhopos, qui erat, anarropos, uiamq; ad loca commoda affectet.

*h* Tu quod partes superiores plus habeant sanguinis quàm inferiores.

*i* *Vt* neque uires, neque ætas, neque anni conditio.

*k* Aequè enim naturæ studet & pugnat cum morbo.

*l* Ob perennem humoris morbifici generationem.

*m* Metu inflammationis febris & translationis symptomatica humoris morbifici ad nobiles partes, unde pleuritis, peripneumonia, epilepsia.

*a* Proprie dicitur, cum ulcus serpit per omnes intestini anfractus.

*b* Lenientibus, detergentibus, adstringentibus & cicatricem indurcentibus.

*c* *Vt* humor rhoridus aut menstruorum

*d* Unde infirmitatis & syncopes metus adferatur.

*e* Imò nõ repugnat Gal.

*f* *Unde* uene sectione in diarrheam prohibet nõ ite

*g* in dysenteria

*h* Ob frequē

*i* tē deiciendi



DE MORBIS INTERNIS

**a** Initio hæc

poterit præ

scribi potio,

cum uacua

di cōflui ad

erit. R. rhei

elect. dra. ij.

macerentur i

liquore stil

latitio endi

uæ & cicho

rij. f. leu. ex

pressio. cui

misce unc. i.

syrup. uol.

f. potio.

**b** Præsta-

bit dilutum

exhibere cū

forti expres

sione. Sic. n.

pres quasq;

subibit rha

barbarū, cū

alioqui tor-

refactū pri

mas tātum

uenas peri-

met. Adde

quod rheū

torrefactū

acrimoniā

acquirat,

propterea q;

ītestinis in

micū. Itaq;

di adstringendū erit, sic imperabis. R. rhei electi in tenuiss. pulue. redacti

dr. ij. macer. in liquore cōuenienti f. fortis expressio: adde syrup. ros. de sic-

us unc. i. f. potio.

fundatur in aqua endiuie, aut simili, quæ uim habeat li-  
berandæ obstructionis. Aliquādo drac. vi. syrup. ros. de  
siccis non tam adstringendo, quā roborando commi-  
scentur. Nonnunquam aromata, cornu cerui, unicornis  
admiscenda putant. Multo magis, ubi popularis Dyse-  
nteria est, & suspitio uirulente materiæ. Cornu ceruinum  
crematum prius, deinde elotum Dysenterias scribit sa-  
nare Galenus. Nec alia uis est unicornis, nisi quod  
arbitrantur ualere contra uenena omnia. Itaque a po-  
tioni ē rhabarbaro Gr. iiii. unicornis, aut plura, aut cor-  
nu cerni ad scrup. i. misceri possunt. Practici plurimum  
utuntur myrobalanis. Dioscorides manifesta quidem ra-  
tione agarici drac. i. imperat, ubi mucosa & pituitosa de-  
iciuntur. Neque a ratione alienum, ubi non ita uitiosa  
sunt excrementa, & obstructiones multæ sunt, descen-  
duntque muculenta, expressioni drac. i. rhabarbari infu-  
si in aqua endiuie aut cichorii adicere expressionē aga-  
rici trociscati pondere scrup. i. infusi in melle rosato co-  
lato. Practici loco agarici expressione drac. ii. aut iiii.  
carthami in sero lactis infusi aut melle rosato utendum  
putant. Nonnunquam polypodio. Sed præ ceteris rha-  
barbari usus probandus est. Procedente morbo infusio  
ni drac. i. rhabarbari serui. eiusdem in puluerem redacti  
admiscere licet. Postremo etiam b torrefaciunt, cum iam  
adstringendi consilium nascitur.

Quod ad Clysteres & ad cætera remedia attinet, ui-  
dendum ne initio adstringentibus utamur. Adstringen-  
tia febrem augent & inflammationem, uitiosam mate-  
riam prohibent ne effluat, eaque prohibita regurgitat  
in partes superiores.

Hinc grauior febris inceditur, Epilepsiæ sunt & con-  
uulsiones, aliaque eiusmodi mala enascuntur. Adde  
quod adstringentia intestinorum ulcera exasperant.

Sed adstringentium tempestiuus usus est iam uacua-

ra in



ta in totū uel magna ex parte uitiosa materia, quoque a *Vide hist.*  
tempore iam excernitur, cum uitioso frugis succus, & in- 2. *vniversa.*  
de uirium calus metuitur. lib. 1. *Ton*

In adstringentibus, quæ leniūs id præstant, meliora *Epidem. ubi*  
sunt, deinde ad fortiora progredi licet. Videndumque *de strangu-*  
est, ut adstringentibus partim lenientia misceamus, par *riosis agit*  
tim etiam si per os sumuntur, ea, a quæ urinas ducant, *Hipp. deri-*  
Sic enim sit, ut nullo periculo materia prohibita ad uri *uatione ab*  
nas diuertat, nec refluat in partes nobiles & superiores. *aluo ad re-*  
Quo tempore confirmandum hepar est, ne tam facile *nes facta.*  
humores e corpore reliquo recipiat. Quod efficiunt ce *b Nam ini*  
rati santalini unc. iiii. malaxatæ cū oleo rosaceo, extēse *tio potior es*  
in aluta, ut fiat scutum ad modum crescentis pro hepa- *se debet ma-*  
te. Cetera quoque, quæ e capite de debilitate hepatis à *terie cura,*  
calida causa dicta sunt. *b Eadē rō stomachi & uentriculi* *quām ulce-*  
habēda est ex iis, quæ propriis capitibus descripta sunt. *ris ichoati.*

Clysteres primum leniant: deinde detergeant & *c Ut ole. cō*  
abluant: postea etiam carnē regenerent, & consolident. *mune uiol.*  
In quibus si oleum dissoluatur, dulce c sit, non salsum: *amyg. dulc.*  
aut si salsum est, prius abluatur, ut fæculinam deponat *d Vel rosa-*  
& omnem alienam qualitatem. *rū. p. ij. vio-*

Clysteribus lenientibus optimum est admisceri quod *lar. M. i. vel*  
intestinum roboret. In detergentibus & reliquiis inte- *lenientē cly-*  
stinorum sensus & nuditas prius cognoscenda est. Alia *stere sic præ-*  
enim intestina uegetiore sensu sunt, nec ita inducta pi- *scribes. R.*  
ruiata, non ita carnosa, quibus clementiores clysteres *uiolarie, ab*  
conueniunt. *th. lactuc.*

*Clysteres lenientes.*  
R. d ros. M. j. Fiat decoctio in lacte recens multo ad *pariet. sum*  
lib. j. s. Colatura fundatur tepida, diu retineatur. Dolo- *mitatum a-*  
rem mitigabis, tēperabis ardorem, ulcera abluēs & de- *nethi ana-*  
tergebis, illines intestinum, solidabis, roborabis, uim *M. i. pran.*  
acrium humorum obtūdes. Galenus, Oribasius, Aetius *14. furfur.*  
solo lacte recens multo usi sunt. Aliud. *macri bord.*

R. ol. iteg. ros. an. *R. ol. iteg. ros. an.*  
P. i. feminis alth. psil & cydon. drac. ij. rad. altheæ unc. i. f. decoctio. in qua *dissolue (si potior sit ratio materie, quā ulceris) vel buty. recē. vel ol. amyg.*  
dissolue (si potior sit ratio materie, quā ulceris) vel buty. recē. vel ol. amyg. *dul. 3. q. mel. ros. et sacch. rub. unc. i. s. vitell. ouor. ij. f. clyst. Qd si roboradi*  
dissolue (si potior sit ratio materie, quā ulceris) vel buty. recē. vel ol. amyg. *consiliū est, adde muscill. tragacat. extracta in aqua plātāg. 3. s. aut 3. vi.*



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Hec ad  
materiā, nō  
ad ulcus,  
prescribun-  
tur.

R. a ol. ros. ad lib. i. leuiter calidū pluribus horis re-  
tentum dolorem & inflammationem mitigabit. Poteris  
addere semissi libræ olei rosarum, decoctionem malux  
& fœnugræci, seminis lini, althex & cydoniorum, aut  
horum muscillagines pari mensura commiscere.

Alii libr. i. olei amygdalarum dulcium, muscillaginis  
sem. cydoniorum extractæ in lacte unc. iiii. adiciunt.

Conuenit amygdalogala, uel orizogala, hordeatum  
auenatum liquidiora ad libr. i. infusa cum butyri recen-  
tis unc. iiii. aut pari pondere adipis, anatis, anseris, galli-  
ne, pinguedinis hirci, caprarū. His enim tutius utemur.  
si qua olei qualitas suspecta est. Amygdalogala & ori-  
zogala leniunt magis, & contemperant. Hordeatum  
etiam refrigerat. Auenatum siccatur. Conuenitque magis  
in tenuibus fluxionibus.

**Rhazes lib.**  
**9. ad Almā.**  
**cap. de dy-**  
**senter.**

Rhazes non habere parem scribit in dolore ab acri-  
monia, olei rosati libr. i. s. muscillaginis sem. psilii. unc.  
iiii. Laudatur & hic clyster.

**b** Ab humo-  
ris acrimo-  
nia, flatu,  
aut affectio-  
ne quadam  
intestinali cā-  
cerosa.

R. sem. lini, althex, psilii, conquassatorum ana unc. s.  
sem. cydoniorum, orizæ & tritici in tegula tostorum an.  
P. i. fiat decoctio in lacte ad libr. i. s. In colatura fortiter  
expressa dissolue sœui hirci, aut pinguedinis raxæ ex ab-  
domine arietis unc. ii. butyri recētis unc. i sacchari uiol-  
lati unc. i. s. onorum uitella ii. Vitella miscemus lenien-  
do, & ut diutius inhereat intestino, quod infusum est.  
Similiter & sepum, & quicquid pingue est, saccharum &  
mel detergendo. Utimur albissimo saccharo, ut leuissi-  
mo: grosso uerò appellato, ut magis detergente. Hoc  
etiam magis melle rosato & communi. Celsus hoc cly-  
stere dolorem mitigat, appetentiam excitat.

**c** Quib. pu-  
gnatur cū  
ulcere &  
acrimonia  
materie.

R. decocti foliorum rosarum quartaria v. uitella ono-  
rum ii. In Dysenteria ferē b tormina sunt & flatus. Qua-  
lac asininū in re summitatum anethi & chamæmeli, florum anthos  
quod mul- & meliloti aliquid miscendum est. Contrā uerò sangui-  
tum habet nis excretiones taxo barbato, plantagine, bursa pastoris  
seri, in quo centinodia, frangaria utimur.

*Clysteres c detergentes.*

Aqua hordei, serum d lactis cum melle, aut saccha-  
ro ros.



ro ros. Similiter hydromel, decoctum cicerum rub. pa- a Minoris,  
rietariae, surfurum, uinum rubrum, decoctum betæ a cē si inflama-  
tauræ, radicis cucumeris agrestis, ficuum pinguium, tio nulla sit  
absynthii, lupinorum. Horum unius quartaria quinque b In aqua  
aut libra. In quibus dissolue mell. rosati, sacchari. rub. plātag. aut  
ana. unc. i. s. Aliquando semuncia terebinthinæ b liqui- rosarum lo-  
dæ cum 3. ii. salis c communis. Aut ut detergeas & le- te.  
nias, detergentia coquuntur in lacte. c Ad pitui

Fuerit quoque utile rosas, plantaginem & similia ad tam contu-  
stringentia admiscere, ut robores. Ut materia cōtumax macem.  
est, quæ inhæret intestino, plus minusve detergebis.

Fortiores sunt Clysteres ex urina, lixiuo, muria, sal  
sugine, aqua salsarum oliuarum. Fortioribus uteris, ubi  
leuioribus nihil effectum est. Detergētibus dolor inte-  
rim exasperatur. Itaque reddito clystere detergēte, lac  
recens mulctum iniicies, aut clysterem qui leniat.

In carnosis intestinis regeneranda caro: in membra-  
nosis consolidandum est. Carnem regenerabis clystere,  
qui primum abluat, deinde impleat carne. Ablues ē se-  
ro lactis & saccharo, ex uino calido, austeriusculo, mul-  
sa & similibus.

Deinde commiscebis 3. ii. pulu. d gentianæ, thuris, d Sūt hi pul-  
enulæ tetrapharmaci unc. i. uel eo plus, aut liquori cō- ueres sarco-  
miscabis mellis, terebinthinæ & butyri ana 3. vi. Opti tici.  
mumque fuerit hos clysteres e diutius retineri, crassio- c Ad leniē-  
res fieri additis ouorum uitellis. dum, confir-

Consolidant & cicatricem ducunt decoctiones ad- mandum e  
stringentium, in quibus terræ sigillatæ, boli armen. san detergendū  
guinis draconis, thuris aut similia 3. ii. uel eo plus mi-  
sceantur.

Sunt autem adstringentia alia calida, alia frigida.  
Calida, nardi spica, absynthium, cinamomū, caryophyl-  
lum, calamus aromaticus, lignū aloes, gallia, thus, ma-  
stiche, manna, aloë, myrrha, uiscum, iris, gentiana, aristo- f Hæc tamē  
lochia, enula, styrax f propolis, saluia, artemisia, thymū ex Galeno  
origanum, rosmarinus, pœonia, anisum, ammi, cominū, uim habet  
nasturtium, coagulum hædi & leporis, caseus inuetera- attrahendi.

Q Frigida,



# DE MORBIS INTERNIS

*a Omnia, n. que adstringunt, crassiora sunt.* Frigida, hyoscyamus, portulaca, lenticula palustris, psilium, semperuium, cichorium, polygonum, lactuca umbilicus ueneris, oxalis, uolaris, cucurbita, atriplex, solanum. Sed hæc non ita adstringunt a quia humidiora sunt: quæ sequuntur magis.

Vitis capreoli, arnoglossum, rubus, mirtus, balauſtia malicorium, rosa sicca, corna, serba, pruna syluestria & pira, mespila, galla, ihus, berberis, acacia, hypocystis, terra sigillata, hemarites, bolus armena, sang. draconis, salix, coriandrum in aceto maceratum, catabe, camphora, corallus, margarita, cornu cerui, santali, sponsia ex aceto expressa, imbuta pice, deinde cremata. Interior tunica uentriculi gallinarum, erinaceorum, papauer, hyoscyamus, opium.

*b Ut R. pastillorum de scriptorum drac. q. opij. gran. i. Dissoluantur in lib. i. lact. f. enema.* Aliud est genus clysterum in putridis ac serpentibus ulceribus intestinorum, in quibus caustica dissoluntur. Fiunt pastilli caustici ex arrhenico, calce uiua, auripigmento rubro, mixta acacia, & iis quæ adstringunt. Coguntur ex succo plantaginis, ex uino cocto, fiuntq; pondere 3 i. ii. aut iii. Dissoluantur autem in lib. i. uini diluti, in lacte & aliis decoctis lenientibus.

*c Quod per sympathia intestini labefactetur.* Sunt b qui addant singulis 3. eorum pastillorum singula Grana opii, antequam infundantur. Buccella panis ex aqua frigida, lacte aut diluto uino exhibenda est.

*d Ut mastichino, menthe cydoniorum, absynthij.* Stomachus c myrrhino oleo, aut d simili roborandus est. Præterea muniendum caput, ne ardore clysteris offendatur. Quod si infuso stomachus exurit, detur frigida ad unc. iiii. & lactucæ cauliculi ex aceto. Retineri oportet, quod infusum est ad horam, quod minimum sit uel duas, quod plurimum. Si uero non retinent, sed statim eiciunt clysteres, Muria prius aquamarina, lixiuium urina cum sale prius iniicienda.

*e Ad expurgationem materiae, partium robur et meatuum libertatem.* Anus ex decocto adstringentium fouetur, uel saccullo è milio & sale expresso in uino nigro adstringente. Post hos clysteres lac recens emulsum iniiciendum est. Clysterum usus, ubi exulceratio in inferioribus intestinis. Si uero in superioribus, potiones conueniunt magis. Quamquam perpetuo e utriusque remediis uti licet.



et Et potionibus a quidem eo ordine, qui in clysteribus præscriptus est, exceptis causticis.

Ad attringendum conueniunt potiones omphacome li ueterum. Nunc syrupus de agresta, de myrtillis, de ribes, succus cornorum, meipilorum, cotoneorum, forborum, prunorum syluestrium. Coquantur succi, & aliquid sacchari rosati admisceatur. Aqua decoctionis sumach. mastiches & rerum adstringentium. Alumen tritum 3. pōdere ex ouo. Similiter symphiti radix, pumex tenuissime tritus cum uino austero, saluæ decoctum, lac utulatum cum 3. i. stercoris canini, aut in quo radices quinquifolii consolidæ maioris & similia coxerint, uel in quo calculi, uel fluuiatiles uel marini igniti prius extincti sint.

Coagulum leporis uel hædi 3. pondere è uino ueteri abluitur. Datur cum aqua decoctionis sumach, mastiche, succo plantaginis depurato. Puluis factus è turture cum bolo armena, sanguis draconis, & mummia cōtusa uase testaceo bene lutato & ita cremata. Dantur 3. ii. ex lacte ouillo cocto.

Conueniunt cydoniatum, conserua rosarum, cornorum, symphiti, & similes. In aquæ ros. lib. i. bulliant mastiches, sumach, caryophyl. ana 3. i. s. fiat decoctio ad unc. viii. pro tribus dosibus. Ouum b ex aceto frigitur: deinde conspergitur pul. astringente.

Ossa femoris bouilli trita, alumen in succo plantaginis dissoluitur. In co linteolū immergitur, siccatur, vritur, fit puluis conueniens. Succus expressus ex stercore asinino. Est aliquando, cū multum sanguinem fundunt. Frigida cibaria iis conueniunt, ut aliis Dysentericis tepida ac calida. Clysteres itaque, ut prius. Hæc uero portio, macis, balaustrorum ana 3. i. Dato 3. aut 3. iiii. ex uino astringente, aliisq; remediis utere, quæ sanguinem sistunt capite de sputo sanguinis.

Sudor excitatus plurimum prodest viribus ualentibus, balneo aut suffumigio ex rebus sudores mouētibus

Later calfactus & uino albo conspersus, inuolutus pannis adhibetur & plantis pedum.

Q 2

Narcotica

a Ut primo  
lenientibus,

mox detergē  
tibus, postre  
mo adstrin-  
gentibus.

b Ac id ven  
triculo no-  
cet.

c Aut etiā  
vasculum  
aqua feruē  
te plenum,  
nisi resolu-

tionis hepa-  
ticæ metus  
aliquis im-  
muneat.



## DE MORBIS INTERNIS

Narcotica conueniunt nondum deiectis uiribus sy-  
rupus de papauere, aqua rosa. tepida, in qua coxerint le-  
mina papaueris albi.

Suppositorio, ut primum in clysteribus, dissolue 3.  
i. trochiscorum de carabe, aut philonii perfici. Quibus  
si nihil proficimus, dabimus scrup. i. aut 3. s. ex decoctio-  
ne mastiches, Philonium capite de colico dolore proxi-  
me descriptum, & alia iam multis locis descripta.

Inungendus est uenter primum quidem iis, quæ le-  
niunt: deinde quæ astringunt, ut oleo de cydoniis, de  
spica, aut cydoniorum carnes in aceto coquende sunt,  
detractis interioribus, deinde malaxatis. Adde trochi-  
scorum de carabe 3. i. mastiches 3. i. s. Fiat emplastrum,  
quod fumigetur cum ligno aloes.

Consulendum uiribus ex iis, quæ dicta sunt de spu-  
to sanguinis. Ratio uitæ instituenda pro rei necessitate.  
Leniendum enim, detergendum & adstringendum.

### S C H O L I A.

Apud Hippoc. & Galenum Dysenteriae differentie qua-  
tuor reperiuntur, sed tres priores improprie dictæ. Una, à  
copia sanguinis toto corpore reiludantis, qui è uenarum  
orificijs apertis in intestina effunditur, ut in Hemorrhoi-  
dibus, è uenis ani. Vbi vi morbi & uitio corporis, non pro-  
uidentia naturæ excernitur, malum, & per uias alienas.  
Sed quedam est naturalis uacuatio sanguinis, ut per uerū  
mulieribus: quibusdam per uares: alijs in crisi: nonnullis  
per hemorrhoidas, natura expurgante uitium grauioris ma-  
li. His uacuationibus suppressis, aut intermissa exercita-  
tione, aut truncato membro certis interuallis solet huius-  
modi Dysenteria contingere, quam cruentam uocant, Græ-  
ci *amatran*. In hac sæpe etiam sanguis niger piciliquide  
similis excernitur. Nam cum hepar sanguinem conficit,  
eius crasriorem partem lien attrahit, & alimento tenuiori  
inde sumpto reliquias deiecit deorsum. Si uero hepar mul-  
tum limosi sanguinis colligat, lien non expurget, neque  
attrahat, aut attrahat quidem, sed præ copia, aut debili-  
tate non conficiat, aut excrementa sua non expurget, utro-  
que miscere copia oppresso & debili facta, fiunt deiectiones  
nigræ



nigra, aut cum ante solita essent expurgari per hemorrhoidas, iterum, aut hemorrhagiam, si supprimatur solennis purgatio, accruatur humor, & per intestina vacuatur. Sed cum triplex sit materia atra bilis, sanguis crassior, ut uinum crassum deposita fece: limus & sex sanguinis crassioris: & bilis flaua: de his deiectionibus intelligimus, quæ nigrae sunt, neque grumescunt, nec quicquam acre, corrodens, uel acidum habent, nec effusæ in terram feruent, aut fermentant terram, sed sunt ueluti sanguis niger, aut limus sanguinis, qui salubriter à corpore sæpe expellitur, & si retineatur diutius, in atram bilem exquisitam transit, & extra uisa nigrescit ac corrumpitur, unde multis interitus contingit. Ob idque optimè de similibus uacuationibus Hippoc. Sanguinem quidem supra ferri, qualiscunque sit, malum: infra autem, bonum: cum niger deijcitur. Nam partes inferiores superioribus minus principes. Deinde leuatur natura excremento melancholico, unde & morbi graues solui possunt, & declinari. Sed reuera multis distinctionibus est opus: Num ui symptomatica, natura, arte exeat, quid inde fructus, quidque sequatur incommodi: Num signum, an causa, an utrunque. Altera Dysenteriae species à Paulo sub priore comprehensa, à Galeno 3. de Symp. causis distincta, fit non propter sanguinis copiam, sed acrimoniam, bile flaua uel atra permixta, unde stimolata uenarum orificia aperiuntur. Potest initium esse à causa frigida, quando crassa et uiscida materia interceptis angustius hepatis putredinem quandam contrahit, unde cruentæ ac sanguinolentæ deiectiones prodeunt aucto feruore. Hæc priore periculosior, aliquando tamen salutaris. Morbo inclinante, pharmaco expellente nihil periculi. Si uero principio & incremento febris, periculum denuntiat. Melius autem, quando parcius, quam cum copiosius effunditur. Multos auctor obseruauit stantes, & sæpius deijcentes, nigra etiam faci aut pici liquida similiter, & in febre, sed natura superante, & non in principio. Natura enim initio coquit, non uacuat: in coctis separat uilia ab inutilibus. Hæc uictrix excernit. Ea enim est natura æconomia. Acrimonia autem irritante, excrementisque magnam uiscerum adustionem &



## DE MORBIS INTERNIS

putredinem indicantibus, visceribus nobilibus graviter laborantibus, superaffuso crassiore sanguine vel bile putredine quadam contracta, lethale, quia superior morbus. Bonum vero, cum natura vi medicamenti adiuta ruffi aliquid, ut à Rhubarbaro: nigri, à cassia & Cathol. alijsq; id genus excernit: utio euncto. Cauendum etiam hoc loco, ne frequentius permittente acri humore, vlcus in intestinis contrahatur. Semperq; à bile deiectione syncrea metuende, & ut causse, & ut signa grauiorum affectionum. Tertia species est hepatica Dysenteria, cum laquosus sanguis dicitur, lotura carniū persimilis ab imbecillitate retentricis & alteratricis in hepate, de qua superius dictum est capite de morbis hepatis. Quarta maximè propriè dicta facta in intestinis ab vlcere cum torminibus ventris & dolore, praesertim cum fluunt, vel redduntur excrementa alui. Aliæq; à Tenesmo, aliæ à Diarrhea incipiunt. Et in alijs acris materia, in alijs mucosa egeritur. Quartus Gale. §. de usu partium, Quomodo illic fieri possit vlcus. Nam cū sentiant intestina, & vel naturalem bilem aut leuiter atram statim expellant, qui fit ut descendente materia acri, & celerius expulsa, fiat vlcus? Respondet transitu per anfractus et circumuolutiones id fieri, bile acriore vtraque, pituita verò saepe inherente intestino. Putrescit enim & saluginem contrahit, sicq; exulcerat. Vnde etiam sequitur à quolibet humore Dysenteriam veram fieri possi, sanguine acriore (qui aliquando intestinis concretus refert etiam bilem) pituita, bile vtraq; . Periculum intelligitur ex natura vlcis & humoris vitiosi. In vlcere enim primo videndum quousque progressum sit ex recrementis abrasis ab intestino, ut intelligatur an adhuc sit, an factum sit. Interior tunica intestinorum carnosior: exterior magis membranosa tertia è peritoneo. Constante fibris circularibus & transuersis, additis rectis, ut non sine ratione quibusdam visum est, ad attrahendum, & ad firmitatem aliarum, praecipuè in recto, quod quia magis laborat in egerendo stercore duro pluribus fibris praeditum est. Canibus eadem ratione plures fibræ in intestinis, quia non nisi magno conatu excernūt. Sua ergò intestinis carnositas substantia, quæ semel exesa & erasa eo grauius periculum denunciat, quo profundius abraditur. Primum pinguedo quædam



den & mucus apparet. Deinde effloratio quedam & ramentum ex superficie, ut in epidermide cutis. Postremo substantia copulenta intestini. Est autem veluti caro, non ut musculorum, sed peculiaris intestino. Cum qua cruenta deiectio sequitur, interdum ulcerum crustale, & puris magna quantitas. Abraduntur enim primo intestina: deinde exeduntur: postremo ulcerantur. Magna ergo parte exempta huius substantie membranose, ea neque renasci potest, neque cicatrice tegi. Unde desperatio. Galenus quidem scribit multos suis se servatos putrefacta interiore tunica, integra exteriori. 4. de usu part.

Sed hoc in eorum numerum referatur, quæ accidunt aliquando. In iudicando tamen multi decipiuntur, quod sæpe pingue aliquid similitudine fallat, ut albida caruncula videatur. Sed pingue iniectum carbonibus liquatur, & indorem pinguedinis effundit. Caro nigrescit & siccatur. Cruor & ramenta cum excrementis mixta, nec statim à dolore reiecta, in tenuioribus: superuatantia, & statim post dolorem reiecta, in inferioribus intestinis & crassis esse ostendunt. Quod attinet ad humorem, qui deicitur, Hipp. sinceris omnes deiectiones periculosas esse vult. Tales sunt, impermixta aquosa humiditati, quando solus humor, qui uacuatur, deicitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorem præseferat, siue bilis æruginosa. Sed id in febre intelligo. Nam deiectiones huiusmodi exustam esse omnem nativam humiditatem à febre demonstrant. Quæ ab atrabile fit, Galenus insanabilem dixit, quia non differt à cancro. Qui in superficie non curatur, quando minus in intestinis, ubi nec medicamenta adherent, & semper superfluitate alimenti irruente tangitur ulcus? In libro quoque de atra bile, Omnem exulcerationem ab atra bile insanabilem facit, nisi quis circunciso loco omnem uim eius abscindat, sublata etiam uicinia cum ulcerata parte. Aetius tamen, si per crism excreta atra bilis Aph. 24. lib. 4.

Dysenteriam mouit, non esse desperandum ait. Si sponte, & non critice, id est, nulla Natura, aut Medici providentia, desperatio. Sed cave, ne sanguinem concretum in intestinis referas ad atram bilem. Vidit Author, qui simile quid crassiori pi. in nullo periculo & sine febre deicerent. Alios cum febre et periculo. Menachus quidam apud D. Genonænam Dysente- cap. 43. lib. 9.



## DE MORBIS INTERNIS

ria laborans, cum ui morbi frigerent extrema, nigra, liquida pici similia deiceret, spiraret difficulter, & iam de funere disputaretur, conualuit. Anno 1557. autumnus, tempore bene constituto, pestilentissima febres extiterunt, & quae plurimos sustulerunt. Dysenteriae salutares. Nemo enim, in multis quos uidu, interijt. Curabantur clysteribus lenibus & rheo. Erant enim ab acri fluxione. Saepe quidem, sed pauceregebant. Parum febricitabant, ac rheo dato conquiescebat dolor. Sicq; breui liberabantur. Anno sequente, Autumnus quoque Dysenteriae multae, in quibus viridia, caerulea, nigra, biliosa, cruenta, deieciuntur, & qualia scribuntur lethalia. Tamen omnes prope euaserunt, cura etiam parum sedulo adhibita. Annus fuerat bene constitutus. Hyeme Aquilonia, Vere Australi & pluuiofo, Aestate calida, Autumnus Dysenteriae. Aliae ex uictus ratione. Vertiginosae & Rufis magis periculosa. Lueticis humidior anno periculosiores, quam aestuoso & sicco. In sicco statu anni, materia saepius bilis utraque. In pluuiofo, pituita putris. Cum cibi fastidium accedit, quibus prius non erat, malum est, & ut signum, quia initium intestini ad orificium uentriculi peruenisse significat: & ut causa, quia non instaurantur, qua re maxime egent. Saepe etiam latius peruagatur affectio, quam ad intestina. Adolescens anno 12. natus biliosus profluo cum febre correptus deieciat frequenter similia Dysentericis, nigrum sanguinem. Sitis, manus frigidae, uigiliae, uini magna appetentia. Nihil adiutus remedys obiit die 9. Apertus oesophagus interiore ad uentriculi os superius & ad medium thoracem, nigro, corrupto, epiploo similiter corrupto, pulmonibus alieratis, recto intestino exulcerato. Dolor fuerat in sinistro latere, imo uentre & stomacho. Alteri febris, uomitus, uentris dolor, deiectiones pici & nigro sanguini similes. 20. die mors. Secto corpore inuentum ulcus ustulatum, in ambitu exesis in uicinis omnibus uentriculi, qua parte decliuus est in pylorum. Huic prociuit anus fere toto morbo.

In huius morbi curatione duobus saepius modis peccatur uulgo: celerius suppressa aluo & astringentium usu, impa-cto pure in inuolucris intestinorum. Suppressa intempestiue Dysenteria uidit Author insanum factum: mulierem, cui in  
perpetuam



perpetuam uitam ita constricta aluus, ut septimo quoque die tantum excerneret, & inde ore & naribus grauiter oleret. Gale, de uenæ sectione contra Erasist. non paucos uidisse scribit, qui Dysenteria, varicibus, hæmorrhoidibus suppressis in insaniam, Apoplexiam, atram bilem, nephritidem, Pleuritidem Hydropisim, sanguinis uomitionem & hæmoptoicā passionem inciderint. Nobilis quidam pictor in scabiem fœdam. Corpore enim pleno materia feruida sursum fertur. Alioquin ita resiccatur intestinum, ut maneat perpetua alui astrictio. a Ab ulcere Si sursum & deorsum obseratur, in inuolucris intestinorum superstitie & aceruatur magna puris quantitas, quæ tādē interficit. Quod dysenteria, nos cuiusdam corpore dissecto obseruauimus. Fluxus acris et uel ab omni malignus moderandus hordeatis, clysteribus è lacte, lacte potio & similibus. Interea fouende uires, ut impetū naturæ sustineat. dysenteria Aliis materia acris, aliis mucosa egeritur, quibus facit. nō eadē remedia cōueniunt. Quæ à Diarrhœa incipit, purgatione, cōfirmatione partiū, diuersione: Quæ à Tenesimo, expulsiōe stercoreis, detergētibus, lenientibusq; clysteribus opus habet. Cōueniunt cholagoga, quæ adstrictionem aliquam relinquant, Clysteres abluentes, detergētes, astringētes, cicatricem aut superstiobducentes, linimēta, fotus, potiones ad somnū conciliandū, te ulcere. Syrupi, iulepi, cōdita. Quantitas clysterū augenda ad libit. s. c Tempesta aut y. quia manita intestina sunt, & melius tergentur. In te preferpulueribus periculum, ne remaneant in parte affecta et puntim austri- gant. Sanguinis quoque missio uitanda, quia uires deicit, na, quæ pineque bilem trahit, neque curat ulcus. In cruenta laudatur. tuita salsæ

De Tenesimo.

Cap. XLI.

parens est.

**T**enesmus irritatio a est ultimæ partis intestini, i. re- d Genera-  
cti, in quo sæpius libet sine causâ desurgere. Excer- tione mul-  
nūtur omnino pauca, mucosa, idq; maximo conatu, insi- ta, aut ex-  
dentque stercorei guttæ b sanguinis. Hic si præter muco- cretrice ui-  
sa stercorea excernuntur, ea cocta ferè sunt. Nascitur hæc imbecilla,  
affectio magna ex parte in c pituitosis d. Aceruatur enī aut deside-  
pituita recto intestino crassa & uiscida: putrescit, tem- rato natura  
pore acrimoniam contrahit, irritat intestinum: hinc de- li clystere  
iiciendi libido. Sed quia contumacius inhæret pituita, ob sollicitudi-  
non nisi magno conatu excerni potest. Hoc tenesmi ge- fellis obstru-  
nus Dysenteriam ferè præcedit. ctionem

Aliud



# DE MORBIS INTERNIS

Aliud uero genus hanc sequitur, à Dysenteria relin-  
quantur ulcera, in quibus acris sanies intestinum uelli-  
cat, ex quo fit Tenesmus, inanis desidendi cupiditas.

Post phar. si quid intestino hæsit, ut male infriata co-  
loc. aga. ut similibus eadem affectio nasceretur. Vlceribus  
quoque in ea parte sponte natis idem accidit. Abscessus  
in recto intestino natus eandem appetentiam inuehit  
nonnunquam.

## Curatio.

Initio causa cognoscenda est. Quod si præcessit fri-  
gus & pituita crassa in causa est, Rutam, hyssopum, ori-  
ganum, calamentum, rosmarinum, maiorana, lauri fo-  
lia, stechades, anethum, melilotum, chamæmelum, uino  
incoques: hinc fouebis sedem: materiã calidam empla-  
stri modo toti perinæo induces.

*a* His imbue *tu* lauant fotus *a* ex oleo rutaceo, chamæmelino, ane-  
*ex* tur lapsus *thino*, sesamino. In uehementi *b* frigore oleo, in quo de-  
*carpto, et pe* cima pars castorei aut bituminis dissoluta sit. In dolore  
*rineo admo* anethino & irino utendum erit. Eiusmodi oleis fouere  
*uebitur.* & ungere oportet perinæum & imum uentrem, iisque  
*b* Ut q̄s acci calidis. Deinde contegendæ partes duplici aut triplici  
*dit, qui sine* linteo calfacto.  
*subligacu-* Laterem ueterem denigratum fumo confringes, &  
*lis per ni-* cominues: aceto feruenti immerges: inuolues linteo, &  
*ues deambu* calidum sedi toti q̄; perinæo applicabis. Molle filtrum  
*larunt, aut* aut cotonem, uel spongiam molliorẽ sepius immerges  
*lapidi inse-* uino calido, in quo ruta, fœniculus & quædã ex supradi-  
*derunt.* cta materia coxerint. Deinde expressã, sed calida, sedi  
*c* ac perinæo applicabis. Post forum linteis calētibus mu-  
*Ex his fi-* niendæ partes, omnino q̄; uidendum est, ne refrigescãt.  
*unt trochi-* Laudantur hac in re suffumigia ex resina pini iniecta  
*sci, quorum* carbonibus, nuce pinea, bene resinosa, aliquando addi-  
*habitus seu* tis semine rutæ, cumini, anisi, fœniculi, uel hoc modo.  
*sumus sede* R. c picis siccæ unc. i. bituminis unc. s. liquenti in ace-  
*exciptidus.* to: liquatis insperge sulphuris in puluerẽ redacti unc. s.

Clysteres ad quartaria. ii. uel iii. ex iis comparentur,  
quæ calefaciunt incidunt, detergent, leniunt, quales pro-  
ximo capite descripti sunt in Dysenteria.

Similiter



Similiter suppositoria ex labdano, styrace, oleo ruta a *Uti si can-*  
 ceo adiectis seminibus sceniculi, rutæ, anisi, cumini, & se magnitu-  
 similibus. *dinem vin-*

Si dolor urget a uehementius, narcoticis butendum *cat doloris*  
 erit, ut prius. *vehementia*

Sacculi fouendę sedi & perinæo ex milio, fursaribus inflamma-  
 fale, ruta, & descripta materia frixis in sartagine, dein- tionisq; me-  
 de sacculo inclusis. Quod si inflammatio est, & cætera tum affe-  
 consentiunt, uena brachii interna secanda est. *rat.*

Probatum quoque Arabibus purgatio leuis è cassia, b *Uti Philo*  
 manna c suspecta Græcis. Urina, & sudor, pronocari pos- nio in lacte  
 sunt ad diuersionē, uictus refrigerās. Clysteres leniētes dissoluto,  
 è lacte, hordeato, oleo rosaceo tepidis, & aliis ut prius. *aut sapa.*

In fessiones in decocto malux, bisinalux, seminis li- Aut coque-  
 ni, uioleariæ, adiecta portiuncula florum chamæmeli & tur fursur  
 meliloti. *cū sapa ad*

Olea conuenient rosaceum, uiolatum & nenuphari. pulvis confi-  
 num, in quo folia salicis coxerint. Deinde etiam axun- stentia hinc  
 gia, butyrum recens, ex quibus & unguenta fiunt, quale dissoluatur  
 hoc est. *opý gra. ij.*

R. olei rosati unc. i. olei salicis & uiolarum ana unc. *aut iii. In-*  
 s. mucaginis quatuor seminum frigidorum in aqua cy- *iciatur.*

doniorum extractæ 3. vi. ceræ modicum, fiat unguentū. *c Ob impen-*

Molli cotone in aceto albo feruente d partes fouen- *sum calorē*  
 dæ sunt, idest, imus uenter & perineon. *quem facilo*

Vlcera si qua sunt, abluenda e primum sero lactis, ui *contrahit.*  
 no austero, mulsa, etiam lixiuio, si sanies contumacior d *Imus uen-*  
 est, aut uino austeriusculo tepido & sexta parte mellis *ter & peri-*  
 rosati, quibus postea adiiciatur aliquid rosarum, thuris, *neum.*  
 mallichis, gummi arabici, tragacanthi & similia. Aut e *Uti R. de-*  
 fiant hæc unguenta. *coct. hordei*

R. fcerusæ plumbi 3. i. mucagi. gummi arabici ex- *aut aque*  
 tractæ in aqua rosarum unc. s. corticis thuris 3. i. olei ro *mulse (si nō*  
 lacei quantum sufficit ad impinguandum. Aliud. *fit ardor)*  
 R. muc- *unc. vi. mel.*

ros. colati unc. i. s. his commistis fiat enema.

f *Uti R. axungie suille unc. i. cerasæ, pompholygis lotæ ana 3. i. cū aqua*  
 plantag. f. unguentum.



## DE MORBIS INTERNIS

**R.** mucaginis gummi tragacanthi & arabici, mucaginis seminis psylli ana unc. s. aloes lotæ 3. ii. olei rosarum, quod sufficit. Cum modico ceræ fiat unguentum. Hæc inunguntur ulceribus, si quidem apparēt. Alioquin commiscantur clysteribus his, qui ad consolidandum descripti sunt, cap. de Dysenteria. Potus lactis caprini primum quidē ad lib. i. quæ paulatim bibatur, non aceruatim. Postridie uero ad lib. s. remedio est Tenesmo. Oportet primo die recens multum bibere. Postridie decoctum ad dimidias & despumatum.

Decoctum betonicæ in uino albo tenui, laudatur ab antiquis.

### S C H O L I A.

Tenesmos affectus est præter naturam in recto intestino, in quo assidua & implacabili desidendi cupiditate ager tenetur, uel, ut Celsus, irritatio ultimæ partis intestini, in quo sæpius lubet sine causâ desidere. Initio excernuntur pauca, mucosa, magno conatu, aliquando conspersa sanguine, sitq; uelut præmium Dysentericæ. Hic necesse est naturam stimulari in intestino ab aliqua causâ præter naturam, quâ excernere nititur, quasi illic esset excrementum. Ea est uel sine materia, uel cum materia: & si cum materia, uel in cavitate intestini continetur, uel extrinsecus comprimit meatum. Sine materia intelligimus, ut cum frigus partem illam constringit & mordicat, ut si ager in solio frigido aut lapide sederit, ære, uento frigidore. Aliquando reduplicatur intestinum, uel musculus, ut nec clysteres, nec alia auxilia excipiat pars implicata, sæpeq; efficiat, ut lateat ulcus. Materiam uero dicimus, quicquid interiorē illam cavitatem irritare potest, uel ulcus, (nisi tum Dysenteriam esse uelis) uel abscessus, uel hæmorrhoides interiores, aut uermes, aut humor acris, aut stercus induratum & coactum. Quæ omnia tum ex relatu ægri, tum excrementis & doloris proprietate, artificiosa coniectura discernere licebit. in ulcere excernitur sanies aut sanguis dolor acutus, humor acris relictus post Dysenteriam, & si nihil perspicitur, profundum esse suspicamur, sitq; aliquando cachecticus. Vidimus uermium globulos assidue reijci ac subinde renasci. Antè Dysenteriam feces sit à putrida putri: in Dysenteria,



Dysenteria, ab acrimonia, uel medicamento malè insfriato, uel glande immissa. Aliquando recur plus iusto calefactam acriorem materiam perpetuo generat, quæ ad partem affectam difluit. Reycitur, sentitur morsus, quandoque sequitur febris quasi hectica, & paulatim atrophia. Stercus induratum conijcimus, si diu æger nihil reddiderit, aut non nisi recrementum dura, sicca, sine mucositate. Extrinsecus comprimitur & pungitur uel à magno & inæquali uesice calculo, quia uesica recto intestino incumbit, uel inflammatione parastatim. Hic adest penis distentio, arder urinæ. Illic calculi signa aduertienda, uirina retenta, turbulenta sanguinolenta & similia. In grauidis minatur abortum, ut scripsit Hipp. Uterus enim inter uesicam & rectum intestinum situs est, fœtusque conceptio amplior, & uesicam (unde assidue in iendi cupiditas) & intestinum premit. Quod fit ut etiam in laboribus partus, & alio quoque tempore l'enesmi cuiusdam imago illis eueniat, & si hoc morbo uehementius corripiantur, in uehementi illo conatu necesse est laborare uterum, fœtum quoque deprimi assiduo decessu, & uires ledi. Unde abortus, Interdum tam uehemens affectus est, ut Dysenteria similis uideatur.

Curatur sublata causa & affectu, unde nascitur. Clysteres ex hydromelite probe cocto cum rebus coquentibus, carminantibus, detergentibus. Omnes in minima quantitate ad unc. v. aut lib. s. quia intestinum ferè strictus, & ultima tantum a Hunc hepatis ablunda. In seffus in decoctione pingui, inunctio, in ul paticam dy cere unguentum Aegyptiacum, fœtus ex uino, in quo ruta, senteria uo uel quæ coquant, incidant, confirment. Later uetus fumo de- cant. nigratus aceto feruenti, ut excipiat fumus, linteo conuolu b Humoris tus, admotus, & similia. suppressio-

De curatione hepatici a fluxus.

Cap. XLII.

ne & astu.

**H**epate duriore excrementa durissima & similia pilulis caprarum, unde Spiratodi à Græcis, nisi iuncta sympto- eta sit imbecillitas. Hic enim biliosa liquidiora, & ut b matum, hu- augetur calor, insigniter flaua, crassiora, grauiter olétia, moris contra æruginosa, nigricantia assatis humoribus, & postremo macia, reso- colliquata hepatis substantia. Hic sitis, ardor, deiecta ap- luta hepatis petentia, assidua corporis iactatio, difficilis c curatio. In ut ac substā infirmitate attracticis Hepatis, chylosa. In infirmitate tia.

alte-



# DE MORBIS INTERNIS

a Gal. cap. alteratricis primum quidem lotura carniū similis &  
 2. lib. 6. de sanguini diluto aqua: deinde uaria qualitate & consistē  
 locis male tia, interim quasi limus sanguinis & grumus. Integra fe  
 affect. re appetentia, sitis nulla, frigoris sensus, setor exiguus.  
 b *Vi pulue* Hepatici fluxus nocte excitantur magis, longioribus a  
 ris huius co interuallis Horum curatio ex capite de debilitate he-  
 chleare vnu patis petenda est.  
 dissoluatur In summa utendum est refrigerantibus, si infirmitas  
 c *Vi R. ce-* a calido est: calefacientibus, si a frigido. In utrisque ui-  
 rati fantali tanda sunt, quæ obstruunt: In calida.  
 ni unc. iii. R. electarii triasent. 3. ii. coriandri præparati 3. i. se-  
 puluer sub- min. acetosæ & portulacæ ana 3. i. coralli rubri scrup. s.  
 tilissimi co- iacchari rosati 3. vi. misce, utatur in b iusculis, in hordea  
 rall. rub 3. tis, in potu.  
 iiii. Male. Syrupi conueniunt rosatus, de ribes, myrthinus, cy-  
 xentur cum doniorum, uel iulepus cum multa aqua ferrata Spodiū  
 oleo cydo semen portulacæ, acetosæ, corall. rubr. illos rosarum, &  
 morum. f. semen arilli, lappa, cichorium, endiuia, sonchus, corian-  
 emplastrū drum præparatum acetositas citri, ptisana, & similia cō-  
 in formam ueniunt. Ceratum c santalinum subactum c rosaceo, ce-  
 luna crescē ratum ex oleo rosarum, deinde subactum cum succo ci-  
 tis, et dextro chorii, endiuia, sonchi, plantaginis & tantillo succi ab-  
 hypochon- synthii uel eupatorii. Ceratis inspergi possunt pulueres  
 drio admo- ex proxime dicta materia.  
 ueatur. In d frigida, unde lotura carniū, electarium de ui-  
 d Materia no prius descriptū, mel passulatū hoc modo præparatū.  
 scilicet cōue R. passularum bene pinguium M. ii. fiat decoctio ad  
 nit quæ pe lib. i. s. uini optimi austeriusculi. Coquantur dum cras-  
 netrat, ut cy sescat uinum. Deinde passulæ in supradictum uinū for-  
 perus, schæ- titer exprimantur per setaceum & satis rarum. Expressio  
 uanth. quæ cum uno rursus coquatur ad crassitudinem. Cui adde  
 aperit, ut aromati rosati 3. i. sem. nasturtii & securidacæ assati &  
 absynth. ci. infriati, cinamomi electi an. 3. s. misce, utatur sepe. Hinc  
 chorū: lenit eundem puluerem seorsum acervabis, insperges 3. i. la-  
 ut passule, Etis  
 uinū granatorū dulce. abstergit, ut mel: incidit, ut uinū granatorū maturo  
 rū. præseruat a putredine, ut calam. aromaticus, cinamomū, lignum aloes.  
 Ceterū electaria de uino Arabū his oībus pollet commemoratis dotibus.



Etis ustulati unc. iiii. cum vitello oui, fiet pulicula.

Poterit inspergi & lacti amygdalarum bene cocto in hoc fluxu. Lac ouillum coctum & ustulatum conuenit, sed inspergere oportet aliquid supradicti pulueris, uel hunc.

R. corticis thuris scrup. ii. caryophyllorū, cinamomi ana scrup. s. Orizogala, pulli gallinarum & columborū, perdices, alicula assata, uinum tenue, odoriferum, sub astringēs. Inungatur hepar cum oleo mastichino, de spica, de absinthio & aliis dictis prius. Deinde superaspergatur pul. mastichis scrup. i. styracis calamit. Gr. 16. thuris albi & nigri ana Gra. 6.

Fotus est spongia expressa in uino decoctionis mastichis, thuris, styracis calamitæ, rosarum, absinthii, florum cupressi, eupatorii, asari.

Si superueniat febricula (quod sæpe fit) proxime dicta remedia calfacientia temperanda sunt prius dictis refrigerantibus.

## S C H O L I A.

De hoc affectu lege Galenum cap. 2. lib. 6. 7. lib. 5. de Locis affectis 8. & 6. de Morbis & Symptomatis. Maior sanguinis quantitas reiecta ab Hepate necessario oritur. Sanguis uel rubet: uel aquosus est: uel ater & niger. Is duplex, uel sanguis crassior, ut in bobus: uel limus & lax sanguinis. Hic rursum duplex siue adustus sit, siue naturalis: crassus nimirum, à quo ulcera profunda fiunt, & eiusdem ueluti serum seu pars tenuior. Rubens amatiran Dysenteriam efficit: niger tenuis & splendescens, Lotium fluxum, quem vulgo uocant, & quæ prima Dysenterie differentia complexi sumus: crassus tum hanc, tum etiam secundam. Sed tenuior magis è uenis mesaraicis & ramis uenæ portæ, quæ in coctum sanguinem & serosum continent: crassior ab hepate, uel liene. Si in torminibus, Dysenteria est. Si in fine februm quartanarum, morbis à melancholia, & aliquando in peste, non malum. Si sanguis aquosus, tertia est Dysenterie improprie dictæ species. Nonnullis etiam lotius fluxus dicitur. Læso hepate, rupta aut aperta uena, sanguis niger, uelut crassum atramentum, deinde rubens aliquando excernitur, & moriuntur. Quæ

les



## DE MORBIS INTERNIS

les duo uult Author. Vterque uix sentiens periculum, ani-  
mi deliquio paulatim extinctus est. Sunt & alie multe dif-  
ferentiae deiectionum alui ex uarijs causis apud Hippoc. ut  
exymata, interpreti strigmenta ueluti linamenta, pelidne,  
liuide, dysodees, sœtude ex corruptione partium, unde ex-  
eunt: cholodees, cholin acraton, bilem synceram significan-  
tes, non multum, ut uult Musa, & similes. In quibus hæc  
duo generalia præcepta tenenda sunt, Omnem synceram ex-  
cretionem metuendam in morbis, quia cruditatem significat.  
Omnem quoque corruptam, si die non critico, crudo adhuc  
morbo, cum labore egri, si die non leuat, aut tantum ad tem-  
pus. Ab initio quidem (inquit Galenus de omnibus) nunquã  
ad bonum fiunt huiusmodi deiectiones, ut pote magnam ui-  
sceris lesionem ostendentes: ad morbos quidem consistentes se-  
quuntur sæpius, natura superfluitates expurgante. Et paulò  
post. Multi deiectionum colores præter naturam, sponte qui-  
dam euacuati, multarum atque malarum in corpore disposi-  
tionum sunt signa. A medicamento autem ducti uim habent-  
te plures humorum species euacuare, nihil absurdum signifi-  
cant. Sed de his multa superiore capite. Varia autem illa  
excrementa, quæ deijciuntur, cruditatibus uentriculi respon-  
dent, quæ retenta corruptelam quandam & uitium con-  
trahunt.

Pro uarietate causarum multiplex curatio. Quibus san-  
guis excernitur, rupta, aut exesa uena, si uires firmæ, san-  
guis modicus è basilica detrahendus, rhabar. in substantia,  
cum syrup. rosa. aqua arnoglossæ, tabulæ ex his, quæ sangui-  
nem supprimunt, syrupus ex iucco arnoglossæ, centinodia,  
bursa pastoris, millefolio, urtica græca, uino granatorum,  
cum sacch. rosa. embroche ex oxycrato parato ex aqua plan-  
taginis, &c. Vitanda in cæteris quæ obstruunt, utendum  
roborantibus, redeundum ad caput debilitate hepatis, ape-  
riendum roborando, aqua decoctionis passularum, Gallina  
cydonis & conferuis adstringentibus cocta in balneo ma-  
rie, donec ius concreuit in causa conueniente, gelatina ex  
rebus corroborantibus, cinamomo & alijs, aqua distilla-  
tionis mastichis coralli seminis cydoniorum, unde diluatur  
uinum.

De



De fluxu a Pestilentiali.

Cap. XLIII.

a Quod est

**G**alenus olida insigniter, fulua & crassa excernuntur, *luis pestife*  
 Galiis subalbida Autumno ferè: liuescit facies, grana *ra sympto*  
 tur corpus, pulsus *b* concidit 4. 7. uel 9. moriuntur, aut *ma.*

agrè conualescunt. Alii tota cute *c* commutantur. Aliis *b Hippoc.*  
 decidunt *d* ungues. Fluxus hic periculose adstringitur. *sect. 3. li. 3.*

Præter remedia supradicta in Dysenteria utatur auro *ton epidim.*

in decoctis pullorum, perdicum & similibus, Syrupo de *c. Diffusa*

ribes, de cydoniis, de myrtillis de limonibus, acetosita- *pestilenti pu*  
 te citri, uino granatorum, syrupo acetoso simplici cum *tredine per*

iulepo rosato. Atque aliquando in aurora *s. bona the*  
 riace in uino granato, acetositate citri, aut re simili dis- *habitu cor*

solues. Iuscula alerentur cum multa acetosa & nodu- *poris.*

lo de berberis. Collatitiis inspergatur puluis hic. *d Ex atro-*

R. limaturæ auri 3. i. diamargariti recens facti unc. s. *phia partiū*  
 nucis moschatæ 3. s. margaritarum, smaragdorum, sa- *venena-*

phyrorum ana scrup. s. panis sacchari unc. s. fiat puluis. *ta humorū*

Interim quoque utatur puluere unicornis & cornu cer- *qualitate.*

ui, uino tenui, odorifero, diluto aqua, in qua aurum ex- *e Interim*

tinctum sit *e*. Utatur interim hoc electuario. *etiā uti po*

R. conferuæ ros. unc. i. s. conferuæ corticum citri con- *terit pilulis*

diti cum saccharo unc. i. corticum citri 3. i. s. margarita- *Rusi ex a-*

rum electarum 3. i. hyacinthorum, smaragdorum ana *loe, myrrha*

scrup. s. serici crudi scrup. i. seminis citri mundati scrup. *croco.*

ii. s. acetosæ 3. s. boli armene, terræ sigillatæ ana 3. ii. li- *ma.*

matuæ auri 3. i. cornu cerui & unicornis, rasuræ eboris

ana scrup. i. sacchari albissi unc. ix. folia auri numero de-

cem. Fiat conditum ad formam sacchari rosati cū aqua

rosata moschata.

## SCHOLIA.

Pestilentis huius constitutionis Galenus meminit pluri-  
 bus locis, ut Aphor. 2 i. lib. 4. & in lib. de atrabile. Excer-  
 nebant nigra ferè 7. 9. 11. Quibus deiectionis talis non fuit, po-  
 st fule nigra toto corpore excitata. Nullus autè seruatus, qui  
 atram bilem exacta deiecerit. Primis diebus deiectiones erant  
 ruffæ & colliquationis indices, uel ut alio loco catatopus, vi-  
cellina, crasse, acres, fætide, spumose. Postea vero, ut scribi

R. ins



## DE MORBIS INTERNIS

tur in eundem Aphorismum, nigra uel superaffato sanguine, uel putredine quadam contracta & corruptela. Sed an fuerit pestis peculiariter appellata, an Epidemius morbus, qui multos interfecerit, dubitari potest. Nam pustula ille nigra raro in peste apparent, quin sequatur mors. Et multos obseruauit Author pestilenti febre laborantes, quibus eruperunt infiniti prope carbunculi aut furunculi similes carbunculis, quorum nullus euasit. Cutim & ungues decidere nonnulli a ueneno putant.

Non temere suppressendus fluxus, sed bezoardicis utendum syrupis, cordialibus, conseruis, opiatis, unicornis & similibus.

De difficultate meiendi. Cap. XLIIII.

**V**esica internam membranam habet contextam omni genere fibrarum, quas dum intedit, urinam continet. Si solum transuersis agit, exprimit. Eius actio in totum naturalis.

Eiusdem collo musculus est obliquus. Agit hic transuersis fibris arbitrio quidem motu, ne urina intempestiue effluat. Itaque cum plena est uesica, & quantitate uel qualitate irritatur, transuersas fibras intendit: musculus cessat ab officio atque ita urina emingitur. Nervi a lumbis & osse sacro ad uesicam perueniunt. Resolutis nervis aliquando torpescit sensus uesicæ: aliquando musculus sphincter, qui collo uesicæ adnatus est, resoluitur, atque ita urina intempestiue effluit. Galen. cap. 4. lib. 6. de loc. male affect.

Aut si sensum perdidit uesica, retinetur. Aliis nascitur inflammatio læsis uertebreis, unde nervi oriuntur, quod & dolore & calore loci intelligitur. Aliis rupta uena sanguis emingitur. Grumus fit, qui meatus intercipit, quo urina expurgatur. Idem meatus & lapillis & tuberculis & inflammationibus crasso pure, uel humore aliquando præcluditur, atque hinc urina exprimitur.

Vitiatæ uero missionis tria sunt genera. Dysuria, id est, difficultas urinæ: Stranguria, stillicidium, aut subtilium matum: Ischuria, cum omnino urina suppressitur. Dysuria libidinem meiendi facit, sed ægrè & ui quadam aliquando:



aliquando etiam cum dolore urina excernitur.

In strāguria assidua meiendi cupiditas, sed urina guttatim effluit. Ischuria improprie quidem fit perdita renum actione attrahente. Si enim serum sanguinis non attrahitur, urina non fit. Proprie uero meatu urinario præcluso aut infirmo excretrice uesicæ, quæ transuersis fibris exprimere non possit.

Idq; propter intemperiem, ut siccitatem in ardētissimis febribus, aliquando resolutis uesicæ neruis, & musculo incolumi. Nam si musculus una resolutus est, urina præter uoluntatem effluit. Dysuriam & stranguriam facit retentricis imbecillitas, quæ ferè fit à frigido. Frigidum enim uesicæ corpus, & frigido facile euincitur. Altera causa est urinæ acrimonia. Adiunge cætera, ut inflammationem, grumos, ulcera, calculos & cætera.

*Curatio Dysuriæ a Stranguriæ.*

Si à frigore infirmitas, calorificis utendum est, unctio ne perinæi & pectinis, fomentis, balneis, clysteribus, positionibus, aliisque remediis. Vngendo olea conueniunt rutaceum, anethinum, chamæmelinum, balsaminum, de scorpionibus, de keiri, de lilio, de cucumere asinino, in quo decima pars castorei, sexta galbani uel opopanacis coxerint. Ex eiusmodi oleis fiunt cerata. Ceratis. Consparguntur & aromata, quæ calefaciant & partium tenuitate facile penetrent.

Fomenta fiunt ex decocto maioranæ, rorismarini, arthemisiæ, origani, calamenthi, thymi, hyssopi, parietariæ, sisymbrii, berulæ & cressonum, ex quibus & balnea comparari debent. Alioqui has herbas friges in sartagine ex oleo uel butyro, & emplastri modo femori superioriori, pectini & perinæo calida admovebis. Omentum arietinum, calidum iisdem locis ad motum iuuat, uel retracts detracta pellis cuniculi. Cuius axungia in eundem usum plurimum commendatur.

Clysteribus & glādulis ex supradictis herbis, oleis & materia, adiecto sale & melle ad irritandū cōfici debēt. Deco-

*gia sœniculi, f. cataplasma admonendum pubi & perinæo.*

R 2

a Expultri

cis. s. facultatis uesicæ

que dysuriam facit,

aut retentricis, quæ strā-

guriam.

b Comendat

præter cate-

ra oleum de

scorpionib.

cū anethino

Vt R. olei

anethini, o-

lei de scor-

pionib. ana

3. x. casto-

rei 3. y. gal-

ban. 3. iy.

Coquantur

in balneo

maria, f. li-

nimentum.

c Vt cargo

phill. macis,

cyperus an-

gelica.

d Vt R. ra-

phani con-

tusi, parie-

tarie, cress-

onis ana

M. i. Ex his

cum suillo

adipe fri-

is, uel axi-



# DE MORBIS INTERNIS

Decoctum radices eringii, cyperi, radices lapæ, am-  
os, cinamomi, nephitæ, myrrhæ, opopanax, crætæ ma-  
rinæ, carthami, extremitatum caulium, & alia, quæ po-

**Naturalis** itea dicentur, cap. de lapide.

**aconomie** Aquæ conueniunt tribulorum, raphani, crætæ mari-  
ritio, excre næ, pentaphylli, alliorum, acori, florum malum, cyperi,  
menti sup- eritrodani, sabinæ, fabaceorum, scolopendrii, alkecan-  
pressione gi. Grana alehecangi trita & expressa succum reddunt,  
quod in pe utilem cum uino albo tenui, terebinthinæ, parietariæ,  
culiari cu- acetosæ, acetum album.

iusq; natu Conueniunt à proprietate uiuerræ gentiale, cinis  
ra redunda scorpionum crematorum, testa oui repurgata, e qua pul-  
re cõsuevit, lus exierit, aselli, uermes terreni, erinacci siccati aut  
aut impro eiusdem testiculi puluis, uesica tauri & capræ.

bavictus ra Conuenit & theriacæ potus, uocatum lithotripon,  
tione. electuarium ducis, aurea alexandrina, Cucurbitæ nati-

b Ad sedan bus affixe. Pediculus inditus foramini uirgæ, aut cimex  
dum ardor uel loco horum si la croci, granulum salis, catheter, al-  
materie eua galia, syringua, aut candela cerea oleo prius illita.

cuatione Vbi uero urina a acrior est, si quidem corpus bene  
faciendum carnosum est, si inflammationis suspitio, uena basilica b  
perspirabile secunda est.

corpus. Purgandum cum 3. x. cassiæ dissolutæ in sero capri-  
c Ut aqua no uel liquore c conuenienti. Vomitus, si quidem con-  
decoctionis suetudo est, plurimum prodest. Clysteres è lacte d sudo-  
glycyrrhi ris prouocatio.

Ze. Galenus e ex Hipp. phlebotomiâ è crure magis pro  
d Ut exitu basse uisus est, quàm è brachio. Arabes prius è brachio,  
habeat icor quàm è crure, quod & aliquot locis Gal. nō repugnat.

cuius acri Hic olea conueniunt, uiolatum, nenupharinum, de  
monia fit papauere, ex quibus cerata fiunt admixta modica quan-  
stranguria. titate camphoræ, gr. iiii. aut iiii. ad singulas unc. cerati.

e Lib. 6. A- Balnea & fots in decocto sem. lini, sēnugrēci, altheę  
phor. apho. philii Nec peccaueris, si quid chamemeli adieceris.

36. e sent. Aqua distillata ex acetosa, plantagine, laureola, pen-  
5. sect. 1. li. taphyllo, syrupus de iuiubis, de papauere, decoctum  
6. ton epi- glycyrrhizę, portu. lactucę, quatuor seminum commu-  
dim. nium, lac asinæ, uel capræ, serum lactis, lac amygdala-  
rum,



rum, hordeatum cum sem. lini, melonum, cucumeris 4. sem. communibus frigidis, quale hoc.

R. seminum psilii, melonum, cucumeris ana 3. ii. seminum althee, cydoniorum ana 3. i. seminum lactuce, hyoscyami albi, papaueris albi ana 3. s. gummi tragacanthi 3. ii. fiat decoctio, cum qua dissolue amygdala dulcia. Fiat lac amygdalarum cum saccharo uiolato. Quod si suspitio est ulceris, iam bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, pul. equiseti cum lacte ustulato, syru po myrtillorum, iulepo rosato conueniunt. Similiter saccharum rosatum, triasantalum, tragacanthum frigidum, cydoniatum sine speciebus factum cum saccharo. Iniicitur in uirgam lac recens emulctum, maxime muliebri, cui si calor maior est & dolor, addatur muccago feminis papaueris, cucumeris, psilii & similium cum modico camphoræ. Vbi uero consolidandum.

R. lactis mulieris, uel bubuli ustulati unc. iii. sarcocolæ tritæ, amyli, cerusæ an. 3. i. fiat iniectio ter aut quater in die. Laudat hic puluis, quo mane & uesper i utat.

R. sem. melonum excorticatum 3. ii. sem. citruli, cucurbitæ, portulacæ, papaueris albi ana 3. s. sem. hyoscyami albi scrup. s. & gra. vi. panis sacchari unc. iii. fiat pul. detur ad 3. ii. cum iulepo uiolato, aut liquore conuenienti. Dragma una trochiscorum alchecangi cum liquore conuenienti plurimum commendatur.

Grumi decocto stœchados, sarmentorum uitis, mumia, oxymelite, rebusq; eiusmodi incidentibus dissolui debent. Hinc graue periculum est. Sequitur enim animi defectio, coloris feditas, pulsus paruus, frequēs, obscurus, anxietas, & ut plurimum mors.

Sanies & pituita si crassior est, incidenda. Inflammationes & ulcera suo modo curanda sunt. Ita & calculus. Plenior uesica manibus comprimenda est, & qua parte tumor eminet.

## SCHOLIA.

*Urina uel supprimitur: uel parum & frequenter mingitur: uel seruat naturalem excretionis modum, sed uesica cum difficultate aliqua aut dolore operatur. Supprimitur aut uel*

R 3 *nascua,*



## DE MORBIS INTERNIS

vacua, vel plena vesica. Si vacua, argumentum est urinam non transire ad vesicam. Nilum igitur erit vel in veteribus vel renibus aut resolutis aut interceptis. Philot. in Aphor. obstructionem addit in crassioribus intestinis à crassa & viscida pituita, quæ prohibet anadosin ad hepar, & consequentione quadam succorum generationem, & urina secretionem. Si vero vesica plena sit, in ea affectionem morbosam esse necesse est. Suppressio urine siue renum vitio, siue vesicæ fiat, quibusdam dicitur iscuria. Proprie tamen hoc nomen usurpari debet in ea tantum affectione, in qua urina supprimitur, læsione in vesica existente. Cum autem parum & frequenter, siue guttatim & maturius, quàm pro naturali excretionem emittitur, stranguria: quando tempore convenienti, sed cum difficili motu aut dolore, dysuria, nominatur. Hæc est vera distinctio inter has affectiones brevissime ex multis Galeni locis comprehensa. In quem acerbius tanquam tenebras offundentem, nobis inuchi videntur, qui nuper Commentarios in Aphor. scripserunt. Aiunt enim in Dysuria semper dolorem fieri, ut in Dysenteria: nunquam in Stranguria. Sicque hac sola differentia Dysuriam differre à Stranguria, siue guttatim emittatur, siue contra. In quo & sibi & experientia repugnant, ut qui alio loco scribant Stranguriam fieri eo modo, quo Dysenteriam ab acri humore confertim ad vesicam irruente, & alibi ardorem urine adiungant, imò producant Aphor. 55, lib. 5. Vbi Hippoc. ait Stranguriam fieri à magna inflammatione uteri, aut intestini, aut renibus purulentis. Quo pacto hic dolor ad Stranguriam nihil pertinebit? Neque ad mixtionem duarum affectionum recurrendum, nisi maiorem multo confusionem in omnibus & Hippocratis et Galeni scriptis, de industria mutatis pro arbitrio vocabulorum significationibus inducere velimus. Vnicuique enim libenter concesserim rem quamlibet, ut velit, nominare, modo aut à seipso, aut ab alijs intelligatur. At in veterum scriptis interpretandis non idem licet. Illi enim perspicuitatem sequuti proprijs & suo tempore vsitatis dictionibus conceptiones animi expresserant, parum admodum solliciti, quo quisque idiomate deinceps loqueretur, aut in quam significationem vocabula traderet, modo sententiam non perverteret. Ac cer



te nescio an vlla vnquam maior in grauioribus scientijs ex-  
 orta sit confusio ex prestigijs quibusdam & captionibus tñ  
 uerborum, tum dialecticarum ratiocinationum, quàm quæ  
 imminere uidetur, neglecta vera illa Antiquorum Methodo  
 solo nomine plerisque etiam doctioribus nota. Cum igitur  
 perspicuum sit, non solum in Dysuria sed & in Stranguria,  
 & Ischuria dolorem sæpe fieri, actionem tamen vesicæ diuer-  
 sæ modo ladi, num satius fuerit à rei natura, & lesionis in  
 excretionem varietate harum affectionum distinctionem suæ  
 mere, quàm ex dolore, qui omnibus communis esse potest? Ut  
 igitur aliud in henteria: ita vesica in Stranguria, siue urinae  
 stillicidio non expectat, ut urina tota colligatur, sed statim,  
 tanquam grauantem (ut ait Galenus) aut mordentem expel-  
 lit. In Dysuria siue difficultate urinae expectat quidem, atq;  
 aliquando diutius, quàm oporteat: sed cum excernenda est,  
 percipit æger dolorem aut tantam difficultatem, ut sæpe nisi  
 locum uesicæ comprimatur manu, aut diu et magno conatu eni-  
 tatur, libere non profluat. Et si in totum supprimatur, iam  
 erit ischuria. His positis causæ facile inuestigari possunt. In  
 Stranguria primum uesicam stimulari ad excretionem ante  
 tempus perspicuum est. Id igitur vel urinae mordentis acrimo-  
 nia fieri necesse est, uel imbecillitate retentricis, quæ minimo  
 etiam onere grauatur, vel ab ulcere, erysipelate, abscessu, in-  
 flammatione. Acrior urina redditur vel admixtione acris  
 alicuius humoris ut pituitæ salsæ aut bilis, puris per uesicam  
 euacuat, ut à renibus suppuratis, uel quia talis ex uenis ef-  
 fluit ex praua victus ratione, aut intemperiem calidam, &  
 humidam, uel humidam acquisiuit. Idq; aliquando per con-  
 sensum vicinitatis ratione. Participat enim intemperie &  
 inflammatione partium proximarum à quarum etiam tumo-  
 ribus premitur, ut intestini & uteri. Retentrix imbecilla  
 redditur ab intemperie qualibet, sed præsertim frigida. Mus-  
 culus uesicam claudens, quandoque resoluitur, ut in senibus.  
 Sed proprie non est Stranguria. Hæ sunt in riuersum cau-  
 sa huius præcipitis excretionis, proprijs signis distinguendæ  
 & ex relatu ægri, quas diuersis locis Hipp. exposuit. Et cum Apho. 16.  
 scribit in siccitatibus urinae stillicidia fieri; alio loco, Recto in lib. 3. 58. 5.  
 testino, aut utero inflammationem patiente, & renibus puri 48. 7.

R 4      lentis,



## DE MORBIS INTERNIS

litis curati quoque vini potione, & sectis uenis interioribus  
 ducipi'as, si dolori pro symptomate habeat, causa erit infla-  
 matio, uel abscessus, uel ulceratio, ut ab usu medicamentorum  
 acrium; uel spiritus flatuosus, uel inaequalis intemperies. Si ue-  
 rò difficilem aliquem motum, imbecillitas potētie excreticis,  
 ut ob frigus uesicae aut colli; uel tumor praeter naturā, uel ob-  
 structio a crassis et viscidis humoribus infarctis aut adhaerē-  
 tibus ceruici uesicae, aut urinae permixtis, ὀξυπία nascitur  
 obstructione meatus urinarū, imbecillitate excreticis, intē-  
 perie. Obstructio, uel cum collum uesicae tumescit & indura-  
 tur extra naturam adeo ut via urinae claudatur: uel cum ibi  
 aliquid praeter naturam generatur, ut tophus, caruncula, tu-  
 berculum: uel aliunde confluit aliquid in illam cavitatē, ut  
 grumus, lapis. Imbecillitas ab intemperie, morbo organico, so-  
 lutione continui, saepe neglecta meiendi occasione uelut euer-  
 sa expultrice ob copiam urinae immodicā, unde etiā obturatur  
 meatus. Sic nec uesica sese contrahere potest ad expellendum  
 nec si id fecerit, pracluso aditu urina exire. Intemperies à  
 multa siccitate idem efficit, ut in febribus ardentissimis &  
 siccissimis. Si lapis exitum prohibeat, sitq; insignis magni-  
 tudinis, cognoscitur, quoniam agro supino, si concutiat, urina  
 prodit: si paruus extiterit, cathetere immisso sentitur  
 in collo uesicae. Si arena, dignoscitur exiū, quanquam rarò  
 obstruat, nisi lentus humor adsit. Si sanguis concretus, liqui-  
 dus solet ante effluere: si pituita, apparet dum excernitur.  
 Si imbecillitas, praecessit aut diuturna retentio, aut frigus re-  
 hemens aut alia intemperies. Si abscessus, dolores & febres  
 praecesserūt. Tophus, callus, tubercula solent sequi ardorem  
 urinae, fluxum seminis, morbum gallicum, ulcerationem à  
 cathetere. In cathetere cauendum ne fallamur, quòd aliquā-  
 do pure aut crassitie pituitae orificium intercipiatur, & os  
 catheteres angustius, aut quia nihil lotū in uesica interce-  
 ptis superioribus. Constat experientia urinam suppressi à  
 calculo in uentriculo renū sine dolore. Sed ubi incidit in ure-  
 teras, acerbissimus dolor excitatur. Plerisq; suppurantur re-  
 nes calculosi, & colliquantur ut tantum maneat pellicula,  
 ficuti D. de Mancy, cui ren dexter colliquatus, sinister calcu-  
 lū habebat, ureter & partes reliquae siccatae. Subita resolu-  
 tione



tione vesicæ cuidam cū subitus dolor motus esset in offe sacro  
 et coccyge, trine suppressio sequuta est, quā tamen reddebat  
 rursus et sese cōprimens manu adnota pūb. Sensus amissus  
 in recto intestino, ut neq; clysterem iniectum sentiret, neque  
 cū redderetur. Admotu fomentis, & emplastris o. si sacro  
 contra Paralysem, redit sensus & conualuit. Viro nobili in  
 pueritia secto aderant signa omnia calculi, nisi quod cathe-  
 tere nō inueniebatur. Mortuo à malè curata cicatrice absces-  
 sus et gangrena in vesica & vicinia inuenta est. Inflammati-  
 vesicæ dignoscitur tumore supra pectinem, febre, vrine re-  
 tentione & excrementorum alui. Sequitur fere vlcus, calcu-  
 lum, vsus medicamentorum acrium, dolorem uehementem.  
 Varia curandi ratio. Pro causarum diuersitate cōueniunt  
 clysteres ex materia cōuenienti, quia collum vesicæ insidet re-  
 cto intestino, fotus, infessus, veronica succus, cuniculoru esus  
 qui iuniperum oleat, candela cerea, iunctiones per uirgam,  
 cassia cum tātillo rhab. terebinthina, iniectio ex oleo nardi  
 no et succo oximi, aqua theriacalis, gallus cū parietaria, ra-  
 dicibus, herbis, seminibus conuenientibus coctus, aqua ligu-  
 stri, herniaria, sacculi, vinum dilutū aqua parietariæ, utim-  
 ctus ciborum in oxymelite, vel succo limonum, sectio uena-  
 rum interiorum iuxta Hippocr. A materia frigida vini po-  
 tio, fotus ex decocto apij, illitus ex unguento Agrippæ, mar-  
 tiato & similibus, vinum enulatum, steruus gradioris muris.

## De a calculo. Cap. XLV.

**C**alculum gignūt calor renum b immodicus, aliquan-  
 do etiam tepidus & humor crassior, qui calore lapi-  
 descit. Generatur aliquando in renam stomacho: ali-  
 quando in substantia. In uesica c quoque generari uerisi-  
 mile est, & maximè pueris.

Signa, dolor d fixus in renibus grauitas, urinæ e ini-  
 tio tennes. Primum quidem cū arenis & exigua asperi-  
 tate: deinde cum multo sabulo & crassiores excernun-  
 tur †. Primum igitur clystere molliendus uenter est. Re-  
 nes enim oppressi stercore grauius dolent: liberati le-  
 uis, & ex eo calculus minori negotio excluditur.

In dolore uehemēti sanguis detrahi potest e poplite

uel

a De lithie

f, siue lapi

de renum.

b Si tenuis

fit humor,

aut acer, u-

naq; expul-

trix renum

facultas lā-

guidior, &

meatus an-

gustiores.

c Primage

nerōne aut

secundaria.

d Non va-

gus, ut in co-

lico dolore.

e Ab obstru-

ctione uasis

urinarij.

Aut etiā u-

rinarij sup-

pressio cum

dolore renū

repitē obor-

to. Ex hipp.

in coacis a-

nimaduers.

† Pituita

uomitio, de

inde etiā bi-

lis arugino-

se, femoris

quod è dire-

cto est, stu-

por.

floria.



*lenitio alui*

DE MORBIS INTERNIS

*a* *U*t *n*e *p*hri uel malleolo. *A*lius quoque leni medicamento *du*cen-  
*t*ica *reme*-da est, ut cassia ad unc. i. cum saccharo uiolato, uel gly-  
*dia inoffen*-cyr. decocto. Optimū quoq; fuerit interim, dum Medi-  
*so cursu ad*-cus laborat excludendo calculo, alternis diebus a Cas-  
*renes perue*-siae unc. s. aut 3. iii. cū saccharo uiolato imperare horē  
*niant.*

*b* *S*tercoris *secta uena est & lenita aluius, unctionibus, fomentis, bal-*  
*enim copia*-neis & remediis lenientibus atq; laxantibus utendum  
*nephritici* est. *Conueniet itaq; oleum uiol. amygd. dulc. butyrum*  
*damnis an-*recens, oleum in quo radices altheę coxerint. Vnguen-  
*gentur, com*-tum dialtheę, clypus, hyeme etiam oleum liliorum, &  
*presis à co*-cham. *fotus & balnea ex malua, bis malua, uiolaria, cha-*  
*lo fecibus*-meliloto, lini semine & fenugr. alijsq; eiusmodi.

*distento re-* Iuscula & quædam ex malua, bis malua, adiectis ciceri-  
*nibus.* bus rubris cum multo butyro & modico sale. *Postea ue-*  
*c* *U*t *R.* sum ro remediis *utendum est, quæ calculum excludunt.*

*mitatu bis-* Primum quidē leuioribus, deinde fortioribus. *Cōuenit*  
*malua M.* initio oxymel simplex cū decocto liquiritiæ. *Betonica,*  
*i. filiusculū* lupulus, capparis, scolopendrium, capillares herbæ, ra-  
*cum multo*-dix graminis, chamebati & similia. Fortiora sunt scylla,  
*butyro & co*-iris, enula, aristolochia & similia. Oportet aut interual-  
*chleari mo*-lis repetere hæc remedia leniendo, laxando, excludendo.

*mellis Nar-* Sanguis e hircinus ē iugulato hirco iuvene, quo tē-  
*bonensis.* pore uix maturescunt, medius quidem excipitur reli-  
*d* *S*i *subsi-*cto eo, qui primus fuit, & postremus fictili uase excipi-  
*stat calcu-*tur. Insolatur fexsiccat, reseruaturq; fideliter. Cum  
*lus & adve-*usus fuerit, accipies pul. 3. i. s. cum uino tenui.

*sicam riam* Aurelianus a balneo aut iam laxatis uis, renes, pu-  
*affectet.* bem, inter femineum, calido hirci sanguine inungit.  
*e* *Hæc ex* Lapis iudaicus tritus & potui datus 3. pondere. *Soli-*  
*Aetio. Ob-*nus, Dioscorides & alii Medici tum renum, tum uesicæ  
*seruabis re*-lapides frangere hunc scribunt. Galenus non uesicæ,  
*ro sanguinē* sed renum. *Author libelli de calculo duplex g genus fa-*  
*illum effica* cit,

*cio rem futurum si postremis diebus hircus diureticis altus fuerit.*

*f* *Obducto linteo, ne solis ardore vis euanescat.*

*g* *Galen. lib 9. Simplic. unum lapidis iudaici genus tantum statuit. Vnde colligas libell. de calculo falso Galeno tribui.*



cit, scribitq; marem è renibus, feminam è uestica calculi educere.

Datur cum oxymelite tritus in cote, uel cum unc. iii. aquæ, Oleū a chamæmelinum fictili uase concluditur, mittis floribus genistæ. Vas fideliter clausum stercora rio fimo sepelitur, illicque ut esteruescat, aliquot dies relinquitur. Eo oleo renes, pubes, perinæū inunguntur.

Belliole in lapidariis, fodinis quasi verrucæ lapidibus obhærescunt, quæ si quinque numero ex aquæ unc. iii. sumant, mirabiliter iuant. Pellis *b* leporis cremata, lepus decolatus, alioqui integer cum croco & carni bus uase fictili crematur. Eiusdem renes siccati & inue terati pondere scrup. iiii. ex uino tenui propinantur. Ci nis ungulæ equi, plumarū palumborum, testæ cochlea rum, cancrorum, uermium terrenorum, asellorū, passer culi; quā caudam tremulam uocant, stercus murium in aceto tritum. Calculus, quem quis primum excluderit. Lotium capræ montanæ, cicadæ aridæ, & alia eiusmodi a proprietate calculum excludunt.

Corticis raphani acerrimi unc. vi. horis xii. in cuini albi tenuis unc. viii. madeant. Colatura duabus dosibus sumitur.

Terebinthina *d* ad cautionem calculi, potius quàm ad exclusionē, imperanda est, eaq; multis modis utimur.

R. terebinthinæ unc. iiii. inuratur in lamina ferrea cā dente, ut possit infriari. Dabis 3. ii. eius pulueris cum unc. ii. aquæ saxifragiæ, chamæmeli uel genistæ & unc. i. oxymelitis. Hoc medicamentum excludēdo calculo satis esse potest, ubi prius lenieris & relaxaueris. ut.

R. terebinthinæ unc. s. lithontripon 3. ii. misce, fiat bolus. Aliud.

R. terebinthinæ lotæ decies in aqua saxifragiæ unc. s. cum saccharo fiat bolus. Hoc uero datur tempore pa roxyismi.

R. te-

non proban

*dus, quòd ad renes humores deducat excrementitios.*  
*d Imò potius ad curationē, quā ad prouisionē terebinthina præscribēda.*  
*c Idem facit terebinthina aqua stillantia.*

*a Huiusmo di oleum te*

*nuandi & incidēdi in diexodo vi habet.*

*b Hæc pro prietate in*

*explicabili dicuntur esse*

*nephritica Puluisculū*

*autem apte conficies ex*

*radi. petro. radi. saxi-*

*frag. & la pillis qui in*

*astacorū ca pitibus repe*

*riunt. Confe ret mirifice*

*ad lapidem confringen*

*dum cum ui no albo a-*

*qua fœni cul. scolopē.*

*aut petrose- lini diluto*

*exhibitus.*

*c Vini albi usus in cal- culi genesi*

*non proban*



# DE MORBIS INTERNIS

**a Exrhayæ** R. terebinthinæ lotæ in aqua uiolarum unc. s. a be-  
*descriptioe*, nediætæ 3. ii. Aliud.  
**quaturbiñ** R. b terebinthinæ lotæ in aqua halicacabi 3 ii pulu.  
*non recipit* tragacanthi & glycyrrhizæ ana 3. i. s. incorporentur in  
*Attamē hu* unc. s. cassiæ, cum saccharo fiat bolus. Aqua distillata e  
*ius loco re* terebinthina.  
**Ete substi** Iustinianum excludendo calculo ad 3. iii. dissoluitur  
*tues hieræ* in glycyrrhizæ decocto, uel cum saccharo uiolato in bo-  
*picæ 3. ij.* lum cogunt. Lithontripon per se 3. iii. pōdere, uel cum  
*b Hoc medi* 3. iustiniani ex decocto glycyrrhizæ aqua uiolarum, chamæ-  
*camentum* meli aut simili. Aliud.  
**pari facul** R. cornu cerui uisti & puluerisati, gummi tragachanti  
*rate lenien* similiter pul. ana 3. i. Terebinthinæ in lamina terrea ut  
*di & tenuā* prius crematæ 3. s. lapidisiudaici, pul. uermiū terreno-  
*di pollet,* rū an. scrup. i. incorporētur omnia in iustiniani 3. i. s. De-  
*proptereaq;* inde in decocto glycyrrhizæ dissoluantur, & fiat potus.  
**ad paroxys** Sunt qui singulare præsidium putant frangendo lapi-  
*mum diexo* di lignum e gaiaicum. Iusta quidem ratione, uirtute uide-  
*du impera-* licet incidente, adstringente & leniente. Talia enim ef-  
*ri potest.* se oportet, quæ calculosis imperantur: uitanda tamen  
*c Gaiaicinū* sunt, quæ nimium siccant, quæ crassiorum partium.  
**decoctis diu** Ratio quoque habitus corporis ineunda est. Obesum  
*reticum est* corpus magis d tenuantia, gracile uero minus perferre  
*unaq;* cum potest. Sic loci, temporis, anni, ætatum & similium me-  
*urinis sudo* minisfe oportet. Laudatur & hæc distillatio.  
**res ciet ma** R. mellis rosa. terebinthinæ ana lib. i. iuiubarum, se-  
*xime.* Sed bestem, nuculorum pini ana unc. iiii. Granorum alche-  
*potius i pro* cangi, seminis cucumeris, nigellæ, apii ana unc. ii succi  
*usione con* raphani per residentiam depurati lib. ii. Semina & reli-  
*fert,* quàm qua materia solida conquassetur. Cum cæteris in alam  
*exclusione.* bico ponantur, fiat distillatio. In distillationis unc. iii.  
**d Quod ue** dissolue 3. i. aut scrup. iiii. e eorum, quæ à proprietate  
*nas habeāt* calculum excludunt. Qualia sunt antea descripta, cinis  
*angustas.* scorpionum, scarabeorum, hepatis asini, testæ ouorum  
**e Vt pulue** ex qua exclusus recenter pullus est, hirundinum, testa-  
*ris polygo-* rum auellanæ.  
**si minoris,**  
**betonica,** lapillorum astacinorum, pulueris corticis cassiæ.

Limonum



Limonum succus à multis commendatur. Item & cinis uetri combulti. In uehemēti siti & calore, si quidem prius uacuatum corpus est, si debilitas uulceris, aut consuetudo non prohibet, aquæ frigide potus largiter exhibitus aliquando calculum excludit. Aliud remedium.

R. rad. asparagi, rad. rubi humilis ana M. ii. foliorum betonicæ, polii montani ana M. ii. cicerum nigrorum M. i. fiat decoctio in aqua pluuiali secundum artem. In fine decoctionis adde aceti scyllitici unc. i. fiat colatura dosis unc. iiii. cum 3. i. lapidis iudaici, aut similia.

*Remedium Porphyry & Octauj.*

R. brassicæ siccæ & in puluerem redactæ 3. ii. piperis unc. s. misce. Dato 3. i. ex aqua, aut aqua alchecangi aut simili.

Gallus lassatus flagris cum polytrico, trichomane, lupulo, asparagis, aliisque eiusmodi ad putrilaginem coquitur. Ius sorbetur. Conueniunt præterea scolopendrium, portulacæ succus, cucurbitæ cinis, ualeriana, semen perionatæ, cardui & damasonii radix, lini, cucumeris, maluæ, fœnugræci, api, seseleos, hederæ semina, cypripis radix, asari, rusci, cynosbati fructus detracta interiori lanugine, & spongiolæ in cynosbato natæ, gummi nucleï cerasorum, persicorum, cortex medius corillis sarmēta uitis combusta & extincta in uino tenui, aut liquore conuenienti, ut bibatur colatura.

Electri, lapidis spongiæ, pul. saxifragiæ ana 3. s. ex aqua genistæ, aut simili.

Cucurbitula lenito prius dolore, remollitis ac relaxatis partibus, iam nō urgente inflammatione, renibus primum, deinde perineo & inguinibus affigi debet.

In summa clystere mollienda aluus, leniendus uenter e cassia. Detrahendus sanguis è crure, nisi plenitudo sit totius corporis. Sic enim è cubito prius lenientibus atque laxantibus: deinde etiam leuiter incidētibus calculus ad exclusionem præparandus est, paulatimque faciendus gradus ad ea, quæ detergent, attenuant, expellunt, atque etiam urinas mouent. Multo maxime cum iam remittitur dolor, & calculus commutat locū.

Quod



## DE MORBIS INTERNIS

Quod si iis, quæ bibuntur, nihil efficitur cucubitus, utendum est. Si uero neque hoc remedio exit calculus, ad

*a* **Ut cata-**  
*plasmata,*  
*ex rapha-*  
*no, nastur-*  
*tio aquati-*  
*co, parietaria in adipe cuniculi frixis confecto.*  
*b* **Quod ad**  
*comminuendum calculum in renibus ualere putatur.*

*a* relaxantia, lenientia & initium curationis redeundum est. Si uero translatus est calculus in uesicam, nec aliter extrahi potest, ad incisionem confugere oportet. Cuius rationem repetes ex 6. Pauli Chirurgia Albucal. & aliis Chirurgis.

In hoc modo dolor intolerabilis facit, ut aliquando utendum sit narcoticis. De quibus multa antea.

*Descriptio b olei de scorpiionibus.*

R. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, corticum radices capparis ana unc. j. Bulliant omnia in lib. j. olei amygdalarum amararum.

Sunt qui addant succi raphani lib. s. ut fiat decoctio ad succi consumptionem. Alij aquam. Per hebdomadem insolentur.

Singulis libris colaturæ adice duos scorpiones, & rursus insolentur dies xv. Gutta eius olei uirgæ infunditur: eodem oleo pecten & perinxum inunguntur.

Probatum quoque multis balneum sulphureum, ex aquis naturalibus; vel sub quadruplo sulphure liquato in quadrupla aqua. Alij in eiusmodi aquâ calidâ lintea immergunt, & calida perinxo ac pectini apponuntur.

### S C H O L I A.

Multis in partibus corporis humani calculi generari possunt. Obseruauit Author concretos in capite & utero mulieris, cui dissectanda in Scholis publicè præfuit. Multis in folliculo fellis leues, nigri, flauî, innatantes aquæ, qui quandoque excluduntur deorsum. In nobilissima muliere 53. repertos secto folliculo uidimus in Aruernia, quos adhuc habemus. Pueri cuiusdam sutoris, in mesenterio inuenti: ducibus mulieribus in pulmonibus: multis in articulis, iecore, liene, uentriculo. Adherent sæpe uesicæ, cranio, utero. Galenus de humoribus meminit calculi in utero. Mnsa mulierem refert ex ano quinque lapides reddidisse. Quod uerisimile est. Nam pituita sæpe lentissima intestino heret, quæ potest concreescere, dum satis non detergitur. Galenus 5. de locis affectis meminit cuiusdā, qui è thorace uelut grandines expuebat. Alberto Sarraronola



le mortuo decem calculi inuenti in uesica magnitudine oui co-  
lumbæ & figura, singuli pendentes plus quàm 3.5. omnes si-  
mul unc. vi. ut scripsit Musa. Pituita putris & pus crassum  
aliquando representant calculi signa, ut in Præsede quodam  
multa mucosa, uiscida, longo tempore quotidie expurgante.  
Sed de materia, causa efficiente & generationis modo in uesi-  
ca & renibus non eadem omnium sententia. Alij aiunt mul-  
tam materiam crassam ac terream primum cogi in unum in  
uesica, cuius pars intima concreuit, tandemque si non eiicia-  
tur calore & frigore parte tenui consumpta in lapillum coa-  
lescere. Hinc uoluitur ab urina, & semper sibi adiungit, at-  
que sic augetur. Causam autem efficientem esse tum calorem,  
tum frigus, unde in senibus et pueris generantur, non in iuue-  
nibus. Alij ex Hipp. materiam faciunt urinam adustam à fer-  
uore & ardore. Quorum enim alius fluida est ac sana, & uesi-  
ca aut uesicæ os non ardet, his facile urinam effluere, & in  
uesica nihil congregari. Quorum uerò alius ardens & ferui-  
da fuerit, in his etiam necesse esse uesicam idem perpeti. Cum  
enim magis, quàm pro natura, fuerit calefacta, stomachus  
eius inflammatur. Vbi uerò hæc perpetitur, urinam non de-  
mittit, sed in seipsa concoquit & adurit: & quod quidem te-  
nuissimum in ipsa est, excernitur: quod purissimum transit ac  
emungitur. Indicio esse urinam splendidissimam excerni in-  
star feri. Brasauolus tertium modum affert ex eodem Hipp.  
4. de morbis. Fieri enim ex arenis, sedimento uelut glutine co-  
pulante. Hoc quibusdam non placet, quia natura ut statim  
arenam senserit, protinus eiicit. Et cum renum calculus nu-  
dus sit, adeo uesicam uexat, ut diu non possit retineri, quare  
nec augeri. Contra nonnulli nullum in uesica lapidem genera-  
ri aiunt, quin in renibus acceperit principium & rudimen-  
tum. Indicia esse nephriticos dolores, qui in omnibus præce-  
dunt, & in omnibus calculis medium quasi nucleum reperiri,  
uerum rudimentum à renibus exturbatum. Philot. contra, sæ-  
pius in uesica propter capacitatem calculos generari. Respon-  
dent capacitatem iustum argumentum non esse, & experien-  
tia doceri contrarium. Tantam controuersiam neque nostrum  
est conciliare, neque breuibus scholiis id potest præstari. Si ta-  
men licet ex his, quæ apparèt, quicquam efficere, cum lapides  
renum



renum & vesicæ, neque eodem colore, neque eadem figura, neque eadem substantia, neque in eodem sexu aut ætate similiter concrefcere sensus doceat, omnibus eandem causam, aut generationis modum tribuere, aut locum non minus absurdum videtur, quàm si in metallis & lapidibus terrenis idem fieret. Vesicæ enim calculi ferè maiores, rarò alio colore, quàm albo, aut cinereo, in pueris frequentius ob edacitatem ut ait Galenus, unde crudi humores generantur, qui calore concrefcunt. Sed fusam crassitiem exceptam ob robur nativi caloris & virtutis naturalis in vesicam renes excernunt. Adde si vis mollia & humida corpora puerorum & fluxilia quod plurimum facit ad excretionem materie crassæ. Quæ quia in senibus & adultis non adsunt, in illis frequentius generantur in renibus. In mulieribus rarius propter menstrua & laxitatem mollitiemq; uiarum. Accruantur lactis, casei, vinorum crassiorum usu, ut Ferrariæ: aquarum limosarum, ut Lutetiæ: alimentorum crassi succi, ubicunq; sit. Urinæ aliquando arenosa ex vesicæ: aliquando cõtra. Ex his omnibus in vesicæ & ab arenulis & a materia terrea atque adusta sed multo frequentius ex crudo succo, limoso ac viscido, quo etiam coguntur arenule, calculos oriri consentaneum est, aliquandoq; arenulas ex renibus in vesicam labi, sed & ex ipsius urinæ fece resoluto humore posse fieri, à calore stomachi ipsius, ut ait Hippocrates, quales in matulæ fundo apparèt. Crassities materie intelligitur ex corticibus veluti caparû, quibus lapides vesicæ integuntur, & ex compacta substantia ac duritie. A viscido humore frigus, à superueniente calore induratio, coctio & quasi assatio ut in lateribus ex luto, unde neque calore liquantur, neque frigore. In renibus vero ferè tinguntur rubro, ut rubrum intelligas, & flauum, & rufum iusta ratione quod & in arenis videre licet. Nam à sanguine, calore loci, & partis colore tingi solent. Minus duri, asperi & magis friabiles, quàm in vesicæ. Ergo magis ex arenulis coalescunt. Cur igitur multi arenas mingunt, neq; calculosi sunt? Causa in promptu est. Non enim coguntur, nisi viscido aliquo & crudo humore tanquam glutine. Opus est tempore. Vbi igitur obstructio à crassis & viscidis humoribus, & acrior urina ac magis jeculenta, angustiores meatus calore



calore superueniente à quacunque parte, ut hepate, corde, renibus, quod diu impactum fuit in meatu, induratur & lapidescit, figuramque accipit à sinu, in quo est. Neque impedimento est, quod nonnulli respondent, ex calculo arenulas fieri, non contra. Cur enim qui generantur in uesica, in arenulas raro dissoluntur? Neque etiam ob id necesse est in calculo renum semper arenulas excerni cum urina. Nam in multis dissectis probatum contrarium, qui calculosi sunt inuenti, cum neque arenas meierent, neque laborarent urina difficultate, in fosso calculo in substantia renum. Archigenes & Philagrius arenas reddi uolunt, cum iam calculus è rene in uesicam descendit. Rudimentum quoque in renibus quandoque accipi, accretionem uerò in uesica non est negandum. Cuiusmodi calculi in medio sunt friabiles, in superficie duriores & magis compacti, doloresque nephritici praecedunt.

Quae omnia plurimum conferre uidentur ad curationem & praedictionem, ut in quibusdam potius ad arenularum generationem respicere in alijs, ad crudorum humorum copiam oporteat, certumque sit in renibus, et ex arenulis facilius posse comminui. Calculus renum exactè describitur his signis. Dolor renum acutus: Sexto tamen Epid. grauis in renem dolor, cum cibo replentur. Quod ita distinguendum censemus. Cum enim in uentriculo renum figitur, uel sine dolore est, uel cum graui. Vbi incidit in ureteras, uel etiam intra renem pungit pelliculam in exortu ureterum, dolor acerbissimus. Cum etiam mouentur uehementius, aut spinam flectunt, dolorem acutum percipiunt, et stuporem circa lumbos & crura ob compressionem nerui à lumbis, uel ut alii uolunt, uena caue. Proinde additur ab Hipp. et in lumbos, et in testem secundum renem situm. Videtur enim quibusdam testis sursum trahi. Dolor ille fixus est, nec locum mutat, ut in colico. Frequenter mingant. Sed paulatim astringitur et supprimitur urina. Urina enim frequenter fluere non est sufficiens argumentum liberos esse calculis ureteras, cum uno clauso per alterum reddi queat. Suppressa urina regurgitat, unde alui tumor, singultus, animi deliquia, Coma, Dyspnoea, Cataphora, &c. Nō semper arenulae rubrae prodeunt, sed saepius, praesertim ubi è  
S renibus.



## DE MORBIS INTERNIS

renibus motus est lapis. *Vomunt pituitam inuolascens dolore & aruginosa. G. Epid. fastidium cibi, alui excretio difficilis. Sape sanguis excernitur ob violentiam calculi.*

Clyster lenis, fomentum, unguentum, holus, ph. ebdomia. Molluntur uia cassia cum rhab. cessante dolore & uomitu. Deinde terebinthina: postea oleo amygd. dulc. cum alphe nice, uel diatrach. hinc cataplasma molliens. Postremo quæ comminuunt. Inueteratus calculus paulatim atterendus. Alioquin frustra contendimus excindere. Vbi iam durior & maior substantie reni impactus, & quasi actis dignis & radicibus inhaesit, frustra oppugnatur. Recens natus mollior. Ille tamen atterendus paulatim & constringendus. Alia enim remedia excludunt, alia atterunt & frangunt. Regurgitante urina ad ventriculum uomitus ciendus, alius subducenda. Alioquinis medicamentorum hebetatur, licet ab hepate & renibus eorum quoque vis infringatur. Vehemens impulsio, comatio, affricatio, qua parte ureteres explantantur, & renibus urina & calculum promouent. In excludendo calculo renum uidetur quedam periodus. Multis quæto dolore, nec opinantibus excidit. Infinita prope sunt remedia in ueteru libris, sed cum iudicio & delectu eligenda. Quidam nobilis Lutetia lapidem habuit mollem, laxum, efformatum ad instar mortarii, per quem trānscolata aqua & epota mirum in modum iuuabat calculosos & urinam suppressam. Cauendum à nimia refrigeratione renum, quia inde angustiora uasa redduntur, et aliquando gignendi inapotentia confutitur.

De calculo uesicæ.

Cap. XLVI.

Calculus uesicæ si per fistulam urinariam exitum non habeat sola chirurgi curatur.

**C**alculus uesicæ curatur eodem modo, quo calculus renum. Nihilominus tamen in calculo uesicæ fortioribus opus est medicamentis, quam renum.

### SCHOLIA.

Signa lapidis in pueris sunt, urina aquea, similis lactis sero, sedimentum arenosum & tensio uirge, alioquin non conueniens illi ætati. Cum factum est, difficultas mieriendi, urina subcructa, dolor in eius excretionem, pruritus in preputio ex motu lapidis & arena, uel etiā lapilli parui ex attritu. Certissimum signum si mieriendo aliquid egerunt, aut egerendi cupiditate



te tenentur. Cū sedent repente, uel sedendo cōcutiunt uehementē-  
ter alterum pedem, dolorē sentiunt iuxta anum, in ima parte  
pudendi. Nonnulli iubent ad certiores distinctionē agrum  
equitare, saltare, exerceriq; uehementius. Inde exhiberi lapi-  
dem cōminuentia, & subsidentia in urina inspicere. In qua si  
tribus aut quatuor diebus pulvis appareat, lapidem esse du-  
rum: si lapidum frusta & quasi arenā, tophum: si nihil horū  
appareat, lapidem proculdubio non esse. Sed cauendum, ne  
exercendo in ardorem urinae incidant. Ponunt aut triplici-  
ter in uesica lapidem generari. Ex arena, sed raro, unde fit  
tophus: ex lapide iam in renibus concreto: & ex faece urinae.  
Cum uero lapis iam ulcus excutauerit, aut carnē, signa con-  
fundi. Omnibus tamen certiora signa digiti in rectum intesti-  
num, cui uesica incumbit, immisio & catheter, sed quae nō si-  
ne dolore adhibentur. Suppressa urina corpore supino & cō-  
cusso si prodeat, lapis meatu occludebat. Neq; catheteri sem-  
per fidendum. Mercatori cuidam omnia calculi uesicae signa  
aderant. Cathetere probari nō potuit. Mortuo duo magni cal-  
culi inuenti sunt, singuli unc. ij. s. membrana inclusi, utrique  
sui. Vbi concieuit in uesica, ferē maior euadit ob maiorem  
capacitatem uesicae & collauit. Tum non mutatione etatis,  
sed sola Chirurgia curatur. Atq; aliquando liber est, interdū  
haeret uesica, nec nisi ui extrahitur. Nam ut matula excremē-  
ta haerentia contrahit: ita uesica imbecillior. Deinde imbecilli-  
tate uesicae & angustia uiarum impeditur exclusio. Hinc  
mors, quia febris & inflammatio sequuntur. In coi. filio secan-  
di uidendum qua parte sit, & an sine periculo eximi possit,  
an pertinaciter hereat, an sit in meatu uirga & an fractu col-  
li eiusdem. Contusio ab asperiore & longiore operatione in-  
flammationem, gangrenam, mortem deniq; infinitis adfert.  
Sunt, qui iniecto oleo scorpionum & alijs per penem contē-  
dant frangi posse. Vidimus mulierem, quae inunctionibus &  
suctu penis multos liberauit. Sunt qui napo orbiculato oleū  
accommodatum immittunt. Napum coquunt: deinde ad mo-  
dum emplastri pubi admouent.

Sunt, qui aperto uesicae collo, quomodo Lithotomi faciūt,  
uiam aperiāt, nulla ut eiusmodi illata, quae inferri solet a va-  
rio genere ferramentorum, ubi calculus extrahitur. Atq; ea

§ 2 ratione



## DE MORBIS INTERNIS

ratione facta uia, aliquādo sponte natura calculus, nisi grā-  
dior sit, excluditur. Hoc in mulieribus facile ob breuitatē &  
rectitudinem colli uesicæ, uix tamen sine læsione aut lacerā-  
tione Sphincteris, unde sequitur inuolūtarius urinae exitus.

**2 Et diutur** In uiris difficilius ob reflexionem, quæ fit in modū literæ S.  
narum, nec Tutior tamen uidetur hæc ratio. Sed si lapis grandior sit, in-  
nō crisi pro strumentis intra frangendus. Deinde sectio facienda paulo  
pria partis supra anū, qua parte est Sphincter secundum fibras rectas.  
alicuius af-

De ardore urinae. Cap. XLVII.

**I**N iudiciis acutarum a febrium bilis plurima aliquan-  
etiam mate do excernitur a natura, quæ si diffluit in uesicam, ar-  
rie auersio- dorem b urinæ facit. Urina sero sanguinis & bile cōstat.  
ne, ut in pa Cum autem alterum acrius, uel augetur proportio bi-  
roridibus et lis, ardor urinæ fit. Urina omnis acris est, sed multo ma-  
surditate. ximè sentitur acrimonia, si pars ulcerata est, effluit. Ad  
b Ab raden uesicam c glandulosa sunt corpora, quæ humorem red-  
do, exaspe- dunt, unde urinæ acrimonia temperari potest. Ea exsic-  
rando & in cantur immodico coitu, morbo aut medicamento, quæ  
flammando. causa ardorem urinæ gignit. Sanies quoque acris ex su-  
c Quia est periori corpore in uesicam defluit, quæ urinæ mixta ar-  
symptomati dorem facit. Cognita causa de Phlebotomia, purgatio-  
ius ipsi uesi ne & aliis remediis cogitandum. Phlebotomia d tum-  
ce, non autē conuenit, cum calidius corpus est, è brachio.

ipsius uesicæ Purgatio e & diuertendo, & acriorem humorē repur-  
symptoma. gando cōuenit. Sed prius considerandū est, an solum le-  
d Si serum niendum, an etiā detergendū. Vbi sola humoris acrimo-  
in uitio sit nia est, leniendum solum. Vbi ulcus, etiā detergendum.

& astu in- Leniendo cōuenit Calia: detergendō, terebinthina.  
cai dperit: Vtriusque uirtus augetur aut temperatur iis, in quibus  
ut si à mi- dissoluitur. Itaque si leniendum, imperabis 3. 10. cassiæ,  
stione bilis aut 3. j. dissoluesq; in decocto iunibarum, passularum  
ardor urinæ mundatarum, sebesten, prunorum & similium. Si deter-  
fiat. gendum simul & leniendum, dissolues in aqua hordei,

e Humorem in sero caprino, in iulepo uiolato, qui & lenit & deter-  
d intestina get. Terebinthina, ut prius dictum est, uteris. Aliquan-  
deriuando, do rhabarbari 3. aut 3. 4. vi. 3. ii. cassiæ commiscebis, at  
qui fereba- que ita dissolues, uel cum saccharo coges in bolū.

tur ad renes Quod attinet ad reliqua remedia, reuocanda sunt in  
hunc



hunc locum, quæ de Stranguria ab urinæ acrimonia dicta sunt. Si tantum humoris acrimonia est, leniendum: si etiam ulcus præterea, detergendum & consolidandū. Leniunt iulepus & syrupus de uiolis, malux & bismalux frequens usus. Aqua ex iisdem distillata. Decoctum glycyrrhizæ rasæ, passularum mundatarum, prunorum, iuinbarum, sem. communium frigidorum, psilij, cydoniorum, lac muliebre, oua & similia. Imperabis ergo.

R. aquæ malux unc. iij. iulepi uiolati 3. j. s. Atque ubi leuiter detergendum, uteris syrupo uiol. de iuiubis, de nenuphare, de papauere. Et his quidē magis, si maior ardor est, hosq; syropos dissolues in supradictis decoct.

Semina melonum excorticata & mundata 3. pondere, aut ex iisdem seminibus, semine cucumeris & cucurbitæ cum amygdalis dulcibus imperabis lac amygdalinum, aut hoc ipsum iubebis comparari, dissolutis amygdalis in decocto prædictorum seminum, atque ubi uigebit ardor, semina hyoscyami albi & papaueris albi & psilij commiscebis. Sem. lini, althææ & cydoniorum, eisdem usui esse possunt, si parentur, ut dictum est, ut vel hordeatis, uel lacti amygdalarum misceantur. Deterget iulep, id est, aqua sacchari: sed leniet magis, si saccharū uiolatum sit. Plurimum laudatur medicamentum ex trochiscorum alkecangi 3. j. iulepi uiolati unc. iij. Hocque utendum erit, ubi maior ardor est. Lac muliebre & bubulum leniens magis. Ouillum confirmat. Caprinum & asininum detergent magis. Serum separatum ab his generibus lactis magis detergebit. Sed quia ardoris sensus magna ex parte sentitur ad collum vesicæ & extremitatem glandis, propterea iniectionibus in colem, turundis quoque in foramen uirgæ utendum est. Leniendo lac muliebre iniciendum est.

Liquor tenuis albuminis oui agitati, atque despumati, uel hoc.

R. mucag. sem. psilij & cydoniorum extractæ in aqua cucurbitæ, uiolarum, malux an. unc. s. lactis muliebris unc. j. liquoris oui 3. ij. misce pro iniectione.

In maximo ardore mucagines seminis hyoscyami



# DE MORBIS INTERNIS

& papaueris commisceri possunt, uel camphoræ gr. vi. aut plura, uel opii gr. ii. aut i. Turunda intingi debet cerato rosaceo Galeni, quod ita comparabis.

R. olei rosarum 3. vi. lanetur sexies ex aqua rosarū. Deinde cum 3. ii. ceræ lotæ fiat ceratum liquidum in duplici uase.

Potest & hoc ceratum refrigeratū affundi succo plantaginis. Et hoc magis, ubi extremitas uirgæ ulcerata est.

In dolore uehementi dissolues camphoræ scrup. i. in aquæ rosarum aut uiolarū unc. i. uel in uino dulci opii gra. ii. atque ita linamentum, idest turundam in his liquoribus madefacies, & molliter indes in uirgā.

Si detergendum, supradictis iniectionibus addes saccharum, ut non solum lenias, sed etiam detergeas, uel aquam hordei, uel serum lactis cum modico saccharo. Cum uero ulcera deterisa sunt, conueniunt, quæ consolidant, ut.

R. sarcocolæ scrup. i. amydi, cerusæ lotæ ana scrup. s. nutriantur in lactis muliebris aut caprini, uel ouilli unc. ii. Fiat iniectio in uirgam, quæ ter aut quater in die repetatur. Aliud.

R. aluminis plumæ (scissile uocatur à Galeno) sacchari ana scrup. i. mellis 3. i. s. uini albi aulteriusculi unc. ii. leuiter bulliant. De colatura fiat iniectio. Conueniunt & hæc.

R. succi uirgæ pastoris depurati, succi plantaginis an. unc. i. boli armenæ, mummie ana 3. s. misce pro iniectione consolidante.

Trochisci de charabe, de terra sigillata, bolus armena, tragacanthum, trochisci de spodio 3. i. pondere dissoluantur in unc. ii. succi equiseti, plantaginis iulepi uiolati, syrupi myrtillorum, diluti, ubi consolidandum est. Sed trochiscis de carabe in maiori ardore urinae dum est.

a Ut ex decocto maluae

alibæ, violæ,

larie, deco-

cto capitis

veruecini.

In curatione ardoris urinæ Clysteres a ex iis, quæ leniunt, inuici debent. Quales multos habes de Dysenteria. Atque ubi humoris acrimonia causa est, sudoris prouocatio & uomitus ex esu sunt. Inunctiones pectinis

nis



nis & peringi, è descripto cerato, rosaceo, oleo uiolato, de nuphare, de mandragora, de salice, cucurbita & cucumere.

Balnea, immersio pudendi in a decocto leniente. *a Ut in la-*

Laudatur à multis iulepus ex aqua acetosa & quarta parte sicchari uiolati. Postremo partes affecta roboranda, de quo in Gonorrhœa. *Et in quo decoctū fuerit verba-*

## SCHOLIA.

*scum.*

Per penem redduntur vrina, ramenta, pituita, vermes, pus, semen & sanguis. Vrina duabus partibus constat, sero & bile. Hæc si superat, aut serum sit acrius, fit vrina ardor aliquando etiam per crism. Sunt & glandula ac parastata humore quodam tanquam salina conferta, quæ vrinam temperant. His resiccatis aut male affectis idem quoque ardor excitatur, idest, dolor quidem, qui sentitur inter meiendum. Multa quoque sunt aliæ causæ, quæ ad Dysuriam pertinet. Sæpe pituita putris, aut salsa ut in semibus, aut pus acre permiscetur vrinae, eamque acrem reddit, aut illa omnia cum vrina exelutia dolorem excitant, præsertim si qua sit exulceratio, aut inflammatio. Sed in vlceratione ramenta quædam simul conspiciuntur. Non erit inutile sigillatim de singulis agere non solum ad huius affectus distinctionem, sed multorum etiam aliorum, quibus hic permiscetur, aut similitudine quadam respondet Puris & pituita differentia obseruanda, tum ex his, quæ præcedunt, tum ex natura rei. Pus præcedit dolor, cruor, grauius olet, minus viscosum est. Contraria in pituita. Nam raro dolor, nisi cum putris, salsa, frigidior. Annotauit author se frequenter vidisse interceptam vrinam crassam pituita, quæ dolorem & ardorem, ut in calculo excitaret. Vidit & intolerabili cruciatu aliquot diebus affectum, qui pituitæ partes velut crystalli, aut concocti succi, quem germanam vocant, globulos colore aqueo pullucidos. Duos itidem, quibus pituita putrescens in vermes vertebatur, quos emingebant. Beaucier Aduocatus post dolores renum magnum uermem eminxit. Quidam literas ad Hispanum scriptas ostendit, quibus consilium petebatur pro calculoso, cui eiectis calculis aliquot & arenulis prodierant duo vermiculti acuto capite, corniculato, ventre & dorso testula im-



## DE MORBIS INTERNIS

ductis instar testudinis, nigri, nisi quod rubebant uentre. In quo uidetur generatio quedam esse à putredine pituita, calore multo totius uenosi generis eam pituitam ita cōformante. Quemadmodum cum sit *πρωταίς*, id est, capillitium illud, de quo agit Galenus Aphor. 76. lib. 4. id est, pituita, quæ in longum diducta à calore exurente capillos representat aliquando ad dimidium cubitum, ex usu crassioris alimentigenita, quæ cum urina crassa excernitur. Frigidior enim sit, & resiccatur non omnino quidem, sed ut in longitudinem produci possit. Aliquando animiatur, ut cetera animalia, quæ ex putredine oriri habent. Archigenes fieri putauit à fluxione mucosa, unde & foliacea, & ueluti pili, aliquando implexi breues, longi, & materia quedam è uenis ad renes, ubi cogitur. Galenus scribit, in quibus talia exiunt, semper urinam esse crassam. Contrarium experientia docuit. Quidā annis plusquam uiginti tales urinas cum capillitia emisit ruffas, mediocri consistentia, non crassas. Temperamentum illi erat biliosum, satis tamen quadratum & carnosum corpus. Multis idem contingit: alijs cum crassa urina. In Preside Longuel pituita lenta, corrupta, quam incredibili quantitate multis mensibus eminxit & deiecit, quoties sumpsit medicamentum, cum urina tenui, serosa, simili sero lactis. Opportunus, erat Arthritidi & calculo. Sed utroque affectu liberatus, uigilijs, frequenti mictu dolorifico torquebatur. Malum modo remissius, modo acerbius per frigora & humidum cælum. Modò stillicidium mictus exiguus & frequens, modò urina largior. Remittebatur dolor, tum acerbior redibat. Pernis & crura condolebāt. Urina modo mordax, modò contra. Eadem omnino apparuerunt in procuratore ad Paruum potestatem. Virique ætas annorum circiter 2, hepar calidius, sitis multa. Sed Preses naribus nihil expurgabat: aliter contra. In sacerdote Normanno multa mucosa per urinam prodibant, sæpe emingebat. In his omnibus cum pituita acris, salsa, putris, frigidior erat, dolor excitabatur. Creditur tamen pituita uiscida & parum permixta, cum dolore excreta & magno conatu in ulcere renum aut uesica calculo tantum enutriti. In Asthemate aut simili affectu, morbi uel magnitudinem, uel mutationem significat. Quæ omnino sine dolore



fore exit, & in fundo crassiori farina similis apparet, crassus succus est. Quæ sepe sequitur renum aut articulorum dolor, aut calculus, aut morbi longitudo, aut corporis consumptio. Pus resudat & effluit ab abscessu, inflammatione, ulcere. Non semper sanguini permiscetur. Multi enim renum abscessus reperiuntur, in quibus pus solum, certis intervalis cum urina excernitur, ut in duabus mulieribus, altera uxore senatoris & Consulis Claudij Fabri; altera uxore Vincen- tii Fabri negotiatoris. In alijs quoque, qui inde tabidi mor- tui sunt. Sanguinolentum aliquando. Vtrumque exactè urina permixtum, aut residens, sed post longum tempus, urina etiam inde crassiore reddita, è renibus est, præsertim si dolor fixus in lumbis præcesserit, aut calculus reiectus fuerit, aut ex ureteribus, ulceratis transitu calculi, vel in illorū cavit- ate orta post ulcus caruncula. Sed copiosius è renibus, quàm ureteribus. Cito subsidens, viscidum, mucro permixtum, cum scæ- mulis minimè carnosus, è vesica, si nullus dolor in lumbis aut circa pubem grauitas præcesserit. Sine urina profluit è pene, ut dicemus. Neque tamen è renibus, aut vesica semper exit. Ab omnibus. n. ferè partibus superioribus miro naturæ artifi- cio, & per corpus confluxile facta exudatione modò in inte- stina, modò in vesicam exoneratur. Mulieri cuida intolerabi- li cruciatu urina purulenta profuebat. Mortua post quartum mensem, & dissecta duo calculi in corde cum multis abscessi- bus paruis inuenti renibus integris & uis urina. In qua ve- risimile est, aut potius necessarium pus acre per urinas natu- ram expurgasse, quo ad fieri potuit. Carnosa ramenta à reni- bus: furfuracea non semper à vesica. In febre enim ardente & colligante à tunica venarū ita exesarū acrimonia quò- à cutis superficie pituita salsa & mordente erosa) furfures redduntur. Aliquando in eadem febre ardente ab adusto san- guine præsertim crassiore & melancholico, ac ueluti in cin- rem resoluti. At in urina mediocriter habente, egroto non febricitante, à vesica scabie & prurigine oriuntur. Semen præter naturā & uoluntatem effluit vasis relaxatis imbe- cillibus post immodicū coitum, colligato corpore, ulcere irri- tante, frigidis flatibus generatibus, acriore semine, retento ob contortionē pudendi. Si nihil horum neque renes neq; vesica patiantur,



## DE MORBIS INTERNIS

patiantur, frequentius Parastata aut glandula semen retinens, quae sunt in vasis circulatoriis in parastatas definitibus, aliquo praeter naturam affectu laborant. Sunt autem multi, ut inflammatio, ulcera, scissura, ressecatio. Inflammatio sine coitu à semine retento et illic putrescente, unde puris reiectio, pudendi mador, erectio, aliquando etià à partibus vicinis inflammatis, ut in haemorrhoidibus: nonnunquam de fluxu humorum post equitationem longam celerem, acrum nimium usum. In ulceribus maior puris quantitas, minor ardor quam in inflammatione. In scissuris, solus urinae ardor absque puris emissionem. Si post coitum praesertim cum insecta, Parastata aut glandula manite & calfae hialitum quendam tetrum contraxerunt a coeubitu, efficiunt ardor urinae, quem vulgò propriè vocant (Chaudespillies) Erigunt urethrum, urina cum maximo dolore redditur, sanies livida, uirescens, mordicatio in meatu. In erectione pudendi fit etià contractio cum dolore non in nervo cauo, ut nuper nonnulli scripserunt. Nam sic erigere tur potius, quam inflecteretur: sed ob plenitudinē, uel inflammationē uel inanitionē in meatu urinae. Unde saepe fit, ut qui iam utitur coitu, ut erecto membro illis scissura fiat, aut ulcus. Hinc uel exiit urinae quasi cuniculis factis per anū aut aliquā aliam vicinā partem, uel caruncula, tanquā fungi crescentes aut tubercula in anfractu colli uisica, aliquando in reliqua fistula penis, à quibus & iocundia & dolor grauis inueniuntur. Oribasius calore loci scribit huiusmodi quae parata celeriter suppurari ex Hipp. Experientia tamē docet saepius carnē absumētibz curari. Saepe hic decipimur specie calculi, ut in nobilissimo uiro post urinae cruciatum in octauum mensem ambigentibus. Medicis & Chirurgis de calculo, adhibitis frustra remedijs tandem apertio facta, ut solent Lithotomi. Liberatus omnino dolore non inuenio calculo, sed carne in collo uisica, quae paulatim consumpta est cōuenientibus remedijs. Harum omnium affectionum causationem exponere non est huius instituti. Quia tamen saepe malorum omnium origo à renum inflammatione est, quae hoc loco praetermittitur ab Authore, non erit alienum sequentia breuiter subiecisse.

De inflammatione Renum.

Vulnere, attritu asidua equitatione, corruptela et afflu



x humorum, potis pharmacis. Dolor pulsatis in lumbis & superius ad thoras & hepar, si ren dexter, inferius ad uesicam, & semar, pectinem, pudendum: stupor cruri. respondetis. Interminatione, concussione cor foris & uehementi motu lan- inatio uehemens. Extrema, sura precipue & pedes, frigent, febris uehemens. Urinae primum retinentur, aut tenues fluunt & aquosae. Procedente morbo in prius, rubra: deinde crassae & mucosae, quae ut augetur malum ita augentur. Nausea, vomitus biliosus, cordis morsus. Quibusdam animi deliquia & sudores syncopales. Sistitur uenter: unde inflatio & rufus. Breuib; aut maioribus interuallis exacerbationes.

Initio molli clystere parua quantitate leniatur aluus: de- ratur sanguis: frugaliter uiuat. Hordeato satto liquido et uisculis mitigantibus utatur. Vino, mellis, diureticis absti- neat. Inijciuntur cum clysteribus, iam puro iniestmo, quae le- uant. Exacerbata inflammatione iterum phlebotomia, cata- plasmatum e farina hordei primum in mulsis, deinde passis ex farina dicta, & ijs quae leniendo discutiant & roborent. Ca- taplasmatum non cedente morbo cucurbitula cu scarificatione applicentur lumbis & ilibus. Iniectiones deinde parentur ex decocto lenientiu & resoluentiu, roborantiu, Prius tamē cū uesica hydreleo plena cu spongijs foveatur locus. Tum ad ce- rata & malaginata ex eadē materia eiusdē uirtutis. Vten- dum quoq; potionibus, narcoticis, & coctis inflammatione, quod urinis crassis euntibus & boni sedimenti intelliges, de- reticis. Mesue initio ex farina hordei rosas & similibus re- pellentibus, deinde mixtis detergentibus chamemelo & c. Em- plastru de muscullaginibus deinde de meliloto Lactis asinini uis cum modico melle efficacissimus renibus exulceratis.

De mictu a sanguinis. Cap. XLVIII.

Quibusdam b naturis eodem modo sanguis per uias urinales excernitur, quo aliis per nares & uenas se- dis, aut duomitum. Hoc ipsum praeter e naturam est, de- betque auerteri secta uena e brachio dextro. Eiusmo- di excretiones sanguinis excitantur febre inclinante Ve- re. Veris itaque initio auerterendum est.

Aliis scrutata est urina, similisq; diluto sanguini ex laxitate

a Sinceri, mixti atq; serosi.

b Vt sangui- nis uel etia

propru ex- crementi et solite vacua

tionis sup- pressione,

aut mēbro aliquo mu- tiis.

c Vt melan- cholicis.

d Vt mulie- ribus, a sup- pressis men- struis.

e Quod san- gui per cō- moda loca- uo feratur.

f Adde quod exesse, aper- te, aut ru- pte uenae, in- firmi etiam

renis sym- ptoma est.

g Tali affe- ctio hepatis ca dysente- riae consimilis est.



# DE MORBIS INTERNIS

laxitate atque amplitudine uenarum, quæ à caua renibus inseruntur.

Renum quoque infirmitas hoc idem efficit. Scriptum a *Aphorif.* autem ab a Hippocrate, Quicumque sponte sanguinem 78. libro 4. mingunt, ijs à renibus uenula rupta est. Sponte, hoc *Aphor.* est, & repente & sine manifesta causa. Rupta uero uena b *Hoc spon* propter humorum multitudinem ac crassitudinem, un- *giosum sedi* de uenæ quæ renum uentres subintrât, discampuntur, *mentum fia* aut aliquando aperiuntur ex casu, saltu, ictu aut uehe- *tulenti spiri* mentiore motu idem potest contingere. Rupta uena cõ- *tus est sobo* fertim effluit sanguis: aperta, paulatim. Laxioribus ue- *les: ex quo* nis emulgentibus, infirma ui renum contentrice aut di- *effœtâ vim* secretrice, statim à cibo serum sanguinis purum post co- *renu liceat* ctionem cum b spongioso sedimento excernitur. In in- *colligere.* firmitate uasorum seminaliũ aliquando excernitur san- *c Ut in ijs* guis, non cum urina, sed in c coitu aliter, quàm uesica *qui laborât* exulcerata. Hic enim cū urina sanguis emingitur qui- *facta collu-* busdam corpusculis immixtus. Nec in uesica solum, *nie, aut qui* sed etiam in cole exulceratio esse potest. Sed ulceris sa- *bus immode* nies & dolor indicia sunt. In imbecillitate primum co- *rato uene-* gnoscendum est, an à calido, an à frigido, fereq; à ca- *reorum usu* lido esse uolunt. Quod malum astringentibus, refrige- *imbecillia* rantibus atque supprimentibus corrigi debet: quæ quia *sunt vasa se* propter tardum motum non facile penetrant ad renes, *minalia.* diureticis, maxime aromatibus, commiscenda sunt. Sed *d Astrin-* diureticorum minima sit portio. Non enim ut urinas *gentium sci* moueant, sed ut astringentia ad renes deducant, commi- *licet & gla* scentur. d Materia in sputo sanguinis, in hæmorrhæ- *tinantium* gia quibus cum uenarum anastomosi pugnandum. Sunt autem adstringen- *tia, plantago, balaustra &c.* Glutinantia uero bol. armena, terra sigilla- *ta, sang. drac. gummi arab. tragacanthi.* Sed trochisci Gordonij cum lacte ouillo recens multo propinati horum omnium instar esse poterunt. Interim sit purgandi & temperandi uicissitudo semel aut bis in hebdomade per ca- *tharticum, ut ex diluto rhei cum multo syrup. uiolaceo:* ne labefactata nõ retentrice ac secretrice renum, excrementis querentur & augeantur sym- *ptomatis. Ut, R. cassia recens extracta drac. vi. pulueris diatrageat. frig.* *dr. i. cum saccharo f. bolus.*



gia è naribus descripta est & aliis locis.

Auicennas nihil melius existimat confirmandis renibus lacte ouillo. Datur ieiunis ad  $\bar{z}$ .vj. quibus aliqui admiscunt boli armenæ, aut similis medicamenti 3. j. alii etiam  $\bar{z}$ .spicæ, aut cinamomi.

R. lactis ouilli  $\bar{z}$ .iiij. aque millesolij unc. j. boli arm.  $\bar{z}$ .ij. spicæ  $\bar{z}$ .s. Aliud.

R. lapidis hæmatitis 3. j. dissolue in aqua plantaginis unc. iiij. Quod si ardor sentitur in rebus.

R. aquæ plantaginis & portulacæ an. unc. ij. philonij  $\bar{z}$ .i. Aliud.

R. muccaginis sem. papaueris albi unc. s. trochiscorū de carabe 3. s. rasuræ eboris & cornu cerui an. scr. s. Omnia incorporentur carne cydoniorum condita sine speciebus. Dentur auellanæ magnitudine, duabus horis ante pastum.

Conueniunt radix consolide maioris, gummi arabicum, tragacanth. macerata prius, deinde feruescens in uino austeriusculo: colatura bibitur. Maxime ubi solidandū est, & hoc quoque laudatum ab antiquis.

R. aluminis plumæ 3. j. gummi arabici 3. s. tragacanthi 3. ij. cum uino adstringente fiant trochisci pondere scr. ij. dentur ut prius. Ad deterfionem ulcerum & consolidationem repetenda sunt, quæ proximo capite. Aliud remedium.

R. spodij unc. s. berberorum 3. iiij. sem. lactucæ 3. v. cum succo cydoniorum fiant trochisci. Detur 3. ex decocto sumach. Puluis sem. lactucæ inspergitur uitello oui manè. In hæmorrhagia uesicæ, ilibus ac lumbis atque etiam natibus & coxendici exteriori a cucurbitula affigi bebet. Inunctiones brenum, perinæi & pectinis ex oleo rosato, myrtillorum de cydoniis, aut e oleo in quo adstringentia coxerint. Hinc fiunt cerota liquida, quibus conspergi possunt santali, bolus armen. cortex thuris, & similia commisceri, acacia, hypocistis & similia.

Hic summum periculum est, ubi grumescit sanguis. Nam hinc sequuntur, quæ capite de difficultate meendi dicta sunt. Conandumque est, ut incidantur grumi oxymelite,

a Ad reuul  
sionem hæ-  
morrhagiæ  
non ad di-  
auroseos a-  
motionem.

b Ad inflā  
mationem  
prohibendā  
et peremem  
arcendum  
affluxum.

c Mastichi  
nū oleū, in  
quo fuerit  
decoctio.  
myrth. ad  
id mirificē  
confert.



## DE MORBIS INTERNIS

oxymelite, arthemisia, itechade, alla odorata, coniza  
sem. raphani, coagulo, luminatim iis, quæ lapides com-  
minuunt, datis ex oxymelite. Quibus si nihil efficitur,

a Ad uitan-  
dam ischu-  
riam, synco-  
pem & uesi-  
ce gangræ-  
nam.

lienda curatio.

## SCHOLIA.

Sanguinis nomine non intelligimus sanguinem purum,  
exquisitum, syncerum mingi, sed aliquando serum, aliquan-  
do suo sero mixtum & cum urina, aliquando cum pure. Ab-  
ulcere id sit aut lesione vasis alicuius. Sed ulcera intelligen-  
tur tum ex dolore tum ex pure & corpusculis simul prode-  
untibus, ut squammulis & uesica. Pus ergo cum sanguine exit  
per urinam renibus, ureteribus medijs & uesica exulceratis.  
Nam si in pene exulceratio sit, sine urinis & pus exit & san-  
guis. Exeunt quoque & renibus sanguinis grana in febris  
affati. Nonnunquam caruncule, ueræ renum partes, licet in  
Aphor. Galenus id se uidisse neget. Sexto tamen de locis affe-  
ctis, & initio primi uidetur agnoscere ubi iam ulceris acri-  
monia erasit particulas renum quomodo & in Pulmonarijs  
tabidis contingit particulas pulmonis expui, & in Dysente-  
ria partes intestini. In Aduocato Perrot uidit Author mini-  
mas carunculas, ut non ab re sarcia micra dici deberet, quas  
sepe emingebat, neque reuera erat grana. Has carunculas  
præcedit dolor pulsatilis, qui ad lumbos & nothas costas ex-  
tenditur, & signa exulcerati renis. In concreto sanguine &  
orobis urinis, non præcedit. In utroque, hepate incolumi, pos-  
sunt urinae naturaliter cetera habere. Si in alijs partibus fue-  
rit exulceratio, ex dolore quoque & simul exeuntibus corpo-  
sculis dignoscendum, hoc tanquam generali axiomate nota-  
to in his omnibus affectibus. A renibus dolorem & sensum  
quemlibet à lumbis ad nothas costas extendi. Ab ureteribus  
per illa oblique descendere. A uesica, in pectine: à uesice col-  
lo, in perinaeo. Potest seorsum pus exire, ut diximus superio-  
re capite. Potest quoque & sanguis solus aut cum urina. De  
quo præcipue hic agitur. Si ergo ulcus nullum sit, huius cruen-  
ta excretionis causæ multe esse possunt. Est quidam mictus  
sanguinis cruentus & interuallis quibusdam motus, qualis

finis



fuit in Moniali muliere, cuius meminit Musa, quæ singulis mensibus, suppressis menstruis multum sanguinem emingebat. Archembault advocatus per aluum, uomitum, urinam intervallis sanguinem reddebat etate virili. Quibusdam inclinante. Vere multus emingitur. Id ab Archigene scriptum reperio, quibusdam per circuitus, ut in hæmorrhoidibus sanguinem multum collectum renibus emingi, unde sublenitur, idque accidere iuuenibus, qui maiori licentia ueneri indulgent. Milesius quidam apud Aurel. s. chronion sanguinem emictum affirmabat esse ex infirmitate seminalium uasorum. Ab Aureliano reprehenditur. Sed cum experientia doceat è renibus per uasa spermatica defluere, & ab his & à renibus exire certum est. Vidimus, qui à coitu multum sanguinem effunderent, quique non facile reprimeretur, laxatis nimis uasis & imbecillioribus redditis profuso omni semine. Animaduertendum igitur, num grauitas renum & calor præceserint, an immodicus coitus, an solita sit excretio. Quod si repente & nulla causa antecedente profuat, è renibus & ureteribus exidit. Neque enim à uenis uesicæ id accidere potest duabus de causis. Una, quia non ita multum sanguinē, ut renum, excipiant. Altera, quia renum uenule nude sunt, inuestes & expositæ rptioni. Quod contra fit in uenis ad uesicam perreptantibus. Ex illis igitur sanguinem tribus de causis exoriri consentaneum est, ut & in cæteris omnibus hæmorrhagijs. Orifici uenarum apertione: erosione: rptione. Apertio fit ob nimiam laxitatem & amplitudinem uenerū, quæ ad cava renum pertinent, & ob imbecillitatem recentericis uel discreticis in renibus. Hæc enim duo sæpe efficiunt, ut calfactis & exercitio commotis cruenta urinae profuant. Sed in laxitate, crassior: in imbecillitate, tinctura est à sero. A cibo quoque serosus sanguis: post coctionem spongioso sedimento. Aperta enim & hiantia orificia uenarum, non confertim, sed paulatim, non crassum sanguinem, sed tenuem: quasi percolatum reddunt, præsertim ubi apertio est parua. Maior crassorem reddit. Rupta autem uena atthroos, id est, copiose & repente prodit, estq; crassior. In erosione denique epi de anauros os oligiston: ut in Anastomosi non sanguis, sed quidam atodes, ut uult Philus. Erosionis cause sunt, quæ

cunque



## DE MORBIS INTERNIS

cunque acriorem sanguinem reddunt & tenuiorem, aut quæ exulcerant, ut cantharides, quibus assumptis sanguis mingitur, penis distenditur, & quodammodo æger ad uenerem irritatur. Rruptionis causas Galenus facit multitudinem & crassitudinem sanguinis interclusi in uenis renum. Hoc etiam fit ictu, casu & uulnere, ut in rustico quodam ense transfosso uidimus. In sæpe nascitur ulcus, nisi occurratur, ut in puero quodam, qui in ludo graui Britone insultante sanguinem mixxit primum: deinde pus annis sequentibus. Ita aliis multis. Sed ulceris ratio distinguenda ut aliorum ulcerum, quia putre, callosum, &c. In uniuersum ergo per penem sanguis exit à renibus, ueteribus, uasis spermaticis, uesica, aut uesica collo. Sine urina, è collo: cum urina statim feri capia. subsidens & cum dolore in pectine, è uesica: cum dolore in lumbis multus, nec nisi post multum tempus subsidens, è renibus manat. In apertione, serosus: in rruptione multus & crassus: in erosione, paucus & tenuis. Singulis causis sua debetur curatio ex aliis locis petenda.

infirmia re-  
centrice.

d Ut bile,  
aut pituita  
falsa.

e Eo enim  
humore re-  
nibus impu-  
tis repenti-  
na fit urina  
nullo modo  
cocta attra-

ctio.

f Ex peren-  
ni et uiolen-

ta feri at-  
tractione.

g De frau-  
datis sero  
humoribus.

### De a Diabete & similibus. Cap. XLIX.

O *Υπερξωσ* Græci uocāt, qui sæpius mingunt. Vitia, quæ in sæpius meriendo contingunt, urinae b multitudine efficit, renum uitium, resolutio uel infirmitas musculi, qui collum uesicæ claudit.

Diabetes proprium est e renum uitium. Nascitur primum humoribus diuitiosis substantia renum imbibitis. Vnde e insatiabilis appetentia potus, ut in canina appetentia insatiabilis ciborum cupiditas ex uitioso humore, qui stomacho imbibitus est.

Sequitur perpetua renum attractio. Sed cum infirma sit alteratrix & contentrix, quicquid hic bibitur, statim per urinam effluit, quo modo in lenteria potus cum cibus.

Hic ardent f uiscera, atque adeo uniuersum g corpus, propterea quod quicquid aquosum est & serosum in uenis, unde uidelicet sanguis temperatur, attrahitur in renes & emingitur. Ex quo, ut & humores solidarum partium exugant uene, quod deinceps renibus attrahentibus



hentibus emingitur. Rara hæc affectio & in ardoribus nascens, ubi urina aquæ omnino similis est.

Alius affectus est uesicæ, cum uel defluxione, uel frigore, ictu, casu, uulnere aut aliis eiusmodi causis nerui, qui uesicæ musculum claudunt, resoluuntur. In qua affectione & noctu & interdum præter uoluntatem urina effluit. Cui & alia affectio uicina est eorum, qui non satis urinam continent, sed stragulas noctu permungunt. Quod uitium familiare senibus & pueris. Senibus quidem propter siccitatem: pueris autem, propter laxitatem & mollietatem.

*Curatio.*

In ardente febre Diabetes incurabilis. In aliis ægrè curari potest, quia non facile initio deprehendi potest. Quod si initio deprehenditur, mittendus sanguis est è cubito, sed moderatè.

Deinde utendum iis est, quæ refrigerant, contemperant & paulatim uitium renum corrigunt. Vitæ ratio omnino frigida tum actu, tum potentia.

Cataplasmata quoque refrigerantia tum renibus, tum uisceribus applicanda. Vomitus eius quod bibitum fuerit.

Sudor excitatus in dolio, ut tantum exeratur caput.

Conueniunt cibi, lactuca, endiuia, oua sorbilia, recens caseus sine sale, lac in quo calybs uel calculus fluuiatilis sæpius extinctus sit. Pulli gallinarum hordeo mundato, uel quatuor sem. maioribus frigidis infracti, hordeatum, lac amygdalarum præparata cum refrigerantibus. Et quia hic uiribus plurimum detrahitur sua caro, uinum crassum, rubrum aqua frigidissima dilutum concedi possunt.

Farinam oxyrhodino subactam emplastri modo & renibus & hypochondriis applicabis. Vitis & rosarum folia, ea in summa, quæ refrigerant & adstringendo roborant, renibus applicabis.

Cerota comparabis lumbis & pectini ex rosaceo, subigensque cum lactucæ succo & similium. Aliquando etiã in maiori ardore expresso succo è foliis papaueris cerota subiges, aut populeum uocatum cerato commisce-

T bis.

a Hanc bis  
tātū uidisse

se cōmemo-  
rat Gal. c. 3

li. 6. de loc.  
malè affec.

b Partium  
solidarū ex

hausto.

c magnitudi-  
ne cāæ, sym-

ptomatum  
uehementia

et curandi  
difficultate

labefacta

oī naturali  
œconomia.

d Vel po-  
tius uituli-

na carnis  
atq; pullorū

st llatitia.

e Præfer-  
tim hordei.

f Ut ceratū  
refrigerans

Galenī cū  
cāphora un-

guentū rosa-  
tū Mesuei.

muccagine  
seminis psi-

lū et cydo-  
niorū, lami-  
na plūbi te-  
nuissima sa-  
pe mutata.



# DE MORBIS INTERNIS

bis. Eruntque dr. ij. populei ad singulas 3. Cerati.

Laudatur & infusio ex oleo, in quo uermes terreni fuerint decocti. Mirum est, quod theriaca ex natura sua calida & sicca sitim diabetis extinguit, data interuallis. Leges ultimum problema primi Aphrodisei. Hunc morbum appellant Syphonem, urinq; profluium, inter cutem matulæ, Dypsacum. Hydrin.

## In paralyfi diabetis Curatio.

Si paralyfis ex luxatione uertebrarum, non facile curatur. Alioqui balneis sulphureis, frictionibus asperis, inunctionibus dictis cap. de Paralyfi, Dropace & sinapismis uti oportet ut vim medicamentorum percipiant lumbi, perinæum & pecten.

a Ex sup.

pressionem se  
ri, aut potu  
largiore  
aut pituitæ  
colliquatio-  
ne.

b Ut deco-  
cto radice  
iuncatæ. ab

stinencia in  
sculorum.

c Cuiusmo-  
di sunt ca-

thartica,

quæ lenien-  
do aut ira-

hendo pur-  
gant.

Quod si urinx multitudo in a causa est, uictus b ratione exiccante, iis quæ ad c intestina diuertunt, utendum est. Ad alios uero, quibus infirmitas claudentis musculi causa est, cõueniunt caro ericii, cerebrum aequi læ, cerebellum, renes, testiculi leporis, pulmo hædi, lingua anseris, galli guttur, uesica suilla, tauri, capræ, ouis, enula, thus, myrobalani, cyperus, coriandrum præparatum, myrrha, mentha, calamentum, galbanum, castoreum, seseli, lac ouillum & caprillum, Oleum de ben, de spica, rutaceum, mastichinum.

Vulgare remedium est elus murium. Oleis itaque uel inde comparatis cerotis pecten & perinæum inungenda sunt. Reliqua ex uino odoro, senibus: ex aqua, pueris exhibenda sunt. Laudantur & hæc.

R. cinamomi electi dr. j. spicæ nardi dr. s. cyperi, coriandri præparati ana scrup. j. uesicæ suillæ siccæ, testiculorum leporis siccorum ana scrup. s. Omnia incorporantur conserua enulæ campanæ prius conquassata & subacta. Aliud.

R. glandum dra. ij. corticis thuris 3 j. sem. coriandri præparati, boli arm. gummi arabici an. dr. ij. spicæ, cinamomi ana dr. j. testiculorum leporis, uesicæ suillæ ana dr. s. misce, fiat puluis, utatur sepe.

Laudatur & lac ouillum & caprillum cum modico saccharo, uel cum medicamentis descriptis.

Ne



Ne permینگant stragulas, uesica tauri uel suis prius  
madefacta oleo interiori parte debet è cole suspēdi, &  
ita alligari, ut quicquid metitur, excipiat uesica.

## SCHOLIA.

Urina secundum naturam habens quantitate potui re-  
spondere debet, aut ab eo paululum distare et tempore conue-  
nienti excerni. Ob in frequens, aut pauca, aut plurima mi-  
ctio prater naturam est. Frequens fit tum ob causas supe-  
rius dictas: tum ob resolutionem musculi orificium uesicae mo-  
tu uoluntario claudentis & aperientis, quæ sæpe fit luxatis  
uertebis, referturq; ad Paralysem. Pueris quoque molliores  
nerui, senibus sicciore, unde permینگunt lectum, neque diu  
urinam continent. Pauca autem fit æstate ob sudorem & ex-  
halationem: uel ob multam & humidam deiectionem, quia  
materiæ pars, quæ per urinam flueret, ad intestina diuer-  
tur: uel ob resolutionem & exiccationem, ut ardente corpore  
in febribus, uel ob Ascitem. Multa, frequens & copiosa mul-  
tis de causis contingere potest. Alimento & potu copiosiore:  
colliquatione aut dissolutione totius corporis: Intemperie uel  
renum, uel hepatis & crisi. Largior ergo potus uini tenuis  
& calidi, & medicamenta diuretica multas urinas faciunt.  
Cruditudo quoque multam efficit & mictionem, & deiectionem,  
& statim à cibo tractus sine mora tenuior succus ab  
hepate calidiore, aut inanito. Quod si hepar adhuc calidiore  
intemperie teneatur, robustum tamen sit & ualens fecem,  
quæ est in intestinis, omnem sugit, unde sicca & pauca re-  
manet, serum autem augetur, sicque fit plurima mictio, &  
pauca deiectio. Nonnunquam quoque ob imbecillitatem na-  
ture partes frigidiores alimenti transmutari non possunt,  
in quibus quoque iusto plus urina apparet. In his omnibus  
non dum ueteres Diabeticam passionem posuerunt sed in af-  
fectis renibus & uesica per consensum. Harum enim par-  
tium morbus est διαβήτης, ἀπὸ τοῦ διαβαίνειν, id est, per-  
transeundo, quod humor corporis subinde mutat locum, &  
uelut tantum per renes percoletur potus. Multum enim &  
frequenter mingunt ægri, et statim à potu urinam aquosam  
& tenuem. Vnde ὁ δειπνῶν ἐστὶν ἀμίδας, & διαρροαῖς οὐρά, &  
διψάνδς Græcis etiam dicitur. Habet enim hæc affectio ali-

T 2 quid



## DE MORBIS INTERNIS

quid simile cum Lienteria & Canina appetentia. Cum illa quidem, quia potus omnis subito per urinas effluit: cum haec uero, quia perpetua sitis ob inexplebilem cupiditatem attrahenda urinae in renibus, & eiusdem retinendae impotentiam. Si igitur huius uehementioris attractionis causam intellexerimus, natura huius morbi perspicua fiet. Tres autem in unum caussae uidentur. Calida & sicca renum intemperies: humor biliosus, acris, salsus, renibus impactus, quos assidue irritat ad tractionem: & uenenum aliquod deleterium. Quibus adde seri tenuitatem & biliosum temperamentum. Ex his igitur sitis ingens excitatur, ob quam aeger assidue bibit. Potum hunc autem renes attrahunt antequam coquantur in uentriculo, sed propter imbecillitatem non retinent. Hinc etiam urina aquosa & tenuis redditur, licet sit ingens calor, quia breuiore mora retinetur, quam ut coctionem & tincturam accipiat. Sunt tamen aliae huius affectus species duae, à colliquatione renum & totius corporis dissolutione. Huius meminit Aretaeus, sitq; frequenter in febribus, quam sequitur macies totius corporis. Cum dolore moriuntur aegri, uiscera aduri illis uidentur omnia fastidiunt, animo sunt dubio, saluam habent albam et spumam, praecordia graua. Increcente morbo calor mordax in uisceribus, abdomen corrugatur, uena intumescant, fit tabes. Si uel modico tempore à moriendo abstinnerint, tument lumbi, testes & ilia. Rarus affectus, & huius tantum à Galeno uisus, ab Authore saepius. Anno 1558. Augusti fine in uico uetere Templi Consuli de Pal, in febre continua non ita ardente, ad sensum lingua scabra, arida, nigra. Quotidie sex Pintas (quas uocant Lutetiae) urinae mingebat, non ita siticulosus, constabat mente. Sub septimum diem obiit. Consuli Quelim Nephritico, in febre profluvium urinae motum, in quo serosa urina ad duas quartas emingebatur, ex quo euasit. Eodem morbo paulo ante eius pater obierat. Alter ab eodem profluvio obiit in uico Sancti Ioannis Bellouacensis. Quibusdam diutius urina suppressa, sequitur urinae profluvium, aut morbus aliquis acutus per crism malignitatem suam in renes deponit, ut ait Aretaeus.

In ardente febre raro curatur, sicuti & in colliquatione.

le



in aliis difficile, nisi statim initio deprehenso morbo occurrat. Secatur vena in cubito, sed moderatè. Refrigerantur renes & confirmantur. Alimenta crassa, emplastica, minime valida unguenta circa renes, iniunctio spinæ, opiata.

De Vermibus. Cap. L.

**V**ermium a tria sunt genera. Ascarides infima parte recti intestini, adultioribus pueris familiares. Rotundi, qui pueris superiore ferè intestino generantur. Latus uermis per totum intestinum aliquando extenditur, raro admodum & paucis gentibus generatur. Nūquam Atheniensibus, Thracibus, ut scribit Teophrastus. De eo tum antea cap. de Canina appetentia. Horum omnium generatio, putris materia & calor. Signa b ex Paulo & Aetio colligenda sunt. Verminam hunc morbum & uerminationem appellarunt, non solum hominibus, sed iumentis familiarem.

In genere conueniunt, quæ enecant uermes & excludunt, acrida, amara, quæ uias lubricant, quæ à proprietate hoc efficiunt.

Ascaridibus, quia infimo intestino hærent, glandibus potius utendum est, quàm potionibus. Fiunt glandulæ ex carne salsa, filo appensa: sunt ex lardo prius in aqua frigida macerato. Item ex melle mixta aloë, & iis, quæ interficiunt uermes, qualia sunt coriandri semen & caulium, decoctum thymi, allium, absinthium, hyssopus, mentha, bouis astragalus uultus, uermes terreni uiti, chamæmelum, zedoaria absynth. xantonicum, myrrha, puluis contra uermes, securidacæ semen, succus portulacæ & endiuæ, oleum omphacinum, medulla cerui, folia persicorum, rutæ, iasura eboris, unicornis, rhabarbarum, cornu ceruinum. Superstitiosum est, quod scribit Scribonius, Oportere e cornu cerui scobem fieri lima lignea. Nam aliter iuuare potest. Plurimum laudatur decoctio sebesten. Alia quoque, quæcunque qualitate ali-

a Hippo-  
crat. li. 4. de  
morbis.

b Ac rotun-  
di quidam  
signa sunt  
cardiognus

lyncope sto-  
machica, cu-  
ad stoma-

chi serpit,  
pruritus na-  
riu, iussica

la sicca, sus-  
fusio robo-  
ris in facie

fugax cum  
uicissitudine  
caloris, tor-

mina in al-  
uo et systro-  
pha, denitiu

stridor pue-  
ri dormien-  
tibus. Latu

canina ap-  
petentia bati-  
mus, & uer-

miculorum,  
qui cucurbitæ  
semen re-

ferunt excre-  
tio. Ascari-  
da uero ani-

pruritus, te-  
nesmus pro-  
lapsus.



# DE MORBIS INTERNIS

*a Ut deco-* qua a uniuerſali uermes interficiunt.  
*Et ungrami* Aquæ conueniunt graminis, abſynthii, portulacæ &  
*nis cum ra-* rerum amararum. Purgatio quoque an conueniat, quæ  
*ſura cornu* ſtio eſt, de qua non dubitandum. Repurgata enim mate-  
*cerui pueris* ria, unde uermes generantur, una cum ea uermes exclu-  
*poterit præ* duntur. Laudantur rhabarbarum, hiera tum ſimplex, tū  
*ſcribi. Vel* diacolocynthidos. Veteres etiam Medici ſcammonio  
*hic puluiſcu* uſi ſunt. Nunc licebit uti graniſ quatuor dacridii, cum  
*lus R. abſyn* aqua abſynthii aut ſimili. Sed purgatio commodior ubi  
*th. xātō. 3.* in ſuperiore inteſtino uermes ſunt.

*s rhei ol de* R. decocti ſebelſten unc. iiii. cornu cerui dra. i. menthæ  
*y. raſuræ* ſiccæ & piperis triti an. 3. ii. latos etiam expellit Rha-  
*cornu cerui* barbari dr. i. aquæ graminis aut abſynthii unc. ii. ſpicæ  
*dr. i. f. palui* nardi Gr. 4. Clyſteres ex uini lib. i. olei abſynthii unc.  
*ſculus. Cap.* iiii. puſueris hieræ dr. ii. Poterit etiam adiici unc. mel-  
*ad dr. i. cum* lis & dr. ſalis. Nam & ſal deglutitum aſcendentes uer-  
*in ſculo ca-* mes ad ſtomachum deorſum pellit.

*pi.* Videndum tamen, ne odioſa uermibus per ſedem in-  
*b Dum hæc* iiciamus, cum ad ſuperiora eorum motus eſt. Tum b. n.  
*ſiunt cata-* iucunda potius, ut mellita & dulcia innicienda ſunt, aut  
*plasma ex* eiſmodi glandulæ ſubiiciendæ. Bibenda uerò, quæ eoſ  
*aloe, abſyn-* dem uermes dorſum appellant. Nam aliquando ad uen-  
*th. xant. 3.* trem uſque aſcendunt & ſtomachum lancinant, unde  
*felle fieri po* ſyncope, conuulſio, mors.

*terit umbili* Emplatra & cerota ex cerato facto è tribus parti-  
*co admo-* bus olei abſynthii, amygdalarum amararum, nucleo-  
*dum.* rum perſici & una ceræ amaræ. Deinde ubi refrixerint,  
 ſubigi debent ex ſucco amaro, ut abſynthii. Adicien-  
 dum quoque aliquod genus fel liſ. Nam fel inſigni ama-  
 rore enecat uermes, ex quo & glandulas felle illini-  
 mus. Medulla cerui, uenter, lumbi & perinæum inungi  
 poteſt. Mirum eſt, quod contigit aliquando uermes  
 per inguina prorupiſſe, uia exedendo facta. Aliis per  
 umbilicum.

Nonnullis quoque contigit, ut multitudo uermium  
 tunicam ſibi contexerit extenſam toto inteſtino, & om-  
 nino ſimilem ueri inteſtini.

Vbi coniunctus eſt alui fluoꝝ, eligenda ſunt, quæ præ-  
 terquam

*De uermib;*  
*in alui fluoꝝ:*



terquam quod uermes enecant, etiamalui fluxionem retineant, quale est rhab. & plantago.

Et quia pueri fere uermibus infestantur, refugiunt autem quæcunque amara sunt, diductis dentibus clysterio aut curuata fistula medicamenta in œsophagum, infundenda sunt.

Fiunt clysteria ex muria, aqua oliuarum, centaurea ablynthii decocto. Sed ubi uermes exclusi sunt, roborandum intellinum, instituenda uitæ ratio, ne in posterum regenerentur.

Theriaca & mythridatium, si nulla febris, uermes enecant & excludunt.

## SCHOLIA.

Ex multis humani corporis partibus reiiciuntur uermes, uentriculo, intestinis, uescica, utero, dentibus, ulceribus. Puella quædam ad portam D. Iacobi album uermem, latum, palmo maiorem, satis crassum reiecit per nare nulla tusi, nullo uomitu antecedente. Præcesserat acerbissimus capitis dolor per duos dies, anno 1553. Aprilis 9. In quodam è renibus longi præcedente magno dolore lumborum per urinam reiecti sunt, in alus duobus parui. Musa Aph. 49. lib. 4. scribit quendam tusi expuisse uermem, nescio an à uentriculo, an à pulmonibus. De generibus uermium, materia, generationis modo in intestinis, non eadem est omnium sententia. Vulgò tria genera faciunt, ἐλμινθας τριγγύλας, id est, teretes & rotundos, qui in superioribus & gracilibus intestinis nascuntur, uentriculum subeunt, & per os sæpe, aut nares reiiciuntur: ἐλμινθας πλατύλας, id est, latos et longos, qui aliquando per tota intestina extenduntur, à quibus oriuntur cucurbitui, quòd semina cucurbitæ referant. Tertium genus Ascaridum, qui exigui sunt, teretes, uermibus casei similes, & in recto intestino continentur. Alii præter latos quartum longissimum adiciunt, eumque Tineam nominant, quam sublatiis comprehendi potest. Cucurbituos etiam à latissimis separant quòd neque illius Tineæ factus esse possint, neque partes animalis, cum ipsi sint animalia. Sicque in uniuersum erunt, rotundi in superioribus intestinis, tinea, longi, latissimi, cucurbitui extensi per intestina, et Ascarides iuxta anu.



## DE MORBIS INTERNIS

In qua dimissione, cum ex rei natura sumpta non sit, & mēbra simul permisceri queant, nihil mirum confusionem reperiri, & controuersiam. Experientia tamen omnia facilia. Cōstat enim longos & rotundos in superioribus intestinis contineri & per os reuicti. Anno 1553. in Collegio D. Barbare puer annos 12. natus interuallis uomere solebat longos uermes, albos e uentriculo. Sentiebat motum, morsum et commotionem. Dum urgebant, sitiebat, agebatur. Nuius fuerat lacte, & fructibus. Tineam uocatum uermem Avelata cum D. Valeriola uidimus longitudine si bene memini, nouem pedum, aut etiam amplius. Cuius uir ille Doctissimus in suis Observationibus copiose meminit, & quæ ad eius generationem intelligendam pertinent, exactissime docet. Encurbituos quoque uermes esse certum est, ut iam quinque genera inter se uel loco, uel figura, uel magnitudine distincta constitui eadem ratione possunt. Ascarides quibusdam quasi sacculo inclusi & membrana inuoluti latitant in fecibus. Quod ad materiam pertinet, nonnulli ex Hippocrate 4. de morbis ab utero seminaria accipi uolunt. Generari enim in utero matris, quoniam tunc fœtus non expurgatur à fœce. Non apparere autem, nisi ad id tempus, quod infans incipit uesci cibo, tum ob benignius lactis nutrimentum, tum quod humidiora, & minus calida sint illorum corpora. Quod certè principium longius petiuit uidetur, cum in grandioribus, atque adeo senibus frequenter, ut in pueris, nascantur. Musa scribit senē annorum 82. in extremis positum accidentibus, quæ uermiculis pueris accidunt, & cum graui halitu, qualis pueris esse solet, plures 500. excreuisse medicamento è scordio, & corallina. Rustica cuidam mulieri plures prodierunt, cum ante incredibile palpitazione & fluctuatione uentris laborasset inde assurgentis & tumentis, ut in grauidis consuevit robusto fœtu. Græci alios à bile, alios à pituita quosdam à melancholia generari uolunt. Actius latum uermem siue tineam nihil aliud esse uult, quam mutationem membranæ interioris tenuium intestinorum in corpus quoddam uiuum animatum mobile. Quæ omnia parum probabilia uidentur. Bilis enim & melancholia humores sunt tota natura ad hanc generationem ineptissimi, nisi temperentur ab aliquo alio longè su-



ge superante. Et Galenus tanquam admirandum proponit in dysenteria hominem abraſa interiore tunica inteſtinali minui poſſe, cum tamen expulſis huiusmodi latis uermibus acri longe melius habeant, ut uidimus in eo, cuius antea meminimus. Rationi magis conſentaneum & experientie, uel ex chyloſo ſucco, uel pituita ortum habere, quæ tamen aliquando aliis humoribus tingi poteſt. Hoc intelligitur ex cruditate & alimentis eorum, in quibus reperiuntur. Deinde facile in gluten reſoluuntur, & ſecti rursus ununtur. Neque alius generationis motus uidetur, quam per corruptionem & putredinem, in qua natura, id quod benignius eſt, calore uniſico tanquam opifice efformat in animal, qualecunque poſſit effingi, ut Ariſtoteles docet in Meteoris. Id perſpicuum eſt ex ſætere excrementorum & halitu. Varia inducunt ſymptomata. Nam chylum conſumendo corpus minuant; in uentriculo uomunt, ſanem, ſyncopem mordendo, & aliquando iugulare uidentur. In recto inteſtino pruritus excitant & ~~in medio~~ in ventre medio fluorem alui iuenteriam, uentris inflationem. In omnibus aliquando febres quotidianis ſimiles, inordinatas & horriſicas, & ſi arrodant inteſtina, ſæpe interficiunt. Hæc eadem uermium ſigna ſunt ſicuti anhelitus ſærens tuſcicula inanis & ſicca. Cum clamore expurgantur acri, arctius dormiunt, ſtrident quodammodo dentibus, morſus, nauſea, ſiſtidium & ſimilia. Latus raro generatur & paucis gentibus nunquam Athenienſibus. In inteſtinis obiectu rapit alimentum, ut alio ſtatim opus ſit. Inde eroſio, fames canina, gracilitas, imbecilitas ſine manifeſta occaſione. Certiſſimum ſignum eſſe uolunt, in recrementis ſimilia quædam cucurbitulæ ſeminibus reiecta. In omnibus nihil certi, quam ſi uermes aliqui reiecti ſint.

Aſcarides glandibus ſine ſuppoſitoris: Rotundi potionibus: Virique lati curantur ex materia, ut eſt ſcopus necandi, alliciendi, purgandi. Cõueniunt ſyrupi, topica ſuprà umbilicum, cataplaſmata, unguenta, inunctiones, clyſteres, & ſimilia.



DE MORBIS INTERNIS

De a Hemorrhoidibus. Cap. LI.

a De sangui-  
nis aut hu-

moris melā-  
cholici flu-

**H**Aemorrhoides uniuersum b corpus uacuant, ali-  
quando c cacochymia, aliquando d puro sangui-  
xu, qui fit ne, quique e sola quantitate peccat. Itaque per ue-  
per uenas nas, quæ à f uena caua explantatæ utero, pudendis &  
ad podicem sedi implantantur. Hoc enim uerisimilius est, quàm  
per uenam, quæ à portis hepatis in extremum rectum  
per uenam, quæ à portis hepatis in extremum rectum  
porrigitur. Neque admodum uerisimile hæmor-  
rheidum materiam per uenam a liene repurgari. Ra-  
ne nomen mus enim uenæ, quæ à medio liene descendit, desi-  
habent. nit in omentum. Hæc uacuatio in genere præter na-  
b Cacochy- turam est. Ideoque periculosa, proptereaque non fa-  
miam pur- cienda eius consuetudo. Quibusdam tamen naturis  
gando, aut fit naturali consuetudine, & incolumis uoletudinis cau-  
plethoram sa est. Tale est, quod scribit Hippocrates g Attribile  
deplendo. uexatis & renum passionibus, hæmorrhoides superue-  
c Melācho- nientes, bonum.

lica, per me

Præterea quòd quartana, melancholia, angina, pleu-  
ritide & aliis eiusmodi grauioribus b morbis hominem  
uindictant. 6. Epid. Salutaris quoque hæc uacuatio Epi-  
d Per uenā lepticis, & iis quibus tubercula & maligna ulcera oriri  
hypogastri- solent. Fluunt tamen hæmorrhoides aliquando i immo-  
cam, qua dicè. Oportet enim ex fluxione corpus k leuari, non in  
musculis in firmari. Atque ubi de commouendis hæmorrhoidibus  
testini recti consilium est, peculiaris natura agri primum interro-  
cernicibus ganda est, an ex cōsuetudine & statis interuallis soleat  
uesica ac eo modo repurgari. Sunt enim quibus periodicè fluūt.  
uteri san-

guinem impertit, atque etiam pudendo.

c Ut in grauidis, in nimia sanguinis abundantia, mulieribus quibus  
suppressi sunt menses, aliquo etiam membro mutilis.

f A ramis illis trunci inferioris uena caua.

g Aph. 11. lib. 6. Aphor.

h Sect. 3. lib. 6. τὸν ἰσχυρὸν. & ad finem lib. de humoribus.

i Vnde cachexiam adferunt, indeque hydropem.

k Quod erat alioqui onustum humoris melancholici prouentu, aut sup-  
pressi sanguinis plethora.

mulie-



Mulieribus *a* uiduis *b* senibus & quibus aliter suppri-  
muntur menses. Sanguis interim diuertit à uenis uteri  
ad sedis uenas, & ita per periodos sese repurgant. *Præ-*  
*terea* ~~interrogandus est æger, num sit opportunus gra-~~  
~~uis, albis~~ morbis, quos diximus. Hæc enim emittit  
continuum excitandæ huius purgationis.

Excitantur autem aliquando *c* purgationibus, quæ  
cacochymia conueniant. Nonnunquam phlebotomo  
è malleolo, uel iis uenis quæ superiore parte pedis emi-  
nent. Cucurbitulis cruribus admotis & sedi. Leuissima  
uia est per sanguisugas.

Ferro etiam aperiuntur, ubi turgent, quas mariscas  
appellant. Tum etiam medicamentis, ut oleo ex nucleis  
persicorum, aut in quo res *d* acres & amaræ coxerint.  
Aut unguento.

R. pinguedinis lardi erasæ ex parte pinguisima unc.  
*i.* olei irini, rutacei aut similium dra. *iii.* Fiat ueluti un-  
guentum molle, quod subigatur ex succo cepæ rubræ.  
Eadem cæpa aceto macerata contusa & imposita. Ve-  
rùm ubi dolor est, cū butyro subigimus oui uitello uel  
rosaceo. Pulpa colocynthidis conuenienti oleo immer-  
gitur, ano alligatur: quinque horarum spatio aperit.

Collyria, suppositoria ex radice ciclamini, ex radi-  
ce caulium induntur. Fortiora, si taurino felle illinun-  
tur. Fellis genera maxime flaua sedi illinuntur, vel co-  
tone excepta induntur. Pallida verò mitiora sunt. For-  
te hoc est.

R. stercoreis columbini in puluerem redacti dr. *iii.* in  
spargantur unguento molli factæ ex pinguedinis lardi  
unc. *i.* olei in quo matricaria coxerit unc. *s.* salis dra. *ii.*  
omnia misceantur in mortario.

Celerius agent medicamenta, si ante confricetur, se-  
des ex foliis ficus, parietariæ, aut aliis asperioribus, ut  
lintheo cannabino, uel detricto panno.

Fotus quoque ex ciclamino, centaurea, abrotono,  
matricaria, brionia, radice enulæ, ireos, absynthii &  
similium. Reliqua materia cap. de commouendis men-  
sibus dicetur.

*a* Quæ fue-  
runt olim re-  
stibilis facō  
ditatis, hoc  
est, singulis  
annis parie-  
bant.

*b* Melācho-  
licis, olim  
biliosis, quo-  
rū corpora  
biliosa iam  
perspiratio-  
ne carentia  
fiunt melan-  
cholica.

*c* Ex deco-  
cto folliculo-  
rum senna-  
e & casia, di-  
luto rhei &  
diaphænico  
maximè ue-  
rò aloesuso.  
*d* Ut persi-  
caria myrio-  
phyllum, ap-  
parine, &  
praesertim  
rubia mi-  
nor.

3278/A



# DE MORBIS INTERNIS

**a** Neque Sed aliquando latent hæmorrhoides, quæ in re pla  
sub aspectu cuit Antiquis ut sedes euerteretur. Inusitatum nec ita  
ueniunt, si- tutum remedium nostris temporibus. Euertitur sedes,  
ne sistendi, quo facilius remedia applicentur.  
sine ciendi R. piperis, nitri an. dra. i. leuigatis locum  
cõsiliu sit, Vti licet & sale gemmæ, & pul. seriphii, & felle, absyn  
sine sympto thii b succo & matricariæ. Postea uero reponenda se  
ma corrigē des ex his, quæ capite proprio dicentur. At uero ubi iã  
di. immodicè fluunt, sistere oportet. Sistuntur autem, ubi  
b Nonnulli odiose sunt. Atque ubi grauius aliquod malum non  
esula lacte metuitur, ad eam rem uena c cubiti secatur, aut extre  
utuntur. me manus. Cucurbitulæ hypochondriis, lumbis ac sca  
c Tum ad pulis affiguntur. Reliqua curatio d potionibus, top- cis  
reuulsione, remediis, Chirurgia perficitur. Quod autem ad Chirur  
humoris eo giam attinet, meminisse oportet, anum maxime ea par  
fluētis, tum te, qua sphyncter est, partim neruosa substantia, partim  
et ad prohi neruoso circulo constare.  
benda fœcu Neruosa substantia neque acris & mordacia medica  
lenti sangui menta, neque vltionem aut incisionem sine conuulsio  
nis genera- nis periculo perferre. Exterior musculus recti terminus  
tionem. ignobilis & carnosus, qui uocatur podex, ea remedia  
d Alteran- perferre potest. Quod autem scriptum est ab Hippoc.  
tibus, ua- quodque ad cõsiliu sistendi hæmorrhoides pertinet,  
euantibus, A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si una non serua  
o sistenti- tur, periculum est, ne Intercus aut Tabes subsequatur,  
bus, Præter ita intelligere oportet. Medico sananti hæmorrhoidas,  
hæc abstine id est, dum sanguinem mittit, affigit cucurbitulas, topi  
dum erit ui ca & reliqua remedia adhibet, rectam uitæ rationem in  
no, ut orgas stituit, una quidè eo tẽpore relinquenda hæmorrhoids,  
mus inhi- vt paulatim non temere ac præcipitanter fluxum cohi  
beatur. beat. Vbi uero perfanauit, nulla relinquenda est.

Potiones cõueniunt, quæ partim cap de sputo sang.  
partim cap. de profluuntis alui & ancti sanguinis descri  
pte sunt, & describentur cap. de suppressendis mensi  
bus. Sed quia in hæmorrhoidibus fere cruciat dolor, iis

Symptoma utendum est.

tum corre-  
ctio.

R. olei violarum vnc. iij. maccag. sem. psilii unc. ii.  
misce, unguatur sedes. Aliud.

ad dolorem hæmorrhoidum

R. olei



R. olei uiolarum unc. iii. cerusæ lotæ dr. vi. ceræ albæ, quod sufficit. Aliquādo uitellum oui cum rosaceo, aut uiolato oleo subigimus. Nonnunquam albumen cōmiscemus, ubi maior ardor est. Similiter & a micam panis albisimi ex supradictis oleis subactam emplastri modo apponimus. Conueniunt & muccag. portulacæ, lactucæ, sed maximè psilii. Fiunt quoque sacculi ex rebus anodynis. Fiunt fots ex iisdem, atque ubi dolor urit grauius.

R. olei uiolati unc. ii. populei dr. ii. Cū ouo integro fiat unguentum. Quod si resurget, opii ꝯ. cōmiscere potes. Postremo uidendum, ne adstringentibus immodicè nimium resiccatus podex non præstet officium. Itaque fomentis humectantibus corrigendi uitium est. Similiter cū nimium podex refrixit, refrigerantibus medicamentis & narcoticis temperandus est.

Potest sisti hæmorrhoidis siccantibus, causticis, uolsella præhensis & uinculo interceptis uenis.

Laudatur farina uolatilis, aranearum tela, & alia in fluxu sanguinis numerata. Vrunt, & ut loquuntur, mortificant ex puluere radicis caulium torrefactæ & stercore canino similiter cremato, facie arida uini adstringentis cremata, adiecta tertia parte uitreoli romani. Extremum est arthenicū rubrum, cum æqua parte aluminis plumæ. Oportebit autem, priusquā hæc admoucas, sedem madefacere uino adstringente.

## SCHOLIA.

Per anum effluit sanguis multis modis, ut per intestinorū fluxum, hæmorrhoidas, πυκνὸν ῥ, siue ficum, et Tymum siue Mariscam. In quibus multi sæpe falluntur, qui sine distinctione, statim fluxu aliquo in ano, aut tumore apparète Hæmorrhoidas esse putant. cū plurimum hi omnes affectis inter se differant & natura et curatione. Tymus à ueteribus describitur tuberculum carnosum, quasi uerruca eminens ad cutem, tenue, supra latius, subrubrum, in summo perasperū, oblongum, florem thymī referens, unde nomen habet. Facile finditur et cruetatur, modoq; unus, modo plures nascuntur in pedibus, talis, palmis, mediis femoribus, glāde, præputio, fa-

a Violaria  
in lacte co-  
cta ad pul-  
tis consistē-  
tiam mirifi-  
cè dolorem  
sedat si eum  
tantillo olei  
rosacei ad-  
moueat.

sistitia mo-  
roidas



## DE MORBIS INTERNIS

cie, & sæpe in ano. Alij sunt sine dolore carnosì, asperi, candidi aut subrubri. Alij cum dolore punctorio duriores, asperiores, maiores sæculenti, liuidi, quæ non facile curantur nisi tota parte excisa, cui innascuntur. Sycosis idem significat, nisi quod minor est quantitate & magnitudine, ut scribit Aetius.

De quibus sic Martialis.

*Caduntur tumida Medico ridente Mariscæ.*

Falluntur ergo, qui Mariscas cum Hemorrhoidibus confundunt. Ille enim generantur ex præpostera uenere, immodica equitatione, uel attritione qualibet in ea parte facta. Hemorrhoids uero (nomine pro affectu sumpto, si quidẽ partem affectam quandoque significat) nihil aliud est, quàm profluium sanguinis per uenas ani, aut in illis tumor ab influente sanguine. Quæ affectio ut distinguatur à fluxu sanguinis antea descripto superioribus capitibus, obseruanda est hæc methodus; omnium fluxionum causis inuestigandis accommodissima, siue naturales sint, siue præter naturam. Tria enim sunt in genere, in quibus causam inuenies. Virtus quæ mittit: instrumenta seu uia fluxionum, unde, quæ, & quo mittuntur: postremo materia fluens. Virtus quadruplex attractrix, retentrix, concoctrix & expultrix. In materia notanda mixtio, consistentia quantitas, qualitas. Primum igitur per quam uiam sanguis fluat, obseruandum, an per intestina, an per uenas ani. Hoc cum ex causis antecedentibus & sensu, tum ex mixtione coniciendum. Nam simul cum recrementis reiectus & cum illis mixtus ab intestinis prodit: sine recrementis, ab ano. Illic causa est uel in sanguinis multitudine aut acrimonia, uel in uirtute, siue non retineat ob imbecillitatem, siue excernat ob copiam: uel in uia, ut ulcere a quo in intestinis. De quibus omnibus dictum est superius. Si à uenis ani, (simul cum arteriis: ab utrisque enim fiunt.) Hemorrhoides erunt. Itaque uidendum initio, ut fluxionis natura & origo exactè intelligatur, unde uenæ illæ oriantur, quæ progrediantur & ubi terminentur. Una est insignis, quæ à ramo splenico uenæ portæ per mesenterium circa collum & intestinum rectum extensa terminatur in musculis ani & intestino interiore, cui circa lumbos

occurrit



occurrit arteria. In eundem locum, sed ulterius ad cutim usque à uenæ cava tres cum suis arteriis à duabus illis & ramulo uenæ sacra dicta à Sylvio. Si per has effluat sanguis, quia exteriores sunt. Hemorrhoides apertæ dicuntur. siue externæ, in quibus necesse est hepar, renes & totum illud uenosum genus à uenâ cava magis expurgari proindeq; sanguinem magis coctum esse, quam qui fluit à uenis mesaraicis, in quibus adhuc rudis est et splendidus, licet ater sit et crassus, quem lien, et mesarion maxime hac uia expurgat. Nam hepar sanguinem coctum per uenâ cauam distribuit. Mesaraica uero sugunt à uentriculo, et omnibus intestinis atq; ad hepar succum mittunt, plurimumq; feri continent. Lien aut sanguinem sæculentum exonerat in ramum splenicum. A quo descendit per mesaraicum ramum, unde primus ramus, qui descendendo occurrit, hemorrhoidalis est: Paulo infra, uenæ mesaraica. Si igitur per uenâ à mesaraico ramo, qui à splenico oritur, fiat ille fluor, Hemorrhoides internæ erunt, quod intus lateant, nec oculis cerni possint nisi descendente ano, aut immisso speculo. Vtræque rursus diuidantur in cæcas & apertas. Cæcæ sunt, quæ tument cum maximo dolore, nec sanguinem reddunt. Quonquam non ignoro cæcas etiam dici illas interiores, quia non uidentur. Aperte uerò, in quibus est sanguinis profusio. Rursus uel sine inflammatione sunt, uel cum inflammatione. Inflammationis signa sunt dolor, rubor, tensio, renixus, febris. In cæcis grauisissimus dolor, quia partes illæ acutiore sunt sensu. Sphincter enim nervosa quadam substantia est, quæ neque uestionem, neque sectionem facile ferre potest sine conuulsione. Deinde habent è uicino ossè sacro ductos nervos, et extremæ partes sunt. Quales acerrimum habent sensum, neque sine periculo offenduntur. Indicio est è pollice pedis subita mors apud Hip. 1. Epid. et læsis extremis digitis dolor grauisissimus et oculis, et pudendis, et sedi. Rectitudo quoque & tenuitas neruorum plurimum facit ad doloris sensum. Quæ omnia indicant, non sine cā plenioribus uasis & distenta membrana, sedis, quæ orificiis uenarum præceditur, à plenitudine, aut inflammatione acutissimum dolorem excitari, qui sæpe ad se totam curationem traducit. Ex his et perspicuum est, non solum propter crassum et sæculentum sanguinem, sed etiam purissimum hemorrhoidas



## DE MORBIS INTERNIS

hemorrhoidas fieri, licet Gal. in Aph. cētra sentire uideatur. Si igitur sanguis, qui effluit, redundet & uitiosus sit, magni ex hemorrhoidibus commoda cōsequitur, quæ numerantur a Hipp. Incipientē melancholicā prohibent, factā sanant, quod ferē is humos crassior et nigrior per has uenas uacuetur, quā et altus. Varicibus, lieni indurato, A. stritidi, Nephridi remedio sunt. Quibus (inquit 6. Epid. com. 3.) hemorrhoides, y. neq; Pl. uritide, neq; Peripneumonia, neq; Phagedena, neq; furuncule, neq; Thermyntis, fortasse neq; Lepra neq; Alphis corripuntur. Sed nō solum his, quæ dicit Hip. præsunt, uerū et uteri, uisceris et pudēdi affectibus. Ex eadē enim diuisione hæc oīa uenas habēt, et uiduis quibusdā loco mensum fluūt hemorrhoides. In grauidis quoq; notauit Author uiliter fluere in duabus mulieribus nobilissimis iā quatuor menses in utero habentibus. In quibus partus tēpestiuus consequutus est, & saluberrimē adoleuit. Erat autem frequens & multus fluxus, sanguis ferē dilutus, qui ubi subsistebat, grauius habebāt. Aegrē excluso leuabatur. Quibusdā etiam familiis consueuē sunt. Cuidā nobili in aede Ambrosii Chirurghi decubenti, qui Authorem ad cōsiliū adhibuit, cū in grauisimo renū dolore emingeret pus, sanguinem et crassam pituitā, natura remediū ostendente, quia tumebat hemorrhoids, & aliis remediis non cedebat dolor, eo statim tempore iussit aperiri hemorrhoidem, unde incredibili celeritate dolor cōquieuit. Sed hæc omnia intelligenda de natura superflua exonerante, & si acri leuiter ferant. Nā quæ ab infirmitate uiscerum & intemperie, unde sanguis uel acrior, uel serosior generatur, uel quæ à laxatione & hiatu uenarū oriū habent, aut immodice fluit, in his celeriter tolli debet totius mali origo. Alioqui intempestiue cohibita deteriora longe et periculosiora uitia inuehūt. Nā suppressus sanguis ad hepar, hinc aliquādo ad pulmonem, cerebrū, latus, aut in corpus diffunditur, uel aliqua parte cōsistit, unde morbi illi omnes superius relati oriuntur, & si quæ adhuc grauiora dici possunt. Paucis enim grauioribus annotatis morbis alios intelligit Hippocrates, ut Epilepsiam & similes. Non immeritō igitur quæstiones illæ duæ ponuntur, an pronocanda sint, an sistenda. Et si sistere cōsiliū in fit, an una relinquenda, ut Hippo. præ-



recipit in Aphorismis. De quibus remota omni disputatio-  
 ab hoc loco aliena sic breuiter censemus. Assuetis et gravioribus morbis laborantibus aut opportunis aperiri posse. Qui in quibusdam familijs consuetas esse, in quibus indiuidui rō habenda. Et quia ante pubertatē nō fluūt, ut est author Hipp. impetus quoque naturae considerādus. Alioquin nō est faciēda consuetudo. Aperiēda igitur nō sunt si non tumeāt, et si nunquam fluxerint. Quā ad alterā quāstionē pertinet, Curati (inquit Hip. 6. Epid.) importunē multi subitō his morbis correpti sūt, et grauius. Gal. importunē curatos interpretatur, qui neque Phlebotomia, neque medicamento subducente per interualla, exhibitio, uel exercitationibus uacuantur, qui itē neque unā ex ipsis relinquūt, sed omnes in uniuersū tollūt. Vbi Gal. uidetur sentire oēs quidē tolli posse, sed non a se ipsis. Deinde oportere natura precipiēdo uacuare corpus, Phlebotomia, medicamento, exercitio. Alioquin unā relinquendā. Quare ubi haec remedia adhibita fuerint, et per interualla, nulla relinquenda uidetur, praesertim cū ea purgatio nō sit naturalis, & optima uictus rōne declinari queat. In recentibus quoque metu grauioris mali una seruari potest. Multis percutiatur. Sed experientia docet, nisi purgetur, et sāguis detrahatur, nescio qua melācholia et obscenis somnis uexari. An at una relinquenda sit, quae statis periculis effluat, an obligādus ager Phlebotomiae per interualla et medicamentis, id serē arbitrio aegri relinquēdū, nisi si quis à Phlebotomia, purgatione, exercitijs deterius habeat, aut haec leuiter ferens grauius ferat hemorrhoidē. Relinquere at unā apud Hipp. nihil aliud est quā nō secare, nō urere, nō cōsuere, siccare, putrefacere. Nā liber est de Hemorrhoidibus, ubi omnes urit, secat, curat, cōsūt, putrefacit, siccant. Vrit at nō adhibito uenae ferro, sed tantu admoto, ut assetur, et siccetur. Quā igitur Aetius nullā seruandā scripsit, Paulus cōtra, non solum in diuturnis, sed ubi stillicidii modo effluit sanguis, ceteris occlusis unā relinquendā praecipit. Seruari duobus modis interpretari poteris, uel neglecta artificiosa curatione, uel adhibita. Si negligatur, una seruanda est: si adhibeatur, nulla. Rursus sistendi cōsiliū duplex. Aliud dū fluētes sistimus: alterū, dū fluxuras animaduertimus. Illis inmoderatū fluxū adstringi debere nō est dubiū. Ce



# DE MORBIS INTERNIS

terū externæ facile deprehenduntur ex tumore. Internæ uero ex pondere circa sedem, egerendi difficultate, & clysteres aut glandes immittendi sanguine alius excrementis non permixto, & consueta purgatione a qua indiuidui natura.

Multi sunt igitur curationis scopi. Tumentes aperiende, fluentes compescende: dolor mitigandus, & inflammatio tollenda. Quæ omnia propria remediis perficiuntur. In oībus partis affecte habita ratione, ab omnibus acerbis et mordētibz abstinendum. Cauendum à cancro aut fistula. Quæ uehementioribus medicamētis facile inducuntur. Nam cuniculi quidā sepe latent, in quibus pus. Vnde longiores sinus in fistulas abeunt. Videndum etiā ne nimīū adstringamus aut refrigeremus podicē. Hinc sequitur ani prolapsus uel resolutio: illinc nō præstat officium, et aliud nimīū reficiatur. Itaq; post usum horum corrigi uitū debet, si quod illatum sit. Vbi remediis non est locus, Chirurgia opus est, ligatis, uistis, tabe factis uenis. Sed reuera in Hemorrhoidibus diuturnis, in uaricibus, & reliquis influxionibus & collectionibus iam inueteratis omnino periculosa sectio, qua uel moriuntur, uel in aliquem grauisimum dolorem incidunt, priore peiorem. Purgato corpore fatus conuenit cum uino adstringente, decoctione ros. centinod. plantaginis, scoriz ferri & similibus. Topica adhibentur & sedi & ossi sacro.

De exitu a ani. Cap. LII.

a De ultima  
recti intesti  
ni partis  
prolapsu.  
b Ductarii  
à peritoneo,  
atque etiam  
aligamentis  
lumborū &  
ossis sacri.  
c Quæ uel  
ab obstru  
ctione, uel  
compresio  
ne fit.  
d Dolore itē  
& pulsu.  
e Ad reuel  
lendum & in  
hibendum flu  
xū.  
f Ad amo  
tionem ma  
teriz coniu  
ctæ.

**A**Nus totum rectum intestinum est, aut extrema laxitas eius. Excidit hæc infirmis musculis obliquis, qui sedem sursum reuellunt: & laxitate b membranarum quibus ossi sacro & lumbis colligatur. Nerui etiam c resolutione, qui ab extrema spina ad sedem porrigitur. Itaque primum animaduertendum, numque inflammatio ad sit, quod tumore, rubore, calore & d duritie intelliges. Hic sanguinem e brachio detrahes. Deinde etiam e malleolo. Si fuerit opus, materiam inflammationis resoluentibus medicamentis & laxantibus digeres, admixta etiam parte eorum, que percutiant & corroborent.

Topica remedia frustra sunt adhibita sedi, si à laxo neruo uitium est. Tūcque applicanda extremitati spinæ,



gubi & coxa est. Redeundumque ad genus *b* curatio-  
is, quod ca. de Paralyfi dictum est. Si uero infirmitas  
teorum obliquorum musculorum, & corpus crassis  
e uiscidis humoribus abundat, purgatione primum  
tendum est ex hiera simpl. aga. hiera diacolocinthidos  
e similibus: tum si qua sordes ano inhesit, detergenda  
rius hydromelite, urina propria, decocto betæ, mu-  
ia, marina aqua.

Postea uero fotus conueniet sæpe repetitos ex uino  
austero in quo acacia, hypocistis, mirthus, malicorium,  
ose, scorja ferri, & alia eiusmodi coxerint astringen-  
ia; adhibita ratione, que iubet mollioribus mitiora,  
lurioribus fortiora remedia esse adhibenda.

A fotu unctiones, insersiones puluerum, insessio-  
nes & balnea usurpanda sunt. Quamquam inunctiones  
& olea, quæque lubrica sunt omnia, non sine ratione  
quidam reiciunt, alii admittunt, quia firmitus inhæ-  
rent. Laudabitur oleum nardinum, coltinum, laurinū,  
malichinum, rosaceum, quæ ubi inuncta fuerint, pul-  
uis ex arida pice trita, seta porcina, usta galla, fimo ca-  
nino, cornu cerui, carabe, sanguine draconis, maltiche,  
corallo & similibus.

Suffitus è bdellio, pice arida, pinea, colophoniam, exu-  
io serpentis; lapide molari candente consperso ace-  
to, in quo porri folia coxerint, uino austero nigro, in  
quo aliquid astringentium ferbuerit; insersiones in a-  
qua sulphurea, marina, bituminosa, aluminosa & simi-  
libus.

Puluis.

R. sang. draco, malicorii ana dra. i. gallæ, bituminis  
ana ꝑ. ii. subtilissimè trita & cribrata inspergantur.

Alius.

R. carabe, cornu cerui usti, coralli, balaustiorum, thu-  
ris albi cantimonii, acaciæ ana dra. s. trita inspergan-  
tur, aut incorporentur uitello oui, & modico petrolei,  
Vitellum oui usurpamus, ut in eo pulueres incorporen-  
tur, tum quia non ut oleum, sordes relinquit.

Emplastra sunt ex ammoniaco, bdellio, ma/laxatis  
cum oleo nardino, & similibus conspersis puluisculis,

V. 2 quæ

a Qua parte

ischium cū

osse sacro

conectitur.

b Ut ad fo-

tus, litus,

emplastra

dropaces.

*Inter-  
gita:*

De his uide *totus.*

Hippocra-

tem ad finē

libelli ad fi-

stulis.

*unctiones.*

*puluis.*

*suffitus*

*insessio.*

c Stibij non  
calcinati.



# DE MORBIS INTERNIS

tempus applicandi  
remedia i. c. fixa  
ani:

quæ adstringant, osi sacro, perinæ & sedi apponuntur, & ne concidant, fasciis contineri. Tempus remedium, ubi iam ægri deiecerint, & abluta sedes reposita fuerit.

## SCHOLIA.

Rectum intestinum, Græcis ἀνὰ πρὸς ἄνω ἰσχύρῃ. Hippocrati ἀπὸς, Aph. 58. libr. 5. ut interpretatur Philoth. Prius nomē illi inditū est, quod cum alia intestina flexuosa sint, recta linea sine gyris in anum suæ podicem deducatur. posterius uero, quod vel alius impeteret, vel aliorum sit principium. Excrementa enim excipit, & foras agit aditū sepe transuerso et musculari abdominis propellētib. Opus, quod habuit musculo, à quo tanquam crumena constringeretur ne ante tēpus excrementa effluerēt, quæ Græci σφιγνῶν παύσαντες ἀπὸ τοῦ σφιγνῶντος id est, constringendo. Quæ est illius propria actio, nō autem excretio, ut multi uoluerat. Deinde altero (qui geminus est, uel etiam ter geminus) oblique supra rotundum sito, quo sursum reuollitur. Adiectæ sunt membranae, ad maiorem firmitatem, quibus alligatur osi sacro et lumbis. In hac parte morborum affectus plurimi oriuntur. Si excrementa nobis inuitis egrediatur, resolutio est sphincteris. Si uero extra anum prolubatur intestini recti, neque sursum retrahi possit, nisi manu protrudatur, necesse est causam esse in musculari aut nervis sursum reuellentibus, uel membranis alligantibus. Id autē sit laxatis illis nervosis corporibus, uel imbecillioribus redditis, uel intumescēte et inflato intestino. Si resoluantur nervi, causa ex capite de Paralyti exquirēda sunt, topicaque osi sacro imponēda. Imbecilliores redduntur aliquādo ob uimiam mollietatem et humiditatem ut in pueris, uel frigus à quacūque causa externa, uel aliquādo aliam intemperiem, aut humorem madescentem. Aliquando uero ob magnam aliquā contentione in reddendis excrementis durioribus, aut acrioribus, ut in Dysenteria, uel Tenesmo. Inflatur autem à quolibet tumore, sed præcipue in inflammatione, quæ sequitur dolor febris, perpetua irritatio ad excretionem, stulicidium urinae. Fieri scribit Hippoc. de fistulis à puita ex corpore in intestinum rectū decumbente. Quamquā in contextu Græco habetur ὁδὸ τοῦ φλυπατος. Certū autē est



est phlegma Hippocrati aliquando inflammationem dici, ut  
in Prognosticis. Nre dubium, quin ab aliis etiam humori-  
bus, praesertim a sanguine fieri possit. Mirum est, quod nobi a Quibus  
li euidam mulieri contigit anno 1559. Nihil excludebatur uterus coale-  
stere corts: dolor ingens in ano, qui nullis remediis cedebat. De scit, adiun-  
causa disputabatur. Nihil è speculo inmissa apparuit inte- gatur moue-  
rior recto intestino. Tandem summa vi, et eo dolore, qui in tur, nutri-  
pariu difficili excitatur, rotundum globum topbaceum e co- tur.  
so intestino directu. Hernia laborabat. Erat is globus tunica b Qd frigus  
incolutus sibi substantia. utero bellu

Non eadem omnibus curatio. Frustra adhaerentur reme- indixerit.  
dia ano, si spina uirto resolutus sit nervus. Inflammatio cu- c Tu in cor  
randa, ut caetera, indicatione sumpta à parte. pore uteri,  
tu in aceta

De exitu matricis. Cap. LIII.

**R**elaxatis a uinculis, refrigerato b utero, collecta bulis ipsis.  
e mucosa substantia uterus excidit, senibus magis, & Vnde gra-  
iis, quae ex instituto uitae d audos pedes in frigida con- uior factus  
tinent, aut diutius in frigido lapide sedent, uel acie fri- uinculis suo  
gidiorum excipiunt, maxime in puerperio & e tempore loco contine-  
menstruorum. Casu, ictu, resolutione quoque decedit. ri non pot.  
In uehementi motu eo modo quo urina & stercora pra- d Et mulie-  
ter uoluntatem effluunt, ita etiam uterus delabatur. ribus lotri-  
cibus.

Totum uterum decidere posse quidam s è Græcis  
negant: contra quos g Arabum autoritas & experien e Quo tpe  
tia facit. Tumque desperata res est, ut cum inueterauit uteri pars  
malum, quod ætatē senili non facile curari potest. utraq; hiat.

Initio animaduertendū, nū retenta urina aut stercus. Accedit et  
Primū enim excludere oportet. Vterus. n. in medio po- coeundi libi  
situs & cōpressus magis expellitur, nec facile reponit. do, cū. s. ute

Apte collocanda mulier est, sublati coxis inuicē di ris defrauda-  
latis, reflexis poplitibus. h Atque eo modo, quo in sede tur, & appe-  
diximus, detergendum, abluendum, fouendum, pessuli tū non ex  
quoq; è lana molli inuoluta linteolo figēdi sunt. In ea plet. Arist.  
lana i pulueres misceri possunt, qui uterū confirment. ea 2. li. 7. hi

Pessulus stor. Anim.

f Et Aetius. g Et Auicenna.

h Et si in crasso intestino sphincteris constrictione obdurnerit.

i Ex balanstis, radice cypri, nucē cupressi, resis.



DE MORBIS INTERNIS

a *Vi* bacca,  
cortex et fo  
liarof. cani  
na, fol. rub.  
hypocistis,  
balaustia.  
b *Ut* repesi  
tus suo loco  
cōtineatur.  
Hinc semi  
sphaerā figu  
ra ouali, ce  
ra obductā,  
filoq; appen  
sam i mulie  
brē sinū (si  
usquequaq;  
sit plapsus  
uterus) im  
mittere, &  
subligaculis  
retinere de  
cuerit.  
c *Ut* maiore  
ui sursū at  
trahātuterū  
prolapsum.  
d Quod uim  
habeat cōpr  
mādi et con  
uiniodi est  
empla. cōtra  
ung. comi  
tis. emplast.  
de mastiche,  
ung. rubri  
dificatiū cū  
rad. cyperī.

Pessulus factus pro ratione ætatis immergendus est  
uino, in quo a adstringentia coxerint, & ita insinuan  
dus pudendo, prius reposito b utero.  
Pectinem quoque & lumbos lana, bombace, aut  
spongiis imbutis oxycrato contegemus, & ne concii  
dant, alligabimus.  
Cucurbitulæ cum multa c flamma umbilico & su  
mini, atque etiam ilibus affigendæ sunt, sepiusque re  
petendæ. Atque interuallis cucurbitularum, d empla  
strum supra umbilicum & lumbos affigendum est.  
R. galbani unc. i. s. myrrhæ, thuris albi ana dra. ii. te  
rebinthinæ dr. s. sem. lauendulæ dr. i. moschi ꝑ. s. incor  
porentur & extendantur in aluta.  
Pessarum, Pessulus, Priapismus.  
R. allæ foetidæ, myrrhæ, thuris albi, mastice ana  
quod sufficit pro ætate & ratione mulieris.  
Fiat pessarium malaxatum cum oleo laurino, uel de  
liliis, addendo dra. i. s. lauendulæ, & baccarum lauri  
dra. s.  
Naribus odora, utero foetida admouenda, pannis li  
neis inuoluēde partes pudendæ & uicinæ perfumigatis  
cū myrrha & thure. Suffumigia & infusiones, ut prius.  
Sed hic peculiariter ex lauendula, bistorta, foliis &  
baccis lauri, adiecta portiuncula myrrhæ, thuris cum  
cortice, & mastichis.  
Si putruit uteri pars, quæ decidit, placuit Græcis &  
Arabibus, ut quicquid corruptum sit, amputetur.

SCHOLIA.

Uterus uinculis undiquaque alligatur ante, retrò: supe  
rius, inferius: dextra, sinistra: oblique ad collum et inguinā.  
Ossi pubis: ilion & sacro per tunicam à peritonæo, dextra  
et sinistra parte annectitur: magnis uasis per arterias & ue  
nas præsertim spermaticas et apophysim peritonæi: spinali  
medullæ per neruos: recto intestino p fibras quasdam tenues:  
uesica per alias, sed plures et laxiores: ossi pubis per uincula  
laxa. Omnia membrana peritonæi præter uasa. Hinc maxi  
mus uteri consensus cum uniuerso corpore. Plato tanquam  
animal uorax moueri putat modo deorsum ad semē excipie  
dum:



dum: modo sursum, fuga male olentium, aut alia causa. Medici uerò naturaliter quidem excipiendo semen, hiare, deinde constringi uolunt, sursum autem nō moueri, nisi uasis plenis reuellatur, aut infletur ut in suffocatione, deorsum uero, cum peritoneum aut uincula à peritoneo relaxantur, uel rumpuntur, uel fundus inuertitur, unde uteri procidentia. Contorquetur etiā interdum ut ob abscessum, uel inflammationē, uel uim aliquā illatā, uel post partiū. Videre ē licet multas, quæ cum utero gestant, dolore coxæ affectis ligamētis laborent, sic ut edito fœtu dolor maneat, unde claudicant, cuius meminit Galenus 6. de locis affectis. Sunt igitur tres affectus uteri præcipui ex deprauato motu, unde infinita & admiranda symptomata cōsequuntur, suffocatio, cōtorsio & procidentia. Hic de postremo tātū agitur, in quo aliquando collū, aliquādo fundū in uulua procidit. Vbi collum excidit, uidetur ueluti glans uiri rubens, quæ se ostendit in ore pudendi cum suo foramine. Fundum autem cum procidit, inuertitur. Quæ omnia rōne diligenter distinguenda sunt. Cause igitur sunt relaxatio aut ruptio aliquando uinculorum ad ossa pubis: nonnunquam peritonei. Relaxatio fit ab humiditate, aut difficili partu, aut rupto peritoneo, aut tensis inferioribus ligamentis. Quod tamen fieri nō posse existimo. Sic enim traheretur ad ossa pubis potius. Aristoteles 7. de natura animalium scribit quibusdam desideria coitus, aut longiore ueneris abstinentia uterū excidere, quibus coitus & conceptus remedio est. Sæpius fit casu, ictu, uehementi metu, mora in aqua frigida ut in loiricibus, difficili partu, magno conatu in reddendis excrementis. Ob rupturam peritonei, aut difficilem partum, uix curatur, aut nunquam.

Si fundum procedat, sublatis cruribus facile redit, si uincula, declinet in latus, unde dilabūtur. Puellæ cuidam (quod ab authore annotatum est) tremor sinistra parte in facie & thorace, non inferioribus partibus. Decumbenti in sinistram mouebatur, quiescebat reuoluta in dextrā. Manè & uespere mouebatur. Ardebat similiter et frigebat. Suppressi menses annis ferè tribus, facies saturato rubore, tenesmus, dolor stomachi, lien inflatus. Si ab humiditate fiat relaxatio, resiccantibus et adstringētibus utendū. Vacua in repellendo debent



# DE MORBIS INTERNIS

a Cum scili- esse intestina & vesica. Conueniunt foris. Inunctiones, pes-  
cet fluunt saria, odores foetidi, fumigia, emplastra, cataplasmata, un-  
immodicè et guenta, cucurbitula, lumbis et umbilico. Extremum reme-  
pter modum diuina est Zona Hippocratis, quae à cingulo zonam habeat à  
peculiaris, parte posteriore per perineum adductam in anteriorem par-  
nature, et a tem ad idem cingulum. Iuxta pubem arctè colligatur. Alij  
tis, diata. è subire ouales formas inductas cera & quasi pediculo alli  
b Quae cōmo gatas immittunt in sinum pudendi, atque alligant coxis.  
do natura Inunguntur oleis & unguentis adstringentibus.

fit et à natu De assistendis mensibus. Cap. LIIII.

re suscipit. Mensis b naturalis est purgatio, nisi uel quantitate  
c Et si bis M excedat, uel e praeferat stas periodos effluat. Deci  
mense repe mo d quarto anno excitatur, nonnullis 12. Rarissime 7.  
tat.

Definit uero 40. aut paulo post, alioqui ad 60. produ-  
d Cum pael citur. Aliis singulis mensibus, nonnullis uno aut pluri  
le ad instā bus mensibus intermissis, quibusdam sepius uno e men-  
magnitudi- se redit. Iunioribus ad lunæ pleniluniam, aliis ferè, decre-  
nem & mo scente iuna, tribus 4. 5. 6. 7. diebus, eo plus minusue.

dum perue- Maiorem copiam efficiunt ratio uitæ plenior, otium,  
nere. temperamentum f frigidus, tenuitas sanguinis, uel acri-  
e Vt salaci monia, amplitudo uasorum, quæ plurima & maxima ad  
bus mulieri uterum perueniunt. Subsistere debent in totum graui-  
bus, quæ se- dis, puerperiis, lactantibus.

ro abundāt. Vt sistas, primum animaduerte q causam immoderati  
f Vt si mu- fluxus, colorē sanguinis fluentis. Si linteo lo excipias,  
lier sit habi animaduertes. Calida enim mēstrua, ubi sanguinis cali-  
tior, corpus dior est: florida atque rubentia, ubi sanguinis copia in  
habeat mi- causa est: subalbida ubi sanguinis b frigidior est. Ruben-  
nus perssi- tibus itaque menstruis, si quidē corporis plenitudo est,  
rabile, gla- i uenam ē cubito secato. Si uerò magna pars plenitudi-  
brum cutim nis iā K depleta est, aut alioqui nō reducat in reliquo  
albā, capil-

corpore  
los nigros et rectos, oculos quoque nigros, uacē acutā, ut si sint iracunde.  
g Quæ triplex est: sanguinis copia & qualitas, uasorum laxitas, faculta-  
tis retentricis infirmitas.

h Aut etiam frigidior mixtione feri.

i Ad reuulsionem & plethoram deplendam.

K Immoderato scilicet fluxu, ut uenam secare tutum non sit.



corpore sanguis, cucurbitulas satis amplas cum multa flamma sub mammis affigito: vinculis brachiorum vti-  
tor, a frictionibus manuum & calfactionibus. In vñ phle-  
botomiæ & reliquorum, interrogabis primum, qua par-  
te vteri maior grauitas sit. Si dextra parte, basilicâ dex-  
tram secabis, dextram manû ligabis, fricabis, calfacies.  
Sub dextra mamma cucurbitulam affiges.

Si verò cacochymia est, biliosum sanguinē rhabarba-  
ri. dr. j. s. aut hiera picra repurgabis. Si pituita, eadē hie-  
ra aut rhabarbaro uteris, sed addito agarico. Sed fere  
vbi nulla plenitudo aut manifesta cacochymia, cucurbi-  
tula sub mammis, aut in humeris apposita, vincula ma-  
nuû, remedia quę sanguinem sistunt, satis esse possunt.

In laxitate meatuû, astringentibus: in tenuitate, increas-  
cantibus vtendum est. Cõuenit inter Gręcos & Arabes  
succû plantaginis efficacissime menses sistere. Memini  
(inquit Gal.) cū quatuor diebus iugiter sanguis fluxis-  
set, nec sisti posset, ciatho uno succi plātaginis cõstitisse.  
Recentiores b aqua plātaginis vtunt. In aqua melius suc-  
rit aliquid dissoluere eorum, quę sanguinem sistunt, vt  
dr. trochiscorum de carabe, de spodio, de terra sigilla-  
ta, & eorum quę iam antea sepe enumerata sunt.

Loco pessulorum (quoniam mulieres non faciliē ad-  
mittunt pessula) lana vel gossipiû, aut mollior linteolû  
succo adstringente, uel plātaginis insuccat, & ita indi-  
gentialibus. Mulieres fingūt e puinca, quę iniiciūt cruri-  
bus. Laudāt ungulas asini, pelles anguillarû, pelliculas  
interiores nucis auellane, quę cū succo cydoniorû cogū-  
tur in pilulas, aut diluuntur in succo conuenienti.

Pessuli, si finguntur, teretes sint ac rotundi ad instar  
digiti e lana, bombace, aut conferto linamento, quibus  
medicamenta adstringentia excipiuntur. Deinde cõuol-  
uatur, uel serico raro, uel lineo linteolo. Pendeat e filo  
ut cum opus fuerit, retrahatur. Vtuntur epithematibus  
lumborum & crurum posteriorum, ex aqua plantagi-  
nis, fumach, uino rubro adstringente & similibus.

R. scorix ferri crematæ & in aceto extinctæ, deinde  
puluerisatæ, lapidis hæmatitis triti an. ʒ. ij. syrupi myr-  
tillorum

a Ad reuul-  
sionē obse-  
ram.

b At felici-  
us aqua us-  
camentorū  
salicis, suc-  
co rad. urti-  
ce albe, suc-  
co bursæ pa-  
storis atque  
lanceolæ. R.  
succorū  
depuratorū  
lanceolæ, bur-  
se pastor.  
rad. urtic.  
alb. unc. ij.  
sacch. q. s. f.  
syrupus.

c Ad regio-  
nē uenarū  
spermaticarū  
qua ad  
fundum ute-  
ri feruntur.  
Iisdem etiā  
partibus em-  
plastra ad-  
moventur e  
bolo, empl.  
contra ru-  
pnam un-  
guentū co-  
misse.



# DE MORBIS INTERNIS

tillorū & ros. an ʒ. s. aque plātaginis unc. ii. Fiat potus.

R. trochiscor. ambræ citrinæ puluerisatæ dr. i. datur cum uino adstringente diluto modica aqua plātaginis.

R. sanguinis draconis, boli armenæ, ambræ citrinæ, coralli rubri an. ʒ. i. fiat puluis, deē ex aqua plātaginis.

R. boli armenæ dr. ii. coque in uino subtili subauste ro ad ʒ. ii. colatura bibatur. **Opiata.**

*a* Huic ad-

*des symphu-*

*enempha*

*ris cōseruā.*

*b* Ut anno

*50.45. aliis*

*serius, alijs*

*celerius.*

*c* Ut i natri

*cibus, quod*

*p uenā epi-*

*gastriā at-*

*que māmā-*

*riā sanguis*

*fiat a vā ppo*

*nos ad la-*

*etis genera*

*tionē.*

*d* Quod nul

*læ sint in his*

*reliquie par*

*tium sangui*

*nearum ali*

*menti.*

*e* Ut in mē

*lieribus be-*

*ne carnosus,*

*et propterea*

*sine incōmo*

*do uoletudi*

*nis non men*

*stualibus.*

R. a conferuæ uereris ros. ʒ. ii. sem. plantaginis dra.

ii. sanguinis dracon. boli armenæ an ʒ. iiii. ambræ citri

næ, coralli rub. an dr. i. cū syrupo de myrtillis fiat opia

ta. Datur castaneæ magnitudo sero & mane ante cibū.

Laudant puluerem e pectunculis, quæ e compostel

la & mari comportatur. lāspis, onix, id est, cornallina,

hamatites, corallus ruber prodesse ceduntur, siue in

puluerem redacta usurpentur, uel e collo pēdeant, ma

nui alligentur, aut supponantur mammis, distillatum e

conserua consolidæ maioris & limacibus ana quod suf

ficit. Aliquando ad stupefacienda deueniēdum est, ut.

R. philonii dr. i. boli armenæ ʒ. i. cum uino stiptico

fiat potus. Ablutiones ex uino austero, in quo saluia co

xerit, aut aliquid ex materia adstringente. Inunctiones

ex oleo rosarum, melino, uel in quo adstringentia co

xerint, unde & alia remedia ex alijs locis.

## De prouocatione mēstruorum.

Resistunt menses b ætate, c lactatione & iis prouocari non debent. Sunt quibus præter calidius & siccius temperamentum, præter frugaliorem uitam, exercitia maiora, uacuationes tum manifestas, tum inenarum ali sensiles, ut sanguinis uacuationem per nares, phleboto mias frequentes, & alia eiusmodi. Item in his d quæ d e Ut in mē longo morbo se confirmant. Alijs propter pinguedi lieribus be neni, in quam totus sanguis conuertitur. Nonnullis ne carnosus, propter gracilitatem & copiam sanguinis. Neque his et propterea commouendus mensis, ut nec bene carnosus, si qui sine incōmo dem/cessatione, mēstruorum nihil ostenduntur. do uoletudi Vnicum tamen est, e quod excipi debet ratio gene nis non men rationis. Nam ut mulier suppressa purgatione, ni stualibus. hil lædatur, quia tamen sine mēstruo sanguine, a generatio



generatio esse non potest, oportet quidem naturam a Hip. sect. alluefacere, ut sanguinem in uterum deriuat. Nam in 7. lib. 6. tur multis conceptum adiuuat bis aut ter detractus b lan- eni' d'v. guis in anno, sed iis maxime, quibus præ copia sangui- b Emalleo- nis menstrua resistunt. Huius rei author est c Hippocra lo. tes. Frequentissimum est, ut uel crassiore sanguine, uel c Hipp. lib. alioqui interceptis uteri uenis resistant menses: qua in d carnibus. re consilium est d Galeni, ut uena maleoli aperiatur. d Lib. de co Tria uascula detrahuntur aliquot post diebus, duobus, rand. ratio- tribusue. Balneum imperetur, in quo chamæmeli flo- ne per sang. res, origanum, maiorana, arthemisia, folia lauri, coni- missionem, za, baccæ iuniperi & lauri, e aliaque eiusmodi coxe- e libell. de rint. Statim à balneo f melicratum propinandum e pu tremore. legio, calamentho, & eiusmodi. Alioqui nostro more e Vt matris syriupus de hyssopo, prasio, calamentho, de bizantiis, caria, nepe- de duabus radicibus, aut quinque radicibus ad unc. i. s. ta hyssopus. cum aqua cuscute, decocto cinamomi, aut cassiæ liquo f Vt R. de- re ab unc. iiii. propinabitur. Quod si fortius uolueris, coct. puleg. castorei ʒ. i. aut eo plus adicies. Hac arte semper ex- e calamen- pertus est Galenus moueri menses, ut nihil inde mu- thi lib. ij. lier lederetur. Cucurbitulæ pubi, inguini, interiori fe- quibus addo- mori affigi debent. Purgationes conueniunt ex hiera mellis ʒ. iiii. picra, quæ hoc modo parari debet. hieme, æsta

R. g aloes succo trini dr. ii. spicæ, cassiæ lignæ, cina- te. ii f. me- momi, xyloaloes, radicis gentianæ, masticeis, asari, cube lior. barum ana Gr. vi. Gr. iiii. Omnia puluerisata incorpo- g Vel R. ca- rentur cum modico conseruæ anthos, aut borraginis, storei dra. i. propinentur cum uino albo tenui. dissolue in

Secretum est quarundam mulierum, uti cōserua bor uino albo, raginis dissoluta in uino albo tenui. Potest & pulueri fiat potus. hieræ aliquid agarici commisceri. Laudantur & pilulæ Mirificè cō elephanginæ, mastichinæ & similes. Laudatur quoque fert ad cien- dos menses. hæc purgatio.

R. Cassiæ fistulæ dr. x. pul. liquiritiæ dr. ii. croci Gr. Ceterum ad iiii. mellis anthosati dra. ii. dissolue in decocto cicerum obstructa li rubrorum. beranda e

materiam preparandam sic imperabis R. sabina foliorum M. s. cuius de coctioni adde syrup. de radicibus, aut capill. uen. unc. i. s. propinetur.



DE MORBIS INTERNIS

rum. Vacuato & bene purgato corpore, aliis remedijs utendum est. *Suspirus* a aromatum muliebria ducit. Fiunt autem cum baccis lauri, iuniperi, siccis herbis odoratis, cassia lignea, & aliis eiusmodi.

**a** Aphor. 28. libr. 5.

Sunt autem

suffixusaro

matum cau

te per infun

dibulum ad

ministran-

di. His enim

plerunque,

sicca uentri

culi intem-

peries cōtra

hitur, imo

uasa et cōy

ledones adu

runtur.

Infusiones ut prius, ubi biliosi & pingues humores sunt petroselino, porro, apio, alii smyrnio, styrace, melanthio, feniculo, utraque centaurea utendum est, & ad suspirus & olea comparanda & pessulos. Laudatur & oleum de ben, de nuce moschata, laurinum, de iunipero. Sunt qui genitrix floribus ad dimidium uas impleant, oleum chamæmelinum superfundunt, fideliter obturant uas fimo sepeliunt, aut reponunt in furno calido, si nantque efferuescere, quo oleo inguina inungunt & pessulo madefaciunt.

Optimum est imperare decoctione cicerum rubrorum coctorum cum radicibus petroselini, ut cum modico butyro iusculum paretur, cui, ut ferè consuetudo, puluerem cinamomi & tantillum croci insperges.

Laudantur quæ absynthii, cuscute, pulegii, calamenthi, mentastri, rubix tinctorum, sabine. Vinum album tenue colatum per manicam Hippocratis cum saccharo in aqua anthos dissoluto & tantillo cinamomi.

Hermodactylos scribit Mesue non habere par remedium in mouendis menstruis & foetu mortuo.

Fortes quoque sunt trochisci de myrrha.

**b** Conserua

borraginis,

in uino al-

bo dissoluta

mirificè mē

strua & lo

chia ciet.

R. b myrrhæ electæ dra. i. lupinorum optimæ trito rū scrup. v. foliorū rutæ, mēastri, pulegii, cumini, rubix tinctorum, serapini, opopanacis ana scrup. ii. Formetur trochisci pondere dra. ii. Detur unus mane cū aqua in qua iuniperi semen coxerit, uel.

R. myrrhæ scrup. ii. assæ foetide scrup. s. cinamomi Gr. x. croci. Gr. ii. cum aqua rubix fiant pilule. Feniculi radix, melanthium, quod quidem præstantissimum est. Alii dant triseræ sine opio dr. i. cum decoct. cinamomi. Eodem modo mythridentium dari potest. In summa omnia, quæ magis calfaciunt, & siccant minus.

*Pessulus.*

R. olei nucelini unc. ii. pulueris gētianæ dra. ii. misce cum



cum bombace moschato in eo madefacto, fiat pessulus.

## SCHOLIA.

Mulierum purgantia per uterum quedam sunt multum inter se differentia, que tamen similitudine saepe saliant, ut species quedam Hemorrhoidum,  $\lambda\omicron'\chi\epsilon\alpha$ , spermatis corruptela, mulieris purgatio & menstrua. Nam ex rama illo uene caue due sunt propagines, quarum una Syluio epigastria dicta sursum ascendit per musculos rectos, ac mammae occurrit. Paulo supra altera propago ceruici uulue & ori inseritur, sicuti & sedi hemorrhoidis, unde fit consensus uteri cum mamma ob uiciniam sursum ac deorsum fluente sanguine ex utero in mammis, & contra. Ab hac propagine posteriore interdum fluit crassior sanguis non aliter, quam per hemorrhoidis. Aduertunt Virgines & grauidas hac uia aliquando purgari. Quod certe in grauidis magis necessarium uidetur post aliquod tempus ob actam illam colli uteri adstrictionem quasi nodulis quibusdam accurate, & artificiosè à natura instructa, ut ne in quidem specillum emitti possit, & ob acetabula è quibus sanguis destinantur alendo foetui. In uirginibus non tanta adstrictio. Que igitur fluxio sit ex his rebus eam ad menstruam purgationem vulgo referunt, cum tamen & partis, & uasorum, & sanguinis fluentis natura diligenter perspecta, Hemorrhoidum potius species quedam appellari debere videatur. Non enim nisi solo situ differunt, nisi dicas in grauidis veram esse purgationem menstruam reurgitante illuc sanguine, qui in capacitatem uteri per uenas & seminares uasis expurgari debebat. Sed cum hoc non sit omnino secundum naturam, & ex his que raro contingunt, id etiam ceteris, que uterum non gerunt, haudquaquam conueniat, nec ita certis & mensuris interuallis fiat, minus id uidetur consentaneum rationi.

Non ignoramus tamen ueram purgationem menstrua in grauidis fieri posse, sed diuerso modo, eoque duplici. Vno, primo mense per uteri capacitatem, quia adhuc os illius non ita constrictum est, cum etiam fiat superfœtatio. Altero, per alterum ramum spermaticæ iuxta hederiformem, que ad latera uteri descendit & hypogastrie occurrit. Sed unicuique liberum sit vocare ut lubuerit, curationem tamen eandem

propago posterior:

N.



# DE MORBIS INTERNIS

dem non habere perspicuum est. Curatur enim fluxus huiusmodi eadem ratione, qua hemorrhoides, praesertim quod attinet ad uenae sectionem. Nam retentis menstruis uena cruciata secatur, hemorrhoidibus suppressis interdum uena cubiti. Quod hic quoque observandum est. Prounde hi affectus distinctione opus habent λόχα quoque distinguenda, tum quod edito foetu tantum prodeant, tum quod comprehendat quicquid post factum & secundas exit à puerpera. Saepe etià à spermatis corruptela salacibus, uenere abstinentibus, uidiis & similibus redditur humor quidam crassus & ueluti seminalis in utero corruptus, uel sanguis grumosus, qui ad menstruam purgationem nullo modo referri debet. Quarta fluxio est illa, quam uocant muliebrem purgationem, quae quibusdam quotidie, aliis post mensium purgationem nonnullis inter duas purgationes contingit, uel à toto corpore, uel affectibus uteri. In hac excernuntur quaedam excrementa serosa, & ueluti ichores sine dolore, & in maiore quantitate quam pus ab ulcere. Quae colore intelligimus modo ab hoc modo ab illo humore uitioso separari. Nunquam enim fit absque cacoehymia. Ponamus igitur praeter has quatuor affectiões, Menses proprie dici quos Graeci καταμηνια uocant cum sanguis ille generationi & alendo foetui destinatus à natura ratis statisq; diebus semel in mense excernitur per uenulas è uasis seminariis in uteri capacitatem, non quod ab utero trahatur sed quia illuc mittitur siue lunae cursus, siue alia quapià prouidentia moderante. Unde non sine ratione multi contendunt neq; praeter naturam esse, neque excrementitium nisi si sola quantitate.

Nam si qua in eo maleficia reperiantur, quae Plinius recenset, ea corruptioni illius, & diuturniori in utero mora, cum euasis proprius excidit, accepta referri debent, aut mixtioni uitiosi alicuius succi, quod satius est, quam duas illius partes constitutere puriorem beneficam, & feculentam ueneficam. Neque enim probabile est hominem ueneno concipi, conceptum ueneno conseruari in utero in lucem editum eodem ali, nisi iam dicere uelis infantis corpus aut totum, aut magna ex parte uenenum esse.

Sana igitur mulieri (inquit Hippoc. 1. de Morbis mul.)  
sanguis

muliebris pur-  
gatio



sanguis menstruus exit interuallis uictimæ ingulate sanguinis similis, rubens. Effluit autem duarum hæminarum Atticarum mensura. Quæ non, ut Fuchsius Aph. 30. lib. 5. olei mensura æstimanda est, sed sanguinis, ut redeat circiter ad tres semisextariolos Lutetianos, natura tamen, ætate, & similibus perpensis. Id autem absoluitur duobus aut tribus diebus. Excessus et defectus in utro est. Illinc tenues fiunt, sætus emarcescit, aut parum uitalis est. Hinc si, uidelicet, minus quam tribus uel duobus diebus, & pauci, crassæ fiunt, nec facile concipiunt. Quæ plus habent sanguinis ad quinque, septem, quæ sanguinē crassum aut uenas exiles, ad plures etiam purgantur. Initio uero et fine pauciores et tenuiores; intermedia purgatione plures et crassiores, præsertim ubi multi fluunt. Aristoteles cap. 2. 7. de hystor. animalium moueri scribit de cumento luna, & hæc crescente colligi, unde cauillo sexum fœmineum luna tribuant. Aliter tamen sæpe experimur. Idem quoque uoluit mulieres quasdam esse, quæ concipiant, etiam si non fluant menses, quibus non plus est sanguinis, quam alius restat à purgatione. Sed haud scio, an id ex principis Galeni admitti queat. Constat tamen multas concepisse antequam passæ essent menstrua. Naturalis purgatio cessat 45. aut 60. ætatis anno experientia & iusta ratione. Incipit 13. 14. quo tempore cessat incrementum, & in quibusdam 20. ob pituitam, & sanguinis paucitatem. Ex his intelliguntur, quot modis menses præter naturam esse possint. Vel enim omnino supprimuntur, uel immodicè fluunt, uel tempore non conuenienti. Sanguis autem peccat in qualitate, quantitate, aut consistentia. In quibus omnibus peruestiganda causa, et an ob id morbose uiuant. Nam alijs debetur curatio, alijs præcautio, alijs conseruatio, ut pro ratione quadam peculiari temperamenti, aut causa morbifica semel in mense multis, alijs sæpius, quibusdam uno mense intermisso, nonnullis tertio quoq; mense prodeunt. Supprimuntur quia uel sanguis absumitur, uel retinetur. Illud fit aliquando in sicciore temperamento & calidiore, in pinguibus ob pauci sanguinis in pinguedinem conuersionem, uenarum angustiam, unde etiam non concipiunt, aut imbecillos pariunt. Id et fit in longo morbo consumptis, lactantibus am-  
diores



## DE MORBIS INTERNIS

diiores pueros, virginibus, exercitio multo attentibus, sanguine in nutritionem conuerso. In quibus frustra natura repugnans mouendis mēibus. Retinentur autē aut emersione utriusque discretionē osculi interioris, in quibus quoque frustra mouemus mēses, aut obstructione, quia sanguis crassior, aut acetabula muco plena, aut condensata substantia. Maxore quoque supprimit etiam quæ iam fluāt, et præ doloribus certū est. Tunc sanguis ferē tertio mēse incipit regurgitare in hepatis, caput, pulmonem, totum denique corpus, unde sequuntur idē ferē morbi, quos de Hemorrhoidibus diximus, ut utriusque suffocato, difficilis spiratio, uel ob plenitudinem uenarū, uel oppresso corde ab humore in pericardio. Si diutius, quā par sit, suppresione mēsiū ferat, uix curatur obductis et induratis meatibus. Immodicē silentiū signū certissimū est imbecillitas uirū. Hoc sit ut cætera fluxiones, nimia uasorum laxitate, ruptione, erosione ab acriore sanguine, imbecillitate partium, causa externa, in abortibus fractis uasīs, aut obstetrici angustibus irritato utero in partu, aut natura imbecilliore reddita ob uolentiā et similibus. Quæ omnia tū propriis tū cōmunibus cæterarū fluxionum signis exquirenda sunt. Sanguis qualitate peccat, si male coloratus sit, quia, ut uult Hip. colore similis non est sanguini recens mactati animalis. Albi, sumosi, lotura carniū similes à pituita: pallidi, flauī et acres à bile: nigri, crassi, pauci à melancholia. Iam atra bilis est, cū ueluti acetiū terrā effusi radūt, fermentat et grauiter exulcerant. Alii carbonculo similes, caliginosi, acres, turbati, falsi, purulenti. Quō magis à naturali constitutione recesserunt, eo periculosiores. Fluxus albus prouentis magis: rubens iunioribus, solum utrisque. Aristoteles uult puellis albos fieri, unde extenuantur, præsertim si uictu humidore utantur, sicque incrementum prohibetur. Alio loco saniosas purgationes et humidiores puellis: senibus paucas, crassas, nigras, quæ faciliē concrecant, mediā aetate medias. In quo non uideatur consentire cum Hip. Et autē ex sanguinis colore humor peccans interuoscatur ex aelē, Hip. iubet substrata arena in sole superfundī menses, aut linteo excipi et siccare. Nā biliosi, pallidum: pituitosi mucosum, grumosum, pelliculosum, albidū colorem relinquunt. A melancholia



lia nigri, walde splendidi, paucissimi. Sed & anteafla uita, temperamentum corporis, etas, omnia consideranda. Tardiores crassiore materia pauciores desatione et preclusionione acetabulorum, osculi uteri, e contrario, plures. Sed et frequēti conu copiosiores fiūt. In omnibus colores fœdi. Quid tamen uitiū aliquādo simplex est suppressis mensibus: aliquando affectis uisceribus et corpore: nōnūquā malo naturali cōtracto ante tēpus mensiū. Quod ad curationem ab agro sciscitari oportet.

In cachexia sanguis generandus: in obstructione medicamenta aperientia, sanguis ad uterū trahendus cucurbitulis circa emunctoria. Sanguinis missio ex talo, poplite, ligatura in coxis, frictions, linimenta, suffitus, unguenta, syrups aperientes, incidentes, attenuantes, pessaria nuptis, oīa tpe quo fluxuri sunt. Hoc præcepto perpetuò obseruato, in omnibus morbis qui fiunt per consensum, partem primariò affectam primo loco curandam esse, & causam sine qua non remouendā: In locū missionis sanguinis succedit catharticū, fit enim affatim, & plus e corde educit, unde uirium maior delectio. Sed longē utilior. Vomitu & narium profusione leuantur à natura. An id medico imitandum? Ad redundantem sanguinem respicienti licet: ad menses mouendos, minimè. Nisi suppressis mensibus oriatur morbus, qui uenæ sectionē requirat e superioribus. Tunc uena secatur e cubito. Ut enim natura uīs interclusis per oppositas partes, aliquādo puicinas multitudinē uacuat: ita licebit apto cubito multitudinē tollere et morbo mederi: malleolo secto, sanguinem trahere. Neq; natura imitator semper esse debet medicus, sed minister in quibus ipsa nihil pōt, ut cucurbitulis affigendi, ligaturis, uenæ sectione. Natura uero id quod cōmodius est, sequi solet in his que pōt. Cu itaq; uenæ p uenas brachii aptas nō pateāt, alias, quas sequi pōt, aperit. Contraria oīa fiunt in sistendo. Reuulsio, sanguinis missione e mediana: cucurbitula in circuitu mammarum, ligatura in brachijs potius, quā digitis, quia per plures uenas fit attractio, & iter breuius.

De uteri a præfocatione.

Cap. LVIII.

**M**ulta ad hanc rem ex capite 5. libr. 6. de locis affectis, & Aetio colligenda sunt. Vocatus in paroxysmo primū an b uiuat mulier, cognoscendum ducatur.

X

est

a. De suffocatione hysterica, quā alii strangulationē appellant.

b. Interdū enim mortue similis uidetur, q̄ spiritum nō ducat.



# DE MORBIS INTERNIS

a Ab impedi est. Nam sæpe fit, ut grauiore a accessione interean-  
 tis respirandi aut nõ aliter iaceant, quàm mortuæ. Infidele est signi-  
 istrumētis. uitæ, quod flocis naribus admotis, uel uase pleno aqua  
 b. Vt helle- imposito, regioni stomachi, colligentur. b Sternutato-  
 boro et pyre rijs potius de uita cognoscendum. Secundum est, ut cau-  
 thro nari- sam cognoscamus. Causæ sunt, Menstruorū suppressio,  
 bus admo- spermatis corruptela in nubilibus, uirginibus, uiduis,  
 ris, aut imis & ijs mulieribus, quæ natura sunt salaces, & præter cõ-  
 so puluere, suctudinem non miscentur uiris. Aliquãdo humor qui  
 aut et pēna. dam crassius & ueluti seminalis utero c collectus cor-  
 c Et eius cor rumpitur. In tali causâ præfocationis uteri, in paroxys-  
 ruptione hy mo extremorum uincula, d. frictiones maximè crurum  
 sterica fit ex sale & aceto uel similibus. Odorata, e utero: graui-  
 suffocatio, ter olentia. naribus admouenda sunt, male olida ut ca-  
 sublati re- storeum, galbanum, f. gagates lapis, capilli hominis, as-  
 spirationis sa scetida, plumæ crematæ, cornu cerui, cornua reliquo-  
 usi propter rum animalium cremata, euphorbium. Quæ omnia ex  
 oppresione cipi possunt pice humida, uel in puluerem redacta gal-  
 diaphrag- bano & rebus eiusmodi. Huius rei causam repetes ex  
 matis. problem. 60. Aphrodisei. lib. 2. Odoratâ uerò, quæ ute-  
 d Vt excitē ro admouentur, zibet seu ciueta, bombax muscatus, aut  
 tur spiritus coston musco conspersum, oleum musco perfusum, gal-  
 et excitetur lia muscata, alypta muscata, caryophylum, & similia.  
 humor ad R. alyptæ moschata scrup. ii. ligni aloes, caryophyl.  
 excretionē. an. scrup. s. aut scrup. i. moschi ambræ, an. Gr. iii. exci-  
 e Vt in sinu piantur oleo de spica. Aliud.  
 pudoris im- R. galliæ moscata dr. ii. cinamomi, folij, macis, ca-  
 mittantur, ryophyl. an. scrup. i. ambræ, moschi an. Gr. iiij. labdani,  
 est uteri cer styracis an. q. i. cū aqua rosata moschata fiat, ueluti sup-  
 uicem. positorium, quod indatur genitalibus. Pulueres eius-  
 f Nisi mu- modi aliquãdo inspigimus oleo costino, de spica, lauri  
 lier sit epile no, de lilio, ut inde intinctis digitis g. obstetrix affricet  
 psia obno- os uteri in uirginibus: in alijs et interiora. Et ut à paro-  
 xia. xy lmo excitentur, uellicadē aures, nares, sed maxime  
 g Vidi Gale pili, qui pudendis adnascuntur. Aliquando etiā piper  
 nū c. 5. li. 6 zinziber, sal gemmæ & alia eiusmodi pudendis immit-  
 de locis mi tuntur, ut naturam irritent ad expresionem. Et quia  
 le affect. magna ex parte plenæ sunt uentorum, glandulis, cly-  
 iteri-



eribus, unctionibus, quæ status discutiunt, utendum  
fit ex capite de colico dolore.

Excitatis à paroxysmo nullum remedium melius  
parito. Alioqui si retenti menses in causa sint, emoue-  
re oportebit ex proximo capite. Et si humor crassus,  
purgationes conueniunt. Imperabis igitur hieræ diacol.  
scrup. iij. aut infusionem dr. i. s. agarici trochis. uel. dr.  
i. pulueris hieræ picræ. Alioqui.

R. terebinthine lotæ in aqua matricariæ unc. s. sem.  
lauci, agni casti, cinamomi an. Gr. viii. cum modico con-  
seruæ anthos fiat bolus. Aliud.

R. terebinthinæ dr. iij. agarici trochiscati scrup. 2. se-  
minis dauci, cannabis, ligni aloes an. Gr. viii. cum eadē  
conserua fiat bolus.

Purgationes per interualla repetendæ sunt, sed pau-  
latim imminuto modo. Laudatur castoreum per inter-  
ualla datum. Hoc autem uariis modis vtuntur. Nam in  
paroxysmo dissoluimus in aceto acerrimo & naribus  
ad mouemus, uel eius scrup. ij. aut dr. i. exhibemus cum  
aqua distillationis radicū dauci uel arthemisiæ q. s. Ace-  
tū scylliticum, uel in quo pulegiū, calamentum, thy-  
mum, organum, coniza coxerint naribus admotū uel  
etiam potum adiuuat, etiam si uterum lædere uideatur.

Laudatur ab antiquis succus & semen plantaginis.  
Cinamomum, lignum aloes, semen dauci, cannabis, ru-  
tæ, agni casti, radix nimphæ & quæ semen extinguunt.  
Vomitibus, sternutatio, cucurbitulæ, primum quidem in  
guinibus & coxis deinde ilibus cum multa flamma af-  
fixæ. Hypochondria quoque fasciis deligata & constri-  
cta. Glomeres fili anethino feruenti inculcati & calidi  
alternatim appressi pectini. Laudatur puluis conchulæ,  
seu blattæ byzantiæ & pectunculorum.

Post alia quoque remedia dropaces & sinapismi ex-  
tremæ spinæ & ventri appositi. Balnea naturalia, fre-  
quens coitus, unctio ex oleo dulci, in quo semen agni-  
casti cinamomi contracta omnia coxerint, ut eo semen  
& lumbi inungantur. Adicitur aliquando pirethrum,  
piper & similia. Sed incunda ratio habitus corporis, tē-

X 2 poris

X.

Remedia hy-  
sterica suf-  
focationi  
quæ fit à se-  
minis corru-  
ptione dica-  
ta.

Castoreū

unctio.



DE MORBIS INTERNIS

poris, anni & reliquorum. Similiter clementer agendum est eum pregnantibus.

a. Nunquā  
enim uenā  
secabis in  
suffocatio-  
ne hysteri-  
ca, à semi-  
nis corrupti-  
one.

Quod ad phlebotomiam attinet, a. suspectum remedium est, nisi cum supressi sint menses. Tumque condico, quo in mouendis mensibus. Si quidem nigella mulier est, malleoli venam phlebotomo aperies: sin alb & mollis, uel sacrificatu vel sanguisugis uteris.

SCHOLIA.

Υστερήσις πνιξ, Græcis dicitur uteri suffocatio, cum uterus sursum ascendit, uel quia inflatur & intumescit, uel quia plenis uenis, quæ ad uterum pertinent, reuellitur, in qua passione, ne motu, sine sensu quasi mortuæ iacent, frequentiusque uidetur et malè purgatus ac sterilibus accidit, & inuenculis ad vener procliuoribus. Vnū commune symptoma est, defectus respirationis, non quod strangulatur, ut inquit Galenus, quia nihil est, quod spirationem intercipiat, sed quia ita inflatus uterus primū intestina, deinde mutuo contactu uentriculū et diaphragma comprimit adeo, ut dilatarī nequeant. Atque ob id non loquuntur, quia aeris satis non attrahitur, aut extrā propellitur. Alii id referunt ad frigiditatem humidi & frigidi seminis totū corpus refrigerantis, ut sic transpiratio per poros illis sufficiat. Quamquam in nonnullis hæc constant, & ratio, pulsus languidus exiguus et aliquando nullus. Sed quia ut etiam maximū cum corde per arterias habet consensum, cum cerebro uero per spinæ membranas & nervos, horum membrorum actiones uariè lauduntur admirandaque; subsequuntur symptomata, præsertim sublato tetro uapore sursum ex causa coniuncta ipsius affectus. Cum accessio imminet, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallor quidam faciei. Hinc sopor grauis, mentis desipientia, sensuum interceptio, a phoræ, crurum contractio et simil. Quibusdam risus, alius lachryma, alijs utrunque, ut D. de Rochepot quæ cum uaricosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio, risu, lachrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis: hinc lachryme, à quibus est monita non cessant. Sed nihil admirabilius, quam quod duabus filiabus Præsidis Rhotomagensis contingere solebat in motu sursum uteri, quo interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam & horas duas imminente paroxysmo capiebantur, quem neque metu

casus admirabilis.



uelto, neque hortatu, neque aliis artibus poterant compe-  
escere. Partibus interrogata & obiurgata respondebat se  
non posse continere risum. Aliis prius lachryme, deinde ri-  
us mouetur in eodem affectu. Sunt quæ magnam ducunt re-  
pirationem, in quibus necesse est nullam fieri compressio-  
nem stomachi & cordis, sed materiam aliò ferri. Inclinate  
necessione humiditas quædam è locis mulieribus prodit, uen-  
ris strepitus, laxatio uteri. Circuitu quodã redit morbus, hye-  
ne præsertim & Autumno. Cause sunt refrigeratio uteri,  
permatis corruptela, humor quidam crassus & ueluti semi-  
ualis in utero corruptus, grumus, menses suppressi, laugatus  
& nimium uacuatus uterus. Sic enim ad loca humida sese  
conuertit, & è capite ac reliquo corpore immodico labore sic  
catus trahit. Id quoque grauidis fieri potest inopia alimenti  
sicciore facto utero & concalfacto labore. Eodem modo è de  
fluxione pituitæ à capite in præcordia, & inde impedito re-  
spiratione, utero ad humiditatem concurrente. In remedijs  
hæ omnes cause distinguende. Alij aiunt uacuato utero, ut  
per immodicam mensuram fluxionem, aere uterum repleri et  
ita inflari conueniente collo. Gravis etiam odoribus ad naves  
quibusdam ascendit.

Præfocatio uteri cessatione mensuræ naturali 45. anno, uel  
50. uel cessat, uel ingrauescens interficit. Descernitur primò  
à syncope pulsu, sudore, pallore, odoribus adnotis. Nū hic pul-  
sus est aliquis, licet languidus, sudor frigidus nullus, minor  
pallor, & odorata nocent, nisi admoneantur inferioribus. In  
Syncope contraria oīa. A Catalipsi uerò, quia rigor nullus  
aut refrigeratio, qualis in corpore gelu concreto, nec oculi  
aperti & similia. Ab Apoplexia, sensu. Sentiant. n. cum pū-  
guntur, licet obtusè. Ab Epilepsia, quia corpus nō cōcutitur.  
A flatibus fieri intelligimus, cum uenter intumuit.

Remedia sunt, odores fetidi sursum admoti, ut bituminis,  
castorei, galbani, picis liquidæ, pilorū combustorū, rutæ, cæ-  
parū, aliorum: grati uerò deorsum utero, uel ad coxas, ligatu-  
re dolorifica in inferioribus partibus, cucurbitule in ingui-  
nibus, pessaria trahentia, emplastrū ceroneū. Vbi frigiditate  
& inde dolor, confect. anææ, quæ etiam conceptum inuat,  
preciosissimum suffumigium.

cāg

quod grauidis  
curniat utri  
stragulatione.

pro dolore uteri  
& frigiditate:



ut ha par  
tes debiscat

perinde ac  
callosa aqlo

nia tepesta

te manus.

Ad infrin

gendam sa-

mei acrimo

niam & ul

cus deter-

gendum.

c. Vel un-

guento dia-

pompholy-

gos item ex

cerusa pom

pholyge, adi

pe suillo &

aqua plāt.

d. Rudior

indigesta q;

moles in uie

ro ex semi-

nis uitio si-

ue effœtia

ui & san-

# DE MORBIS INTERNIS

Ad Ragadas.

Cap. LVII.

**R**agades ulcera sunt a ani & uteri deducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, nonnula cancrofa & feruida. Saniosa primum b. ablues sero-  
tis, mulsâ: deinde cōsolidabis tetrapharmaco in ros-  
ceo dissoluto, medicamentis ē lythargyro, c calcitio  
& metallis. Callosa remollies cēsyro humida, radice  
lij, iride ilirica, quam excipies terebinthina. Alioqu  
uitellum oui allum cum lacte muliebri subactum imp  
nes. Vbi feruet & cancri suspitio.

R. cerusæ. lotē, tuthiæ præparatæ & puluerisatæ pa-  
tes æqual. misce. Aliud.

R. succi portulacæ, lactucæ, plantaginis, psilii, horti-  
vnus unc. 3. Agitentur in plumbeo mortario pistillo  
plumbeo ad crassitudinem. Aliud.

R. ceratum rosaceum Galeni cum succo solatri, vni-  
guentum de cerusâ. de plumbo, quibus tuthia lota & in-  
friata comisceri debet.

## SCHOLIA.

*Parades fissura, uel rima, quibus partes musculose ueluti  
proscinduntur, ut labra quandoque & manus ex uehemen-  
ti frigore. Nascentur ex difficili partu & uiolento coitu: in-  
ano ex ui aliqua. Aliquando in causa est humoris acris af-  
fluxus, aut condylomatum inflammatio & distensio, rupta  
cute. Hec ulcera uel saniosa sunt, uel callosa, uel cancrofa.*

Conueniunt diapompholygos Nicolas mollitū liquido ce-  
rato rosaceo, ubi callus est, muscillagine & adipibus emollie-  
tibz si calor est, uitellus oui, succus cancrorum plātagnis,  
unguentum de cerusâ, de plumbo, lithargyro & similia.

De mola. Cap. LVIII.

**M**ola cruditas quædam est & d. coagulatio materiæ,  
quam naturalis calor confirmare non potest, uix-  
que curatur. Utendum tamen est primum quidem  
molliētibus, ex capite de Scyrrho. Deinde iis, quæ par-  
tum eiiciunt & foetum mortuum excludūt, quales sunt  
trochisci de myrrha, hermodactili & alia eiusmodi.\*

## SCHOLIA.

*Ea est naturæ prouidentia, ut calor opifex & formator eo-*

rum



rum quæ generantur, nūquam sit otiosus, sed quamlibet materiam in opus aliquod miro artificio ducat, quaecunque tandem sit. Sic Aristoteles in putredine uermes generari scribit, cum humidum substantificum, in quo calor insitus est, dissoluitur, & extra calore externo illectum effluit. Tū enim calor in exitu, ne proprio subiecto deserto intereat, quicquid est benignioris materia colligit, eamque effingit in animalculum aliquod, in quo conservari queat, pro quantitate et qualitate illius materia, ex qua nihil maius efficere potest. Quod si eā quasi pro arbitrio tractare nō possit, quia aut copiosior, aut minore copia, aut ex diuersis generibus cōstās, minusq; sequax, mōstrū generat, si quidem aliquid perfectius non licet. Sin inepta omnino sit, aut herbam aut aliquid adhuc rudius efformabit, inducta quā maxima fieri poterit perfectione. Natura enim, quæ in perpetua indiuidui successione cōtinuatur, longe satius est creare aliquid, quā nihil. Hoc idem nostra quidem sūa in utero generationi à natura destinato fit, à spiritu illo gignituo et calore, quem nō sine rōne sui domicilij architectum ueteres Philosophi appellarunt. Materiā enim cōuenientem et tractabilem si repererit ex utriusque sexus semine, sœtum pulcherrimū ad utriusq; exemplar diuinitus fabricatur, aut uni magis, quā alteri similem pro rōne materiae et uiribus imaginatricis facultatis, tāquā optimi moderatoris. Si uerò ipse imbecillior sit materia aut subiecta qualitate, quātitate, consistētia, aut mixtione alicuius extranei, ut sanguinis crassi aut alterius succi uitiosi ineptior ad tātā perfectionem, aliquid tamen, ne nihil, generat siue animatū, siue rude & expers uitæ. Vidimus mulierem, quæ cū nouem mensiū spatio uterū gestasset, oībus, quæ in legitimo partu euenire solent, mirificè respēdentibus, tandem nihil aliud præter animalia quædā ranis haud absimilia cū multis purgationibus cruentis et corruptis in lucem edidit: aliā, cui carnea moles in formis exiit cū sœtu, ueluti superfœtatione quadā. D. Valerius multas habet & admirādas in huiusmodi partu observationes, curationemque pulcherrimā de mola, cui partus quatuor mensium erat alligatus, cū ipsa iam pro uero sœtu nouem mensibus in utero latitasset. Qui quia materiam



## DE MORBIS INTERNIS

hanc copiosissimè & doctissimè tractat, longiori demonstra-  
 tioni super sedendum putamus, summā generationis tantū cō-  
 plexi. Primū carnem hanc informem & tanquam exiguum  
 quoddam chaos non eodem modo quo uermes, in utero gene-  
 rari à calore tantū cōquente & humore crasso ac uisido,  
 sed ex semine & uiri & mulieris efformari à spiritu illo gi-  
 gnituo. Indicio sunt mēbranae, quibus aliquādo integitur li-  
 gamenta, supersētatio fœtu alligato, incrementū, motus qui-  
 da tremulus cum tumore uteri. Quae omnia cōcepti fœtus spe-  
 ciē per initia exhibent. Neque unquam quisquam sine coitu  
 concipi obseruauit. Causa igitur efficiens erit spiritus ille,  
 qui opificis uices gerit: materia, semen cum multo crasso &  
 spisso sanguine menstruo concreto & indurato: uel (ut ait  
 Hipp. de sterilibus) morbosum semen uiri & modicū, cū mē-  
 sium copia: forma, modo profectior & animata (nam & ani-  
 malia illa speciem quandā molē, quod eodem modo, iisdemq;  
 de causis generentur, esse putamus) modò rudior & expers  
 uita, licet augeatur & increseat. Galenus scribit fœtū ita in-  
 formari in utero, ut primū uiuat tanquam planta: deinde  
 ut brutum: postremò ut homo, nō quod tot simul formae in ho-  
 mine contineantur tanquam Gerione quodam, sed quia cum  
 quatuor sint naturae perfectiones, Esse nimirum, ut in elemē-  
 tis: *U*uere, ut in plantis: *S*entire ut in animalibus: & *I*ntel-  
 ligere, ut in homine: posteriores prioribus continentur, ut nu-  
 meri minores maioribus. *U*t enim unitas non est binarius, ne-  
 que binarius est ternarius, binarius tamen cōtinet unitatē,  
 & ternarius binarium: ita quod essentiā duntaxat habet, ne-  
 cesse non est ut uiuat, neque quod uiuit, ut sentiat, aut quod  
 sentit, intelligat. Quod tamen intelligit & sentit ut homo, ne-  
 cessariò & in rerū natura coheret & uiuit. Atque haec uera  
 ratio est cur ueteribus homo *μικρὸν ὄν* dicatur. Eius enim  
 forma ceterarum omnium perfectionē complectitur, siqui-  
 dem essentiā cum elementis, uitā cum plantis, sensum cū  
 animalibus, intelligentiā cum formis diuinis habet com-  
 munem. Cum igitur natura ita progrediatur, non ut ex spe-  
 cie aliam speciem procreet, ut ex planta hominem, sed for-  
 mam perficiat gradatim ascendendo, haud absurdum for-  
 tasse fuit neque à Galeni sententia alienum in hac porten-  
 tosis



toſa generatione idem fieri. Primum enim rudis quædā mo-  
les gignitur, in qua ſi natura uitio materie quaſi itinere in-  
tercipiatur, conſiſtit neque aliud quicquam addit. Sin ulte-  
rius nullo uitio repugnante progrediatur, paulatim perficit  
ut iam uideatur ſtipex, deinde animal. Cuius pro materie  
quantitate & temperamento uariè figura immutatur & cor-  
poris effigies. Hinc fortasſe ex molis aliæ rudiores, aliæ pro-  
pius ad legitimum ſætum accedentes, aliæ uariis animalium  
imperfectorū figuris effictæ cōſpiciuntur. Finis autem ſem-  
per eſt generatio humana nature, ad quam perfectionem di-  
uina illa facultas corporis noſtri architectatrix, uteri uitio,  
colluuiæ humorum, materie ineptitudine, & coloris imbecilli-  
tate præpediua, peruenire nō potuit, nonnunquā etiā altera  
to optimo ſemine ab acre externo, aut uteri intēperie, ut fri-  
gore. Locus generationis huius præter uterum nullus eſt. Tem-  
pus & reliqua ſcrè omnia, ut in legitimo partu. Hinc fit, ut  
in principio à uero partu diſtingui non poſſit. Menſes ſup-  
primuntur, uterus attollitur, nauſea & uomitiones incur-  
runt, motus in utero tremulus percipitur ſiue ſit à mola, ſiue  
ab utero ueluti inutile pondus excutere contendente. Quòd ſi  
animatum ſit, quicquid illud eſt, difficilius adhuc internosci-  
tur. Certiſſima ſigna ſunt, primū ſi tempus legitimi partus  
exceſſerit. Nā aliquando geſtatur mola decē, duodecim &  
plures menſes: aliquando toto uitæ ſpatio, ſepe furas expelli-  
tur primis menſibus. Deinde ſi motus inſtar lapidis percipia-  
tur à latere in latus, non qualis ineſt ſætui, qui calcitrat &  
circūuoluitur, neq; eo tpe, ut menſe 3. in maribus 4. in ſæmi-  
nis. Præterea ſāguis mēſtruus, qui in uterū delabitur, in ali-  
mentum non ita abſumitur, ſed corrumpitur, unde uterum  
peius affici neceſſe eſt & per conſenſum corpus uniuerſum.  
Hinc uentris tumor maior & tenſio, color ſedior, appeten-  
tia magis deiecta, grauitas difficilior, quam in uera impre-  
gnatione. Sed nihil adhuc certiſſus, quā ſi mammae tument  
ſine lacte. Si initio depræhendatur, non expectandum tem-  
pus partus. Sic enim ſæpe incurabilis eſt, aut onere grauata  
natura propulſatur, ſed exeundo interficit, aut dolores a-  
cerbiſſimos, ſymptomataque periculosa inuehit. Quibus Per-  
piniani uidimus mulierem nobilem interiſſe, cū mola  
geſtaſſet



# DE MORBIS INTERNIS

gestasset duodecim mensibus.

Curatur sanguinis missione, laxatis partibus foru, medicamentis aperientibus & his oibus, quæ abortum provocat.

**P**t ad dia Alioqui Chirurgia est opus, videndumq; an insideat ori ute  
gnosim, pro ri, an superiore parte, uel ad latera, ut remedia adaptes. Si  
gnosim & uel ante, uel post uerā impregnationem oriatur, fætū necat.  
curationem

De Hernia.

Cap. LIX.

11  
cap. 27

hernia,

b. Labore,

ictu, casu.

c. Leue di-

tributioni

chylī & se-

cretionī ster-

coris dicatū

quod à suo

mesareo di-

uulsum de-

scēdit. Quā

obrem ente-

rocele ferē

fit cæci inte-

stini prolā-

psu, quæ ni-

hil aliud est

quām apo-

physis quæ-

dā cum me-

terio mi-

nimè conne-

xa, & pro-

pterea abso-

lutè intesti-

ni dicitur.

Comm. in

sent. 3. sect.

4 lib. 6. Epi-

d. m.

**Q**uæ ad hanc rem pertinent, plurima capite 18. & sequentibus; libro 7. Cornelij Celsi. Multa quoque apud Paulum & Aetium.

Cæterum uinculum quoddam membranofum est, utrinque ab inguinibus procedens in peritonæum exporrectum, cuius robore peritonæum confirmatur. Atque hinc omentum & intestina. Relaxatum Herniam facit descenditque plus minusve intestinum & omentum aliquando in inguina, nonnunquam in scrotum, unde nomina Enterocèle Epiplocèle.

Aliquando b rupto peritonæo idem fit. Graue malum est, cum 3. intestinum descendit, intestinumque in scroto conuoluitur. Supprimuntur fæces, regurgitatque in uentrem. Testiculus erythroide tunica uestitur. Post hanc uerò adnata est darre: In superficiem extenditur folliculus genitalis, quod ἐσχος Græci, scrotum Latini uocant.

Inter erythroidem & darton, & inter testiculum & erythroidem, aut etiā in scroto aquosa sanies aut aqua colligitur, unde Hydrocele. Nonnunquam soli flatus Herniam representant. Id recēs natis puerulis sæpe cōtingit, facileque discutitur. Varicosus ramex, sarcocèle, testiculorum inflammatio, tumor & similia extra rationem Herniæ sunt.

Aquosa & uentosa Hernia remediis curantur, quæ descripta sunt in Ascite & Tympanite. In aquosa peculiariter laudatur emplastrum factum è recēti stercore uacino, & tertia parte pulueris boli armenæ, uel sang. draconis. Laudatur & semuncia pulueris è cremata radice brassicæ. Puluis is incorporetur adipe suillo uetere. Ad Enterocèlem & Epiplocèlè multa remedia sunt medica



medica, tum quæ per os sumuntur, tum quæ apponuntur. Sed in primis habenda ratio, ut quod decidit, repnatur. Quies ad multos dies imperetur, molli lecto decumbant pro ratione corporis, abstineant clamoribus. Et in a egerendo manum apprimant pubi & scroto, ne quid recidat. Fasciæ seu loculamēta scroti ex panniculis comparentur, sed ita compactis, ut solidæ sint. Optimumque fuerit materiam eiusmodi fasciarum ad stringentem materiam primum imbibisse. Possunt & ex ligno, ferro aut alioqui solidiore materia confici, sed ita ut interiori parte, qua scrotum contingant & inguina, molliori corpore inducātur. Laudatur succus iaceg b. utriusque. Datur singulis diebus manè, quantum testis capiat, cum modico uini albi, Ex eodem succo depurato iulep & syrupi comparari possunt.

Laudatur pul. & succus radicis consolidæ maioris, rasci, osmundæ regalis, sigilli salomonis, panis cuculi, radicis ualerianæ pul. 3. Datur pueris in lacte cocto, addito oui uitello, aut ex solo oui uitello. Succis utemur ut succo iaceæ eodem modo, sem. thlaspi uermibus terrenis, limatura chalybis, lapide (quem uulgo diamentha uocant) hepatica trita. Et hæc quidem probata multis. Herbula c est in sabulosis nascens: ramulos multos in terrâ spargit, folijs minimis & rotundulis, alijs foliolicatis ex uiridi flauescens, per ramulos sparsis, ad stringente gustu, ex qua succus expressus subinde affuso uino albo certissimum & aliquoties probatum remedium contra descensum intestini. Nam nouem diebus ita percurat, ut postea non redeat malum. d Facilis inuentu Autumno.

Ex radicibus Osmundæ regalis repurgatis sunt syrapi, qui huic rei conueniant. Radices eiusmodi in nigro uino austero coqui possunt, & inde emplastra faciuntur: quigi. Alioqui utendum erit emplastro Pharmacopolarum contra rupturam. Valet & lenticula aquæ trita & alligata, similiter & cicuta ualer, radix pētaphylli sicca tria dr. pondere ex uino data. Semuncia foliorum equiseti tritorum ex aqua calida. Parabile emplastrum ex unc. i.

bdellii,

a. Imo da  
da opera, ut  
fæces duræ  
non sint,  
sed molles.

b. Præfer-  
tim tamen  
alba.

c. Hæc her-  
niaria di-  
cta. Ab alijs  
herba Hol-  
leri.

d. Puerorum  
pudicula ex  
pane albif-  
simo in te-  
nuissimum  
puluerem

reducto &  
lacte confi-  
ciantur: qui  
bus mellis  
nonnihil ad-  
di poterit,  
ut alius fin-  
at liberius.



# DE MORBIS INTERNIS

bdellii, mane quidem subacta cum salua hominis: ne  
spere uerò, cum uino aultero. Radix cyperi, arnoglō-  
fæ, aristolochiæ longæ & rotundæ in emplastrum for-  
mata & trita prius, deinde data potui.

## Emplastrum.

\* Glutinis  
piscis.

R. mastichis, corticis thuris, nucis cupressi, myrrhæ,  
sarcocollæ, \*usblach an. unc. s. usblach in aceto dissolu-  
tur, reliqua trita, misceantur, extendantur in aluta:

E nucibus cupressi & gallis immaturis ad consum-  
ptionem coctis emplastra sunt parabilia, quæ in men-  
sem relinquuntur, nisi superueniat dolor. Liquor autē,  
in quo coxerint, potui datur.

Probatissimum Octauio. Balauftiorū unc. i. s. galla-  
rū 3. s. radicis asphodeli, radicis narcissi. Aut si hæ radi-  
ces desūt radices arnoglōssi & betæ loco psonatę ana.  
unc. i. s. coquantur in uino, tundantur in emplastrum,  
subigantur.

## Aliud.

Spumæ argenti uehementer combustæ unc. ix. aceti  
lib. 2. & unc. 3. olei cydoniorum lib. s. succi plantaginis  
unc. 2. Spuma argenti in aceto extinguetur, etiam dum  
feruens: deinde teretur, Tum adiecto oleo & succo, per  
petuo agitando fiat decoctio secundum artem, ut fiat em-  
plastrum, quod quidem diebus continuis adhibetur.

## Aliud emplastrum.

R. thuris, mastichis, sarcocollæ, acaciæ, lapidis hæma-  
titis, mummiæ, tracaganthi, gummi arabici, terræ sigil-  
latę an. dr. iii. boli armenę, galle, lithargiri balustio-  
rum, nucis cupressi, malicorii, aristolochiæ longæ &  
rotundæ, corticis olibani, rosarum, radicis utriusque  
consolidæ, orobi, filiginis, sambuci, cyperi an. unc. s. pi-  
cis naualis dr. ii. s. colophonæ, resinæ pini, terebinthi-  
næ an. unc. i. uisci quercini unc. i. s. cerę dr. 2. pilorum le-  
poris ustorum dr. 4. olei in quo ficus pingues coxerint  
unc. s. fiant magdaleones secundum artem, de quibus por-  
tio extendantur in aluta applicetur. Quod si his reme-  
diis nihil proficitur, ad Chirurgiam ueniendum est, q̃  
ex 6. Pauli, 7. Celsi & recentioribus colliges.

Sco-



## SCHOLIA.

Ad ossa pubis nō perforatur peritonæum, sed productio  
quædam illius descendit in scrotum, per cuius meatum uasa  
spermatica, arteria scilicet & vena perreptant ad testes, &  
per eundem locum ejaculatoria ascendunt, ut inseratur collo  
pudendi. In hac productione multi tumores fiunt, quos Græ-  
ci *κυστας* uocant modo in scroto, modo supra scrotum, qua par-  
te in illud descendit. Quorum omnium causa est uel flatus  
aut aqua ibi contenta, aut caro, aut tumor venarum varico-  
sus: uel delapsa pars aliqua ex his, quæ intra peritonæum con-  
tinentur, ut intestinum & epiploon. Idq; fit uel rupta peri-  
tonæo, uel relaxato & hiantæ. Ex omnibus autem intestinis  
solum ileon, in quo chylus semper continetur, procidit. Nam  
rectum in anum, cum relaxatur, descendit. Colum alligatum  
est renibus, & altius ascendit ad ventriculum. Ieiunna & te-  
nuia intestina sublimiora sunt. Ileon itaque tantum super  
est, uel cæcum. Neque enim de duodeno ulla dubitatio. Duo  
igitur in his affectibus, statim initio distinguenda sunt, an sit  
aqua, uel flatus, uel caro, uel varicosus ramex, in mulieri-  
bus, laxatio foraminis ligamenti descendens ad internam  
partem inguinis: an ileon delapsus, uel epiploon: nonnulli  
addunt masculos ruptos epigastrii. Deinde si quid descen-  
derit, qua parte sit, & an ruptione, an relaxatione, id fiat.  
Si aqua fuerit. Hydrocele: si flatus, Pneumatocèle: si caro,  
Sarcocèle: si varices, Cirsocèle: si ileon, Enterocèle: si epiploon,  
Epiplocele nominatur. A situ uero partium, Bubonocèle, in  
inguine: Oscheocèle in scroto dicitur. Quibusdam testiculus  
in inguen translatus imposuit, ut herniam crederent.  
Aliquando etiam hi affectus inter se complicantur. Sæpe  
uehementi imaginatione libidinis colligitur semen inter  
tunicas testiculi, ut videatur quædam esse Sarcocèle, aut  
hydrocele. In quibus omnibus cauendum, ne iudicando falla-  
mur: Primum in Hernia aquosa cognoscenda omnis aditus  
lucis intercludatur. & obiecta candela cerea, uideatur nun-  
quid pelluceat. Est enim liquando durities, quæ plenitudi-  
ne & tensione fallit, ut uideatur esse carnosæ, aut intestina-  
lis, sed pelluciditas fraudem detegit. Sed quia pelluciditas  
conuenit et flatusosæ, ad lenitatem respiciendum. Nā aquo-  
sa



## DE MORBIS INTERNIS

sa obscurior est & grauior, quàm flatuosa. Vbi constiteris de aqua, uidendum quo loco contineatur. Qua in re uetere satis perplexi & confusi uidentur. Galenus de tumoribus scribit in tunicis, quæ testes ambiunt, contineri. Paulus in corporibus scrotum implicatibus. Celsus integris membranis colligi: alij ruptis etiam & relaxatis. Alij modò intra tunicas, modò intra membranas. Si inter tunicas, uel inter summam & mediam, uel mediam & imam. De loco certò & ad prædictionem & curationem non est ambigendum. Nam aliquando in superficiali scroto continetur: aliquando profundius. Sed cum testiculus duabus tunicis insignibus inuoluatur, erythroide, quam sequitur Darton, ferè semper Hydrocele fit, uel inter has duas, uel in toto scroto. Hic totum scrotum intumescit sine rugis, uesica inflata simile. Illic tumor tantum in testiculo percipitur uideturq; rotundus & tensus rugato & laxiuiore scroto. Aliquando, ut Paulus scribit, peculiari quadam tunica humor ille comprehenditur, quæ supernascitur, ueluti atheroma quoddam aut steatoma, ut uideatur esse tertius testiculus. Quod hoc anno 1564. mense Decembri dum Lutetia hæc scriberemus, uidere nobis contigit in puero Typographi filio, in quo omnes tertium testiculum esse existimant. Adfuit D. Gabriel Danagneus Belignaceus uir Doctissimus, & cui plurimum in his omnibus nos debere fate-mur. Sunt tamen, qui asserant quibusdam familijs peculiare esse, ut tertium habeant testiculum. In mulieribus Aetius tumorem aquosum fieri scribit circa pudendi alas inflationi similem, debilem, mollem ut humor fluctuans appareat modò in una parte, modò in utraq; tantum. His perspectis de humoris natura cogitandum, an tenuis, an albugineus, an sanguineus & feculentus, ut naturæ humoris remedia adaptentur. Si egro uenter tumeat, symptoma est Hydropis. In Pneumatocele similia omnia, nisi quòd, ut dixi, perspicuitas & leuitas maior adest, quia dilatio fit à flatulento spiritu. Fit aliquando uel in quatuor uasis testiculos alentibus, uel in arterijs darton intercurrentibus. Ille durior, nec compressu digitorum euanescit, recipitq; curationem: Hic oppresso digito intra recurrit & euanescit, uixq; curatur, periculo ab incessabili sanguinis profusio imminente. Fit sine Hydrope, &

cum



cum Hydrope. Sarcocoele, tumore, duritie & colore ubique sui simili dignoscitur. Est enim tumor rotundus, oblongus, durus, formā testiculi referens, qui longo tempore pedetentim increuit. Quibus duobus ab Enterocoele distinguitur, quæ mollior est et repente oborta. Fit à carne duriore in aliqua scroti parte nata. Galenus ad scirrhum refert. Aliquando testiculi, aliquando nervi, à quibus testes dependent, indurantur, aut inter tunicas caro illa generatur. Causa sunt, fluxio ictus, succisio ramicis non rectè curata, & similia, quæ scirrhos procreant. Girsocoele, id est, varicosus ramex, cum uenæ intumescunt testiculum nutriendes. Sentitur diuersitas tumorum & paruitas in epididymo & uasis spermaticis, quæ sunt ueluti conglomerata & intorta. Paulus vasorum aut darts dilatationem chirsus, id est, varices simplici uocabulo appellat: eorum uerò, quæ testiculū nutriunt, chirsocelyn. Celsus ex loci uarietate quatuor differentias facit omnesq; uno nomine comprehendit. In Enterocoele signa sunt, Tumor mollis, repente natus. Augetur uel minuitur pro rōe materie collectæ. Clamore & cibi satietate crescit, frigore contrahitur, scrotum multum distentum apparet, magis in una, quàm altera parte. Tactu sæpe discernuntur excrementa indurata, nec excerni possunt, ut uideatur iliaca passio. Cum ad inguen retrahitur, murmur flatulentū percipitur. Quod fit, cum æger supinus tacet & quiescit. In Epiplocele percipitur ueluti strophium molliusculum, lubricum, inæquale: tumor paruus, frequēius in osse pubis, quàm scroto. Idē semper manet, siue à cibo, siue ante cibū, et quouis mō collocetur, aut huc et illuc moveatur corpus, nec intento spiritu adeo increscit. In his duobus uidēdū an ruptū sit peritonæum, an relaxatū. Ruptura fit in lateribus ossis ilium post saltū, ictū, uehementem corporis contorsionem. Initio tumor paruus, progressu temporis augetur. Paulatim enim magis disrumpitur peritonæum. Quæ tumore faciūt, in summa cute apparent, quia extra peritonæum dilapsa sunt, atq; à sola cute integuntur, magisq; supra scrotum. Dolor punctorius sequitur & quasi lacerans. Contrà in relaxatione. Tumorem enim efficiētia cū maiore renixi sentiuntur, quia intendunt meatum illum peritonei, per quem uasa & musculi cremasteres descendunt



## DE MORBIS INTERNIS

descendant, uidenturq; esse in secundo uase, quæ ubi in uentrem recipiuntur, tumor cessat. Si uel omentum, uel ileon remaneat in illo meatu, nec perueniat ad scrotum, Bubonocoele erit, in ipso nimirum inguine affectu consistente. In mulieribus fit ob sætis magnitudinem aut multitudinem. Alioqui raro hernia laborant, quod peritoneum firmitus continendo foetus habeant. Omnium periculosissima Enterocoele, præsertim si reduci nequeat intestinum. Sinistra parte adhuc grauior, ubi colum conuolutum desinit in rectum, & multa intestina tenuia incubant. Quibusdam inde singultuose febres, in quibus reposito intestino, mors acceleratur. In aliis non reposito, gangrena. Experientia etiam docuit paulo post mori, quibus uir reponitur.

Carnosa insignis non curatur, sed testiculus extrahendus. Neque Circocoele sed minus molesta est. Epiploë ob mollitiæ uix reducitur. Remedia adhibenda uacuato uentre à stercore et flatu, blando clystere aut medicamento. Inunctiones, sacculi, ligamenta subligaculum, decocta, emplastra. Extremum remedium in ferro. Alii aperiunt uentrem ad intestina, ut dissito retrahatur intestinum. Id fit supra ilia, uia ad uasa spermatica, quæ proinde separatur, & peritonei locus costringitur, non colligatur, ne impediatur generatio. Periculosum certe remedium, et sepe frustra tentatum. Ex quo gangrena oritur & mors, ut eundem in suburbio sancti Germani. Alii sectionem faciunt ad ilia. Ubi alligant productionem illam Peritonei simul cum uasis spermaticis. Deinde curant uulnus callo illic obducto. Alii id faciunt puncto uocato aureo in ilibus, quæ permeant uasa spermatica, ac ducta, & exceptis uinculo uasis illis et uicinis corporibus. Experimentum fit coirectato & deorsum tracto testiculo, ut intelligas, an sit uas spermaticum. Et certe si quis uasis illis non ligatis costringere posset peritoneum, neque testiculus excidendus esset, neque impediretur generatio. In aliquo quoque ramice si nihil efficitur fomentis, cataplasmatibus, emplastris, diæta, purgationibus, ad incisionem, punctiorem, cultellum, canterium actuale, potentiale ueniendum. Habita tamem ratione corporis, uiscerum, partis affectæ, & multis diebus præparato agro, ad mensem aut 40. dies adhibitis emplastris superiori parti, quæ humor defluit. Sectio periculosa est cultello. Multis gangrena inde mota, atque inde mors.

Melius



Melius cauterium potentiale & alia remedia. Anno 1555. a Arthritis  
 mense Martio in suburbio sancti Germani, nobili cuidam cui enim ex hu-  
 tello aperta hernia aquosa, unde in gangrenam, dolorem in moris mor-  
 tolerabilem febrem & delirium incidit unde mors ab omni. bisici copia  
 bus expectabatur. Exclusa multa aqua per urethram concit. & articuli  
 sa magna parte gangrene conualuit prater expectationem. imbecillita-  
 Cauendum quoque, ne assiduo fotu excoquatur testiculus & te nascitur.  
 corrumpatur, ut uidimus contigisse in aquosoramide. b Ad prohi-

De Arthritide. Cap. LX.

bendu mor-

**C** Vratio in a vacuando & roborando. Vacuamus & bisica mate  
 repellendo & diuertendo, & propriq uacuando in rie genera-  
 cautionem, & initio morbi etiā si Arthritis frigida est. tionē, et ad  
 Si quidem nihil aliud prohibet, detrahendus sanguis est. fluentis re-  
 Echio, id est, coxa uel crure laborante b. uenas brachij uulsionem.  
 diuidimus. Et, si quidem fluxio est a capite, a. mediam: c Ut hepa-  
 si a reliquo corpore a basilicam. tis et uisce-

d Hippocrates non satis manifesta ratione uenas rñ paratio  
 post aures aperit, ubi coxendix afficitur. Arabes uehe- habeatur.  
 menter laudant phlebotomiam ex interuallo annularis d Aph. 22.  
 & parui digiti. sect. 5. li. 6.

Brachiis laborantibus, deplendus sanguis est è crure rñ uacuando.  
 & hæc perpetuo secundum rectitudinem. In coxendico c Ut diacur  
 post phlebotomiam e brachio, uenā poplitis & malleo thamo, ele-  
 li incidere oportet. Multo magis, si sanguis in causa est. Etario de su

Quod si dextrum crus, dextrum item brachium la- corosarum.  
 boret, e sinistris membris uena secāda est. Si uero in om f Ut cassia,  
 nia membra dolor sparsus est, ex eo qui minus laborat. catholico sy  
 Purgatio. rup. ros. pal

In biliosa Arthritide & serosa Arabes e fortioribus lidarum la-  
 cathartici utuntur. Alii primum quidem leuioribus, ut xatio.  
 cassia: deinde fortioribus. Melius fuerit partē materiæ g Ad deriu  
 leui s pharmaco repurgare, quod est reliquū, partim g. tionē mæ:  
 urinis, partim sudoribus excludendum. h Nā meli

In pituitosa aliis magis ducenda, ut cum h. melan- dolicos ex  
 cholia in uitio est. Solo a potu lactis asinini & decoctio Hipp. serio  
 radicis graminis dulcorato cum modico saccharo. Cali purgare o-  
 de Arthritides internæ curant. Purgationes ex superio portet.  
 ribus repetendæ sunt, & maxime ex morbis capitis. Pe i Hip. li. de  
 Y culia affectionib.



# DE MORBIS INTERNIS

culiariter laudatur purgatio, quę sit hermodactylis. Gręcis & Arabibus pilulę sunt de hermodactylis paratę in officinis. Maiores, in causa frigida, minores in causa calida. Minoribus rhabarbarum: maioribus agaricum adiciēs, ut massę pilularū pro dr. i. sit, reliquorum scrup. Gręci hoc modo.

a Vel R.  
aloe, hermo-  
dactyl. my-  
robalan. tur-  
bith. coloci-  
thid. sapa-  
geni an. dr.  
vi. castorei,  
sarcocollę,  
opopana-  
cis, euphor-  
bię, rutę a-  
gre. an. dr.  
iij. cū succo  
brassicę f.  
massa.

R. a hermodactyl. unc. s. anisi, cumini, piperis cōmunis & lōgi, cerui medullę, sem. carthami an. scrup. i. moschi Gr. 2. cum aqua saluę fiat massa. Dosis scrup. 4. ex hydromelite. Arabes hoc. Hermodactylorum dr. 3. s. cumini, zinziberis an. scrup. i. trita incorporēt cū melle. Dantur cum aqua tepida. Hęc in pituita magis conueniunt. In biliosa singulis dosibus grana duo aut tria adcrij adici possunt. In biliosa hoc modo componunt.

R. aloes dr. i. dacridii Gr. xv. rosarum & diacydonii, sem. apij & fœniculi an. scrup. s. hermodactyl. dr. 3. masticeis dr. 2. rhabarbari dr. i. sacchari dr. 3. Fiat puluis, detur ex aqua calida.

Vtuntur electario de succo rosarū & diacydonio cathartico in biliosa. In pituitosa unc. s. turbith. gummosi in lacte cocti, ut expressio bibatur. Neq; reformidāt 3. i. dacridii cum saccharo rosato.

Comparant & pilulas ex dr. 3. sarcocollę, serapini uel opopanacis. Sed uidendum in usu fortium pharmacorum, ne æger macilento sit corpore, uirtute non ita firma, maxime uentriculi & intestinorum. Periculum enim inde fit, ne citetur Dysenteria. Et hermodactylus natura sua stomachum lædit. Propterea quidā ē ueteribus nō radice, sed herba eius utebantur: nihilominus adiectis, quę stomachum roborant.

Alexander loco hermodactyli coronopodia herba utebatur.

Plurimum laudantur hęc pilulę, nec stomachum lædunt.

R. agar. dr. i. nucis moschatę, zinziberis an. 3. s. infunduntur in aqua menthę. Fiat leuis feruor super calidos cineres. Materię expressę adde rhabarbari. 3. 4. pul. hierę diacoloc. dr. i. s. dacridii 3. s. cum infusione, fiant



sant pillulæ. Dosis dr. i. uel scrup. 4.

Quinque topicorum scopi. Topica sunt, ut a dolorē *a. Tempera*  
leuiant, *b* repellant, *c* coquant, *d* discutiant, *e* robovent. *tionē humo*  
Celebre iam olim, nunc ēt frequentatum remedium. *ris et habi-*  
*tus restitui-*

R. f. medullæ panis P. i. dissoluatur in lacte calido *tionē.*  
muliebri, bubulo, uel ouilo, cui adde croci dr. s. Et si *b. Incrassa*  
uehemens dolor fuerit & calor, adde opij a dr. i. ad dr. *do, acrimo-*  
2. plus minusve. *nium infu-*

R. tria g albumina ouorum bono agitata & despuma *gendo.*  
ta cum unc. i. olei rosati, misce, Lintoela in medicamen *c. Papasmi*  
to madefacta applica. Aliud. *mitificando*

R. cerusæ unc. 2. dissolue in aqua endiuix & modico *inducant.*  
aceti, fiat liquidum unguentum. Quod si ad narcotica *d Inaspecta*  
per doloris uehementiam deueniendum est. *bilem pur-*

R. ol. ros. unc. 4. opij dr. 2. incorporentur. Aliud. *gationem et*

R. butyri recens. unc. 2. mandragoræ subtilissime tri- *diaphoresi*  
tæ dr. i. misce. *faciendo.*

R. lactis muliebris unc. 2. opij dr. s. Alia sunt ēt alijs *e. Partem*  
locis descripta. Sola aquæ frigidissimæ perfusio, uel ni *nimirū in-*  
uis aliquando satis esse potest. *firmam.*

Verbasci flores & folia, lenticula palustris, psilium, *f. At incun*  
nymphaea, uiolaria, portulaca & similia trita p se, uel *te morbo su*  
cum rosaceo apponuntur. In calida, quibus leuiter di- *mes micam*  
gerentibus utendum est, ut cerato ex oleo chamæmeli *panis filigi*  
no, anethino, de lilijs & similibus. *nei q. s. ma-*

In frigida conueniunt oleum, in quo enula, aristo- *ceretur in a*  
lochia, gentiana, nepitha, rosmar. iua, id est, chamæpi- *qua rosa-*  
tys, saluia, maiorana coxerint. Lenius, in quo radix *cea, deinde*  
althææ, uulpes, uermes terreni coxerit. Laudatur & o- *coquatur in*  
leum raphaninum, aut in quo *b galbanum liquefactum lacte vacci*  
sit. Oleum de terebinthina, oleum expressum è granis *no f. cata-*  
*tritici, plasma. At*

si pars sit rubore suffusa, R. aquæ plantag. & solani lib. s. acetii unc. i. im- *buta splenio eo oxycrato*  
buta splenio eo oxycrato *partis admoveantur. Deinde parari po-*  
terit cataplasma ex folijs hyoscyami in lacte bubulo coctis, quod mirificè *proderit. g Ouerum albumina non aequè prosunt. Nam exitu prohibent*  
proderit. *humorem h. Imo Castoreum ipsi si dissoluatur in oleo lubricorum mi-*  
rificè confert ad frigidam arthritim.



# DE MORBIS INTERNIS

tritici, vel nuce moschata in lamina ferrea candente, quibus aliquando axungie commiscetur.

2. *Ut R. axungie humane lib. i. fol. lauro chamæpites, salvia, maiorana an. M. s. Coquantur in balneo marie. Deinde allinatur locus affectus. b. Minime tamen probandum est a. d. remedium si frigida sit a. thuris.*

Laudatur plurimum a humana & ursina. Oleum, in quo folia ebulli coxerint, uel succus radicis eius.

Sunt qui dolentem locum primum quidem frigidissima perfundant, idque diutius: deinde e petroleo fouent.

Quædam occulta proprietate profunt, quæ hæc sunt ossa comminuta potui data. De plume caput milui crematum & tritum, corium canis marini adnotum loco, corium torpedini, sterco, ut cum adipe ursino fiat vnguentum.

Pulli ciconiæ, pulli cigni in oleo costi, ut oleo medulla ceruina misceatur. Historia est Sexti Pompei, qui pedibus immersis acetuo tritici persanatus est b quod remedium postea Medici sequuti sunt.

In tophis caseus iuerteratus, acris, marceratus in decocto cruris suilli falsi, ut inde fiat emplastrum.

Sterco caprinum in oxycrato dillo lutum cum farina hordeacea. Sed hæc durioribus corporibus. In mollioribus axungie, radices altheæ commiscendæ sunt. Aliud.

R. collæ, id est visci, terebinthinæ, cere an. dr. i. galbani dr. 3. liquefactis utitor.

Vfus mytridatii & theriacæ post bene purgatum corpus.

Laudantur Græcis & Arabibus balnea, si nullum uiscus infirmum est: si vacuatum corpus, remissionis tempore minuta prius ægra parte ex puluere boli ar. Inueterato in oui albumine, uel hoc medicamento.

R. corticis granatorum, sumach an. P. 2. Coquantur ad mollitiem. Incorporentur cum P. 3. farine hordei & succi semperuini, applicentur loco. Hæc autem, ne balneo liquefactus humor deluat in partem infirmam.

Quibus remediis & in repellendo uti licet in fine morbi, & ad cautionem. Origanum, menthastrum, nepita in aqua salsa diu coquantur. Inde fit fons, vel vna parte salis tali aquæ, vel olei mixtis locus affricatur.

Abstinencia uini multos sanauit. Balnea quoque natura



turalia ad cautionem conueniunt.

Vere & Autumno podagræ excitantur, Aprili fere & Septembri. Itaque prius cauendum est. Humor ferè calidior Chiragræ: frigidior, Podagræ.

In a Ischiadicis uenæ sectio, ut prius, ita & purgatio.

Clysteres acres, cucurbitulæ loco affixæ. Repellentibus abstinendum. Fortioribus remedijs utendum, phenigmis, iberide, nasturtio, dracuntio, batrachio & similibus. Cauterio, incisione cum ferro, ut in Eupolemo Hipp. fieri oportuit. Hæc eadem reliquis arthriticis, ubi contumacius malum est. Inuentum quoque hoc remedium est, ut superiori parte, qua humor influit in articulum, caro nudaretur, uenæ hamulo exciperentur, uinculis interceptæ secarentur, atque ita uia fluxioni præciditur. Plurima remedia scripta inuenies apud Actium.

## SCHOLIA.

Ossa inter se connectuntur tribus modis in uniuersum. Vel inuicem coalescunt, modo sine alicuius materiæ interuentu, ut in mollioribus & fungosis: modo intercedente aliqua materiâ, ut in duris & siccis, p Symphysim. Vel ita cõmittuntur inter se, ut obscurû habeant & difficilem motû p Synarthrosim: uel manifestu & euidentem, p diarthrosim. In prima cõnexionione articulorû dolores nō fiunt. In secunda raro, nisi tophi & œdematosi tumores, ut in articulationibus carpi, aut metacarpi. Tertia Arthritidis sedes est, inter membranas, tendones & ligamenta, quæ oriuntur à periostio, et proinde sensum habent, ex quibus omnibus firmatur articulus. Vnde dolor uehementissimus excitatur, si quæ materia illic intercipiatur, siue acrimonia, ut bilis: siue frigidityte, ut pituita: siue asperitate, ut gypsea, siue distensione membranarû et ligamentorû, aut inflammatione, quod ab omnibus humoribus fieri potest sanguine, pituita, & utraq; bile cû proprijs symptomatis cuiusq; humoris. Oportet autem humorem intra ipsum articulum contineri, antequam uere dicatur Arthritis. Si enim uel sola intemperies adsit, uel humor diffusus per carnem partesque circumiacentes, diuersa

a Ischiadicos ut cures primò quidem (si nihil te auocet)

ijs uonitum imperabis, neque medi camētū par gās præscri bes. Deinde ad clysteres lenientes, hinc acres, ueniendum est. Postea uero cōma.

teria paginæ: dum est. At l mouendū i cataplasm i mater iā uide lib. 10 xatē 71- 80us.



## DE MORBIS INTERNIS

est affectio. Nam quod Hippus scripsit *Articulorum dolores fieri in siccitatibus*, id non est intelligendum de *Arthritide*, ut scribit Galenus, sed dolore & difficili motu, qui fit ab sumpta humiditate, nisi quis omnes articulorum dolores hoc nomine complecti velit aut eum locum interpretari de biliosa *Arthritide*, quæ fit immodicè calida temporis constitutione, aut sicca, quibus infirmis redditis articulis talis humor defluit. Imò Galenus, *podagræ* materiam contineri tantum vult in articulis & ligamentis quæ tenduntur, non nervis & tendonibus, quæ duntaxat ad tensionem alterum contenduntur, argumento, quod inde non fuit visa convulsio. Fluxionem enim humoris suscipiunt, primum quidam loca articulationum, deinceps circumstantia omnia usque ad cutem. Verisimile tamen non est materiam ad articulum confluentem imbibere durissimis ligamentis, non mollioribus nervis, & tendinibus. Proinde *Actius* non solum distendi, sed permollescere scribit. Materia hæc aliquando tenuis est, aliquando crassa vel tenax, nonnunquam simul & crassa & tenax, aut etiam gyssea resoluta tenuiore parte. Colligitur enim duobus modis, per affusionem ab alijs partibus, & per congestionem malè concoquente parte. Hæc naturam partium retinet, nisi quod moras & dolore incalescit, & aliunde novam materiam recipit. Per congestionem magis fit in morbo Gallico sine tumore, cum dolore totius periostij. Quæ fit per defusionem, ferè materiam mixtam habet, & distensione, ac calore concepto potius dolorem parit, nomenque accipit à parte affecta. In pedibus, *Podagra*: in manibus, *Chiragra*: in coxis, *Ischias*: in multis simul articulis verè & propriè *Arthritis* nuncupatur. Tria igitur hic consideranda, *Pars*, quæ recipit: *Origo fluxionis*, et *Via*, per quam fit. In parte necesse est imbecillitatem esse, alioqui, nunquam admitteret fluxionem. Ea contrahitur contagione seminaria à parentibus podagricis, in quibus semen erat vitiatum: deinde venere: Postremo consuetudine fluxionis et qualibet intemperie, aut laxitate. Non tamen necesse est, si adsit hæc imbecillitas, *Articularem* morbum generari, si invita eger nihil deliquerit, ut ait Galenus. Nam humor non influet, si corpus liberum sit cruditatibus. Unde etiam *Poete Greci*, *Podagram* *Bacchi* & *venereis filiam* esse sinxerunt.

Hippo-



Hippocrates quoque ob eandem causam Eunuchos, Mulieres, Pueros arte usum venererum Podagrâ non laborare dixit. Quod intelligendum est, modò temperanter uiuant. Notuit Aulher Eunuchum Podagricum, eumq; uehementer. Seneca quoque epistola quadam inuehitur in mulieres, quæ per luxum Hippocratem mendacem fecerint. Sed reuera Mulieres multo rarius eo morbo corripuntur, quam uiri, ob menstruum purgationem. Et si laborent sæpius menstrua defecerunt, vel pauciora sunt, quam prohibeas morbis conueniât. Alioqui uitam maximè immoderatam esse oportet. In pueris autem, cum ad pubertatem peruenierunt, naturalis est motus feminis, unde rari scit corpus & relaxatur. Accedite uenere, cœu sio, motus, cœu factio articularum, ex quo celerius eo materia decabit. Atq; etiam inde fit ut podagrici magna ex parte sint salaces, tum ob assuetudinem, tum ob frequentiorē nruorum rigorem atque intensionem. Adde quod crebro in dorsum decubitu humores ad partes genitales conflunt. Ob idque duo precipua remedia podagræ futura esse putamus, abstinentiam à uenere & uitam frugalem. Seminaria autem quatuor, Imbellicuitatem hereditariâ: Venerē: Vinū præsertim forte: & Cruditatem ex intemperata uita: Origo defluxionis est à capite, uel hepate. Illic intra tunicas tendonum per forame nuca pituita exudat, quæ per palatū aut nares expurgari debebat. Hic uerò cœu uenæ magnæ & hepar copia grauantur, quā continere nō possunt, aut irritantur qualitate aliqua uitiosa. Sic uel à plenitudine & redundancy uenarum fiunt defluxiones in articulos, uel à recrementis aliarum partium, ut cerebri. A capite autem defluxionem fieri intelligimus, si grauitas capitis & ceruicis præcesserit, sæp; q; frigus uel horror parus sentitur. A uenis magnis internis, si citra hæc dolor præhndat partem aliquam, sed cum febricula, uel aliqua inequalitate fiat, pars eudò intumescat, rubeat, doleat, ab una parte in aliam moneatur. Quibus autem uis fiat huiusmodi fluxio, non eadem est omnium sententia. Alii à capite sub cute materiam per summa corporis in extimas partes influere aiunt. Alii negant, quod cum sit fluxionis species partibus robustis ad imbeciliores suas excrementa transmutentibus, probabilius sit



## DE MORBIS INTERNIS

non solum secundum membranas nervosq; sed etiā per nasa, id est, uenas & arterias id fieri. Sed hoc ut uerissimum est fluxione orta ab hepate, ita minis consentaneum, cum pituita à cerebri uentriculis per spinalem medullam delabatur. Sic enim oporteret materiam e uenis egressam rursus uenas subire. Fluxionis modus est, quasi inundatio aluei & eluuius quedam in cavitatem articulorum, & partes uicinas. Sed cū per musculos fit transitus, dolor non percipitur ob laxitatē. Raroq; de fluxio sincera est à uenis, cum in his humores omnes contingantur. Sepius si uel à recrementis cerebri oriatur, uel per congestiōem fiat, humor sincerus est. Podagra fit modò in articulo maioris digiti pedis, modo calcanei extremo, aut cauo pedis. A pedibus paulatim ad genua progreditur hinc ad coxam & femorū iuncturas, postremo ad manus, uertebas humerorum & maxillarum. Coxendicus tamen dolor saepe fit multis, qui podagra nunquam laborarūt, fuisse à recrementis illius partis illic congestis, uel in eā tantum partem defluxis. Dolor profundus est, & cum mouetur crus, sentitur. Causa quandoq; est eluxatio, aut dissectio ligamenti, qđ à periostio nascitur. In mulieribus à partu, aut cū uterū gerunt, dolor in parte interna inguinis & magis ad interiorem partem, quā exteriorū, cōtinuus quoque sine crus moveatur, sine quiescat, nō est coxendicus, sed à ligamentis uteri ob flatū, retractionē, refrigerationem, contortionē uteri & similia. Humor uitiosus deprehenditur tribus potissimò modis doloris proprietate: antecedentibus ut uirtu, anni cōstitutione, etate regione, tēperamento: postremo cuiusq; humoris affectu. Mulius. n. humor distendit: acris erodit: calidus calefacit: et frigidus refrigerat. Qualis quoq; acris est, tales in corpore generat humores, ut et cibus, et tēperamentū, et atas. A sanguine color rubens, dolor pulsatorius, uel hemēs, tumor non solum uenarum, sed totius particule. Neq; refrigeratiō admodum, neq; calfacientia tolerant. Accessiones quotidianæ, minus diuturnæ, quā à pituita. A bilioso sanguine multū caloris sensus, irritatio à calidis, à mitigatibus remissior: color sub pallidus, sub rubens, quādoq; flauo pmixtus, nullus euidēs tumor. Si locus tēgatur, facili sanguis subterfugit, citius ab una parte mutatur in altā. Exacerbationes, ut pluri-

num



mum tertio quoque die. A pituita, color subalbidus, aque in  
tercutem similis tumor tactui cedit, dolor mediocris, sepe a De cancro  
nullus, exacerbationes quotidiane, diuturniores. A melan uniuersi cor  
cholia rarissime fit. Color partis niger, frigoris sensus, dolor poris aut tu  
profundior instar scalpilli pforatis, exacerbationes quarto bero so cor  
quoque die. Vere et Autumno magna ex parte mouetur dolo pore, quad  
res Arthritici, ut scribit Hippocrates in Aphorismis. Signa elephantis  
precedentia sunt, quod non tantum mingunt, aut sudant, quam sole similitudi  
bunt, et quod humor crassior est, copiosior, desiore membrana in nem fingit.  
clusus, aut imbecillitas maior, eo diutius durat huiusmodi dolores. b Signis si

Cura in praecutione et curatione distribuitur. Remedia gnificata  
uaria et ex alijs petenda. Admonemus tantum dupliciter hic proprius ex  
peccari in topicis admonendis. Primum, cum nulla de toto corpo quibus non  
re habetur prouidentia: Deinde cum digerentibus resoluta tenuio generatio  
re parte, calli, artuum durities, articularum curuitas inducun- uerum perfe-  
tur, aut pars affecla immodice calefit, refrigeratur, siccat, Ello signifi  
humectatur, aut fortiter attrahentibus materia copiosior e catur. Cuius  
uenis extrahitur.

De a Elephantiasis uera.

Cap. LXI.

Confirmata b Elephantiasis non curantur. Recens d  
curari potest et prohiberi. Recentem autem uolunt la et tabero  
quae annum non superat.

Sepiusque Medicus, ut de morbo iudicet, quam ut  
eundem curet, appellatur. Signis itaque de morbo e p  
nunciandum est. Temperamentum hominis spectandum  
est. Qui sanguine sunt crassiore, huic uitio magis op-  
portuni sunt et aliquando hereditarium malum est. Lo  
cis calidioribus, adultis, sanguis aut a frigore congela-  
tus hoc malum inuehit. A febribus continuis male cu  
ratis, ab usu alimentorum et medicamentorum quae me  
lancholiam gignant, aut pituitam crassam, quae nimium in habitu cor  
cidunt et attenuant, aut aliter calfaciunt, nonnunquam poris omni  
huius mali initium est. His piger sensus et motus no deprana  
spira- ta sit affimi

latio, in uisceribus corrupti sanguinis omniumque humorum perennis generatio.

d Mutatione dietae, uacuatione et alteratione.

e Ne contagione morbus ad alios seipat. f Ob generationem humoris  
melancholici perennem: quia abundant faece et facile sanguis affatur.



# DE MORBIS INTERNIS

a aspiratio retardatur. Durescit b alius, urinae c crasse-  
a *Oppressio* scunt ad instar iumentorum, aliquando tenues d mingun  
ne cerebri, tur spiritus e olet grauius f frequens ructus & g stertu-  
muscularu ratio incitatur, h libido incenditur, i concidit appeten-  
corum acta. tia crassescunt malae, mentum, supercilionum locus, cru-  
b. *Viscerum* ra & manus, x labia crassescunt, tabescunt, muscoli & is  
incendio et plurimum, qui medius est inter indicem & pollicem.  
humorum Fit corpus grandinosum. Sub lingua varicosee urinae ni-  
a. *appetit.* gricant, facies rubetur ad liuorem. Pili le capite & sup  
c Ex pertur cilijs decidunt, habitus corporis commutatur. m Fiunt  
batione i ue pterigo dos quasi allati. n Satyros representant. Som-  
nis a flatu- nia o molestissima p incubi, mœror & anxietas. Pulsus  
lento spiri- exiguus, imbecillus, creber, tardus, rubent oculi & in ro-  
tu cum calo- tunditatem coguntur, raucescit uox, narium pinnae di-  
re contrana- latantur inferiore parte, nares constringuntur. Dispnoea,  
turam. mollis auricula contrahitur.  
d *Viarum* Excrementa olida interstitium nasi corrumpitur, fixus  
obstructio- intuitus. Quibusdam detractus sanguis totus corruptus  
ne. non cogitur, Sal iniectum calenti & recens extracto san-  
e Ab aluo, guini non dissoluitur. Acetum iniectum sanguini non  
pulmonibus commiscetur. Si ad spondilia colli transfiguntur, non  
& cerebro. sentiunt. Perit tamen extremitatum sensus. Oportet  
f. Ab humo igitur uocatum Medicum, ut de re magni momenti pro  
re melanche nunciet, hæc signa omnia percurrere. Quæ ut aucta sunt,  
lico in aluū ita aucti uitii inditium est. Consilium est. q Galeni, ubi  
fluente et co eius mali suspitio est, ut Vere sanguis detrahatur, dein  
etionis infir de resectis uiribus exhibeatur medicamentum, quod  
mitate. atram bilem purget. Ratio uitæ instituat, quæ san-  
g. Aucto guinem crassiorem attenuet, ac depuret.  
symptoma- Vitato tamen immodico usu attenuantium ratione  
tis plethori uitæ ex Aetio & aliis colliges. Consensus est Græcorū  
cis cerebro. &  
h. A falsis humoribus & flatulento spiritu.  
i Alui impuritate. x Continuitate interioris tunicae, quæ aluo & libijs  
communis est. l Nam neque aluntur neque gignuntur.  
m Consumptione partis inferioris musculi trapeziæ. n Mutato faciei  
colore, charactere, mole, aurib. retortis. o Materia somifera corruptione.  
p Oppressi lienis tumore. q Gale. lib. 2. Ad Glauconem.



& Arabum initio detrahendum cum sanguinem. Sed *fumariae*, ue-  
quia magna ex parte corruptus is est, particulatim ex *ronica sco-*  
utroque brachio detrahes, eligesque maiores uenas, si *lopendria*,  
quidem uires patiuntur, multo magis cum spiratio dis *cetherac.*  
facilior est. Alioqui uenas *extremæ* manus, uel malleo b *Ad uisce-*  
li aperies. Nonnunquam etiam contentus eris sangui *rū collapsio-*  
sugis, aut cucurbitulis cum scarificatione apposis par *rum restitui-*  
tim tibiis, partim scapulis. Auicēnas uenas etiam capi *tionem.*  
tiis incidit & iugulares, si suffocatio imminet. c *Aquæ ge-*

A sanguinis missione purgatio ex hiera *diacolocyn-*  
thidos, deinde etiā adiecto *dacridio*. Postremo etiam *cocti sum-*  
elleboro, sed interuallis hæc fieri oportet. Quo tempo *rie, a grimo-*  
re cessamus a pharmacis, sero lactis, lacte etiam & his *nie, hetero-*  
quæ humores a præparant & deputant. Materia ex ca *curialis.*  
pite de melancholia. d *Hoc co-*

Postea uero frequens vomitus. Primum quidem le *mentū ridet.*  
uioribus: deinde raphano. Postremo elleborismo. Cu- *Gal. lib. 10.*  
cucurbitulæ b inanes stomacho & uisceribus admouen- *de simplic.*  
tur. Caput purgia, gargarismata, unctiones primum ut *med. facul.*  
e butyro: Deinde ubi pruritus est, ex iis, quæ detergent: e *Modò ma-*  
Postremo cum ulceratæ partes, conueniūt quæ leuiter *rasimus pe-*  
adstringunt. p *q̄ p̄ uos u-*

Balnea e primum dulcia. Persuasum d uulgo est bal *ueru te non*  
nea cōparata sanguine humano morbum hunc persana *auocet. Tū*  
re. Deinde si pruritus est naturalia conueniunt. In mul *enim tutius*  
tis remediis brassicæ & absynthii decoctum, stæcha- *decoctū ra-*  
dos, ligni e sancti commendantur. dicit *iucata*

Optimumque fuerit cum his passulas, ficus, uiolarū *imperabis.*  
flores, buglosi & borraginis incoquere. Multo magis, f *Sic enim*  
si feruidior sanguis est. f Castratio, ut singulae reme *retenta ma-*  
diū, ab antiquis probata est. Scrobes eboris, cornu cer- *teria sper-*  
ui, succus cyrenæicus, aselli aquarii, scyllæ semen & hæc *matica abū-*  
duo maxime cōtra dispnēā. Smaragdus trita, & ex aqua *dat qua par-*  
data, uel cum aqua & gummi illita. Erinacei caput lau- *tes solide*  
datur a Galeno, nepitha, qua co modo utendum erit, *fruitur et*  
quo ligno sancto, id est, cum passulis & cæteris. Lauda- *um scilicet*  
tur theriaca, quæ in calidiore conditione temperari po- *de asinuio*  
teli, adiecta parte cōseruæ uiolarum aut borraginis. Lau *nis de praua*  
dat *tio tollitur.*



# DE MORBIS INTERNIS

a Lege Ga datur vinū, in quo a uipera uina extincta sit. Viperarū  
lenum c. 1. carnes abscisso capite & cauda ad putrilaginem coctae  
libr. 11. de cum iure albo ueterum, uel iis quae huic morbo conue  
simplic. me niunt, ut & carnes edantur & iusculum sorbeatur.

dicamento- Alioquin nō tā suspectū remediū, si pabuli caporū &  
rum facul- gallinarū iusculū illud & carnes misceantur. Sētes pene  
tatibus. trasse uirus, cū plumae decidāt a uibus, tūq; aues ad cibū  
elixabis. Sed theriacae & remediorū usus magis tēpellū  
uus à thermis cōparatis ē fumaria, borragine, endiuia,  
nepitha, rosmarino, origano, meliloto & alijs eiusmodi.

Villio frequēs circa cap. satis fuit aliquādo, alio q. i. ti  
bīs ac genu, aut musculosa parte brachiorū imprimatur.

## SCHOLIA.

Αλφας, id est, Vitiligo, αρισμός, siue pruritus aut prurigo,  
λιχνις, id est, impetigo, ψώρα, λιπαρά, λιπαρά, nōia sunt affe  
ctionū, in quibus omnibus m. uē afficitur cutis à uitioso ali  
quo succo, qui nequit assimilari, cū aliqua contagione aliā  
maiore, aliā minore. Differunt aut magnitudine et proprijs  
differentijs. Nam Vitiligo & pruritus ad Lichenem: haec ad  
Pforam: Pfora ad Lepra: Lepra ad Elephantiasim uelut uia  
quādam est vitiligo uitiosa macula est & scēda ex malo cor  
poris habitu excitata nō in tota carne, sed in cute sine mani  
festa cutis asperitate, scamis, exulceratione. Cuius tres sunt  
species, Alphos nomen generis retinens ex pituitoso sangui  
ne, Color albus, ferē subasper, similis quibusdā guttis disper  
sis. Leuce paulō albidior, ad carnem usq; descendens, à pitui  
ta lenta et uiscosa, unde pili albescent, et μελας ab atro humo  
re cū colore nigro & umbræ simili. Leuce dicitur etiā quibus  
dā Lepra alba, in qua non iā caro, sed alba caro, media inter  
sanguineā et exāguem, ac pituitosa generatur. Nō facile sa  
nescit, si locus pilosus glabrescat. Cutim incidi iubent aut ac  
pungi ad intelligendū, an sanari queat. Nā si sanguis exit,  
curationi locus est: si pro sanguine humor albidus, sanari nō  
pōt. Aliae duae species facilius curantur. Pruritus sine asperita  
te etiā est et exulceratione cutis, sed excrementi acris sub cu  
te sensū excuat et dolorem. Excrementū acre nitrosum, sal  
sum et amarū, paucius, tenuiusq; quā in Lepra, aut Pfora.  
Nasciturq; multū ex sorditie, cruditate, cibis uitiosis. Lichen  
deterior



deterior est, habetque duo symptomata perpetua, summa cutis asperitatem et leuē pruritu. Gignitur (autore Galeno) ex serosis tenuibus & acris succis cū crassis permixtis. Si augeatur & cutē in surfures resoluat, in Psorā degenerat: si in scāmulas fit Lepra, succis illis tenuibus discussis & crassioribus adustis. Initio à iunio salina si quotidie fricetur, curationē recipit. Hoc nomine cōprehendit Metagrā Romanorū et nouū illū morbū ignotū ante Liberū principatū, de quo multa sunt apud Plinium. In Psora asperitas cutis est, surfures, pruritus & colliquatio corporis. Sed nō tāta profunditate in carne descendit, quāta Lepra. Distinguitur ergo in scāmulis, tū profunditate à Lepra. Paulus addit figurā, quæ uaria est ī Psora, circularis in Lepra. Materia habet melācholicū humorē et sāguinem biliosū, sepeq; ī squamas resoluitur, exulceratur, serpit: pustulas & sanie emittit, uocaturq; ἄγρῃ Græcis, Cornelio Celso fera scabies. Lepræ propria sunt asperitas cutis: profundior, pruritus maior, squamula. Scabendo eger nō uiuatur, sed ulcera et phlegmonas inducit. Subiecta caro colliquatur et corpus uniuersū à calore præter naturā. Materia est melācholicus humor, multus, viscosus, crassus, acris, terrestris, siccus. In quatuor differentias distribuitur, sola intensione et remissione malignitatis humoris distinctas. Primæ symptomata sūt rubor exulceratio maior, q̄ in scabie, pustule, squamula. Scāda, quæ deterior ē, papule, aspitæ, rubor maior, figura uaria, squamula, rosio maior, et celerius, latiusq; procedēs. Tertiæ, crassities tumor, fissuræ, rosio, omnia, q̄ in prioribus, maiora. Quartæ subalbida, recenti cicatrici similis, incurabilis. Elephātiōsis ab omnib. differt magnitudine. Est. n. ueluti cācer totius corporis. Cuius descriptio copiosa est apud Arateū. Ex deformitate figura et magnitudine affectus varia nomina habuit: à Græcis. Elephas. n. dī quia corū crassitie, tenebricoso colore, facie scēda & infirmi, magnitudine Elephātem refert: λεονταὶ λεοντίον. pp extremarū rugarū frōtis similitudinē cū leonibus: satyriasis, tū ob facie satyris similē, tū ob libidinem: ἡπάχλιον, quia nullus morbus eo maior est. A liene et iecore initio supio ad extimā cutim cōtinuatur, ibiq; pficitur. Morbus cōtagiosus est ob materiā uenensā et malignā, quæ aerem et proxima quæq; inficit, sed imprimis salina, quæ cyatis adhærescit, pp leniorem & uenensā limum dentit. Et quia humor melācholicus triplex est, sanguis crassior, fex sanguinis, et atra bilis, idcirco tres illius differentias consti-



## DE MORBIS INTERNIS

tuunt, à sanguine crasso ὀνυχοπόως, subrubicūdas, mitiores et minus malignas: à melancholico humore cū pituita mixto, crassa, salsa, introsa et acris, ἰκτεράς, albas: ab atra bile omnibus deteriores, in quibus uniuersum corpus statet ulceribus & extrema etiam decidunt. Causse feruntur, semen parentum elephanticiū, nullus ratio talem humorem protreans, suppressi menses, hemorrhoides, varices cohibite, & quandoq; lues venerea. Quia igitur morbus hic contagiosus est admodum & abominandus, atq; aliquando cognitū difficilis, optimè constitutum est à ueteribus, ut & extra urbis pomeria ablegentur Elephantici, & Medici doctissimi, tanquam Crici ac Censores constituentur, qui hos explorent, ut apud Belgas & Arelatē. Qua de re doctissimè scripsit F. Valleriola in suis enarrationibus. Initium est de annua Elephantorum apud Arelatam probatione uetere senatusconsulto instituta. Signa quedam uniuoca faciunt, alia equiuoca. Uniuoca quidem, ut ab Elephanticis prognatos esse, etiam anis, aut atois repetita origine, cum Elephanticis consuetudo, excretionum consuetarum retentio, ciborum crassorum, salforum, acutorum, nidorofozum assiduus usus, uini multi & crassi potus, uita erummosa in metu & mœrore, extuberationes in plerisque corporis partibus, sed in facie magis & secundum frontem, aures acuminatæ, nasus simus, labra crassa, horrendus aspectus, color faciei ex rubeo luens, uocis rauitas, oculorum rotunditas. Signa equiuoca sunt extuberationes extrinorum & crurū, color morpheæ similis & ventrosus, capillorum defluuium, & tenuium regenerationis, musculorum, precipue pollicis consumptio, stupor, aut sensus amissio in extremis partibus iduratis et exiccatis, scabies, impetigines, gutta rosacea, extuberationes rotundæ & duræ sub lingua palpebris, auribus, ulceroſa lassitudo, cutis crispitudo, instar implumis anseris, unctuosæ cutis, et tanquam respersa aqua; sanguis trambosus, niger, luens, obscurus. Ex his omnibus notis uel multis simul concurrentibus, uel paucis, sed essentialibus & pathognomonicis explorantur Elephantici. Præter quas signum ex urina certissimum habemus, sæpius probatum & nobis a uiro doctissimo pro secreto datum.

De Cutis excoriatione.

Cap. LXII.

**E**Xcoriationi cutis, qualis est ex attritu, longiore decubitu ceratum ex tribus partibus olei mirthini, uel rosacei &



Seuna ceræ cōuenit. Quod si calor est, ex succo plātaginis, decocto sumach, aut rei frigida adstringētis subigatur: eidē rei conuenit unguētū de cerusa. Vbi uero rubor faciei & pustulæ, sanguis ē media uena brachij detrahendus est, impetranda purgatio, quæ partim flauā bilē, partim melancholiā purget. Cucurbitulæ & ceruici & scapulis affigendæ cū scarificatione. Sanguisugæ malis, extremo naso, extremis labiis, lateribus menti affigendæ. Abluenda facies primū ex remollientium decocto, ut ficuum, passulatum, ab hisq; fumus excipiendus. Tum uel aquæ plantaginis, uel terebinthina, in qua mellis portiuncula dissoluta sit, faciem lauabis. Inunges autem axungia ursina, uel uulpina: alioqui taurina, uel porcina, in qua farina ciceris incorporata sit. Casseus recens ex aceto subactus Aestate conuenit, unguētum mixtum ex sapone gallico, & unguento albo. Ex unguenti albi parte j. & iij. olei rosarum subactis cum aqua plantaginis, nenupharis, semperuiui. Sanguis leporis calidus & reliquorū animalium utilis est. Conuenit aqua distillationis florum salicis, succus limonum, sulphur uiuum, Cerusa, cāphora Vbi pustule eminent, unguento enulato, siue hydrargyro concidunt, Argentum uiuum ex salina hominis ieiuni extinctum, & cerato, uel adipi excorporatum efficacissimū est. Hyeme theriaca uti licet, uel unguento citrino, uel pomulato, uel lythargyro auri modo Seruitoris præparato. Sed interim dum hæc sunt, uitæ ratio instituenda est, quæ calorem hepatis attemperet. Deinde etiam quæ fumos prohibeant à cibo. Qualis est dragea communis, puluis, communitalis adiecto coralli modico.

De Dolore

## Cap. LXIII.

**D**E dolore iam multis locis dictum est ac postea dicitur. Fit autem uel intemperie, uel solutione continui. Remedia uel paregorica, uel contraria qualitate pugnantis, uel narcotica. De narcoticis multis locis. Paregorica sunt oleum simplex, anethum, chamæmelinum, lini, oleum ouorum, oleum in quo althææ radix coxerit, Axungia suis, gallinæ, anatis, uituli, ouum crudū & alia sæpe enumerata.

Contraria qualitate & hæc paregorica, Carinum, laurinum, oleum de galbano, de sulphure, & similia calida olea

CX



## DE MORBIS INTERNIS

ex refrigeratione nato dolore. A Calore uerò excitato repugnant oleum uiolatum, oleum rosaceum, de nenuphare, papauerinum & similia. Dolorem à siccitate corrigunt aqua tepida, hydeelson, lac, purpurum, oleum, axungia, celsipus. Dolorem à sanguinis copia tollit phlebotomia. A flatu oxycratum tepidum, decoctum rutæ, anethi, serpilli, & alia quæ capitibus de morbis intestinorum descripta sunt.

A crassis humoribus cum flatu oxycratum, in quo hyssopus, thymum, pulegium, calamentum & similia coxerint.

A contusione Caleus recens, aloë, aut mastix in oleo myrrhino liquata. Vbi locus intumuit, spongiæ foras ex sero lactis. si quidem inflammatio non est. Sic enim ex aqua tepida fouebimus. Oleum ricinum, caninû & in his inculcatus pannus & parti impositus.

### SCHOLIA.

Galenus in Aphorismis & plerisque aliis locis in doloribus hæc obseruanda esse uult, qualitatem, uolumentiam, diuturnitatem, remissionem, intermissionem, comparisonem in diuersis ægris & in genere dolorû, sensum peculiarem hominis, quod alij alijs uigetiores sint sensu, ut hinc cognoscas, præ sagias, remedia distinguas. Quæ uitas est, ut gravis, pungens, tendens, stimulan, feriens, torpidus. Vehementia ex natura partium & materie, uel eiusdem qualitate & multitudine, uel loco affecto pendet. Diuturnitatem facit materia pigra, multitudo, nature imbecillitas, uia intercepta. Ex iisdem & remissio, & intermissio. In duobus autem ægris ita differunt, aut sunt similes. Ex his omnibus periculum, aut contra facile intelligitur. Sed de his omnibus accuratius alio loco. Interea (studiose lector) partim Typographorum importunitate, qui hæc, dum scriberentur, prælo excudebant, partim descendendi necessitate coacti, non modo in libros, qui sequuntur, scholia scribere licuit, sed ne institutum quidem ab initio teneat ut singula remedia expendere, adamus sim, & quid cauendum quidque inrepide faciendum, quo tempore, loco, quibus, in qua regione, quomodo doses uel minuende uel augendo, multa que alia, quæ manus orium desiderant, adnotaremus. Interea hæc, qualiacunque sint, ut æqui bonique consules, precamur.

FINIS.



IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI.

De morborum internorum remediis,  
LIBER SECVNDVS, DE FEBRIBVS.

*Quid sit Febris.*



**F**EBRIS calor est, præter naturam accensus in corde. Substantia ergo febris est calor præter naturam, qui omnino in corde accenditur. Aliàs uerò toto corpore sparsus, nonnunquã minimis partibus, uel certè principibus inest. Pessimum genus febrium, cum utuntur interiora, exteriora frigēt, ut in hypiriis, & cū uiscera interiora inflāmantur. Malignū quoque, quod Aso des uocatur: in quo exteriora quidem moderatè calida sunt, intus ardor est, sitis insatiabilis, perpetua corporis iactatio, uigilia, delirium, quod ferè fit crasso atq; contumaci humore in primis uenis putrefacto. Aliquando in corde uehemens æstus est, quod uehementi palpitatione intelligitur, moderatus tamen ad manū calor est. Pereūt hi celeriter, & sub mortē tenuis quidā & frigidus sudor effluit. Itaq; febrilis calor non ppetuo toti corpori equalis est. Optima rō diuidēde febris, ut è substantia, hoc est, iis, quæ definitio eius continet, differentiæ sumātur: è calore uidelicet, iis in quibus calor est. Calor itaq; alius siccus, alius humidus, alius uaporosus: ex quo febris alia sicca, alia humida, quædam uaporosa. Maligna sicca est. In hac squallescit cutis, arida lingua est, uehemēs sitis & uigilia, calor acris, nihil uaporum, nihil sudorū excluditur. Talis est exquisitè ardēs. Hæc autē aut breuiter occidit,



## LIBER SECVNDVS

dit, aut in hefticam uix curabilem conuertitur. In humi-  
 da perpetuo sudore ac madore corpus refoluitur: quales  
 funt Typhodes & Elodes. Quanquam Typhodis ab Ae-  
 tio & quibufdā alijs dicitur, quā *crisypelas* hepatis incē-  
 dit. Salubris ferē, in qua madidus & mollis calore eft, cu-  
 ris quoque eiuſmodi, & sudores in tēpore erumpūt. Rur-  
 ſus calor quantitate & qualitate diſtinguitur. Nā aliās co-  
 pioſus, aliās paucus, nōnunquam in medio eſt. Similiter  
 hic acerrimus, hic (ut febris eſt) ſuauiſ & mitis, ille me-  
 dius: magna uis eſt febris, cum & plurimus, & mordaciſſi-  
 mus. Febris alia morbus, ut ardor: alia accidēs, ut in pleu-  
 ritide: alia ſimplex, alia cum grauibus ſymptomatibus, &  
 iis, quę epigenomena Gręci uocāt: ut quę febris cum fre-  
 quēti ſyncope, cū ſingultu, cum Synceris deiectionibus.  
 Rudis illa & nimis antiqua Hypocratis diſtinctio: lau-  
 danda tamen, ut fuit ætas Febres alię manu mordaces, a-  
 lię manſuetę quędam uehementer rubrę, nōnullę admo-  
 dū flauę, alię crocęę, alię crudę, &c. Quę pluribus 6. epi-  
 dimiō ab Hippocrate & Galeno, tum initio librorum de  
 differ. feb. explicata ſunt, nondum tamen ſatis intellecta:  
 quod uox, Theuphigodes, ſatis oſtendit, nō ſatis intel-  
 lectu interpretibus. Alii enim ad peſtilentiales, nonnulli  
 ad uaporofas & humidas transferunt. In qua ſentētia fuiſ-  
 ſe uiſus eſt. Galen. in exegeſi uocum Hypocratis. Alia  
 uerō diuiſio febrium, quia hę acutę ac celeres, ut ardēs  
 & tertiana. Alia longę, ut typhodis & quartana. Non-  
 nullę medię, ut quotidiana & ſemitertiana. Acutę ſunt,  
 quia propria tempora ad finem uſque celeriter percur-  
 runt. Acutum enim & celer idem eſt. Sunt ē Gręcis, quę  
 ex ratione prægreſſę cauſę, ita diuidunt. Alię febres de  
 repente atque ex cauſa manifeſta ortę ſunt. Hę minus pe-  
 riculoſę, minusque fallax præſagium oſtendunt. Alia-  
 rum cauſa ignorata, ſed latenter atque longo tempore  
 contracto uirio ortę ſunt, de quibus hoc uerbum Hipp.  
 maximē pronuntiatur (commune quidē reliquis morbis  
 acutis) Acutorum morborum nō omnino certē ſunt pro-  
 nunciationes ſalutis aut mortis. Atque hę ferē periculo-  
 ſiores. Longas item ex cauſarum uarietate diuidūt. Lon-  
 ge



græ enim sunt uel quia materia frigida, crassa & cōtumax  
 est, ut quartanæ: uel multa, ut typhodis: uel quia pars af-  
 fecta frigidior est, unde primū calor succēsus est, ut quar-  
 tana à liene lōgior, ab hepate breuior, uel imbecillitatis  
 rōne. Ex quo in senibus longior, ī iuvene breuior, uel de-  
 nique exteriorum uitio, quæ τὰ ἐξωταῖα uocat Hypp. Ae-  
 gri, Medici, ministrorum, loci, aeris, tēporis anni, & simi-  
 lia, Alię itē febres peruigiles, alię soporose, nōnullę me-  
 diæ. Somnus atq; uigilia, utraq; si modū exceſſerint, ma-  
 lū. Praxagoras quasdā febres soporosas annotauit, ab an-  
 no 12. ad 16. & 17. priuata quadā perniciē. In soporosis,  
 grauius periculum est, si præter soporem & silentium, sal-  
 tus partiū ac ueluti cōuulsio, faciei rubor, oculorū fixus  
 ītuitus, à somno, manuū neglecta abiectio, mœror, anxie-  
 tas, deliria cōuulsifica, motio articularū, frigus. Sed qđ  
 ad institutum maxime pertinet. Alia febris, in solidis  
partibus, hectica: quædam in spiritibus, diaria. Tertium  
genus in humoribus, putrida. De hectica differentiis &  
 diariæ suo loco dicetur. Putrida fiet uel à bile, quæ ter-  
 tiana: uel pituita, quæ quotidiana: uel atra bile, quæ  
 quartana. An uerò à sanguine, postea differetur. Putrida  
 rursus, uel intermittit, uel continua est. Quæ intermit-  
 tit, Hypp. quidem sine periculo est. Diocli minus pericu-  
 losa, quàm continua ac ferè salutaris, sed quæ tamen ali-  
 quando interficit, & maximè ubi talis est, qualis sopo-  
 rosa, quæ proxime descripta est. Continua magis peri-  
 culosa, quæ tertio quoq; die exacerbatur, auth. Hypp. &  
 Archigenē. Accedit ad periculum si quarta die uel tam  
 grauis est, uel etiam asperior, quàm fuit tertia. Cæterū  
 quando quidem hic de curatione febrium agitur:  
 Primum est, ut febris species cognoscatur, ex propriis si-  
 gnis, communibus & externis coniecturis. Cognita fe-  
 bris specie, causæ magna ex parte innotescunt. Secun-  
 dum est, ut febris constitutio intelligatur. Quod fiet si  
 obseruemus qualia sint, & quanta fuerint & futura sint  
 uniuersalia febris tempora, principium, incrementum,  
 status & declinatio. Deinde quod in toto morbo, idem in  
 particularibus accessionibus obseruemus, & has rursus



## LIBER SECVNDVS

inter se comparemus. Postremò adiungemus externa, anni tempus, ætatem, locum, regionē, peculiarem ægri naturā, &c. eiusmodi: videamusq; ne quid ministri peccēt, & ut æger imperata faciat. Ita fiet, ut & morbi natura cognoscatur, & remedia medica fideliter adhibeantur. Certū deniq; ac minimē fallax prælagium de febre instituatur.

### *De Tertianā.*

**T**ertianam facit putrefacta bilis, non quidem in uenis, sed toto corpore dispersa. Tertio quoque die accessiones habet, quodque putrefactum accessionibus singulis excernitur, ferè per sudores, aliàs etiam uomitu, & deiectione alui repurgatur. Duodecim horas exquisita tertiana nō superat accessione particulari, nec pluribus quàm septem accessionibus sollicitat. Sic enim scriptum ab Hypp. in Aphor. quanquam in coacis prælagius 5. 7. aut 9. circuitu, ad summum iudicari scribit. Statum ferè habet quarta accessione, hoc est, die septimo. 9. 11. Decimotertio declinat: atque ita soluitur. Initium ferè prima accessione, incrementum secunda ac tertia: accessionis tempus, à quatuor horis ad duodecim: inuadit cū rigore, in quo ueluti pungentes aculeos sentiūt ægri: initio quidem uehementior, paulatim mitescit, ex quo increfcit calor. Intima uruntur, iactatur corpus, uexat sitis, & uigilia, solitudo quæritur. Hæc uerò ut progreditur accessio in statum, ubi calor admodum acris & mordax est, pulsus initio tardus, paruus, rarus, debilis: postea magnus, celer, frequens, uelox, & ut declinat accessio, paulatim redeūt omnia ad naturam. Post uigorem uomitus sudores aut excretiones, & ubi iā concoquitur ad salutē febris principio accessionum uomitus, in fine sudores sunt. Vrina subrufa subflaua, tufa, mediocri substantia, aut, ut Arabes, rubra, tenui, substantia ignea. Parte quidē inferiore subtilior: superiore umbrosa atque nebulosa. In qua si nebula alba aut eiusmodi sublimamentū initio appareat, non transcendet quartum circuitum. Si uerò primo die uel secundo sedimentum album est, leue & æquale, tertio circuitu terminabitur febris. Quod si talia non apparent primis diebus. i. prima uel secunda accessione,



sione septimus circuitus expectandus est. Tumque rursus magis sunt urinæ. Et si contingit longiores esse accessiones, id efficit materiæ copia aut crassior consistentia. Alioqui ad densitatem cutis aut imbecillitatem naturæ causa referenda est. Describunt autem Græci & Arabes tertianam quæ sit ueluti idea quædam & exemplar tertianarum omnium quæ ut proprius ad ideam illam accedunt, ita & manifestiora signa proferunt, uel minus manifesta. Excitantur hæc febres ferè ætate, temperie calida & sicca, cœlo, ætate, rationes uitæ & aliis, quæ corpus reddunt calidius & siccant.

Curatio ad duos scopos relata est ueteribus Medicis, alterationem & uacuationem. Alteratio, refrigerantibus & humectantibus. Vacuatio per sudores & urinas. Paulus rectè quidē infirma hæc remedia credidit, propterea quod non tertiana illa quæ idea & exemplum quoddam est reliquarum, nobis curanda, est: sed quæ iam aliquid pituitæ commixtum bili habet. Oportebit ergo intendere in scopos illos ueterum, sed ita temperare, ut quantum declinet curanda febris ab idea illa, tantum curatio euariet. Initio ergo si resistit alius clystere, leni uel debili quodam pharmaco mouenda est. Medicamenta sunt, ut Cassia fistula ex decoct. uiolarum, prunorum, tamarindorum, & similia. Vehementer commendant hanc potionem.

R. succi granati acidi & dulcis ana unc. i. s. per noctem salubri loco resideant, postridie in eo suc. dissol. zuchari optimi unc. i. Et si uehemens calor est, sacch. uiol. sit & addatur potioni aquæ ros. unc. i. Si uerò pituitæ aliquid mixtum est, loco aquæ ros. misce uini tenuis unc. i. Lenies aluum, reuocabis appetitum, partes naturales roborabis. Quod si obstructionis suspitio est, aquam end. aut hordei unus unc. i. commiscebis. Alii. unc. ii. oxy-sacch. simplicis, succi end. depurati unc. i. utuntur eadem utilitate. Vbi uerò plus pituitæ mixtum est, pro succo end. succus rad. scæni. pro oxy-sacch. oxymel simplex miscendum est. Atque utilius oxymel uolunt in quo ferbuerint frondes nucis. Alii contenti sunt. unc. iiii. decocti prunorum cum sacch. uiol. unc. s. Eodem modo &



## LIBER SECVNDVS

tamarind. uti licet. iam remollita aluo de phlebotomia statuendum. Saluberrimum, inquit Gal. febr. omnib. non modo continuis, sed iis quæ ex putredine natæ sunt, secare uenam, si ætas, uires, &c. permittant. Omissum tamen hoc remedium à Græcis & omittendum quidem, si exquisita tertiana est. Alioqui admodum salutaris, quam tamen temperare oportet, ut tertiana quam curamus uel ad exquisitam accedit, uel ab ea recedit. Arabes ex urina rubra consilium sumunt phlebotomiæ fallaci quidem cōiectura. Talis. n. urina, aliquādo infirmo hepate, uel rene aut aliis de causis, nō ex natura febris. Addunt præterea nō esse detrahendū sanguinē ante tertium paroxysmū, adduntque experientiam, quod quibus aliter sanguis detractus est, iis ferē exasperatum malum: secant ferē sexto die aut prædici rubent fore, ut proxima accessio, quæ quarta est & die septimo grauissima, ne id ex phlebotomia & peccato Medici contigisse uideatur. Conueniunt cū Græcis in usu eorum quæ urinas mouent & sudores. Utuntur plurimū oxyfach. simpl. syrup. acetoso, Græci, si materia sursum ascendit & æger nauseat, uomitiones adiuuāt: si mordentur intestina lenib. clyst. excludunt, alioqui lotia & sudores mouent, uomitus cient ptisanæ tepidæ unc. iiii. sac. unc. s. Aliud.

R. decoct. lact. atripl. portul. ana unc. s. olei communis unc. ii. tepido utatur. Sed abstinend. uomitionib. in his maximē qui ex consuetudine non uomunt. In clyst. cass. unc. s. aut catholici, plus etiam, ut res exigit, dissol. debet oleo uiol. In iisdem utendum est sacch. potius quam melle, apio & anetho mixtis in potu, aliisq; leniorib. diuret: utebantur. Sudores mouendi sunt si quidem resistunt sub finem accessionis.

R. ptisanæ uulgaris calidæ ℥. iiii. aut ℥. iii. cū ℥. i. decoct. flor. cham. uel diluto oxymel. in quo nepiræ modicū ferbuerit, idq; magis si crassior humor fuerit. Vsitatus est ptisanæ uulgaris potus calidus cum subduplo syrupi acetosi, ut sint ptisanæ unc. iiii. syrupi acetosi unc. i. s. Vinum quoq; album, tenue, oligophorum, & urinas & sudores mouet. Verū neq; urinæ mouendæ sunt, neq; exprimē  
dus



dus sudor, nisi cū apparuerint manifesta signa coctionis: multo maximè, cum iam perfecta signa coctionis apparuerint, & quæ uomitiones mouët, tepida: quæ sudores, calida exhiberi debent. Quòd si superioribus remediis non concedit febris, rhabarbaro utendum est ad drac. i. s. uel dr. ii. Si uerò neque his concedit, & uires sustinent, Phlebotomia repetenda est. Alioqui cathartici paulatim deducenda materia est, quale hoc est.

R. Syrup. de cichoreo simpl. unc. vi. rhabarbari pulueri sati, & nodulo raro inclusi dr. ii. suspèdatur nodulus, & sy-  
 rupo immergatur, capiat diebus intermissionis unc. i. s. sy-  
 rupi, cū aquæ hordei in calidiore cōditione, hydromeli-  
 tis in frigore unc. ii. Atq; iam declināte morbo, & lōgius  
 progressio medicamētis cathartici aliquid totū, quæ me-  
 lancholiam purgāt, miscendū est. Pars. n. materiæ ardore  
 febris in melancholiā uersa est. In accessionibus, ubi ue-  
 hementer sitiūt, sed maximè in statu, aqua hordei, iulep-  
 uiolatū, syrup. uiolatus cū aqua frigida, uinū etiā album  
 oligophorū, si quidem iam tempus est sudoris promouen-  
 di & urinæ, exhiberi debent. Nec hoc quidē exigua quan-  
 titate, sed semel quantum appetunt. Ratio uictus, quæ  
 refrigeret & humectet non tam tenuis, quàm ab antiquis  
 præscripta est. Licet enim uti iusculis plurimum altera-  
 tis cum lactuca, acetosa, portulaca, hordeato cum sem-  
 nibus frigid. alterato. Postea uerò apparentibus signis  
 coctionis, lacte amygd. pedibus ouilis, piscibus saxati-  
 libus, cancris, percis, & similibus, utello oui, de quibus  
 quia controuersia est, postea dicetur. Tumque iusculis  
 commisceri debent, quæ aperiunt, & urinas mouent. Vsi-  
 tatæ sunt radices acetosæ, petroselinæ hortensis & cicho-  
 rex. Sed per omnia meminisse oportet, maiora remedia  
 conuenire diebus quietis. Excrementa uerò promouēda,  
 cum iam manifesta coctio apparuerit. Vigilant, æstuant,  
 sitiunt & alia patiuntur, contra quæ remedia suo loco  
 dicetur. Remedia quædam sunt uulgaria, quibus quidem  
 uti licet, non neglectis aliis, quale hoc est. Sonchus tri-  
 tus, sambucus, plantago, ex aceto subiguntur, & carpis  
 alligantur. Sunt, qui & semperuiuum & alia eiusmodi



LIBER SECVNDVS

refrigerantia trita hepatis regioni applicent. Suspectum quidem hoc remedium, quanquam aliquando febrem extinguit. Sed nunquam hoc utendum est, ubi obstructio nis suspitio. Alii pul. fuliginis è furno, & saluiam contusam una miscent, cum oui albumine, & ita imponunt carpis. Nonnulli eandem fuliginem cum alluis, capis, albumine oui, & germine, miscent, acetum affundunt, admoventque carpis. Temeraria, uerò remedia caustica, quale est, quo uulgus interim radicè ranunculi trita. Utuntur alligata carpo. Eadem quoque exteriori gutturi admovent. Itaque prudenter utendum est uulgi remediis.

*De Tertianâ Notha.*

**T**ertianâ notha cum rigore quidem incipit, sed languidiore. Materiam habet pituitam commixtam bili. Inuadit, ut plurimum febris hæc otiosos iuuenes & imtemperatos, sub autumnum frequens. Signa eadem quæ tertianâ, nisi quod habet commutata ex proportione pituitæ ad bilem media, quodâmodo inter signa quotidiana & tertianæ. Alternis diebus inuadit: aliquando tamè, ut etiam tertianâ duplex, singulis diebus. Neq; enim singulis inuadere diebus, neq; alternis tertianâ facit. Oportetque non tantum ex periodis, sed propriis signis cuiusque febris speciem constituere. Accessio ultra duodecim horas producit, aliquando ad triginta & eo plures. Nō terminatur septem periodis, ut tertianâ uera, uixq; duos decima periodo, aut 14. terminatur. Sæpe etiâ in mensem. quadragesimum diem extenditur. Nonnunquam sex menses integros perseverat, fereq; desinit in uitia lienis. Hic plurima grauitas corporis, dolor uertebrae, inflatio uentriculi, fastidia, sitis, magna oris amaritudo, urina citrina & crassior, quàm in uera. *Curatio.*

Clysteribus primùm nō ita mollibus utendum est. Deinde leui pharmaco: unde primæ uenæ repurgentur. Postea consentientibus numeris, phlebotomia, è basilica extra. Auicennas post 3. uel 4. paroxysmum uenam aperit, dextram Aestate, Hyeme sinistram.

Victus alias parcior, aliàs plenior, ut breuitas, uel longitudo febris expectatur. Nam in longis plenius nutrimus:



# DE FEBRIBVS.

mus: in celeribus, parcius. Victus sit incidens & abster-  
gens, coctu facilis. Vrinæ & sudores paulo calidioribus,  
quam in tertiana moueantur. Iam apparentibus signis  
coctionis, Gal. hordeatis aliquid piperis adieciſſet, amy-  
dalino lacti aliquot amygdala amara commiſcere licet,  
alioqui amygdala diſſoluemus ex decocto rei, quæ inci-  
dat & detergeat. Græci muſa utebantur, in qua hyſſo-  
pus feruiſſet, aut aliquid tale, quod uidelicet ſine inſi-  
gni calfactione & exſiccatione urinas ducat. Qualia ſunt  
ſpica celtica, cinamomum, radices apii hortenſis, ſemina  
anethi, fenicul. comæ abſynthii, qua poſt ſeptimum ute-  
bantur. Oxymel quoque conuenit conditum aliquo aro-  
mate, ut ſpica uel cinam. puluere hyſſopi, menthæ, cala-  
menti, ſtechade.

Potiones autē dilues magis aut minus, pro ratione fe-  
bris, materiæ, quæ febrem facit, temperamenti, ætatis, tē-  
poris & ſimilium. Iam ferè paratur hydroſacchar. ex lib. i.  
aquæ coctæ col. per manicā Hippocratis cū unc. iiii. ſacc.  
& 3. s. cinamomi uel 3. Veteres loco hydroſacch. muſa  
utebātur. Nunc uero in frigidiore cōditione, loco ſaccha-  
ri, melle albo uti licet, partim ſaccharo, partim mel. albo.

Vbi iam apparuerint ſigna coctionis, molliter ſubdu-  
cenda alius eſt ex iis, quæ poſtea dicentur. Non omittē-  
dum, quod Hippoc. primum, deinde Gale. & Auicennas  
annotarunt, uomitum à cibo tam efficacem eſſe in hac fe-  
bre, ut hoc uno remedio permulti conualuerint.

Hiſtoria eſt apud Hippoc. de uxore Theotimi, quam  
muſo ſucco granatorum percurauit, inde uomitu cita-  
to. Licebit itaque uti oxyſacchara tepida, uel oxymelite  
ſimplici cum aqua tepida, in qua ſex rotulæ raphani co-  
xerint, ſtatim à cēna. Alioqui.

R. hydromelitis unc. ii. decocti hyſſopi unc. ii. s. detur  
tepidum à cēna.

Noſtra ætas non feret tenuem uictum, quem vete-  
res præſcripſerunt. Nutriemus itaque, ut ſemel in die  
comedant, remiſſionis uel intermiſſionis tempore. Vi-  
no tenui uti licet extra acceſſiones. Pullus iam ſatis a-  
dultus in aqua coctus cum borragine, cerephylo, oxa-  
lide,



LIBER SECVNDVS

lide, petroselino, hyssopi modico: coques autem ad putrilaginem, & si uis, iusculo sacchari aliquid iniicies.

Hordeato & lacte amygdalino uteris, sed bene conditis saccharo, uel melle albo. Ptisana vulgari, in qua anethi coma, aut aliquid seminis eius, apii, feniculi, spicæ, cinam, piperis maduerit, uti oportet, aut in ea octauâ partem sacchari, uel mellis albi liquefacies. Poteris imperare hanc ptisanam.

R. hordei mundati q̄. i. hyssopi, glycyrrhizæ mundatæ ana ʒ. s. iuiubarum, passul. mundatarum, cicerum rubrorum ana unc. i. fiat decoctio in aqua purissima ad lib. ii. Colatura passetur per manicam Hippocratis cum unc. iiii. sacchari. Fiat ptisana clarificata & aromatizata cum scrup. ii. cinamomi, uel mullâ, uel hydrosaceh. parabitur ex aqua, in qua pugilus spicæ celticæ, aut stechados efferbuerit. Materia clysterum, quibus interuallis utendū est, furfuribus, hordeo, chamemelo, meliloto, absinthio, anethi coma, beta, scariola, ficubus. pinguibus, addita etiâ lactuca, portulaca, acetosa, si refrigerandi consilium est. In decocto lib. olei communis aut chamem. unc. iiii. mellis communis unc. ii. dissolues. Nonnunquam etiam uel cathol. ʒ. vi. uel diaphenici aut benedictæ ʒ. s. Supposito-ria acuantur cum ʒ. ii. hieræ picræ & ʒ. i. salis gemmæ.

Purgationes conueniunt ex rhab. mixta parte agar. trociscati ut utriusque scrup. ii. Sex. ʒ. catho. incorporentur. Alioqui pauperibus imperabis. ʒ. vi. catho. ʒ. ii. diaphenici cum hydromelite uel diaphenici ʒ. ii. agari. ʒ. i. cum hydromel. Quod si ab infirmitate uentriculi metuatur.

R. pul. hieræ picræ recentis, rhab. electi torrefacti & subtiliter puluerizati ana scrup. ii. incorporentur ʒ. iiii. terebinthinæ fiat bolus coopertus auro uel nebulis ut facilius transglutiant. Laudantur pillulæ de rhab. maxime Autumno, de eupatorio.

R. aloes, rhabarbari, mirabola, citrinorum, succi agrimonix ana ʒ. s. uniantur cum succo endiuæ aut sceniculi. Laudatur trisera saracenica sine scammonio Syrupi imperandi oxymel simplex oxysaccharum, Syrupus acetosi s



# DE FEBRIBVS.

tosus, de scolopend. capillorum ueneris, dilutum cuscute, cichoreæ, absynthii, cicerum rubrorum, sed diluta saccharo & tantillo cinamomi condienda sunt. Maximè probatur syrup. de chicoreo compositus, qui etiam catholicus est. Datur ad unc. ii.

Nonnunquam quia metuitur, ne degeneret in quartanam, imperamus dissecandis humoribus & aperiendo, quale hoc est.

R. summitatum lupuli, cich. an. M. s. rad. apii, petroselinii, gramin. ana unc. s. sem. melonum, cuscute, anisi ana 3. i. s. glycyrrhizæ rasæ 3. i. fiat decoctio ad lib. s. In col. dissolue syrup. de bisantiis & capill. uene. an. unc. i. s. fiat apozema clarificatum & aromatizatum cum tantillo cinamomi. Aliud.

R. rad. petroselinii, acetosæ, graminis ana unc. s. seminis anisi & feniculi torrefacti, liquiritiæ ana 3. s. summitatum lupuli, fumarig, cichoreæ cum toto ana. P. i. trium florum cordialium ana P. s. fiat decoctum ad lib. s. In collatura dissolue syrup. capillorum ueneris unc. ii. oxymelitidis simpl. unc. i. fiat apozema ut prius pro duabus dosibus: tempestiuus usus remissionis febris. Ab his uero cathartica imperanda sunt, quale hoc est.

R. Passularum mundatarum, hordei integri ana unc. s. cinamom sandali citrini ana 3. i. uiolarum P. i. fiat decoctio pro una dosi, in qua infunde rhabar. elect. 3. ii. expressioni collatæ, adde syrup. de cichoreo simpl. unc. i. fiat dosi. Aliud.

R. hordei integri P. i. summitatum lupuli, & absinthii, cichoreæ, eupatorii ana P. s. seminis melonum, & cucumeris ana 3. s. stechados arabici 3. i. folliculorum senæ mundatorum 3. iii. fiat decoctio ad unc. iiii. In collat. infunde rhabarbari electi scrup. iiii. agar. trociscati 3. s. Expressioni adde sacchari albiss. unc. s. santali citrini & cinamomi ana scrup. i. Probatur inunctio hypochondriorum ex oleo de cydoniis, de absinthio, chamemelinno, anethino, & alia quæ stomachum corroborant. Balneum quoque probatum antiquis post signa coctionis. Sed iam usus eius exoleuit & perit industria parandi quæ



## LIBER SECVNDVS

quæ suspectum auxilium reddunt.

*De Semitertiana.*

**D**E hac febre parum constat inter veteres Medicos, dubitaturq; vtrum continua an intermittens, qua in re etiam Gal. dubius est. Ex tertiana interim semitertiana fit, inquit Gal. & contra eademq; ferè habet accidentia, sed hæc periculosa Stomachum & nervosa lædit, lethargicas attonitasq; passiones infert, colliquat corpus, animi deliquia excitat, profunda uehementer commouet, typo fero & periculi plenissimo, ætati virili familiaris, Autumno peculiariter commouetur, tumq; periculosior frequens Romæ, in Aethiopia & toto littore tractuque terre, ubi cælum calidius cum aduentitia humiditate. Non semper continua, sed aliquando intermittens, acutis nõ solum, sed diuturnis connumeranda ex Hippocrate. Auicennas author est. ad 7. mensem aliquando protrahi. Mirissima, accessiones habet 24. horarum: mediocris 36. fortis 48. aut iam cõtina est. Primo epidimion & 2. de diff. feb. multis disputat Gale. cõt. Agathinũ & Archigenẽ continuã esse, nec posse ex duabus intermittentibus cõponi, aut ex duabus cõtinais. Pessimum uero hoc genus febrium, quæ in crudis & biliosis humoribus incéduntur. Cæterũ duplex est semitertiana. Altera simpliciter, idest, exquisita, quæ ex quotidiana continua biliosa, tertiana æqualiter mixtis bile & pituita constans, primo die horrificas habens accessiones, & ingeminâtes: horrificas quidem ex natura intermittentium. Tertiana, rigorem: quotidiana, frigus facit. Itaq; mixtis causis frigoris & rigoris horror, qui horum medius est. Ingeminatio vero propter naturam humorũ, commota bilis putre facit de integro pituitam. Pituita putrefacta calorẽ accedit, & bilem acuit, ita fit ingeminatio horrorq; inæqualis. Hæc stomachi labor est, totiusq; nervosi generis. Secundo die, quo quotidiana continua sola regnat, nullus horror est, tertio die, eodemq; primo. Est & altera semitertiana non exquisita, in qua alter humor superat. Vter uero superet, ex signis coniciet. Nam si biliosæ febris indicia superant, bilis pituitam uincit: utriusq; autẽ symptomata



ptomata concurrunt, seseq; proferunt. Quo enim tempore biliosa inuadit, rigor: quo desinit, uomitus, sudor, deiectio. Cum uero pituitosa, frigus, cæteraq; quotidianæ sese ostendunt. Quo uero tempore uterq; humor confusus incenditur, symptomata confusa medium quid efficiunt. Sed interim semitertianæ tertiana cōplicatur, qualis est historia mulierculæ 2. de Crisibus, uariè quidem scripta in Græcis codicibus, nec satis fideliter uersa à Latino interprete. Ergo semitertiana cum horrore inuadit, diebus imparibus: paribus uero tantum frigus est, inæqualis pulsus, calor quoque inæqualis. Modo enim increscit, quasi procedat accessio in statum, aut in medio sit augmento: modo derepente horror inuadit, extrema frigent, calor in medium corpus contrahitur, soporosi fiunt, è stomacho laborant, conuelluntur, urina ferè crassior ac turbulenta. Animaduertendumque in hac febre, num aliquando proferant se signa propria tertianæ. Sic enim tertiana complicata semitertianæ. Rursus videndum est, num semitertiana sit, cum tertiana quotidiana complicata est. Neque idem est apud Medicos epiploci, idest, complicatio febrium & semitertiana. In semitertiana, bilis & pituite omnino confusa sunt, & æquali proportionem mixta. In semitertiana quotidiana, ferè continua est, tertiana intermittens. In semitertiana, neque quotidianæ, neque tertianæ propria signa apparent. Sed ueluti ex duplici horum genere unum quoddam confusum & mixtum genus coalescit. In complicatione uero manent integra signa tertianæ, integra signa quotidianæ, quæ suis interual-  
lis proferuntur. Huius febris semitertianæ, & proximorum generum Cornelius Celsus lib. 3. ex Asclepiade ex eodemq; authore Aurel. meminerunt. Est & alia de nomine controuersia. Ridet Gale. primo Epid. qui nomen tale semitertianæ indiderunt, propterea quod potius dupla tertiana appellanda sit. Duplicat enim accidentia omnia tertianæ, eademque duplo peiora habet, non dimidio minora, uel clementiora, quod sonare nomen semitertianæ uidetur. Secundo de differen-  
tiis



## LIBER SECVNDVS

tiis febrium institutionem nominis approbat, quòd dimidio sui semitertiana constet tertiana. Nec id reprobatur ex Agathino lib. de typis. Ratio nominis ad curationem nihil pertinet. Recentiores Medici eadem ferè dicunt. Alitria genera instituunt. Minus, in quo pituita in uasis putrescit: extra uasa, bilis. Medium, in quo bilis putrescit in uasis, & extra uasa pituita. Pesimum uero tertium genus, quod continuum est ac ferè interficit, urinae rufae, spissae, superiore ex liuido flavescent, pulsus durus, inaequalis, frequens, dolor est capitis, grauitas, sopor, sed à quo uocati statim excitantur, cui si succedit acuta febris, admodum lethalis est. Curationes temperant mixta curatione tertianae & quotidianae. Eadem ferè curatione, quae tertianae nothae, nisi quod in semitertiana maior pituitae ratio habenda est. Itaque descripta curatione quotidianae, & repetitae, quae in tertiana dicta est, semitertianae curatio fiet manifesta.

### *De febribus horrificis.*

**F**Rix Græcis, horror est, unde febris phricodes, horrificae. Horror remissus est rigor, media quaedam affectio inter rigorem & frigus. Is autem fit calore flauae bilis humorem crudum commouente, & putrefaciente. Itaque febres omnes horrificae, succensa bile, in crudis humoribus enascuntur, atque utroque humore aequaliter mixto, si quidem cruditas putrescit in uenis, bilis extra uasa, exquisita fit semitertiana.

Aliæ febres horrificae, in quibus horror repetit, breuibus interuallis & eadem accessione, estque eiusmodi motus horrificus inaequalis, cum uidelicet natura conatur excludere materiam. Sed hæc propter crassitiem, aut quia densior cutis est, uel denique quod natura non ita robusta est, resistit, nec potest discuti. In hoc genere tardissime incalescunt, longaque sunt, & principium accessionis, & incrementum. Aliis simul atque motus bilis remissus est, nouus redit insultus, quia dum calor affligit corpus, frigidi humores putrescunt, nouamque accessionem commouent, & inde frequens reduplicatio, quam anadiplosin uocant, fitque ut succedens accessio longe



longe sit deterior præcedente, quia iam lassata uirtus est priore accessione. Sudores in his febribus mali. Etenim ui exprimuntur, non uictoria naturæ effluunt. Idque uel propter crudorum copiam, uel uirium imbecillitatem. Frigent extrema, utuntur intima, soporosi fiunt, uentres cruda deiciunt, urinæ crudæ, decolores, tenues, alias turbulenta, & crassitudine præditæ, nullo sedimento, aut malo, inæquali, diuulso. Fastidia, animi deliquia, syncope, conuulsiones, mala omnia. Pessimæ enim febres, ut ante diximus, in quibus crudorum copia bili confusa est.

Curatio, ut ante, mixta, nisi quòd summa ratio adhibenda est, ut intelligamus ultra materia superet, cruda an biliosa.

*De pituitosis febribus.*

**O**Mnem humorem frigidum & humidum in corpore pituitam appellari scribit Gale. 2. de diff. feb. Generatio pituitæ ab infirmo calore est, cibis phlegmaticis, intemperantia uitæ, otio, intempestiuis exercitiis, ætate puerili, & senili, hyeme, constitutione cœli humida. Tria eius genera à Gale. ferè statuuntur. A forti frigidityte, acida: a calore præter naturam, falsa. Vbi uero leuiter affectus calor, & pauca est frigiditas, dulcis & fatua. Salsa, sitibundos: acida, famelicos: dulcis somnolentos facit. Acida concoqui debet: salsa repurgari: dulcis & fatua, naturæ relinquendæ sunt, quia facile in sanguinem conuertuntur. Fit aliquando, ut phlegmaticus cibus non coquatur in uentriculo: quod inde generatur, cruditas est, non pituita, aut pituita cruda dicatur, quæ appetentiam tollit, inducit fastidia, & pallorem. Qui humor à cerebro per nares emungitur, aut distillat in corpus, pituita non est: quemadmodum nec humor ille uitiatus & crudus, unde pruritus, ulcerosus affectus, lepra, scabies, & alia eiusmodi.

Salua ore contenta potius pituita est. Vniuersali nomine hæc omnia pituita sunt. Frigidissima & humidissima pituitæ species, quæ uitrea appellatur, ouorum albumine persimilis, uel uitro fuso, uehementes dolo-

res



## LIBER SECVNDVS

res infert, & quasi palo fixo impetentes, ubi loco calido, aut laxiore intestino impingitur, frigus infert, si immota est. Si uero mouetur per sensilia, rigorem, ut acida, commouet. Nam & acoris est particeps, unde subacidarum genere sunt, qui comprehendant. Leuiter hæc putrefactæ aut ex parte Hepialem inferunt. Vbi uero putrescunt magis, præcedit rigor, febris. Alia dulcis rigorem non infert. Oportet ergo cum de pituitosa febre agitur, diligenter animaduertere in quo genere pituitæ febris incendiatur. Nam ex eo, & curandi ratio euariet, & prælagium certius instituitur. Græci ferè in genere de febre quotidiana scripserunt: Arabum familiæ plenius distinxerunt.

### *De febre quotidiana.*

**F**ebris hæc raro aduenit sine offensione stomachi, & hepatis, pulsu minino, raritate medio inter pulsum tertianæ & quartanæ, tarditate simili tarditati pulsus quartanæ. Accessionum initia habet circa uesperam, & noctu magis, quam interdiu uexare consuevit. Non inuadit cum rigore, sed frigus uehemens est partium extremarum: aliquando & horror quidam est. Difficulter eius materia accenditur, uixque in calorem commutatur frigus unde locum habet incrementum: materia est crassa & frigida, pigra ad motum, calor non ita magnus, pori angustiores ac ferè constricti, ex quo fit, ut materia non possit tam celeriter discuti. Atque inde accessiones producuntur, aliquando ad horas octodecim: atque ubi desit accessio, uestigia quædam febris reliqua sunt. Vnde nonnullis non tam intermittens, quam continua credita est. In declinatione sudores nulli, aut si qui sunt, à multitudine materiæ, non uictoriæ naturæ excitantur. Postea iam progressu morbo, paulatim sudor effluit. Primum quidem certis partibus, deinde uero toto corpore emanat, calor ferè similis ei qui fumoso igni comparetur, humidus uaporosus, non deurens, sed tantum leuiter acris est.

Aegri non uruntur, non iactant corpus uehementius, non nudant pedes, aut pallia deiiciunt. Neque uehementer spirant, aut efflant igneum. Non appetunt frigidam, & leuiter sitiunt.

Vrinæ



Urinæ albæ, tenues, aquæ, crudæ initio, progressu temporis crassescunt, multumque deponunt sedimentum. Frequentior febris hæc constitutione phlegmatica, quam proximè descripsimus. Longa quidem ex ratione materiæ, sed non ita periculosa. Addunt Auicennas & Arabum sectatores, grauitatem capitis, totiusque corporis, sopores initio accessionis inæqualitatem frigoris partium extremarum, animi deliquia, syncopas. Atque ex ratione generum pituitæ ita distinguunt. Primum quidem ex eo quod gustus indicat salsus, dulcis aut acidus. In salsa horrificus motus est, urina rufa, mediocri substantia. Pulsus fortior, uelocior, densior quam in cæteris pituitæ generibus, incertis nec statis temporibus commouetur, sitis maior est nausea à frigore, calor sequitur, à calore sudor.

In phlegmate naturali fatuo, saluatio, urina citrina uel alba & spissa, pulsus tardus, rarus, nullus salinæ gustus, grauitas capitis. In phlegmate dulci urina rubra uel subrubra, per totum spissa, pulsus uelox, densus, paruus, inuadit media nocte. In declinatione sudor, oris amaritudo, sitis, capitis grauitas, excrementa fetida. De uitreo in epiala & aliis. Excrementa omnibus quotidianis deiectiones & uomitus periculosa.

*Curatio.*

Primis diebus cum urinæ tenues, sæpe etiam albæ, utendum est incidentibus & aperientibus: materia enim crassa quam incidi oportet, & iisdem medicamentis liberantur obstructiones. Verum in salsa & dulci iis quidem leuioribus & paucioribus diebus utendum est. In uitrea & acida, fortioribus, idque pluribus diebus Græci & Arabes ad 7. diem iis utuntur. Iustus terminus definiri non potest.

Conueniunt itaque oxymel simplex, & hoc leuior syrup. acetosus, aqua sacchari condita cinamomo. Fortiores sunt oxymel diureticum, scylliticum, syrup. de duabus & quinque radicibus, & alia descripta capitibus morborum phlegmaticorum. Laudatur plurimum melicratum, hyssopi, thymi, pulegii, stæchados, rerumque similium.

¶ Verum



## LIBER SECVNDVS

Verum habenda est ratio, ut iusta sit proportio mellis ad aquam. Nam ubi natura egræ frigida est, materia febris contumax, frigidum anni tempus, & cætera eiusmodi, sexta pars mellis misceri potest, alioqui uel octaua uel nona, hocque perpetuo meminisse oportet. In usu syruporum oportere aliàs plus, aliàs minus dilui. Neque consuetudo recipienda, quæ tantum duplum aquæ aut similia liquoris imperat, ut syruos diluat.

Iam præparata materia, si quidem urinæ crassæ & rubentes appareant, uidendū est, an phlebotomia cōueniat. Nam & antè, si tales urinæ fuerint, conueniet multò magis, ubi uel pituita dulcis, uel salsa est. Arabes calida constitutione cœli, dextram basilicam: frigida, sinistram percutiunt. Oportet autem parum detrahere.

Quod autem ad purgantia pharmaca attinet, neque cassiam, neque tamarindos, aliæque eiusmodi leuiora recipiunt. Quia stomachum offendent, & tantum quod est subtile, euacuant. Itaque & aloë, turbith, carthamo, & aliis, quæ dicuntur uti malunt. Et quia semel non potest repurgari tota materia febris, epicrasi utendum est. Primum enim, ut ante dictum est, materiam incidimus & obstructions liberamus, tum pharmaco uti mur, eoque leuiori, sed quod stomacho nō noceat. Quinetiam omnibus medicamentis commiscere oportet ea, quæ stomachum roborant. Etenim in quotidiana stomachus ferè laborat, idque meminisse oportet salsam & dulcem pituitam leuioribus deduci posse, uitream & acidam non posse. Propterea in dulci & salsa poterit conuenire hæc potio.

R. summitatum absynthii P. ii. passularum P. i. glycyrrhizæ. sem. anisi, & fœniculi ana drac. s. Fiat decoctio, in qua dissolue catholici unc. i. mellis rosati colati unc. s. Fiat potus.

### *Catharticum Auicennæ.*

R. mastichis, zinziberis, turbith bene gūmosi ana ℥. i. sacchari albiss. dra. i. cum decocto passularum fiat potus. Licet uti pil. elephanginis, de hiera, assaieret, ut sint harum ℥. ii. agarici ℥. i. laudantur quoque hæc pilule.

*Pilule*



*Pilula compositæ.*

R. aloes lotæ in succo maioranæ drac. i. agar. ʒ. i. mastichis, cinamomi, piperis ana Gr. viii. cum succo absynthii formentur pilulæ. Alioqui.

R. pil. hieræ picræ Gal. ʒ. iiii. agarici trocif. ʒ. i. sem. carthami, sem. urticæ an. dr. s. turbit gummosi scrup. i. mastichis, rosarum, cinamomi, galangæ an. Gr. vi. sacchari in uino albo tenui dissoluti q. s. cum oxymelite fiant duæ lozengæ pro duabus dosibus. Aliud.

R. pul. hieræ diacol. scrup. ii. agarici trocif. scrup. i. nucis moschatæ & cinamomi an. Gr. viii. cū syrup. de absynthio fiant pilulæ.

*Pilula probata.*

Auicennas agarici dr. i. aut ʒ. iiii. corporat melli, aut eandem dosim sem. urticæ, dat quæ breuibis interuallis. Quæ sequuntur pilulæ, multis probantur.

R. pul. hieræ picræ drac. i. agar. troc. drac. s. pulpæ colocynth. scrup. i. mastichis scrup. s. nucis moscatæ & cinamomi ana Gr. vi. cum succo absynthii, formentur pilulæ pro duabus dosibus. Aliæ.

R. agar. albi, turbit gummosi ana dr. ii. aloes, rhab. corticum myrobalanorum citrinorum & chebulorum ana drac. i. sem. cuscute & absynthii, eupatorii ana drac. s. mastichis, laccæ, anisi, sacchari albi, spicæ nardi, glycyrrh. ana Gr. xviii. esulæ puluerisatæ dr. i. cum oxymelite scylitico formentur pilulæ.

Conueniunt tempore frigidus ad dr. i. nec his tamen recentibus utendum est, sed post mensem. Quæ sequuntur, caput & stomachum uisceraq; purgant, sensus acuum, colorem reddunt, & diurnam quotidianam sanant.

R. aloes optinæ drac. iiii. mastichis ʒ. iiii. rosarum, epithymi, caryoph. absynthii an. scrup. i. laccæ, cuscute an. ʒ. s. croci, esulæ ana Gr. viii. cum succo absynthii fiant pilulæ. Dos dr. i. ad ii. datur breuibis interuallis. Simul atque apparebunt urinæ crassiores & magis coloratæ, stomacho consulendum est per ea, quæ postea dicuntur. Conueniunt foci ex oleo cham anethino, iasmino, quibus totus uenter fouendus, spina inungenda est. Idque

¶ 2 cum



cum frictione. Laudata est ueteribus frictio ex tela aranæ, quæ imbuenda est prius oleis supradictis.

Laudantur quoque diuretica. Balnea quoque in declinatione.

Sed neque frictionibus, neque diureticis, neque pharmacis, multo minus balneis utendum est initius febris.

Quod ad clysteria & suppositoria attinet, ubi resistit aluus, imperari possunt. Comparantur autem ex eorum decocto, quæ incidunt, attenuant, & flatus discutiunt. Inflantur enim magna ex parte præcordia iis, qui quotidiana laborant. Vomitus quoque maximè, ubi nausea est, & iis qui facilè uomunt, utilis est.

Post initia iam uacuato corpore dantur hora ante accessionem aquæ sequentes.

R. theriacæ uel mithridati dr. i. propinetur ex uino tenui. Probatur quoque decoctum apii, uel quod sequitur.

R. zinziberis, origani, ameos ana dr. iii. coriandri præparati dr. iiii. rosarum, calamenthi ana dr. iii. passularum drac. i. coquantur libr. vi. aquæ ad consumptionem medietatis. Dantur 3. iii. hora ante accessionem. Vitæ ratio institui debet ex iis, quæ coquunt, attenuant, incidunt, & ut progreditur morbus, horum uis augenda est. vinum album, tenue, aut uermiculum.

Abstinendum est multis iusculis, quia nec coctionem ita iuuant, & replent caput: nec stomacho amica sunt. Quibus si utimur, alterare oportet iis, quæ has noxas prohibeant. Adultis auius utendum est, potius quàm iunioribus.

*De febre Epiala.*

**E**pialon Græci uocant algorem, & febris genus in quo sensus totius corporis inæqualis est. Nam simul algere & calere. alger quidem uehemens est, & calor mitis. Hinc epialon appellatum uolunt, ἡπιον Græcis blandum & mite est.

Pituita uitreæ omnium humorū, qui in corpore sunt, frigidissima est. Illa siquidem integra est, neque putrefacta. Inexpugnabile frigus infert corpori, & ea, quæ superius capite de pituita dicta sunt.

Vix



Vix multa colligitur in corpore, eiusque causa, uel ciborum materia, uel languidus calor, uel utrumque. Si tota putrescit, quotidiana febris est: si tantum ex parte, epiala.

Itque huius febris materia pituita uitrea est, non in totum, sed in partem putrefacta. Quæ pars non putruit, algorem: quæ putruit, uapores calidos dimittit in corpus, unde febrilis sensus. Initio oscitatio, pulsus minimus, tardus, rarus, urinæ crudæ & aquosæ, quotidie ferè inuadit. Accessio à 4. horis ad 24. sed ferè breuior. Aliquando tertio quoque die, aut quarto commouetur, fortasse etiam maioribus interuallis. Neque falli oportet, ut tertianam existimemus, uel quartanam: quia tertianæ uel quartanæ periodis moueatur. Ad cognitionem huius febris antecedens uita, cœlum, ætas, temperamentum, & cætera adhibenda sunt.

Hic abstinendum phlebotomia. Medicamentis incidentibus, & calfacientibus utendum est. Hyssopi, calamenti, origani, thymi, stœchados. Melicratis, quibus quarta pars uini poterit commisceri. Alioqui syrupis utimur in curatione quotidianæ descriptis, initio facto a leuioribus, ut syrupo acetofo, oxymelite ad fortiores, ut oxymel compositum, scylliticum, & similes.

Iam incisa & concalfacta ex parte materia, utendum erit medicamento ex puluere hieræ picræ. Gal. pul. hieræ diacolana drac. s. utendumque erit, ut recentes sint, & electæ species, & quibus pulueres componuntur. Post purgationem redeundum est ad incidentia medicamenta & alimenta. Atque interuallis glandibus & clysteribus acrioribus utendum, in quibus pulueres proximè dicti dissoluuntur ad unc. s. Probant thermas siccas, ubi iam se produnt signa coctionis. Meliores thermæ, si ex rebus incidentibus & calfacientibus comparentur. Itaque calamentum, mentham, origanum, roremarinum, thymum, satireiam, stœchada, & alia eiusmodi, quatuor partibus aquæ, & una uini incoquemus, atque inde pro ratione uirium, thermas comparabimus. Valent statim à thermis diatrium pipereon, diacalamynthes, aurea alexādrina,



## LIBER SECVNDVS

drina, dianthos & similia data ex uino tenui. Dosis dr. i. Poterit quoque his uti tempore matutino. Sed optimum fuerit statim à thermis fricari corpus, sed spinam maximè: deinde inungi oleis suprà numeratis ea. de quotidiana, aut iis, quæ capite de Paralyfi scripta sunt. Post hæc reponatur in molli lecto, & sumpto diatrium pipe-reon, uel simili, conquiescat.

Vitæ ratio eadem, quæ in quotidiana, sed attenuet magis & incidat.

### *De Quartana.*

**Q**uartanæ materia succus melancholicus, uel atrabilis: quorum generatio apud Græcos superaffatus sanguis, uel flaua bilis.

Arabes torrefacta pituita etiam melancholiam gigni existimant. Quartana alia primùm inuadit: alia febres alias sequitur, maximè erraticas, quæ κατὰ μὲν πρῶτον appellant. Arabes uerò quartanam notham hanc faciunt, de qua Apho. 29 lib. 3. Prognost.

In quartanam uerò firmatur febris, quoties intermittit, præhenditque modum erraticum Autumno propè est, & cùm tricesimus, aut tricesimùs quintus agitur annus. Febrium enim præcedentium materia non solum putrescit magis cum tempore, sed torrefit, ac uelut cinis quidam relinquitur. Quæ materia torrefacta, si aliis quidem partibus putrescit, feruet & commouetur.

Aliis uerò non putrescit, neque feruet, neque commouetur, quibus febris erronea fit. Contrà uerò, si æqualiter hæc sunt in corpore, quartana fit. Hoc genus quartanæ nothæ ætati consistenti magis familiaris. Quæ uerò quartana uera est, declinanti ætati, hoc est, post 35. annum. Qua ætate languescit calor, sanguis melancholicus colligitur, densatur cutis, & putrefacto sanguine melancholico, quartanæ excitantur.

Æstate quartanæ breues magna ex parte, quia humor tenuior est, cutis laxior, & materia facile discutitur.

Autumnales longe, maximè quæ hyemem attingunt. Harum materia crassior, cutis durior, externum frigus est, quod excretionem prohibet, & materiam febris intrò repellit.



repellit. Nec perpetuo Aestate breues, sed cum materia tenuior, sanguis tempestiue detrahitur, & iusta uitæ ratio obseruatur.

Alia febres, uitio hepatis: alia, uitio lienis: nonnulla, uitio uentriculi. Ab hepate color albidus, subtumidus corporis habitus, urinæ subrufæ sandaracæ colore: dextrum hypochondrium intumescit, maior spirandi labor & tussis, quàm à liene. Atque hinc inuitabilis ferè Hydrops. Aliquando uitio uentriculi crudus humor Vere potissimum colligitur, tam crassus & cõtumax, quàm atra bilis. Hinc quartanam gigni posse scribit Aristoteles, id est, febrem, quæ quarto quoque die repetit. Nec id quidem repugnat Græcis, aut Arabibus Medicis. Etenim pituita quantitate pauca, sed consistentia multum crassa & uiscida quartanarios, aut etiam rariores, circuitus facit. Sed quæ quartana hæc est, ad Epialam referri potest. In uera ac simplici quartana, quæ sæpissimè contingit, initio quidem frigus est, quod in altum penetrat, ut etiam ossa pertundere uideatur, calor sequitur non ita magnus. Non desinit in uomitus biliosos. Tenuis sunt urinæ & aquæ, pulsus paruus, rarus, debilis, tardus, occultus, quarto ferè die repetit. Aliquãdo tardius Autumno, & ætati declinanti familiaris, melancholicis naturis magis etiam, si constitutio anni frigida & sicca est, uita refrigerans & siccans.

Post initia rigor fit, in declinatione sudores fluunt.

Quod si etiam lien intumuit, diuturnius malum est, quàm si ab hepate ortum sit. Resistit aluus, facilius, in sinistrum latus decubitus, metuitur hydrops. Soluuntur quartanæ urinæ crassæ, aliàs albæ, aliàs nigre, cunctibus mensuris aut hæmorrhoidibus fluentibus, proflauio sanguinis è naribus, abscessu in crura. Accessionem ferè habet 24. horarum, aliàs breuiorem. Quartana salubris est, neminemque iugulat. Quod tamèn intelligi debet non simpliciter. Senes enim magna ex parte interficit. Aliquando quoque uiscerum tumor est, defluxio in uiscera, aut aliquid tale, unde mortis periculum est. Producitur ferè in tertium uel sextum mensem, aliquando in an-



## LIBER SECVNDVS

num. Auicennas in 12. annum produci scripsit. Nec id mirum. Nam Meccenas tota uita perpetua febre laborauit, supremo triennio nunquam dormiuit.

Ad genus quartanarum longiores periodi referri possunt. Hippocrates quasdam quintanas, hasque pessimas facit, quæ aliàs ante fiunt, aliàs tabidis superueniunt & interficiunt. Idem septimanas longas, uerùm non lethales. Præterea nonanas cæteris longiores, sed non lethales.

Verùm Gal. hæc non Hippocratis, sed alterius esse putat, scribitque nullas se uidisse periodos ultra quartanarium. Agnoscit tamen aliquando fieri posse, ut à præcedente febre semen aliquod relinquatur, neque iustæ uitæ ratio obseruetur, atque inde fieri, ut uel 7. uel 9. 5. uel 6. die repetat febris. Verùm non protinus quintana, sextana febris est. Quòd si in ratione uitæ nihil peccatum est, & fiant eiusmodi periodi, quintana sit febris sextana, &c.

Paulus quartanæ periodos interim producit ultra quartum. Epiales circuitus rariores aliquando quàm quartanarij.

Razes & Auicennas, aliorum quoque experientia eiusmodi circuitus cognoscunt. Rariores etiam, ut qui repetant 15. quoque die, semel in mense, semel in anno. Existimantque hæc fieri à materia melancholica, pauca & crassissima, quàm exusta crassior pituita generauit. Nec si ultra quartanariū, circuitus quintani, septimani, & alij admittentur, non propterea nouæ humorum species fingendæ sunt.

### Curatio.

Cum quartana clementer agendum est initio. Neque medicamentis catharticis natura irritanda, medicamenta quoque incidentia, & ( ut uocant ) digerentia media sint. Nam quicumque initio non solum catharticis, sed etiam fortius incidentibus, & digerentibus utuntur, ea simplici quartanà, duplicem omnino maiorem & difficiliorem, ex duplici triplicem, uel omnino ambas maiores, difficiliioresque reddiderunt. Nonnunquam intempestiuo



pestiuo usu remediorum continua sit, quæ agros occidit. Tempora igitur huius febris diligenter animaduertenda sunt. Neque urina sola, sed omnia accidentia consideranda sunt. Paroxyismi inter se comparandi, uidenturque an grauiora, an minora accidentia superueniant. Verum quod ad pharmaca attinet, non perpetuò expectanda sunt manifesta signa coctionis. Aliquando enim multa materia est, corporibus neruosis impacta sequiturque paralyti, cuius si qua ostenduntur signa, etiam si manifesta coctio non apparet, maioribus remediis utendum est. Neque leuioribus pharmacis, & clysteribus interdictum est. Verum, ut primæ uenæ leuiter repurgentur, exhibetur castiæ fli. vnc.s. Aestate in sero caprino dissolutæ. Hyeme uerò in hoc decocto.

R. passul. P. i. foliorum sennæ drac. i. cinamomi scrup. s. Fiat decoctio pro una dosi, in qua dissolue uel castiæ, uel catholici ʒ. s. Alioqui ex iusculo galli uel capi alterato cū multa borragine, buglossō, apio hortēsi, lactuca, scariola, infundimus drac. ii. foliorum sennæ, & iusculum colatum sorbendum exhibemus, uel eadem folia liquidiore iure pisorum, aut cicerum rubrorum incoquimus, butyrum & modicum salis adiciamus, cinamomi etiam puluisculum, & ita damus. Eadem folia in puluerem redacta pondere drac. ii. inspergimus, decocti absynthii ʒ. iii. Frequens usus ueteribus fuit epithymi. Nunc folia sennæ plurimum usurpantur. Iam apparentibus signis coctionis utimur agarico, pul. hieræ picræ, hieræ diacol. quibus folia sennæ trita commiscemus. Veteres etiam el leboro, quidam lapide armeno & lazuli fortioribusque catharticiis, quæ ex cap. de melancholia repetenda sunt. Quod ad digerentia attinet, cōueniunt syru pi capil. uen. de lupulis, scolopendrio, adiatho, uiolatus, de pomis, de fumoterræ, oxymel simplex.

Deinde etiam apparentibus signis coctionis, oxymel diureticum, syrupus de bizantiis, oxymel scylliticum. Alioqui melicrata ex absynthio, eupatorio, chamædri, scolopendrio, radice capparis, fœniculi, petroselini, rusci genistæ, fraxini, polypodii, tormentillæ, tamarisci, glycyth. . .



## LIBER SECVNDVS

cyrrhizæ, & similia. Aut ex his syrupos comparamus, fereque passul. borrag. cuscutam, scariolam, cichoriū quatuor semina frigida maiora, sc. anisi, fœniculi, carui, sem. portulacæ, coriandri commiscemus. Mel item passulatū prius descriptum, aliquid aceti, decoctum limacum, ranarum uiridium, succum pomorum odoriferorum.

Sed in his omnibus diiudicandum: initio enim leuiora conueniunt, ubi neque fortiter calfaciendum, neque refrigerandum est. Eligendaque sunt, quæ uel temperata, uel proxima temperatis sunt. Vfus calidorum, cū iam uiger morbus, & apparent signa coctionis manifesta, ut sudores & urinas moueant.

*phlebot.*

Quod ad Phlebotomiam attinet, si quidem corpus crasso sanguine abundat & redundat, si gracile corpus est, si uenæ turgidæ, si suppressa aliqua solennis purgatio, uena secanda est.

Atque ubi niger & crassus sanguis effluit, pro ratione uirium, & multitudine sanguinis deplendum est. Si tenuis & flauus, statim claudenda uena est, fereque aperitur basilica, sinistri brachii, uel saluatella, si quidem uiribus metuinus. Atque aliquando periculi gratia, ut qualis sit sanguis, cognoscamus, uena inciditur.

*balnea*

Suppressa purgatio suo modo incitanda est. Est & in quartana thermarū & balnei usus. A balneis (inquit Galen.) penitus arcendi non sunt: à quibus si omnino abstineant, solis contenti frictionibus plurimum iuuari possunt. Galenus uidetur omnino reiicere, nisi consuetudini aliquid concederet. Hippocrates & Arabes recentioresque practici hoc modo utuntur. Ante signa coctionis dulcia quidem balnea, leuiter calfacientes thermas, ut breuis mora sit, permittunt, idque ante cibum extra paroxysmum. Apparentibus uero manifestis signis coctionis, fortiora balnea & strophas permittunt, eademque frequentiora. Quorum iusta ratio est. Nam in quartana, per initia quidem, omnis motus corporis, & animi, qui quidem uehemens sit, uitandus est.

Postea uero is conuenit, siue fiat per pharmaca, siue per potiones, & alia quæuis remedia. Debent autem & thermæ,



thermæ, & balnea ex dicta materia comparari: gratia exempli. Chamæmelum, melilotum, anethum, herba fœniculi, postea etiam calamêthum, melissa, pulegium, itachas, origanum, coquantur aqua unde lauacra fiant & uapor thermarum excitetur. Iam apparêtibus signis coctionis, à thermis & balneo tempestiuus usus est theriacæ. Quartanarios (inquit Gal.) multos sæpe hoc ordine curauimus, eo die, qui accessionem præcedit uomitum à cœna commouui. Postridie manè cremorem absynthii exhibui, tum duabus horis ante accessionem, theriacam dedi, idque tam fœliciter cessit, ut postea non redierit accessio. Hoc modo igitur ex Gal. Arabibus, & recentioribus Medicis in quartana te habebis. Vbi iam apparent signa coctionis manifesta, pridie accessionis, ex decocto sem. atriplicis uel raphani, aqua, uel ptisana tepida digito immisso in gulam pœna illita oleo, uomitum à cœna commouebis. Stomachum oleo absynthii inunges, somnum in noctem procurabis manè.

R. summitatum absynthii M.s fiat decoctio in aqua ad unc. iiii. colatura detur, quæ modico cinamomi condiri potest. Ex quo duabus horis antè accessionem.

R. theriacæ bonæ dr. i. dissol. in uino albo tenui ad ℥. iiii. in quo calido chamædreos pugillus maduerit. Alii etiam initio paroxysmi eundem potum imperant, hocq; meminisse oportet eum diem, qui præcedit paroxysmum, commodissimum esse & pharmacis & aliis remediis.

Alia quoque antidota interuallis sunt danda, multò magis ubi manifesta signa coctionis apparent. Plurimus usus theriacæ mithridaticæ, aureæ alexandrinæ. Dosis à drac. i. ad drac. ii. ex uino, decoctione chamædreos, aqua ligustici, cuscutæ, scolopendrii, fumaris, lupulorum, capilli. uen. ualerianæ, calamenti & rerum similium. Probatum quoque & hoc.

R. cinamomi dr. ii. piperis dr. i. croci, mirthæ, stiracis, serapini, an. dr. s. beniouini dr. iiii. rad. gentianæ dr. ii. excipiatur melle Dosis dr. s. aut scrup. ii. ex aqua calida. Eadem dosis castorei, uel bituminis iudaici. Dentur autem duabus horis ante paroxysmum. Fetus & illitio-

nes



## LIBER SECVNDVS

nes non solum stomachi, sed & uiscerum primum quidē ex iis, quæ remolliunt & relaxant: deinde additis, quæ flatus discutiunt & aperiunt. Conueniunt oleum chamæmeli, anethi, absynthii. Adduntur & semina apii, rutæ, cumini. Solenne fuit veteribus Medicis, obseruatū quoque recentioribus, ut præter supradicta remedia, quæ ante paroxysmum descripta sunt, spinam, scapulas, brachia quoque inungerent. Cui rei cōueniunt oleum chamæmelinum, de cucumere agresti, oleum, in quo rosamarinus coxerit, & ea quæ in Paralyfi dicta sunt. Sic enim præciditur causa Paralyseos, quæ aliquando quartanariis accidit. Deinde rigor anteuertitur. Probatum hoc linimentum.

R. succi rutæ unc. ii. olei scorpionum unc. 4. uini maluatici unc. 3. feruefiant ad succi consumptionem, & addito ceræ momento fiat linimentum. Aliud.

*puluerē* R. cinamomi, piperis an. drac. 2. terātur tenuissimè & misceantur, & postquam spinam oleo chamæ. inunxeris, pulmonem inspergito, sequentibus paroxysmis: idem & in scapulis & brachiis facito.

Post hæc autem, quæ fieri debent imminente paroxysmo, molli lecto ægrum reponito, bene contegito, lateres calidos perfusos uino tenui odorifero, & linteolis cōuolutos, plantis pedis & uolis manuum admoueto, uel aliter contra frigus munito.

Iam uigente morbo, urinq̃ & sudores moueantur: Cui rei melicratum ē calamentho, mulsa, in qua anethum, ruta & similia coxerint, gaiaci decoctum conuenit.

*vomitū* De uomitu sic habeto. Qui Isagogem seu Medicum scripsit, initio paroxysmi extrema calfacit, in remissione uomitum prouocat. Græci à cœna uomitum fere imperant.

Auicennas antè cibum, post cibum, hora ante paroxysmum, initio paroxysmi. Practici recentiores initio uomitum prouocant, & antè paroxysmum. Commodissima hora est commota materia, & facile sequenti. Id fit initio & remissione paroxysmi: fit etiam iam cœnatis.

*lysteria* In Clysteribus eadem ratio seruari debet, quæ in pharmacis



macis. Primum enim ex remollitis uocatis, adiecto furfurum cremore, prunorum & passul. decocto. Postea uero ubi materia cepit concoqui, paulo acriores clysteres conficimus. Dissoluimus autem initio quidem cassiam fistulam. Denique etiam cum materia decoctionis ephthymum, folia fennæ incoquimus, hieram picram dissol. uel Galeni, quæ leuior, uel Oribasii, quæ acrior. Cuius hæc est descriptio.

R. aloes drac. ii. & Gr. vi. spicæ nardi, asari, mastichis, croci, xylobalсами ana Gr. ix. corticis rad. ellebori nigri ꝑ. s. terantur omnia, incorporentur ex decocto pulegii, uel succo absynthii, alioqui melle incorporentur. Dissol. autem huius picræ melle incorporatæ dr. ii. iii. qua & uti licet iam progressio morbo ad dr. i. uel ꝑ. iiii. si inde formantur pilulæ. Alioqui imperabis pul. hieræ picræ dr. i. pul. fennæ drac. s. incorporabiliter ex succo absynthii, in quo scrup. s. corticis rad. ellebori nigri madefeceris.

Quod ad uictum attinet, conuenit initio è materia media, interuallis quoque ab initio ad uigorem rebus acribus, ut sinapi & pipere, & salsamentis uti licet, quam & post uigorem tempestiuus usus est. Similiter diatrium pipereon, diaspoliticon ad drac. ii. ex unc. iii. uini uel maluatisci, uel tenuis & odoriferi, idque ante paroxysmum. Id autem fiet commodè, uel 3. uel 4. quoque die. Salsamentis ueterum ferè caremus, neque ut salsamenta Græcis & Arabibus permittantur, quibusvis rebus sale conditis utendum est.

Non enim bubula aut suilla, non iethiocola seu molluta, in summa iis, quæ crassum sanguinem gignunt, quæ nimium siccant, quæ uiscidam materiam relinquunt, uti oportet. Nam ideo salsamenta imperantur, quia sal incidit, attenuat, discutit excrementa, siccant, uirtutem colligit, & roborat.

Vitanda sunt, quæ refrigerant & siccant, nisi temperentur aliquo, quod humectet. Siccant capillares & refrigerant. Scolopendrium & alia, quibus hic utimur. Sed aliis ut saccharo, & aqua corrigantur. Refrigerantia uerò & humectantia prohibet ex Græcis Aetius. Auicen-

*uictus:*



## LIBER SECVNDVS

Auicennas permittit iusto modo, ut scilicet, facilis sit coctionis, boni chymi, quantitate modica, & si quidem nihil metuimus, ne inde uix concoctrix uentriculi offendatur, tumque corrigenda sunt. Numerat lactucas, endiuia, melones, persica. Melius fuerit uti persicis cōditis, cerasis & eiusmodi fructibus æstiuis, qui saccharo condiri solent, & ita seruari. Alioqui persica coquantur, si recentia sunt, nec condita. Cerasa duobus uasis conclusa cum modico uino macerantur. Saccharum inspergitur: ita prodesse possunt nec nocent. Vino quoque contra errorem multorum persica infundi possunt. Nam hoc à uino accipiunt, quod & inde frigiditate temperantur, nec facile corrumpuntur.

Lactuca & endiuia leniter feruefiant. Saccharum inspergatur. Probantur conseruæ uiolarum, rosarum & borraginis. Sed perpetuò distinctio adhibenda est, ut in usu horum omnium remediorum rationem ineamus naturæ, materiæ, ægri, cœli, regionis & reliquorum eiusmodi.

### De Febre ardente.

Causas habet, procatacrticas quidem res non naturales, quæ siccant & calfaciunt immodicè. Qualis est uehemens ardor solis, liberalior potus uini fortis, longa sitis, alimenta quæ calfaciunt & siccant. Plurimus labor, uenus, uigilia, cæteraque eiusmodi, ex quo uenæ exhauriuntur, exsiccantur, effervesceat sanguis, affectio sequitur, quæ febris ardens appellatur, cuius indicia pathognomonica eadem, quæ in tertiana: sed uehementius aucta, nisi quod neque præcedit rigor particulares accessiones, neque sequitur excretio. Nam hæc fieri solent in ardore cum omnino morbus iudicatur, sitis est uehemens, fastidium, iactatio corporis, lingua arida, scabra, nigra, delirium, uentris erosio, effusio alui perpallida, uigiliæ interim perpetuæ, interim profundi somni, eleuatis uaporibus crassis, qui cerebri ineatus obfarciant. Nonnunquam fatigata uirtute, uigilandi impotentia, & falsus somnus interim nimium resiccato gutture, uox plangens, ac ueluti pauca, pessimum signum & lethale. Celerri-  
mò



mè interficit hic morbus.

Quarto aut sexto ferè die, cum à mera bile natus est. Nam & ardor est, in quo flauæ bili crudus humor aut pituita salsa commiscetur. In hoc genere magno corporis perturbatio, capitis grauitas & dolor, conuulsio, à quibus mors. Urinæ crassæ sunt & turbulentæ.

De ea re hystoriæ scriptæ sunt ad Hippocr. de Praphante Philini uxore, & Sileno in epidemiis. Actuarius adolescentis meminit, qui post hoc lotium conuulsus expirauit.

Causa huius urinæ crudus humor & crassus, putrefactæ bilis ardore agitatus, multo præditus spiritu, unde turbatio & in caput sublatus uapor crassus & mordax, qui dolorem, grauitatem, conuulsionem, mortem denique inferre solet. Celerrimus hic morbus, atque periculosissimus. Initio ergo præsagium instituendum est, ut calamitiam declines.

Si itaque omnia supradicta accidentia statim initio magna sunt, si anxietas, timor modicus, rigor subinde motus, sudor lenis in frõte & clauiculis, multa deliria sunt, squalescit cutis, carpuntur flocci, conuelluntur uestes, stragula colliguntur, frequens motus est digitorum, difficilius spiratur, uehemens cordis motus est, extrema non ita calêt, aut etiam frigescent, nec facîle ad calorem reuocantur, si diebus paribus exacerbatur, si tertius & quartus difficiles sunt, si urinæ tenues, nigræ, crudæ, paucæ, aluus quoque adstricta est, aut deiecit, quæ colliquationem indicant, uel ea excrementa, quæ ab Hippocrate lethalia describuntur. Si guttæ sanguis naribus extillent, si non sit pro ratione, curatio tentanda non est. Sed prædicenda mors. Hyeme ferè periculosior ardor est. Eorum uerò, si nihil est, aut lenia omnia, uel pauca quidem, & ea quidem minus lethalia, desperandum non est.

Quemadmodum & spes est salutis, si omnino adfuerint contraria.

Differt à Synocho putrida. Synochus enim putrefacta fit sanguine: ardor à bile. In synocho una est ab initio ad finem exacerbatio. Ardor alternis diebus exasperatur. Indicatur



## LIBER SECVNDVS

dicatur ferè hæmorrhagia uomitu, sudore, alui deiectione, urinis, in summa excretionem. Genus autem excretionis his signis iudicabis. Sanguinem è naribus ostendunt aures & ceruix rubentes, cætera pallida, spontaneæ lachrymæ, caligo oculorum. Interim cum splendore, grauitas capitis, colli, frõtis, & temporum, pulsatio uenarum, quæ illic sunt, pruritus narium, contentio hypochondrii sine dolore, pulsatio spinalis arteriæ, faciei rubor, urine, & alui excrementa sine causa manifesta candicantia, pulsus magnus, manus tremulæ.

Est autem salutaris fluxus sanguinis, si die fiat decretorio, quod & reliquis excretionibus criticis commune est. Si è directo fluit, si fluit, nõ stillat. Stillare enim pessimum, præsertim quarto. Verna constitutione, aut calida temperaris corporibus, & biliosis iis, qui nondum triginta annos superant, magis accidit. Vomitus autem signa sunt horror inferiorum partium, frigus, pulsus durus & inæqualis, mordax capitis dolor, tenebræ obiectæ oculis, uentriculi dolor, inconstantia labri inferioris, tenuis sputatio. Fit post annum trigesimum. Pueris etiam & in febribus admodum biliosis. Sudorem pronunciant pulsus undosus, & præmollis, rigor proprius ferè ardoribus cum imminet crisis, suppressa aluus simul & urina, suppressa urina & modicè mota aluus, deliria, incrementi partes calidiores & rubidiores, uapor calidus, humida anni constitutione sunt magis, calidi esse debent, & toto corpore dispergi. Aliarum excretionum nulla propria signa sunt. Sed cum superiorum signa non apparent, & crisis imminet, inferiorem excretionem prædicimus per aluum, & urinas. Interim etiam lumbis prægrauatis, tensis & dolentibus, menstruorum fit eruptio salutaris.

### Curatio.

Bilis repurganda & extinguenda. Primumque animaduertendum, utro remedio potius utendum sit, phlebotomia, an cathartico. Inedia & omnino exquisita, phlebotomia omittenda est. Suspecta quoque in ea, quæ ad ideam proximè accedit. In aliis si numeri phlebotomiæ consentiunt, etiam ad animi deliquium, authore Galeno,



no, sanguis detrahi potest. Nunc uerò animi deliquium expectandum non est. Veteres etiam purgationibus utebantur, alij quidem fortioribus, alij leuioribus, præferenda leuiore. Hippocrates asinino lacte cocto, Gal. etiam sero utebatur. Mollibus clysteribus ex ijs, quæ feruorem febris extinguunt, uti licet. Ut paratis è sero lactis, è decocto uiolarum, maluæ, rostri porcini & similium. Saccharum potius, quàm mel in his dissolue, oleum uiolatum, potius quàm commune. Catharticum conueniens cassia est in sero lactis dissoluta, aliquando etiam infusum rhabbarum, quæque cap. de febre tertiana dicta sunt. Maxima pars curationis in extinguenda bile consistit. Extinguitur commodissimè uictus ratione. Decumbat igitur loco suauis auræ exposito. Quòd si locus sine uentulo est, flabello utendum est.

Mollis sit culcitra, tragula & linteamina tenuissima, minimè aspera, & sordida. Ideoque contra errorem uulgi subinde commutanda sunt. Lectus amplior sit, ut subinde locum commutet æger, atque ut aer qui imbibitur, frigidus sit, corpus reliquum non ita perficitur, ac refrigeretur, præsertim accessionis initio, & incremento. Obscurum aerem commendat Hippocrates. Alii neque obscurum, neque lucidum. De ea re iam disceptatum est cap. de Phrenitide. Aestate etiam aer cubiculi flabellis excitari ac refrigerari potest, aqua putealis alioqui frigidissima è uase in uas sæpius transfundatur, ut etiam strepitus ad aures ægri perueniat. Solum insternatur rosis, capreolis uitium, lactucis & similibus aqua rosarum, & aceto, aqua frigida, rami quoque è salicibus toto cubiculo componendi sunt, ac subinde commutandi. Siccati enim iam lædunt. Quòd si aer non admodum calidus est, sed temperatus, eo contentus esse poteris. Victus potus sit magis, quàm cibus, mulsæ cocta, sed diluta nostro more aqua cocta modico saccharo condita, quæ ex hordeo potiones, sorbitiones, alimenta comparantur. Detracto cortice hordei comparantur, hordeata diluta sint. Aqua frigida ante uigorem usui esse non potest. Aetius permittit, si quintam

partem



# LIBER SECVNDVS

partem aquæ temperatæ ad aquam frigidam adijcias. Verum potius uteris aqua ut prius cocta, & modico saccharo uiolato condita, ut sit octupla aqua, sub octuplum saccharum.

Alioqui pane prius eloto abiecta quæ priore aqua, aquam conficies, quam panatam uocant, eamque frigidissimam propinabis, sed maxime in uigore & declinatione accessionibus, multo liberius.

Iam apparentibus signis coctionis, Pruna multa aqua cocta cibo esse possunt. Præter hæc ceratum Galen illinendum est paribus, in quibus maior feruor est, ut hypochondriis & thoraci. Dictum autem prius ex una parte ceræ, quatuor partibus rosacei simul liquaris, uale duplici comparari. Atque ubi refrixerit, in aquam frigidissimam demergi debet, subigiq; uel succo lactucæ, uel semperuiui, uel eorū, quæ refrigerant simul & humectant. Si in thorace feruor est, loco rosacei, uiolaceum eligendū est, meliusque fuerit olea prius elui. Rosaceum ex aqua rosarum, uiolaceum ex aqua uiolarum, quæ quia statim incalescunt, subinde commutanda sunt. Fiunt & cataplasmata & farina hordeacea, subacta succo lactucarum, cucurbitæ, cucumeris, polygoni, plantaginis, capreolorum uitis & similium. Folia lactucæ, ramenta cucurbitæ, aut cucumeris, manibus contrectentur, & admoveantur plantis pedum. Extrema quoque aqua frigidissima immergatur, cui, si uis, tantillum uini commixtum sit. Contineat in ore, & lingua, folia portulacæ, lactucæ, aut acetosæ. Genitalia inuoluantur linteo subinde inculcato in miscella ex aqua rosarum, uino tenui & aceto. Etenim mirabiliter contra æstum facit. Poteris os colluere aqua frigida, uel simplici, uel refracta quinta parte temperate. Veteres etiam cochleare succi rosarum, contra æstum stomachi propinabant. Verum in usu horum omnium frigidorum, obseruandum tempus est. Nam initio & augmento febris non conueniunt. In uigore & declinatione cum iam in superficie calor diffusus est, æstum extinguunt. Alii pulmones recens mactatorum animalium, columbos, pullos, catellos diuisos, medios, raso capiti, pectori, plantis, hypochondriis

paribus

ceratū gal.  
positū

N. 1

vide qd apud  
et colubis, pulli et catellorum capite



chondriis admovent, ut tepido calore, calorem igneum foras attrahant, laxatis uis faliginem ducant, & per accidens refrigerent.

Veteres thoraci, & pectori linteolum hydrelæo calente madefactum applicabant. Alioqui lanam, quantum manu capitur, in aqua & oleo rosaceo, uel uiolacei calefactis madefactam, exprimebant & sublimi in pectus, modicum quoque salis & aceti adiungi potest: sic enim sudorem excitant.

Ad refrigerium quoque lactucarum tenella germina, calente posca immergantur: deinde uel saccharo uiolato conspergantur.

Alioqui ex oleo & aceto comedantur. Melius oleum rosaceum, sed prius abluantur. Practici recentiores miscella ex oleo chamæmelino, aceto albo, & aqua rosarum, hypochondrio, pectus & latera, qua maxime parte feruent, inungunt, & ita dolores mitigant. Galen. lini semine in hydrelæo cocto, & tepido admoto hypochondriis, æstum doloremque mitigabat, oxymelite quoque diluto utebatur, multo maxime, ubi obstructionis suspitio. Quietos esse oportet, quantum febris patitur.

De syrupis & eorum usu iam ante dictum est. Familiaris est iulepus rosatus, syrupus de limonibus, uiolarum, oxysacchara simplex, syrupus acetosus. Verum syropos multa aqua cocta, uel aqua hordei excorticati, aquis scabiosæ, buglossæ & similibus dilui debent.

Aetius diacodio utitur, nunc syrupo de papa. de nenuph. uti licet. Aquæ conueniunt distillatæ & cucurbita, cucumere, melone, portulaca, rosas, uiolis, oxalide & similibus. Sed oportet uel quarta uel sexta parte sacchari conditi, ut fiant iulepi. In sculis quoque alteratis, cum herbis refrigerantibus æstum temperamus. Multa uerò incidunt, ut deliria, uigiliæ, sitis, linguæ scabries animi deliquia, dolores, singultus, tusses, colliquationes aliaque eiusmodi, contra quæ, remedia propriis capitibus dicentur.

*De febre putrida continua.*

**O**bstuuntur pori corporis, & constringuntur, quia  
ucl

*accidens ha  
ius febris.  
p. 37: et  
infra:*



LIBER SECVNDVS

uel cutis densatur frigore, uel contrahitur immodico calore, uel rerum astringentium contractu, uel balneorum naturalium, uel duritie obfarcuntur & impinguntur humorum lentore, crassitie, copia. Præclusis itaque spiramentis corporis, fumosi effluxus quotidiani excrementi retinentur. Nec iam perflatur calor, & spiritus, quos necesse est libera transpiratione refrigerari, ut & excrementa diffluant, & externus aer excipiat. Commutatur ergo natiuus calor, & alteratur in qualitatem præter naturam. Præterea humores corporis, qui motum caloris & spiritus consequi solent, iam non perflantur, neque libere agitantur. Itaque & peculiarem quendam calorem præter naturam contrahunt, & ab alteratis calore & spiritu commutantur. Triâ ergo iam concurrunt, quæ putredinem faciunt. Impeditur transpiratio, calor natiuus in igneum commutatur, hinc putrescit humor.

Quod si hæc modica sunt, diaria fit, tantum alteratis calore & spiritu, non etiam putrefacta materia. Si uero maiora sunt, putrescit humor. Et si hoc quidem in uenis, continua est: si extra uasa, intermittens. Nascuntur continue ex inflammatione partium. Intermittentes non ita. In continuis maligna putredo est & periculosa. Intermittentibus non ita. Putrescit autem aliquando sanguis, nonnunquam pituita, alias etiam uel flaua, uel atra bilis. Et continue quidem materiam ferè habent putrefactam in uenis primis, quæ circa hepar sunt, suisque intermittentibus materia quidem & nonnullis accidentibus, non omnibus tamen respondent. Hinc febris continua pituitosa, biliosa, melancholica, uerum an sanguine aliqua sit, non sine re dubitatum ab antiquis: de quo certant Arabes cum Grecis. Galenus id pernegat.

Idem in problem. Aphrodisei. Quod sanguis si putrescit, parte quidem tenuiore in bilem, crassiore in melancholiam commutatur.

Contra Galen. Auicennas multis disputat. Hippocrates 6. Epid. febres quasdam exiritros, id est, ualde ruben

tes



tes facit. Galenus in Commentario ualde rubentes intelligit à sanguine, materia in qua calor incensus est, unde diffunditur & calor & rubor in corpus.

Et quo tempore, ei qui continua febre laborat pulsus magnus, uelox, æqualis. Urinæ sanis proximæ, horror nullus aut rigor, calor mitis ac uaporosus, succulentum corpus est, ætas ad iuuentam inclinans, uernum tempus, regio, & cætera temperata sunt. Verisimile admodum febrem esse sanguineam cōtinuam. Verum Galenus negat esse putridam: alii contra Galenum certant his argumentis. Putredo (Gal. definitore) commutatio est putrescentis substantiæ: exempli causa, sanguinis ad corruptelam. Commutatio ergo motus est. Huius motus terminus à quo (ut loquuntur) sanguis est incorruptus: terminus ad quem, bilis flaua, aut atra, in quam, igneo calore, sanguis degenerat. In eo igitur motu substantiæ, quæ putrescit, hoc est, sanguinis forma deletur, & noua inducitur, ut iam sanguis non sit, qui sanguis fuit, sed flaua uel atra bilis. Si ergo putredo est motus, suis terminis concluditur. At uerò motum esse hæc uerba indicant inclusa definitione, putredinis commutatio, & putrescentis iam acquisita noua forma. Cum iam è sanguine bilis est, motus ille desinit, ergo & putredo illa desinit. Iam uerò constituamus synochon illam Galeni sine putredine, & ex ea commutationem in febrem biliosam. In eo tempore commutationis febris est, & putredo est. Commutatio enim putrescentis &c. Febris ergo putrida est. Quòd si dicas non consequi, queritur cum in eo motu febris sit, ea aut putrida, aut non putrida est. Nemo enim dicat non putridam. Neque enim est talis, qualis fuit quæ sanguinea non putrida dicebatur, & iam putredo cœpta est. Neque putridam cognoscit Galenus. Alioqui putrida sanguinea dicenda est. Reliquum sit ut semiputridam appelles mediam inter febrem sanguineam non putridam, & febrem, quæ sit iam mutato sanguine in flauam bilem, uel atram. Queritur ergo cur non uoces putridam, cum porrio humorum iam putruerit. Nec enim neces-



## LIBER SECVNDVS

se est uniuersam materiam putruisse, ut febris putrida sit. Nec in omni febre putredo per uniuersum corpus sparsa est: sed aliquando sola parte aliqua, uel partibus resedit. Et intermittentibus putridis exiguum est, quod putruit: plurima materia integra est.

Neque satis constitutum est, cur putridam biliosam appelles iam corrupto sanguine in flauam bilem. Nam bilis illa ex sanguine facta uel putrida est, uel non putrida. Si non putrida, non erit febris biliosa putrida. Alioqui æstate, ætatis flore, cum sanguinis bona pars bilis sit, putredo esset, corruptio uidelicet sanguinis à calore præter naturam in flauam bilem. Si putrida bilis illa est, unde putruit? Nam ea ætate & æstate, cum sanguis in bilem commutatus est, bilis putrida non est. Rursum si putrida est, quæritur an bilis putrida bilis sit, an non bilis. Bilem non esse putredinis definitio & natura motus secundum substantiam, quæ mutatio appellatur, satis ostendunt. Nam putredo corruptio est eius commutationis finis. Si corruptio, ergo ab esse ad non esse motus. Bilis ergo putrefacta, bilis non est. Iam sic collige. Bilis putrida bilis non est, & tamen biliosam febrem putridam denominat. Ergo eodem modo sanguis corruptus in bilem, etiam si sanguis non est, febrem sanguineam putridam denominabis. Quòd si in tempore motus febris illa putrida est, dicetur putrida sanguinea potius, quàm biliosa. Nam lignum, dum corrumpitur, etiam dum lignum, nec dum cinis est. Eadem ratione in aliis.

Deinde quæritur an necesse sit sanguinem, qui etiam uehementer incaluit, conuerti in bilem? Quòd si necesse dicas, cur igitur in reliquis generibus febrium, quas uel pituita uel bilis commouit, sanguis non corrumpitur? Cur in inflammationibus, in bilem non degenerat? At in his etiam, ubi multos dies febris exarsit, sanguis plurimus isque integer per nares effluit. Idem è uenis integer aliquando detrahitur, & in phlegmone apostema sanguineum facit nõ biliosum. Ergo corruptus in uenis febrem sanguineam faciet, non biliosam. Et cum scribit Gal. in febre



bre sanguinea sanguinem putruisse in omnibus uenis, uel ergo totus putruit, uel tantum pars. Si totus putruit, non conlabit uita, toto scilicet sanguine partim in bilem flauam, partim in atram conuerso.

Oportet enim, ut consistat uita, sanguinem reliquos humores superare, qui si non superat, sed iam nullus est, nulla quoque uita est.

Si tantum pars putruit, cur non & totus putruit? Cum toti sanguini præsens sit calor, & reliqua, quæ putredinem faciunt. Deinde si pars crassior, ut uult Gal. quæ natura sua & siccior & frigidior est, magis resistere debuit putredini, putrefacta est & in atram bilem uersa, multo magis reliquæ celerius putruerunt, & in aliam substantiam conuerſe sunt, ut iam nullus sit sanguis. Sunt & alia permulta, quæ Arabum sententiam confirmant. Sed in eo laborandum magis, ut fideliter curemus, quàm ut subtiliter differamus.

*Curatio.*

In febribus putridis & continuis quedam intermittentibus respondent, nisi quòd neque rigor, neque frigus præcedit.

Non sequitur uomitus, aut sudor, intermissio nulla est, sed tantum remissio, quarum curatio eadem in genere, quæ intermittentium est, seruata ea ratione, quæ in exquisita tertiana & ardente dicta est. Sunt & Synochi peculiariter appellatæ febres. Aliæ quidem homotoni, quia ab initio ad finem una eademque exacerbatio est, ac ueluti tenor unus accessionis. Aliæ ab initio ad finem perpetuò increſcunt, & Epacmasticos appellat Hippocrates, ut Paracmasticos, quæ initio acerbissimè, paulatim decreſcunt, quibus materia est sanguis, qui in maximis uenis conclusus inguinibus & clauiculis interceptis effluuiescit. Is autem aliquando superat quantitate, aliquando crassior est, nonnunquam etiam putredinem contrahit, ex quorum distinctione consilium uniuersale curationis transferri debet. Fingamus ergo Dionem iuuenem, aut ea ætate, qua desinit adolescentia, continua febre laborare. Pulsus magnus sit, uelox & æqualis, urinae fa-

r 4 nis

*ma febrim  
synochæ.*

*excep  
dionis  
iuxta  
iuxta  
hædine.*



## LIBER SECVNDVS

nīs proximē. Horror nullus aut rigor, calor mitis ac uas  
porosus, corpore bene carnosō, tumentibus uenis, sensu  
distentionis, rubente facie. Adhuc quoque cetera, quæ  
sanguinis generationem ostendant. Statim colliges febrē  
citare ex obstruptione, quam efficit sanguinis plenitudo.  
Itaque facile consilium est.

Detracto enim sanguine tollitur plenitudo, & depleta  
copia sanguinis liberatur obstruētio. Nihil uerō reliquū  
est, quā ut corpus, quod per febrem alteratum est, suæ  
naturæ restituamus. Quod quia nimium incaluit, refrige  
randum est, ut hæc duo remedia sanguinis missio, & tem  
pestiuus frigida usus, uel eorum quæ refrigerant & hu  
meant, exacte percurent Synochon.

*phlebot.*

Phlebotomia auctoribus Græcis Medicis ex interna  
dextri brachii etiā ad animi deliquium esse debet. Quod  
si uires, aut alia repugnant, quo minus tantum materie  
semel auferatur, uacuationem partiri oportet. Et in mu  
lieribus propter mēstrua, in aliis etiā propter suppres  
sam aliquam uacuationem ea seruanda ratio, quam sæpe  
diximus. Repetendum quoque, ut si quid uel cruditis  
in uentriculo & primis uenis, uel si quid ueteris ltercoris  
in intestinis, hoc quidem clystere molli: cruditas uerō  
mollis pharmaco ante phlebotomiam excludatur. Aut si  
res patitur & tempus, cruditas illa frictionibus, unctioni  
bus, & aliis remediis concoquatur. Post phlebotomiam  
duabus aut tribus horis mulsam Græci propinabant, ex  
hinc hora, ptisanæ cremorem. Nunc uerō mulsæ loco, quæ  
quidē suspecta est in magno calore, aqua cocta, cui octa  
ua pars sacchari commixta sit, utendum est. Deinde hor  
deato, loco cremoris ptisanæ.

*leui*

Victus in reliquum tempus instituendus est, qui re  
frigeret & humectet. Is autem tenuis sit & magna ex par  
te in forbitionibus. Itaque nostro more iuscula conue  
niunt ē tenuioribus pullis gallinarum, uel uitulina car  
ne, molliuscula. Alteranda uerō ex acetosa, lactuca, &  
portulaca. Potus, aqua hordei, syrupus uiolatus, multa  
aqua cocta dilutus, iulepus uiolatus, oxysaccara simplex,  
syrupus acetosus, iulepus Alexandrinus, oxymel simplex,  
dilutum,

*uictus*

*potus*



dilutum, uel hæc oxysacchara.

R. aquæ coctæ lib. iiii. sacchari libr. ii. aceti libr. s. Fiat potus clarificatus. Verum in aceti & sacchari modo id obseruandum est. In mulieribus, in gracilibus corporibus, in iis quibus intestina facile mordentur & raduntur, aceti usus suspectus est, aut certe minuendus modus. Quanto maior calor est, tanto minor modus debet esse sacchari. Apparentibus signis coctionis, nullus potus melior est aqua frigida. Postea etiam uino albo tenui, aquoso, uti licet, ex quo & sudores & urinæ prouocantur.

In morbo, si resistit aluus, clysteribus mollibus incitanda est. Si uero etiam crassities humoribus accedit, incidenda & attenuanda est, diluto oxymelite & aliis sæpe enumeratis. Quod si materia incisa, urinæ aut sudoribus uacuata non est, leui pharmaco uti licet, manna, cassia, rhabarbaro. Præterea uidendum est, ne densata cutis, obstructa uel occlusa obstructionem faciat, à qua & putredo, & febris. Et si quidem frigore densata est, calidis laxantibus utendum erit, ut chamæmelino. Si densata, alstringentibus, & siccata, ad ea quæ humectant, refugiendum est, ut hydreleum. Et iam apparentibus signis coctionis, ad balneum aquæ dulcis. Si uero occluditur cutis, humorum copia, uacuatione opus est. Si humorum crassities, attenuantibus utendum est.

Si lentore, detergendum. Præfici maximam partem curationis in refrigerantibus collocant, quæ conficiuntur ex hordeato mandato, prunis damascenis, glycyrrhiza, quatuor seminibus frigidis, endiuia, scariola, cichoria, lactuca, rostro porcino, acetosa, floribus uiolarum, nenupharis, buglossæ, borraginis, & aliquando aliquid aceti adiciunt. Nonnunquam syrup. capillorum ueneris, portulacæ, acetosæ, & aliis supradictis utuntur. Syruposque diluunt aquis uel decoctis endiuia, capillorum ueneris, portulacæ, acetosæ & similibus.

*De Febris Colliquantibus.*

**F**ebres hæc pessimæ, in quibus substantia corporis multis modis dissoluit. Idque aliquando paulatim, ut in Marasmo & febribus hæcticis. Nonnunquam uero ita-

oxysacchara

potus  
aq. frig.

N.



## LIBER SECVNDVS

tim initio morbi substantia corporis dissoluitur, carnosum genus, pingue & solidum. Sed aliquando quidem fit effluxus substantiæ per insensibilem transpirationem.

Idque dupliciter. Nam aliquando fit paulatim, ut in febribus, quæ Marasmodes & Hecticæ nominantur. Alias uero breuissimo tempore.

Et huius signa sunt, Nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, & cætera in eo prognostico enumerata. Sed longè periculum maius est, si id derepente fit, ardore febris & igneo calore, qui quidem substantiam corporis resolvunt in fumos, frugi quoque spiritum & naturalem per poros excludunt. Minus periculum est, cum ex uigilia, insigni purgatione, inedia, rebusque eiusmodi colliquatio facta est, eaque breui tempore reparari potest. Ex mæstitia & grauioribus animi curis idem contingit, sed ea colliquatio non ita celeriter instaurari potest. Proprie tum colliquans febris appellatur, in qua feruidus malignusque calor est, qui non solum per insensibilem transpirationem, sed per manifestam excretionem exoluit corpus. In hac deiectiones alui rufæ, crassiusculæ, foetidae, aliquando pingues & uiscosæ, biliosæ quoque spuma insidet, quæ feruorem indicat, urinæ similes. Aliquando etiam appetente morte tenuis sudor, syncope, & mors.

Si itaque in febre acutissima statim initio ex facie illa mortifera colliquationem intelligas, maioribus remediis omnino abstinendum est, tantumque procurandum est, ut effluxum illum prohibeas, & causas syncoptes anteuertas. In his febribus uirtus ferè languida est, quæ maiora remedia non admittit.

Atque ubi uideris alui excrementa rufa, grauiter olentia, spumosa, & uires languidas, non solum maioribus remediis abstinendum, sed etiam syrupis mellitisque rebus, nisi eiusmodi syrupi plurimum diluantur. Hippocrates interdicit mulsæ, quæ tantum octauam partem mellis recipit. Duo remedia annotat, ptisanæ cremorem & aquam frigidam. Ut dum erit hordeato, lactuca, in summa, rebus, quæ refrigerant & humectant. Aquæ frigidae tempus est, cum res melius habere coepit, & excrementa magis

*tempus a summa  
aqua frig.*



magis cocta sunt, quanquam & ante hoc tempus licebit uti frigida, si quidem æger uehementer appetit, uehementer sitit, & assuetus est potui frigida.

Quod si ab ea metus est, refringi potest decima parte uel octana sacchari communis, uel uiolati, alioqui eadem menſura ſyrupi uiolati de papaue. de nenuphar. de acetosa de agreſta, de limonibus & aliis eiufmodi. Præterea epithemata, illitiones & hypochondriis & thoraci conueniunt, quæ refrigerant, humectant, leuiter astringunt, ex aqua roſacea, acetii momento, oleo roſaceo, ſantalidis. Cõſtitui debent loco aura frigida perflato. Atq; aliquando etiam ſtabelle uentiliũ facere oportet. Et quia aliquando acrimonia excrementorũ inteſtina exulcerari ſolent, Clyſteribus utendum erit, quæ refrigerant, humectant, leniunt, quorum compositio ex cap. de Dyſenteria.

Cibus optimus hordeatum eſt, quod ut magis refrigeret, ex decocto lactucarum confici potest. Accidentia hic multa ſunt, de quibus poſtea.

*Febres affodis.*

**H**anc febrem cognosces ex eo, quod perpetuo iactantur ægri, nec ullam ſeruant figuram decubitus. Omnia faſtidunt, hypochondria contenduntur, ſitiunt, uigilant, aut in leui ſomno delirant. Materia, craſſus eſt humor, alioqui acris & bilioſus, tunicis ſtomachi & uentriculi imbibitus. Quanquam & ex ardore febris aliquando etiam difficili natura ægri, uel dolore interiori alioqui grauiore quædam accidẽtia eius febris eſſe poſſunt. Hippocrates diluto oxymelite utitur, nunc & ſyrupo acetoso, & oxyſacchara uti licet, multo magis cum & bilioſus humor eſt, & calor acrior. Cicerum quoque decocto, diluto abſynthii hordeato facto ex hordeo integro. Purgatio leuis eſſe debet ex rhabar. Viſtus incidat & refrigeret. Tenuiſſime nutriendum eſſe præcipit Hippocrates, ſi quidem permittant uires. Neque enim ſorbtiones admittit, antequam uinæ maturentur & malum remittatur.

Obſcuro loco iaceat eger, & molli lecto. Contineat corpus, & ut minimum fieri poſſit, deſiciat. Hypochon  
dria



## LIBER SECVNDVS

dria hydrelæo foueantur, in quo semen lini, althææ & similia coxerint.

Farina hordeacea ex eodem hydrelæo subigatur.

Cataplasma fiat, quod hypochondriis applicetur.

Pessimū hoc genus febris est, in quo celeriter pulsus concidunt, & occasio præcipitur maiorum remediorum.

### *De Cardiaca.*

**N**on minus grauis est & periculosa febris cardiaca. In hac uehemens æstus est, facies rubet, magnus est cordis saltus, exigua frequensque spiratio. Residere uolunt similiter pulmonariis. Dolitant in regione cordis. Inclinate morbo, sudor tenuis fit, frigidus aliquando, ex quo syncope, & mors. Alioqui uapor calidus per cutem exit, quod Medicum fallit, nisi & manum adhibeat ori & naso. Hinc, n. spiritus frigidus, ex his mors.

Initiò detrahendus sanguis est, aer frigidus imbibendus, flabello quoque eger uentilandus. Victus refrigerans & humectans. Epithemata ex aqua uiolarum nenupharis, buglossæ & borraginis, additis santalis & momento croci, syrupo de limonibus, de acetosa, de nenuphare, acetosus, uiolatus, de papauere, ex quibus syrupis & aquis cordialibus iulep confici debent. Loco lucido stare debent, suauis aura perflato. Altior sit decubitus.

### *De febre Lypiria.*

**Q**uæ sit hæc, non satis conuenit. Galenus in eo genere reponit, in quo propter magnitudinē internæ inflammationis & malignum humorem interna ardent, externa refrigerantur. Id quod in mediis corporis inflammationibus contingit. Nam internus calor ad inftar cucurbitulæ calorem externarum partium intrò attrahit. Actius lypiriam putat, quæ sequitur erisypelas uentriculi.

Arabes pituitam crassa & uiscidam aut eiusmodi bilem collectam in primis uenis & calorem unā cum uaporibus suffocantem, ne uidelicet, calor dispergatur in corpus, causam faciunt huius febris. Alia quoque parū uerisimilia de hac febre prodiderunt. Lypiria Græcorum primū quidem phlebotomia, deinde refrigerantium usu, ut lactucæ ex aceto diluto, ac iam urgente morbo largi



go haustu frigida aquæ curari debet.

Cataplasmata ex hordeacea farina subacta cum succo semperuiui & similium hypochondriis applicentur: sub inde commutentur.

Arabes syrupo acetoso, oxymelite materiam crassam incidūt, postea etiam oxymelite diuretico, sed perpetuo incidentibus aliquid admiscunt, quod stomachum roborret, ut syrupum rosatum, de agresta. Quod perpetuum est in febribus phlegmaticis, ut cum incidimus, stomacho etiam consulamus. Deinde purgant.

Purgatio ex aloe, hiera, rhabarbaro: Interim incidūt, uomitum cient, clysteres acres imperant, utūtur attenuante uictu, eo modo stipha, & sudoribus utuntur, deinde etiam antidotis quomodo in Epiala dictum est.

*De Hæctica febre.*

**H**æctica febris ex eo appellata, quia sic radices egit calor febrilis, ut iam aut nullo modo, aut ægerrime extinguī possit. Difficultas sæpe nascitur, quod uel nimis confirmata est, uel coniuucta est hæcticæ febris putrida, tumor aliquis præter naturam, ut inflammatio, Erysipelas.

Tenuia corpora & pauci sanguinis ferè corripit, & celeriter consumit. Febres diarias ardente, & biliosas sequitur, huiusq; origo aliquando primū nascitur à thoracis partibus: sed fere priusquam uigeat inde nata hæctica, mors est.

Vita longior, & curatio faciliior, si à uentriculo, hepate, renibus, utero, ieiuno & colo intestinis. Consumit calor hic hæcticus humores corporis, deinde rorem illum, qui ueluti comæatus quidam, & futurum alimentum spatiis inanibus corporis concipitur, postea etiam substantiæ pinguis carniū, fibrarum & solidarum partium humiditatem depascitur.

Hic tabes, marasmus, & summa ariditas corporis ubi consummata hæctica est & incurabilis.

Pulsus habet durum à siccitate arteriæ, debilem, paruum, & frequentem ab intemperie cordis, nisi aliquando urgente necessitate ad frequentiam & uelocitatem

com-



## LIBER SECVNDVS

commutetur. Quod idem contingit à cibo, quo tempore calor hecticus non aliter efferuescit, quàm calx uiua, si aquam aut aliquid tale superinfundas. Calor toto corpore equalis est, ex quo non dolèt, nec se febricitare intelligunt. Quanquam si manum admoucas, senties paulò post acerrimum, mordacemque calorem. Quod si in hectica febre calor inæqualis est, sentitur dolor, febrisque ab egro intelligitur, iudicabis aut Erysipelas, aut Phlegmonem, aut febrem denique putridam complicari. Desperatio est, cum hæc hecticæ coniuncta sunt, præsertim si phlegmone, aut aliquid tale in parte principe incenditur, tumque difficillima curatio est, indicationibus inter se pugnantibus. Hecticis aliquando oculi cauantur, nasus acuitur, collabuntur tempora, nudantur ungues & acuti fiunt, pedes etiam aliquando intumescunt, squalescit cutis, à cibo augetur calor. Calor maior in uolis & plantis pedum, non reuera quidem, sed quia manifestior illic est, aut fortasse, quia illic extremæ uenæ sunt, & magis nudæ eò procliuor motus caloris illic est.

Incipientem hecticam non facilè cognoscimus: cognitam faciliùs curamus. Reliqua genera non facilè curantur, facilè cognoscuntur.

In curatione hæc maximè obseruanda sunt, an simplex sit febris hectica, an coniuncta sit febris putrida: Erysipelas, inflammatio, an Syncope frequens incidat. Hæc enim remedia hecticæ interpellant. Simplex nullo maiori remedio irritari debet. Maiora remedia sunt Phlebotomia & Purgatio.

Deinde uehemens tum animi, tum corporis motus uitandus est. Vnicus scopus est, ut refrigeres & humectes, idque partim balneis, partim alimentis, tum etiam epithematibus rebusque non naturalibus. Quod ad balnea attinet, exoleuit iam curiosus ille apparatus ueterum balnearum, nec nisi cum periculo tentari potest. Exoleuit enim consuetudo, & si quid in apparatu peccatum est, grauius esse solet: itaque hoc tempore proximè lectum ægri, labrum aqua plenum disponi potest. Quod si uapor balnei ægri corpore excipitur, prisquam immergatur,



tur, salubre est. Itaque linteo conuolui potest, ut duobus pluribusve hominibus teneatur, ita ut horę frigidum aerem inspiret, reliquo corpore per raritatem linteı uaporem balnei excipiat. Iam rarefactis poris corporis, ac posteaquam æger uires receperit, satisque quieuerit, aliquoties aqua tepida & temperata immergi potest. Mora fit pro ratione uirium. A balneo quoque corpus oleo inungi potest, uel communi, uel uiolato. Cæterum quod aliquando monuimus, & hic quoque summopere obseruandum est. Nec oleum, uel rācidū sit, uel salsum, quod uix reperiās multis in locis. Vbi itaque commodū oleū defuerit, butyrum recēs uel per se, uel prius ex aqua uio-  
larum lotum usui esse potest. Subiiciebant ueteres balneum ē frigida, quod suspectum esse potest, nisi & uires consentiant ætas sit, consuetudo frigidi balnei, temperamētum calidum & siccum, nulla cruditas, nullus tumor, nulla plenitudo. Alimenta imperari debent, lac asinæ, uel mulieris, bubulum etiam usui esse potest. Sed eligēdum lac est, probandumque notis suis. Sugatur ē mamma, uel recens mulctum bibatur. Periculum fit mensuræ lactis datis primum vnc. ii. Quod si in uentriculo non corrumpitur, paulatim augeatur modus. Corrupti intelliges partim e ructu maxime nidoroso partim ex pulsu, qui debilior, tardior, rarior, languidior factus est. Quod si ructus nidorosus est, poterit aliquid aquæ incoqui cum lacte. Si acidus, momentum mellis aut sacchari misceatur. Hordeatum quoque maximē conuenit, uel ptisana ex critico comparata & colata, iusculum item pulli gallinaei, in quo hordeum mūdātum & excorticatum coxerit, alteratum cum lactuca & portulaca.

Et quia in hecticis uis attractrix infirmior est liquidiora sint alimenta, alioqui aceti modicum, etiam si uideri possit nocere (quia desiccet) misceatur. Lactuca, portulaca ex aceto diluto, aqua etiam aliquando frigida, quam modus esse debet, nec adeo gelida nec multa exhiberi debet, ubi nimis extenuatum corpus est.

Potiones frigidi iusculæ, solidiora alimenta non ita frigida, sed subtepida imperētur. Epithemata ex farina hordeacea,



## LIBER SECVNDVS

deacea, quam subiges, & succo lactuæ, oxalidis, semperui  
ui & similium.

Portulaca per se contusa stomacho, & hypochondriis  
utiliter apponitur, Alioqui.

R. ceræ elotæ vnc. iii. olei rosati similiter loti lib. i. Li  
quefiant in vase duplici. Liquefacta refrigerant. Vbi re  
frigerint, ex aqua frigidissima, lactuæ succo, uel portu  
lacæ subigantur. Fiat cerotum. Inungatur uenter, hypo  
chondria & partes, unde primum hæctica nata est.

Alioqui luteolum subinde inculcatum, omphacio, la  
ctuæ, intibi, semperuiui, atque eiusmodi refrigerantium  
succo, hypochondriis & thoraci apponemus. Verum in  
horum omnium usu animaduertendum est alia quidem  
refrigerare & humectare, alia siccare.

Humectantibus utemur, si neq; alui profluvium est,  
tum. n. siccantibus utendum est simul, & refrigerantibus.

Denique quia breui tempore admota remedia incalc  
scunt, subinde commutare oportet. Præterea partes spi  
ritales non sine noxa diutius perferunt refrigerantia, sed  
inde dispnæa nascitur: omnia itaque temperare oportet.  
Olea conueniunt de nenuphare, de salicibus, cucurbita,  
papauere, uiolis, rosis, cydoniis. Eadem seruata distin  
ctione in usu siccantium & humectantium. Supra omnia  
aer componendus est, qui si temperatus alterari non de  
bet: si calidior, ut æstare refrigerandus eo modo, quo ca  
pite de æstu dicemus. Hyeme iam frigidior, quo tẽpore  
leuiter alterari debet, non tam igne, maxime è prunis,  
quàm leui flamma, aut uapore aquæ calidæ.

In ratione alimentorum consideranda est uirtus. Nu  
triemus enim pro ratione uirium lacte uaccino, à quo re  
cens butyrum extractum sit, lacte asinæ: aut si nutrien  
dum, quàm alteradum magis, lacte muliebri. Bulum plu  
rimùm nutrit, sed ratione butyri nocere potest.

Caprillum quoque usui esse potest. Sugi debet, ut an  
tè diximus, uel recentissimè mulctum bibi. Plurimùm  
nutrit panis sepius lotus in aqua, deinde ex lacte recens  
mulcto comeditur. Plurimùm laudatur aqua hordei, in  
qua cancrorum caro detractis testaceis coxerint.

R. Hor-



R. Hordei mundati vnc. i. cancrorum excorticatorum unc. 3. bulliant in libr. iiii. aquæ, dum diffiliat hordeum. Oportet antè excorticatos cancras prius diligenter abluï, ut omnem fœditatem odoris deponant, deinde coqui. Potionum eiusmodi cancrorum mundatorum singule unc. singulis libr. aquæ hordei incoque. Similia ex cap. de Phthisi repeti possunt. In instaurando hordeata, in quibus etiam vitellus oui dissoluantur. Aliquando quoque ut refrigeres, semen portulacæ, lactucæ & similia concoquantur.

Si à syncope metus est, aliquid etiam vini granatorum margaritarum, semen acetosæ, & alia, quæ cordialia appellantur. Iuscula carniū permittuntur, sed alterari oportet hordeo mundato, concocto holeribus, quæ refrigerant & humectant. Permittitur in potus aqua, in qua aliquid sacchari dissolutum sit. Vinum granatorum similiter dulcoratum. In uiribus infirmis, expressionibus, collatitiis, distillatis, instaurantibus utendum erit. Si à profluuiō alui metus est, aqua hordei paretur ex hordeo torrefacto, similiter & hordeatum. Quibus addi possunt gummi arabicum, milium torrefactum & alia eiusmodi, quæ sine calore aluum supprimunt. Auenatū loco hordeati ad tempus commodum est. Etenim fluxiones alui supprimit. Sed dum symptomatibus consulimus, febris habenda ratio, & ad huius remedia temperatè redeundum est. Cacus recens sine sale paulò firmioribus conuenit, ut uocata gelatina minus firmis. Vinum dilutum bene contra syncopem facit & lapsum uirium. Cibus duabus horis, antè balneum imperari debet, aut paulò post balneum. In balneo non est exprimendus sudor. Madidus enim uapor satis. Summatim in usu balnei, ad uires diligenter animaduertere oportet. Multa, quæ ad hanc febrem pertinent, ex commentariis de sanitate tuenda, Methodo medendi, Libello de marco re colliges.

*De febre ex Cruditate.*

**F**ebbris hæc ferè debilis, sed periculo non caret. Desperatio est, cum uel uentriculi, uel hepatis inflammatio



## LIBER SECVNDVS

matio accesserit, in qua quantus, qualis, quo loco intus crudus humor est, considerandum est. Aliquando enim, cum sanguis utilis plurimus sit, cruditas exigua est. Contra rursus, nonnunquam plurima cruditas est, exiguus uero sanguis reliquus. Humor crudus aliquando frigidior est, aliquando ad coctum succum accedit proprius. Cruditas aliquando in primis uenis, nonnunquam toto corpore aceruata est. Cruditatis in uentre & primis uenis signa sunt, nausea, ructus, uellicatio, ac tormenta uentris, frequens borborysmus, hypochondrii atque inflatio. Alimenta ferè in flatu commutantur. Cruditatis totius corporis signa sunt urinae tenues, aquosae, leuiter tinctae, diuulsa, conturbatae, nonnunquam cum sedimenti asperitate, calor faciei pallidus, aut alius quàm rubens, ut limbus & plumbeus, totius corporis moles subtinuda, pulsus inaequalis, obscurus, paruus. Adicienda sunt, quae ad coniecturam adhibentur ex antea acta uita, otium, crapula, intempestiua exercitia, immoderata uenus, & alia eiusmodi cruditatis coniecturam augent. Vocatus itaque ad eum, qui cum cruditate febricitat, ad haec omnia animaduerte, & si quidem omnia, ut malus faciei color, urinarum cruditas, pulsus inaequalitas & paruitas, si etiam accesserit totius corporis grauitas, tarditas, motus mentis & sensuum hebetudo, de remediis cogitandum non est & de morte praenunciandum. Multo magis, si qua inflammatio uentriculi, uel hepatis. Illic enim & ciudorum succorum plenitudo est, & uires admodum infirmæ, à quibus & syncope & mors expectanda est. Si uerò omnia leuia sunt, de remediis ita statuendum.

Phlebotomia in hac febre nunquam imperanda, nisi color faciei leuiter rubeat, pulsus mediocriter magnus & uehemens, nec ita inaequalis, urinae quoque melius colorantur. Hic enim conuicimus frangi sanguinem superiorem esse cruditate. Itaque aperiatur basilica angusto foramine, ac modica quantitate sanguis detrahatur. Exibit primum sanguis tenuis, subalbidus, simul atque coeperit fluere magis rubens, uena claudatur. Neque tamè perpetuò expectanda est sanguinis mutatio. Sed interim dū exit

sanguis



sanguis, vires è pulsu & aliis recognoscende sunt. A Phlebotomia imperanda mulsæ, in qua aliquid origani, hyssopi & similium coxerit, & si quidem humor crassior est, oxymelite uti oportebit. Decumbant molli lecto, aere temperato. Dormiant & uigilent utrumque mediocriter, uictus incidat & attenuet. Sed aduertendum in usu muliæ & melilotorum. Aliquādo enim acrimonia mollis alius irritatur. Diarrhæa sequitur, quæ si perseverat, hominem præcipitat. Itaque si inde metus est, uel bene coctæ mulsæ, uel ptisanæ cremore utendum est. In usu attenuantium & incidentium tum alimentorum, tum medicamentorum. In usu denique omnium, quæ uel intro sumuntur, uel foris admouentur. Vitanda sunt omnia, quæ nimis calefaciunt. Etenim febrem augēt, humores crudos cōmouent, deiciunt vires, syncopem accelerant & mortem. Hæc igitur omnia non longè à medio recedant. Frictionibus & inunctionibus opus est. Omnia quidem, ut cruditas concoquatur. Aspero itaq; linteo crura, brachia, spina deinceps ordine perfricentur deorsum uersus, dū incallescant. Postea uero oleo dulci, nō salso, non rancido, alioqui butyro recenti eadem partes inungantur. Hyeme etiā chamæmelino, anethino & similibus, quæ leniter quidem calfaciunt & digerunt. Sed perpetuò ad pulsum animaduertendum est, qui si minor, obscurior, magis inæqualis fieri uideatur, omnino uiribus consulendum. Vinum dilutum propinandum, mica panis ex uino, hordeatum, lac amygdalarum, omnia quidem exigua quantitate, sed non ita magnis interuallis repetita. Alioqui si constant vires, tenuis uictus conuenit & per interualla. Leue catharticum, ubi iam apparet aliquod signum coctionis. Maioribus pharmacis abstinendum. Intempestiuus enim maioribus remediis uel necantur ægri, uel in periculum coniciuntur, unde uix possint reuocari. Animaduerte ergo ad vires ex pulsu, ad coctionem ex urinis. Urinarum hic ferè ordo est. Vbi expectatur salus, exeunt initio crudæ, & aquosæ, postea sedimentum ponunt crassum, diuulsum & asperum. Conturbantur, sed conturbatæ sedimentum ponunt, celerius quidem, si quidem melius habet coctio:

♂ ♀ tardius,



## LIBER SECVNDVS

tardius, si non ita bene sedimentum, Deinde melius sit, proprius accedens ad album, læue & æquale. Melius procedente morbo, iam non sedimentum, sed sublimamentum, nebula in media urina ostenditur. Cum iam appetit perfecta coctio, neque sedimentum, neque sublimamentum, sed tantum nebula in summo urinae attollitur. Atq; ita urinae ad naturam redeunt, simulq; æger ad pristinam ualitudinem. Videndum quoque, ne te fallat urinae conturbatio. Perturbatur urina, uel quia calor naturae iam cruda cōcoquit: uel quia extinguitur. Vtrumq; distingues ex pulsu. Etenim si pulsus, quam ante, melior, coctio cœpta est. Si uerò minor, obscurior, magisque inæqualis, mors in propinquo est. Suffocatur calor multitudinem materiae, deinde quia humor crassus uias intercipit, multaq; obstructions fiunt. Clysteres, ubi resistit aluus, atriulculi infundantur. Alioqui si a uiribus metus est, remittenda sunt cætera remedia ad tempus, & tantum uiribus consulendum est. Vbi omnia mediocria sunt, mediocriter temperanda omnia, ac toto decursu morbi faciei color, urinae commutatio, & pulsus diligentissime consideranda sunt. Ex his omnis remediorum ratio colligitur. Et in hac febre, quæ sepe incidit, nullum leue peccatum est. In summa clementer cum hac febre oportet.

### De Peste.

**E**pidimia morbus est aliquo anni tempore, certasque locis multos occupans. Qui si plurimos rapit, λοιμός, id est, pestilens dicitur. Nam λοιμός, pestis epidimia quæ uidelicet populariter grassatur, & multos interficit. Suntque eiusmodi morbi ab aere omnino distinguendi ab his, quos σποραδικός appellat, quibus antecedens uite ratio causa est. Atq; in primis animaduertere oportet, unde primū eiusmodi pestes publicæ oriatur. Nā & id ad curandi rationē pertinet. Sporadici uniuscuiusq; proprii, ac ferè uexat populi uulgus, multò maximè cū præcessit longa fames, & caritas annonæ: sequit̃ uerò feracior annus, & frugū terræ pronētus uberior. Vulgus p̃ famē legumine, radicibus cacochymis & obuiis quibuscq; alimētis pascit̃. Hinc humorū corruptela acerrari solet; ubi uerò succedit annona

*causae unde  
oriatur pestis*



annona melior solito, magis sese replent, cibos ingurgi-  
 tāt. Sed nō pura corpora quanto plus nutries, tātō magis  
 lades. Etenim quod bene succosum est & euchymū mul-  
 titudine aceruari uitii corrumpitur. Hoc genus pestis nō  
 ita contagiosum est. Contra uero maxime contagiosum,  
 quod est ab aere, nullique parcat, ne temperatis quidem  
 quanquam celerius corripit, qui humorum uitio redun-  
 dant: ac ferē austrini, & maritimi flatus constitutio cali-  
 da & humida, annus magnus ex parte iurummalis, hoc  
 est, quando modo calor, modo frigus est, nocte frigus, ca-  
 lor interdiu; quo tempore cœlum ferē nebulosum est, &  
 magnus est prouentus animalium, quæ corruptela gignū-  
 tur. Similiter & morborū, qui à putredine fiunt. Vbi hæc  
 adsunt, pestis expectanda est. Addunt Arabes ignes in ae-  
 re uolitātes, stellas, quas uocant Cadentes, Cometas, &  
 alia eiusmodi. Perphyrius grauissimas pestes indicari  
 scribit, quas nemo declinet, si emergens cometa ad Oriē-  
 tem uergit. Hæc si Aestate, & Autumno fiūt. Hyems pe-  
 stifera expectāda est. Quod si uere pluuia raræ sunt, fri-  
 gus, austrini flatus, aer turbidus, serenitas, sed paucis die-  
 bus, ut hebdomade, interiecta, autumnalis constitutio,  
 qualis proximè descripta est, nocte frigus, interdiu calor  
 uehementior, exanthemata, pustulæ, quas uariolas appel-  
 lant, ranarum, & reptilium, & eorum quæ ex putredine  
 gignuntur, multa generatio. Si denique latibula, & cubi-  
 lia relinquūt mures, talpæ, glires, aliasq; eiusmodi, quæ  
 sub terra uiuunt, hæc, inquam, si Vere & prima Aestate  
 fiunt, in Autumnū expectanda pestis est. Causam alii ad  
unicum cœlum referūt, decreta syderum, figuras, ac deni-  
que quasdam imagines. Verū quæcunque causa est, unus  
aer proxima atque continens causa statuatur. Aer corrū-  
 pitur aliquando cæde hominum, strage animalium, stagna-  
 tibus putridisq; aquis, maligno terre halitu, noxiis uen-  
 tis, pestifero deniq; influxu syderis. quale est, cum Sa-  
 turni sydus cū Marte coniungitur. Idq; obseruāt an ab  
 aere primum, & cœlo lues cœpta sit: an à terra afflata pe-  
 stis. à terra quadrupedū genus primū inficit, uolantia ue-  
 ro si ab aere. Corruptus itaq; aer nos inficit, ac deinceps

quæ aer  
 in pestis:

alia in  
 pestis:



## LIBER SECVNDVS

mutuò inspiratu & expiratu communiter nos inficimur. Celerius, si vitium est in humoribus, & cutis rarior est. *Signa uero pestis iam occupantis, hæc ferè sunt.* Febricitans est, ut sitent recte, nec decumbant, exteriora mediocriter habent, uruntur interiora, ad somnum procliuus est, fastidium, nausea, anxietas, nullo loco stare possunt cum uigilant, cordialgia, sitis uehemens, lingua ardet & scabra est, hypochondria contenduntur, respiratio magna, in qua thorax plurimum atollitur. Quod si halitus etiam grauius olet, pessimum ac maxime lethale pestis genus est. Polius alias naturalis, alias frequens & paruus, nonnunquam uehemens & undosus. Vigile interim, & leuia deliria, bubones excitantur, carbunculi sparguntur in corpus, exanthemata nigra & luida toto corpore excitantur. Urinx sæpe naturales, squæ, biliosæ, nigre, quæ interim conturbantur, capitis multus dolor est. Excrementa alui crassa, grauius olentia, spumosa, pinguis, multo bile tincta. Vomitiones biliosæ, nigre, sudor foetidus, extremitatum frigus, syncope, conuulsio, atque

### *Præseruatio à peste.*

**C**ognoscenda primum causa. Nam si cadauerum halitus aerem inficit, omnino procurandum, ut uel crementur, uel sepeliantur. Deinde frequenti rogo aer repurgetur. Quod si pestifer halitus à terra est, omnino præcludenda uia est, residuum aquarum & putridarum uapor multo igne corrigi debet. Aeris uero pestifera conditio, idque multo magis cum turbidus, meridialis, maritimus, multis ignibus temperari debet. Extruendi uero ignes, qua parte uenti importantur, compitatum etiam & priuatim domi.

**V**Celebris est historia Hippocratis. Nam cum ex Africæ Aethiopique locis pestifer halitus per medium mare Athenas inueheretur, consuluit ignes incendi, atque famosa illa pelle ciuitas liberata est. Hoc idem Empedocles Græcis & Acron quidem consuluit. Salubrior quoque ignis futurus est contexta lauro, iunipero, roremarino, radice acori, ireos, cyperi, herbis quoque odoratis.

Fumi

*sig. pestis  
in occupantis*

*ignis laudat  
9. pestem*



Fumi quoque excitari debent filice candenti, quem in aceto immerges, atque subinde extinguas. Vellis, stragula, reliquaq; eiusmodi bene munda sint, quæ odorem receperint ex supradictis rebus, aliisque eiusmodi. Saffumigia è ligno aloes ambaro, thure, costo, sandaraca, mastiche, caryophyllis, stirace, beniouino, terebinthina, seuguantho, calamo aromatico, melle, croco, lauro, iuniperro, & uulgaribus herbis odoratis. Ablutio manuum ex uino odoro, aqua rosarum, aceto, rosis quoque, aliisque id genus pauimenta domus conspergantur. Optimum uero ac tutissimum remedium commutare solum, & in salubre secedere. Tenere corpus bene mundum, & uacuum excrementis, fenestræ domus ad Aquilonem spectent, qui uentorum saluberrimus est. Victus sit mediocris, inanitio pariter ac repletio. Fames, sitis, omnis incontinentia uitæ fugienda est. Alimenta conueniunt, quæ facile coquuntur, uacantque excrementis, quæque putredinem arceant, ideoque conduntur cibi omphacio, acetosa, granatorum succo, limonum citrinorum, citrangelorum, aceto, cappares ex aceto, intiberum genera, passulæ, uæ. ficus, cerasa, pruna damascena, saccharum rosatum, conferva rosarum, buglossæ, citri conditi & limones, conferva anthos, enulæ, gentianæ, uiolarum, sed in horum omnium usu habenda ratio anni partitis, cæli, ætatis, reliquorumque eiusmodi. Vitanda sunt colloquia suspectorum, abigenda aedibus domestica animalia, canes, cati, & reliqua eiusmodi. Exercitatio domi sit pro consuetudine, uel in uicinis hortis, cælo bene puro, matutino, & longe a cibo, neque suspectus sit exercitii locus, non decliuus, non uaporosus aut palustris, sitque in sublimi positus: sed quem sol feruentior non euerberet, affletur Aquilonibus, aut eo uento, qui loco sit salubris. Aliis enim Zephyrus, ut Italiæ: aliis subsolanus, ut parti Galliæ, & Hispaniæ salubrior est, quin & pestifer Auster nobis est, multis partibus Africæ salutaris. Venus rara sit, uita hilaris, & libera curis. Somnus & uigilia pro consuetudine mediocris, atque in reliccando corpore maximum studium esse debet.

*Saffu  
migia:*

*Victus*

*N.*



# LIBER SECVNDVS

bet. Declinanda plenitudo, & excrementa sæpe purgan-  
da sunt, atque ideo, ubi uenæ tument, & plethoræ signa  
ostenduntur, utile est aperta uena aliquid sanguinis de-  
trahere. Alius quotidie reddenda est. Exercitia habi-  
tum corporis repurgent. Singulis hebdomadibus leui  
cathartico primæ uenæ purgandæ sunt, cassia, manna, ta-  
marindorum decocto & prunorum, pilulis comuni-  
bus, uel. Rufi quæ Græcis & Arabibus maxime com-  
mendantur, quarum tamen non una descriptio est.

R. aloes hepatici, ammoniaci repurgati an. dra. i. mir-  
rhæ dr. s. cum uino albo tenui formentur pilulæ. Detur  
dra. uel eo plus.

R. aloes lotæ in aqua endiuivæ uel acetosæ ꝑ. ii. croci,  
myrrhæ ana Gr. xvi cum uino albo, fiant pilulæ.

R. aloes lotæ ꝑ. iiii. boli armenæ dr. s. croci, myrrhæ  
cinamomi an. ꝑ. s. cum succo granatorum, fiant pilulæ  
Dosis dra. i.

R. aloes croci ana. dra. i. myrrhæ dra. s. Ex aceto fiant  
pilulæ. Dosis dra. i.

R. terræ sigill. boli armeni ana dra. s. ex succo cyperi  
fiant pilulæ.

Sed hæc antidota sunt. Interea utendum est apido-  
tis, idque quotidie, uel aliis quidem maioribus interual-  
lis. Theriaca & mithridatium nullis remediis cedunt.  
Dantur bis in hebdomadē: Dosis a ꝑ. i. ad dra. i. Quod si  
æltus est, temperari oportet. Temperantur mixta confer-  
ua uiolarum, uel diluantur ex aqua ros. & aceti modico.  
Cucumeris syluestris radix in mortario teritur cum te-  
nellis foliis sempertuiui, apii, coriandri.

Bene tritis mel adijcitur, & puluis ex septem uel no-  
uem granis piperis. Mixta omnia stagnæ uasē reponi  
debent, datur auellanæ magnitudo ex uino tenui & odo-  
ro. Tantæ uis huius medicamenti ueteribus probata est,  
ut qui eo fuerit usus in ieiunio, non solum vim aeris ef-  
fugiat: sed etiam tuto possit cum correptis lue versari,  
aut iam correptus statim sanescat. Pompeius uisito Mi-  
thridate Ponti rege hoc reperit in sanctuario regis nullo  
ueneno lædi posse, qui hac ueretur antidoto.

Nuces



Nuces duæ, toridem ficus, rutæ folia & salis granum crassiusculum: teruntur omnia, & si uis modico melle excepta deuorantur, aut uino conspersa manè ieiuni assumuntur. Remedium à Plinio, Dioscoride & Sereno scriptum. Aetius alii tribuit quàm Mithridati.

Ficus diuidatur, nucleus nucis tritus indatur ficui, folia quinque rutæ & granum salis torrefiant leuiter in igne, conspergantur uino, & ita deuorentur.

Conueniunt contra pestem buglossum, borrago, melissa, calendula, calamintha, rosmarinus, absynthium, maiorana, uiolæ, rosæ citreum malum, limones, poma & pira odorata acetosa, portulaca, cichorium, cerefolium, hypericum, enula, gentiana, bubonium, lisimachia, raphanus, aristolochia, lanceola, agrimonia, marrubium, hyssopus, scabiosa, tormentilla, capparid, citrulus, scordium, uerbenaca, iuniperi & lauri bacca, dictamni radix & zedoaria. Quorum omnium usus est, ut macerentur eceto, uel uino odoro. Acetum bibitur uel uinum ex iisdem facies & manus abluuntur, macerata materia linteolo raro includitur, gestatur manibus, ac sæpe naribus admoetur.

Ex his etiam conseruæ & aquæ distillatæ utiles sunt, Distillatas aquas, uel cinamomo, uel cassia lignea, cypetro, calamo aromatico, ligno aloes, santalis, caphora, horum uno uel pluribus in aqua maceratis distillata meliora reddimus. Passulis quoque uis inest contra putredinē. Hæ uel aceto, uel uino præmacerari debent. Quod sequitur, probatum antiquis & uulgo usurpatur. Alii nucleus manditur, priusquam domo exeatur, tum modico uini odori colluitur os. Vulgus iusta ratione enulæ radice plurimum utitur, priusque macerat in aceto, conuoluitque linteolo ac sæpe inspirat naribus. Aceto uerò & os collui, & facies conspergi, & manus ablui debent. Alii urina propria utuntur.

Nonnulli dr. i. stercoreis columbini. Frequens usus acetosæ putredinem cohibet, & pesti resistit.

Syrupus de acetosa, de acetositate citri, de limonibus. In oleo scorpionum magna uis inest. Sed aliud quiddam



## LIBER SECVNDVS

dem simplicius suffocatis aliquot scorpionibus sit in oleo amygdalarum amararum.

Aliud uerò, quod hoc modo paratur.

R. Arilolochiæ, gentianæ, cyperi, corticum radices capparis ana drac. i. amygdalarum amararum libr. j. Conquassata omnia in oleo dulci coquantur, adiecta aqua simplici, uel distillata ex supradictis, uel denique uino odore tenui. Coctio fit ad consumptionem aquæ uel uini, sitque olei libra, reliqui liquoris tantundem.

In collatura xvij. scorpiones immergantur, atque ita suffocentur, contineatur uas in furno pistrinali, unde sub tractus panis est, idemque bene clausus sit, deinde loco salubri subiecto acere fundo uasis reponatur. Vfus ut inde arterias temporum, manuum inungas.

Præterea si quis iam correptus est, occiput, gulam, petus, uicina loca carbunculis & bubonibus.

Taxo barbato magna uis inest contra uenena omnia. Testes sunt Medici ueteres, & Mustella docet. Etenim Mustella, ubi cum serpente certat, simul atque uirus sensit, statim eam herbam queritat, & inuentam mandit, atque ita instaurat pugnam, quæ si inuenta non est, disrum pitur Mustella.

Id quotidianis experimentis rusticorum certum est. In peste uerò sic utuntur. Hinc succum exprimunt, rene uinum & odorum miscent, hocque remedio ad cautionem, & iam correpti ad salutem uti solent.

Plurimum laudatur Auicennæ coriandrum preparatum. In ieiunio, & à cibo sumendum est. Lac similiter, ex quo butyrum extractum sit. Alijs aqua è papauere rheade distillatur & bibitur. Fiet bene, si rusticum remedium modico cinamomi condiatur.

Superstitiosum hoc translatum è regibus Persarum, In hæmatite lapide inculpatur hominis figura, genibus flexis, serpente cinctus, ut dextra manu caput, sinistra candam teneat. Tum in aurei annulli capsula immitatur hæmatites lapis, subiecto prius serpentariæ herbæ folio, gestatus hic annulus omnino præseruat à peste & uenenis.

*Aliud*



*Aliud remedium.*

R. mannæ granatæ, mellis ana unc. iij. terebinthinæ liquidæ unc. i. s. pulpæ granatorum acidorum, granorum berberis, corticum citri conditorum ana ℥. iiii. aquarum scabiosæ, melissæ, borraginis, acetosæ ℥. ii. succi taxi barbati depurati, vini optimi ana libr. s. Reliqua solidiora per diem integrum in liquoribus macerentur. Postmodum distillantur omnia in alambico uitreo.

R. supradicti distillati ℥. iiii. passetur per manicā Hipocratis cum unc. s. sacchari uiolati & drac. s. cinamomi.

*Aliud.*

R. aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, gentianæ, myrthæ electæ ana unc. s. Omnia trita melle excipiantur. Dosis auellanae magnitudo ex uino tenui, decocto berberorum, passularum & similium.

*Aliud.*

R. theriacæ ueteris dr. i. includatur in cæpa prius cauta. Coquatur cæpa in furno pistrinali, aut calidis cineribus. Vbi cocta fuerit, calida iniciatur in uini granatorum aut berberorum unc. iiii. Bibatur expressio fortis. Potest eadem cæpa in succo tormentillæ refrigerari, ut sint succi unc. iiii. Syrupi de limonibus unc. i. Semen attractilidis, id est, carthami syluestris, idem potest quod semen citriorum. Bibitur enim tritum aut ex eo exprimitur oleum. Oleum exprimitur ex granis citriorum, quod & bibi potest, & inungi similiter oleo scorpionum.

*Aliud.*

Ouum utrinque perforatur iusto foramine, ut tota oui materia depleri possit. In uacuum testam. dr. ii. croci immittitur. Testa cōueniente baculo traicitur, traiecta ad ignem assatur, dum uehementer incaleat. Postea cum croco ad summam tenuitatem teritur, tritis ℥. s. theriacæ adiiciuntur dr. xv granorum sinapi. Adiecto melle modico omnia uniuntur, totum hoc corpus in duas partes diuiditur ex utraq; parte septem, decem, uel undecim pilule formantur. Et si quidem lues iam concepta est, dimidia pars totius corporis deuoratur. Quod si euomerit, rursus danda pars reliqua. Quod si nō euomerit, ager saluus est.

Sant



## LIBER SECVNDVS

Sanis autem ad cautionem, pilulæ sex deuorantur.

*Aqua distillata imperanda diuitibus.*

R. rad. tormentillæ recentis libr. i. radicis enule unc. iiii. radicis berberorum & betonicæ, radicis dictamni ana libr. s. acetosæ unc. xx. sem. eiusdem acetosæ unc. iiii. buglossæ & borraginis cum floribus rosarum rubrarum ana libr. i. pimpinellæ, scabiosæ ana libr. s. succi limonum lib. i. theriacæ bonæ libr. s. aquæ uitæ ex uino optimo factæ, ac sæpius distillatæ unc. ii. santalorum, spodii, ben albi & rubri, margaritarum splendidarum ana unc. i. s. ossis de corde cerui unc. i. rasuræ eboris ʒ. s. croci dr. iiii. camphoræ dr. ii. foliorum auri purissimi unc. s. Hoc autem modo conficies folia auri, quantum fieri potest, comminues, & aquæ uitæ commiscebis. Repones in ampulla uitrea bene clausa. Ita permittes per dies xv. margaritas tritas repones in alia uitrea ampulla, cum supradicto succo limonum fideliter obturabis, & ita fines per dies quindecim. Radices tormentillæ & reliquas ex optimo uino ablues, teres in mortario, siccabis in umbra, loco bene mundo, herbas & flores loco similiter bene mundo & umbroso constitues, dum siccæ sint. Reliqua omnia repones in uase uitreato: adicies herbas & flores, superfundes aquam illam uitæ, in aqua aurum maduit: succum limonum cum margaritis fideliter obturabis, ne quid recipi possit, & ne quid expires, foueam tripedaneam loco satis humido effodies, infernesque calce uiua, cui uasis fundus infideat. Ita uas illud uitreatum & bene clausum immittes: quod est reliquum foueæ uel uinaceis, uel fimo ueruecino, uel equino implebis, eademque materia totum uas operies, superfundesque quatuor aut quinque quartas aquæ purissimæ, quarto quoque die fimum, uel uinacea commutabis. Maneat sepultum uas duodecim dies. Post hos dies tota materia ex eo uase in alambicum uitreum transponatur, & hoc quoque bene ac fideliter sigilletur, ne quid expiret.

Fiat distillatio lento igne, & sine fumo. Quæ distillauit aqua, rursus reiciatur in reliquum magna, atque iterum distilletur.

Quæ



DE FEBRIBVS.

31

Quæ secundò distillauit aqua, tertio distilletur in balneo maris, atque ita fideliter reponatur. Detur manè co-  
cleare unum.

*Puluis.*

R. cinamomi unc. s. zedoariæ dr. ii. boli armenæ præ-  
paratæ dr. vi. sem citri & acetosæ, corticum citri ana dr.  
iii. radicum betonicæ, dictamni, tormentillæ, limaturæ  
eboris ana dr. i. s. ossis de corde cerui dr. i. fragmentorum  
smaragdi, rubini, granati & saphyri an. ꝑ. i. Fiat puluis,  
qui si parū gratus videbitur, incorporetur cum conseruæ  
acetosæ & buglossi an vnc. iii. sacchari albissimi lib. ii.

*Aliud.*

R. tormentillæ, dictamni, betonicæ ana vnc. s. sem. ci-  
tri, boli armenæ præparatæ ana dr. ii. rasuræ eboris, coral-  
lorum alborum & rubrorum, trium santalorum an. dr. s.  
radicis gentianæ dr. i. s. spicæ nardi Gr. vi. camphoræ dr.  
i. Bolus armena hoc modo præparatur, similiter & terra  
figillata. Alternis capiatur vnc. s. super fundatur vinum  
tenue, odoriferum, oxycratum, aqua acetosæ aut similis:  
deinde siccetur, secundò teratur ac tertio, atque toties  
irretetur, & siccetur. Detur dr. i. ex vino tenui, oxycrato  
& similibus: poterisque aliquid cinamomi & puluerum,  
quæ huic rei conueniunt, commiscere.

*Descriptio trociscorum camphoratorum.*

R. tragacanth. spodii, gummi arabici electorum, sem.  
psilii ana dr. s. sacchari candi, glycyrrhizæ mūdaturæ, sem.  
cucurbitæ citruli, portulacæ ana dr. i. penidiorum vnc. s.  
camphoræ ꝑ. i. cum succo citranguli & pane sacchari  
quantum sufficit, fiant trocisci magnitudine lupini. Ma-  
gis conueniunt Aestate & naturis calidis, danturque ex  
iulepo uiolato rosato, uel aqua condita saccharo.

*Aliud.*

R. electuarii lætificantis dra. ii. margaritarum splen-  
didarum ꝑ. iii. ossis de corde cerui, coralli rubri ana  
ꝑ. s. unicornis Gr. vi. pulueris pilularum communium  
dra. i. dissoluantur in syrupi de limonibus & de acetosi-  
tate citri ana dra. vi. aquarum scabiosæ, & absynthii ana  
vnc. ii. fiat potus. Magna hæc dosis, & quæ magis conue-  
nit



## LIBER SECVNDVS

nit iam correptis. Etenim meminisse oportet augendam esse dosim antidotorum iam correptis. Atque perpetuo reuocare oportet, quod ad cautionem facit maxime, & Galenus scriptum reliquit, duo esse capita contra pestilentem aerem, ut temperate uiuamus, hoc est, ut neque quantitate alimentorum, succi corporis præter modum redundant: deinde ne qualitate eorundem corrumpatur sanguis, & excrementa colligantur. Hoc illud est, quod uolunt ueteres, siccandum esse corpus. Neque ideo probanda ratio est, quæ tenuiorem uictum præcipit, multo minus, quæ præcipit uino & cibo replenda esse corpora, quam si sequimur, uino certè optimo, cibis euechymis, nec excrementitiis utendum erit: Alterum caput est traditum à Galeno, ut corpus perpetuo transpirabile sit. Sed hic adsit modus. Nam corpus rarius multa uacuatione spiritus dissoluitur, atque magis opportunum est externæ iniuriæ aeris. Alia prope infinita remedia sunt descripta ab aliis.

### *Curatio iam correptorum.*

**C**elerrimus hic morbus, qui intra triginta horas hominem rapit, & maxime ubi latet febris. Vrantur interiora, exteriora uero naturaliter habent. Vbi urinae naturales, pulsus quoque naturalis est, ac sæpe fit, ut cum omnia nullum periculum ostendant, de repente agri moriantur. Hæc omnia, quia uenenum cor occupat, paulatimque uitam extinguit, naturam quoque morbum non aggrauatur. Vbi manifestior febris est, urina, pulsus, & cetera commutantur, uita fere producit longius. Summa ergo diligentia opus est, nec sunt differenda remedia. Videmus in primis, ne quod iam conceptum uenenum est, cor occupet, ipsumque quoad fieri potest, extinguere debet. Alioqui foras curandum est. Virtutis quoque habenda ratio, multo maxime uitalis. Nam sæpe fit, ut cum reliquæ facultates integræ sint, uitalis paulatim extinguatur. Vocatus itaque aerem salutare institue agro. Salutaris est ferè, qui Aquilonibus aperitur. nisi e uicinia, quæ ad Septentrionem uergit, pestifer halitus importetur, ac bene fit, si subinde aer commutatur.

Quod



Quòd si loca suspecta sunt, in quæ transferri debet qui peste correptus est, igne lucido, & odorifero (ut prius) aspersione aquæ rosarum, & aceti, rerumque similibus alterari oportet. Aliquid ex antidotis supradictis propinandum est, uel.

R. rad. tormentillæ, betonicæ, dictamni, gentianæ, morsus diaboli tum radicis, tum herbæ, croci ana dra. j. fiat pul. dentur dra. ii. ex unc. iii. uini tenuis, odoriferi & unc. j. aquæ ros. aut, ut Auicennas.

R. aquæ ros. unc. ii. uini tenuis, odoriferi unc. i. bol. armenæ ut prius præparati dr. i. Qui sumptas antidotos retinent, nec euomunt, magna ex parte seruari solent, si cætera quoque sunt commode. Maius periculum est, si reuomant, sed nihilominus abluto prius ore ex uino, repetenda est antidotus.

Acetum cum aqua rosacea naribus admouendum, granum salis ore continendum, ne reuomant. Nec oportet tantum semel in die uti antidotis: sed bis, ac ter, sæpius etiam si res parum procedere uideatur. Post hæc de uacuatione cogitandum. Atque, si quidem sanguis uidetur abundare, uena secanda est, alias quidem ad animi deliquium, si uires robuste sunt, & uehemens morbus. Alioqui partienda est uacuatio. Sanguis interim bonus & floridus, quemadmodum in maligno genere febrium.

Natura retinet, quod est uitiosum, dimittit quod utile. Aliquando uero maxime corruptis effluit: utrumque malum.

Vena, quæ buboni proxima, eligi debet: Et si quidem ad aures, uel in gutturæ, cephalica. Si sub alis, media uel basilica: si in inguinibus, exterior malleoli, uel interior. Aliquando quoque extremorum uenæ aperiri debent, ut sub lingua, quando in gutture bubo est, sed secta prius cephalica.

In cacochymia omittitur phlebotomia, cathartica imperantur, quæ redundanti uitio respondent, atque interim uiribus consulitur.

Cibus è media materia, qui facile concoquitur.

Distillata, expressiones, collatitia, gelatinæ. Quæ omnia



# LIBER SECVNDVS

n'a oportet pulueribus supra descriptis, succis & aliis  
tidotis meliora reddi, exempli gratia.

Distillata imperabimus ex herbis & radicibus, con-  
feruis, distillatis aquis, pulueribus, quæ per se contra  
pestem faciant. Iam distillatis uinum granatorum, ber-  
berorum, acetositatem citri, aquas prius enumeratas  
commiscebimus. Similiter expressionibus collatitiis,  
gelatiuis. Potus, aqua hordei cum multo saccharo, in-  
lepo è uino granatorum, berberorum, aquis supradictis.  
Condiuntur hæc aliquando santalis, aliquando pulueri-  
bus supra scriptis.

Quod ad somnum attinet & motum, iam nulgò usur-  
pandum est, ut omnino quiete & somno interdicator.  
Iam correptis ratio uulgi legitima est. Etenim quiete &  
somno uenenum intrò colligitur: motu nerò & uigilia  
foras euocatur. Sed hic uirium habenda ratio est, quæ  
aliquando multa uigilia, & motu dissoluuntur. Horum  
itaque quasi regula quædam sit uirtus egri, ut bene ha-  
beant cætera. Quod ad antidotos, uacuationes, rationem  
uitæ pertinet, quotidie si cessat alius, lenienda erit cly-  
steribus, balanis, catharticis leuibus. Et si quidem uehe-  
mens ardor est in trunco corporis, Cerato Gal. ex succo  
acetosæ subactis, hypochondria inungenda sunt, sæpius-  
que renouandum remedium. Regio nerò pectoris & ma-  
ximè cordis, linteolo molli fouenda est, quod madeat  
& aqua rosarum, uiolarum, buglossæ, borragin. melissæ,  
scabiosæ & similibus. Ac bene fit, si supradictis aquis, ali-  
quid aceti, uini odoriferi, camphoræ, santalorum, spo-  
dii & similibus commiscebitur. Quod si non concedit  
malum, & iam extrema frigere uidebuntur, omnino pro-  
curandum est, ut foras euocemus, frictionibus, cucurbi-  
tulis, calidis fomentis. Sed hæc remedia pro ratione ui-  
rium temperanda sunt, neque negligendus bubo est. Vio-  
lentum est remedium, sed quod succescit multis, tenacu-  
las candentes imponunt buboni, & ita à corpore sepa-  
rant. Alii acie ferri circundant, atque ita erunt.

Nonnulli multis scarificationibus contenti sunt, ut  
per uulnera disfluat uirus. Sunt qui sanguisugas multas  
infigunt.



infigunt. Alii primum quidem fouent ex oleo chamæ-  
melino, de maiorana, de lilio: Deinde cucurbitulam im-  
ponūt, postea scarificant, atque iterum cucurbitulam af-  
figunt. Quidam causticis medicamentis aperiunt, aut  
candentibus cauteriis inurunt: uerū his maioribus re-  
mediis utendū non est, nisi cōstent robore ægri. Etenim  
imbecillę uires eiusmodi uiolenta remedia nō sustinēt.

Leuioribus sunt. Catellus uiuens medius diuiditur,  
gallinæ aut columbæ pullus, pulmones recens mactati  
arietis, atque ita buboni apponuntur, ac subinde com-  
mutantur, deinde theriacæ dra. ii. in cauata cepa conco-  
quuntur, cocta cepa cum theriaca subigitur, & ita bubo  
ni applicatur.

Nonnulli dum medicameatum subigunt, parum olei  
de scorpionibus affundunt, quod ante descriptum est.  
Alii rursus cepam ita coctam cum theriaca, etiam dum  
calentem uino granatorum, & syrapo de acetositate ci-  
tri immergunt, deinde cepam cum theriaca exprimunt,  
expressioni addunt unc. ii. aquę tormētillæ, acetosę uel  
similium, idque totum propināt: materiam uerò expres-  
sam, ex oleo de scorpionibus, uel expressio ē seminibus  
citri subigunt, atque emplastri modo buboni applicant.  
Nam dum curatur bubo, non est omittendus usus anti-  
dotorum. Alii anagallida ex iisdem oleis malaxant, &  
per se, uel cū mithridatio & theriaca uetere apponunt.

*Aliud.*

R. ualerianæ lib. s. radic. ebuli unc. iii. leuistici cum  
rad. unc. i. bulliant in aquæ maioranæ & olei chamæme-  
lini ana quantum sufficit ad consumptionem aquæ. De-  
inde radices malaxentur cum reliquo oleo, & buboni  
applicentur.

*Aliud.*

R. diachylon unc. ii. ammoniaci, galbani ana unc. s. cū  
oleo scorpionum incorporentur. Ad eam rem laudatur  
lisimachia & scabiosa. Teri debent, & ex conuenienti  
oleo subigi. Aliquando maturatur bubo, qua parte mol-  
lior est, magisque eminet, si theriacæ ueteris momentū  
apponatur, Alioqui cultello aperiāt, repurgeť sanies,  
uicinia



## LIBER SECVNDVS

uicinia foraminis, medicamentis quæ pus moueant, muniatur, ac tandem ut reliqua apostemata percuretur.

In peste aliquando nusquam apparet bubo. Periculosior est quæ sub alis eminet, uel in gutturæ, propter uiciniam cordis.

Carbunculi uerò sepe excitantur, alias partes uicina, alias toto corpore. Pustula est initio pruritus inferens, deinde paulatim prominens, ueluti paruus quidam clauus, initio rubet, postea uirescit, ac nigrescit, aut uersicolor est. Vicinia liuet, pustulæ admodum excitantur exiguæ, perinde ac cum exustus est locus aliquis. Dolor magnus, ardor grauis, crustam relinquit. Deterior est & longior, qui neruosis partibus insedit.

In Carbunculo, quod in peste generaliter dictum est, mittatur sanguis etiam ad animi deliquium (si cetera permittant) Punctum scarificari debet, emplastra apponi debent quæ modicè discutiant, ac refrigerent, qualia sunt, Plantago, lens, panis cibarius: coquuntur aqua & apponuntur.

### *Aliud.*

Granata acida aceto cocta ad putrilaginem, & linteolo expensa apponuntur. Liliorum radix recens emplastrum modo imponitur, tegiturque folio taphi barbati: finis bouis siccus ex aqua subigitur, emplastrum fit. Conueniunt hæc per se scabiosa, cauda equina, taphus barbatus, theriaca, mithridatium. Ficus arida, & passulæ enucleatæ uino coctæ, carbo quernus commixtus melli, lanugo cotoneorum ex uino cocta cum modica cera. Stercus humanum calidum, cotula foetida trita & circumposita. Saphyrus carboni circumducitur: Deinde è directo continetur.

Ac meminisse oportet remedia admodum carbunculis, celeriter exarscere, itaque subinde commutanda sunt: uicinia quoque aliquo repellente munienda est, ut unguento quod populeon uocant, uel hoc.

R. olei rosati unc. iiii. aceti rosacei unc. i. boli armenæ quantum sufficit ad inspissandum. Conueniunt & sanguisuga, & gallus à podice admotus compresso rostro,  
Nasturtium



Nasturtium uel urtica cum sale trita, & ex oleo de liliis subacta. Alium tritum per se, uel cum pipere, & nucleo mundato auellanarum, terebinthina cum nitro, mel & oleum cum sale trito cocta, caricæ, passulæ cum sale subactæ, uel stercore passeris coluborum. Hæc autem, quæ magis discutiunt, nec refrigerant post initia. Alioqui perseverante malo, & imminente periculo, si quidem uires sustinent, cucurbitulis, fotu, scarificatione, ferro, cauteriis, maximè aureis, & calibeis, aliisque uiolentis remediis, ut supra in Bubone, utendum est. Reliqua carbunculorum curatio ex ratione partis uariatur. Aliter enim in palpebris, aliter in pudendis, parte neruosa, aut carnosa, parte uicina cordi, aut remota curari debent, ac ferè exasperantur iis, quæ pus moucant.

*Trocisci mirabiles.*

R. thuris, mastic. uernicis, ligni aloes, stiracis, calaminthæ, cinamomi, caryoph. minii, rosarum rub. bacch. lauri an. unc. i. cinnaprii optimi unc. v. stiracis liquidæ quantum sufficit ad fingēdos trociscos. Quilibet trociscus sit trium drachmarum.

Accipe radicem enulæ campanæ coctam ex aceto, & de ea rode parum singulis diebus, mane.

*De Exanthematibus, Papulis, Variolis, & Morbillis.*

**C**riticæ sunt interdum eiusmodi papulæ in synochis febribus, atque alias quidem, ubi appetet solutio morbi circa labia tantum & nares existunt. In quibusdam febribus à corruptis succis toto ferè corpore, aut certis partibus erumpunt. In pestilenti conditione & maligno genere febrium ulcerantur, saniem reddunt, & naturam carbunculi imitantur. Nonnunquam celeriter resiccantur, & concidunt.

Deteriores aliis, quæ uel interna occupant, uel foris faciem. Plures deteriores paucioribus, maiores minoribus, diutiùs perseverantes iis, quæ celerius decidunt, mæx quoque pruriginosæ & ardentes, quæque sunt cum fluore alui, aut frequenti uomitu. Etenim melius est hic aluum astringi, multo magis ubi apparuerint, aut mediocriter solui.

*presagia  
variolarum*



## LIBER SECVNDVS

Vbi igitur apparent in febribus, recognoscenda sunt, quæ præcesserunt signa. Virtus consideranda est, si præcessit coctio, si uirtus robusta, si febris leuior, facilior spiratio, cætera quoque meliora facta sunt, salutare papulas iudicabis, alioqui exitiosas. Nonnullis sub mortem & in morte certis partibus excitantur, Vulgus purpuram appellat. Variolas aliquando febricula præcedit, idque melius est, quam consequi. Fiuntque ea omnia nature motu, quæ quod uel copia grauat, uel qualitate lædit, extra propellit. Atque aliquando tanta uitii multitudo, ut natura nequeat excludere, & papulis quidem scateat tota cutis, & pulmones, guttur, intestina, partesque interiores eodem malo uitiantur. Fit aliquando, ut quæ iam foras exierant, intro recurrant imbecillitate nature, Vere plurimum præ copia, Autumno magis uitio humorum, colo & constitutione calida & humida, infantibus ac pueris, post etiam adolescentibus, rarius iuuenibus & uiris, rarissime senibus excitantur. Arabes ad menstruum sanguinem partem causæ referunt, qui poris corporis in hæsit & robore nature aliquando excluditur. Alioqui ad ea, quæ prius, copiam uitiumque sanguinis, referenda causa est. Sed à copia ferè rubent, nisi cum iam corrupta materia est. A uitio repræsentant colorem succi redundantis.

Minus periculosa, quæ rubent, aut albicant, quæque extant in superficie corporis. Magis periculosa, quæ flauæ, uiolaceæ, liuidæ, nigræ, quæque sanie uirulenta fordent, aut latent in corpore.

Perniciem adferunt, quæ intro redeunt. Periculum est, cum magnitudo febris, sitis uehemens, æstus, dispnœa, iactatio corporis, dysenteria, urinx mala, nigræ, animi deliquia & alia eiusmodi lethalia coniuncta sunt. Sunt qui paulo ante quam erumpant papulæ, ueluti epileptici concidunt. Vbi enim nature impetus superiora appetit, alias hoc accidens commouet, alias graues capitis dolores, quo tempore summa difficultas anhelitus aliquando fit, densatur sputum, pruriunt nares, facies rubet fulgor oculis prætenditur, uox raucescit, fluunt lachrymæ,



chrymæ, pulsatio in spina, dolor in dorso, territatio in somniis, corpus ueluti aculeis configitur, exiguae notæ quasi capita acuum, aut milii magnitudine rubent, quæ paulatim inangentur, & numero crescunt, apparent ferè primo, secundo aut tertio die post febriculam. Melius est citò apparere, celeriter angeri & maturari.

Alii anginosi, quod plurimum est. Nonnulli Dysenterici, quidam etiam Syncope moriuntur. Morbillos magis biliosos esse uolunt: Variolas magis sanguineas.

Apparent ferè exanthemata intra diem tertium. *Curatio.*  
 Primo itaque aut secundo die sanguis detrahendus est, sic enim melius transpirat corpus. Putredinis causa intercipitur, leuatur natura, & si quid uitii reliquum est, celerius in superficiem corporis repurgatur, alioqui periculum est, ne ex magna putredine ardentissima sequatur febris, & natura oppressa multitudine, uel nihii exponat in superficiem, uel tantum partem uitii, quæ si per imbecillitatem naturæ, quæ nimium oppressa est, intro recurrit, suffocatur æger, nisi beneficio naturæ initio reuocata materia uomitu, uel deiectione excludatur. Tempestiuè igitur detrahendus sanguis est ex interna brachii. Verum ubi iam malum euasit in habitum corporis, periculosa est phlebotomia, quia uidelicet, à superficie in medium corpus uitiosam materiam reuocat. Caterum perpetuum non est abstinere phlebotomia, cum iam papulæ in superficiem corporis extiterunt. Etenim fit aliquando præ copia uitii, ut & plurimum reliquum sit in corpore, urgeat uehementer difficultas spirandi, grauis sit febris, quo tempore si nihil repugnat, uena secanda est. Alioqui sanguisugis utendum erit, quas dorso, scapulis & naribus affiges. Similiter cucurbitulis cum scarificatione.

Sunt, qui loco phlebotomiæ hæmorrhoidas, & menses incitant: profluuium quoque sanguinis è naribus.

Quòd ad purgationem attinet, leues clysteres satis esse possunt, qualis est ex diluto hordeato, in quo uitelus oui, & oleum chamæmeli dissolui debet. Alioqui in aqua hordei, unc. s. cassiæ aut dr. vi. modicū sacchari,



## LIBER SECVNDVS

& vitellus oui dissoluantur. Clysteres diutissime retinere oportet, & minime acres esse, multo maxime, cum iam materia in superficiem commouetur. Pharmaca quoque leuia esse debent, ex decocto iniubarum, tamarindorum, prunorum, cassia, manna, glycyrrhiza, iure galli ueteris.

Aut ubi ardentior febris est, & bilis redundat in corpore, dr. i. aut ꝑ iii. rhab. in aqua endiuie infundantur. Fiat inde potus. Et similiter in aliis humoribus lenissime quoque pharmaca eligenda sunt. Et quia hæc omnia vitia effervescente sanguine fiunt, statim initio laborandum est, ut febris sanguinis extinguatur, & putredo prohibeatur: cui rei conueniunt, quæ refrigerant, & leuiter altringunt. Alimenta quoque eiusmodi, & quæ contemperant. Conueniunt itaque syrupus de ribes, de acetositate citri, de granatis, & reliqui refrigerantes syrupi in pessilentia numerati, in quibus etiam misceri possunt antidoti illic descriptæ ex materia refrigerante.

**¶** Quod si uehemens sanguinis motus est, neq; id genus remedii resistit, natura iuuanda est, ut propellat foras.

Conueniunt igitur, quæ sudores mouent, & in superficiem corporis materiam adigunt, qualia ferè sunt descripta à multis, ficus sicca, passule, lens, semen apii, semen fœniculi, oxysacchara, decoctum calamenthi, hysopi, ligni sancti, syrupus acetosus simplex, aqua hordei & similia. In quorū delectu habenda est ratio magnitudinis febris. Imperabis igitur ficuū siccarū unc. s. liquiritiæ dr. ii. bulliant in aqua sufficiens, detur expressio.

*Aliud.*

R. sem. apii, & fœniculi ana dra. i. lentium excorticatarum dr. ii. ficus siccas duas, bulliant in aqua sufficiens, detur expressio. Aqua distillata è floribus lini huic rei confert, potestque modico saccharo condiri. Alii res rubras prætendunt corpori. Linteum insuccatum in aqua fœniculi & apii, uel horum succo tepidum corpori admovent, & tepidum conseruant.

Nōnulli aquæ hordei unc. iii. uini subtilis unc. i. propinant.



pinant. Aëre temperato collocandi sunt initio, priusquam appareant.

Somnus conceditur, sed posteaquam eruperunt, idē minuendus est.

*Somnus*

Alimenta initio, quę refrigerant & leuiter adstringant: postea uerò quę contemperant. Vbi apparet motus frictio mollis conuenit. Variolę ferē ad septimum maturantur, quo tempore animaduertendū alias quidē maturas esse, alias crudas. Quę maturę sunt, molles, & plenę sanie, acu configantur. Molli linteolo sanies detergeatur, quęq; maiores sunt, pluribus locis configi debent. Vbi iam sanies deterfa est, ne supersit cauitas, puluis aliquis ex iis, quę implent, inspergendus est, amilum, thus, manna thuris, aloë, lithargyrum, cerusa, farina fabarum, cicerum, orobi, lupinorum. Atque hic habenda ratio partis est, ætatis, temperamenti, eaq; oīa ad consilium adhibenda sunt, quę adhiberi solent, cum ulcus carne replendum est, ne supersit deformitas.

Crudę, quęquę durę sunt, nec maturę, uapore decocti chamæmeli, caricarum, pallularum, tritici, dactylorum pinguium & maturorum, sem. althę, lini, scenu græci, & similibus perfumandę sunt. Tum eodem decocto fouendę, post quę linteum calens mediocriter imponendum, dum maturefcent. Atque ubi maturuerint, ut priores, curandę sunt.

Variolis oculi, nares, pulmones, intestina sæpe læduntur & uestigia superiunt, unde deformitas. Itaque ubi signa se produnt uariolarum, muniendi sunt oculi fotu e succo granatorum, aqua rosacea.

*De variolis  
oculis inuā  
tia*

R. coriandri, sumach ana dra. i. santali albi & rubri ana ʒ. s. in pul. redacta concorporentur albumini, meliusque fuerit albumen oui, mixta aqua rosacea prius agitari & despumari, uel.

R. sumach conuassati dra. ii. made fiat in aquę ros. unc ii. Fiat fortis expressio, expressioni adde camphorę Gr iiii. Iam læsis oculis pistacia conteruntur, trita aqua rosacea madehant, expressioni farina hordei torrefacti commiscetur. Item.

*Camphora*



LIBER SECVNDVS

Rec. cerusæ lotæ drach. v. sarcocolæ drach. i. s. traga-  
canthi drach. s. opij. Gran. iiii. cum mucilagine traga-  
canthi extracta in aqua plâtaginis, fiat collyrium, quod  
postea dissoluatur in lacte muliebri, uel albuminibus  
ouorum.

*ori et gut-  
turi cōfe-  
ctio.*

Ori & gutturi conseruando granatorum succus &  
berberorum. Si iam ulceratio est, abluatur primùm a-  
qua herdei, cui aliquid sacchari uel mellis commixtum  
sit. Deinde ex supradictis succis diamoron, & diacarion  
fiat gargarisma. Post collutionem oris, folium plantagi-  
nis inducat.

Pulmonibus syrupus de papauere: postea diatraga-  
canthum in decuplo decocto liquiritiæ, caricarum, passu-  
larum dissoluatur.

Naribus odoretur acetum rosaceum, item in quo ro-  
sæ coxerint. Excipiatur uapor è decocto rosarum, san-  
talorum. Linteolum quoque in his insuccatum, uel in  
mixture omphacii, aceti, aquæ rosarum sæpe inducatur  
naribus.

Iam exulceratis, ceratum rosaceum, uel uiolaceum  
mixta quarta parte mucilaginis tragacanthi conuenit,  
Intestinis decoctum rosarum & cydoniorum.

Delendis uestigiis hæc conueniunt.

*delenda uesti-  
gia uariolæ.*

R. lithargyri, cerusæ lotæ, cadmiæ lotæ, pul. canna-  
rum adustarum, croci ana ʒ. s. Trita incorporentur cera  
to facto ex ceræ dr. vi. & olei de lilio ʒ. ii. Conueniunt  
aqua fabarum, aqua distillata è pedibus uituli, arietis,  
porcellorum, aqua distillata è melle, terebinthina, radi-  
ce serpentariæ limonibus, citrangulis, floribus fabarum,  
aqua quæ folliculis ulmorum includitur.

Pene repurgatur à uermiculi, & modico saccharo  
candi commiscetur, uel cum melle & terebinthiua di-  
stillatur.

R. cerusæ lotæ, amili, fabarum farinæ, cicerum, pha-  
siolorum, tragacanthi ana dra. ii. Vniantur omnia lacte  
muliebri.

Liquor ouorum extractus ex albuminibus, & distilla-  
tus delet uestigia, & illustrat faciem.

*Aliud.*



*Aliud.*

R. masticis, myrrhæ electæ, aloes hepaticæ, spicæ nardi, sanguinis draconis, olibani, opopanacis, bdellij, carpobalsami, croci, gummi arabici, stiracis liquidi, & rubri ana dr. ii. s. terantur omnia, & cum terebinthina ad pondus omnium fiat distillatio in alambico.

R. lithargyri argenti lib. s. Optimè trita decoquatur in libr. ii. aceti albi optimi, semper agitando, usque ad consumptionem medietatis. Deinde per filtrum distilletur, & in uase bene mundo reponatur, postea.

R. camphoræ dr. iii. aluminis, boracis, ana dr. vi. musci Gr. iiii. Terantur omnia, quibus adde olei de tartaro ℥. i. s. Bulliant omnia in libr. ii. aquæ ros. ad consumptionē tertiæ partis, semper cōmiscendo. Postremò per filtrum distillantur, & in ampulla bene clausa reponantur.

Oportebit primùm contingere maculas priore distillato: deinde secundo. Alia permulta è Practicis colliges.

## DE ACCIDENTIBVS FEBRIVM.

*De Somno & Vigilia.*

**S**omnus in febribus, alius naturalis, alius præter naturam. Maximè naturalis est in declinationibus, tum totius morbi, tum particularis accessionis. Præter naturam uerò in initiis accessionum, atque ubi multus humor uitiatus acernatus in corpore. Sic enim uitium rapitur in medium corpus, laborem facit, conuulsiones, timores, & alia eiusmodi. Ideo scriptum ab Hippocrate, In quo morbo somnus laborē facit, mortale: si uerò iuuat, non mortale. Laborem facit, qui præter naturam est: iuuat, qui est naturalis.

Bonus est (inquit) qui delirium sedat, intelligens malum, qui delirium facit. Ac rursus. Somnus atque uigilia, utraque si modum excesserint, malum. Neque enim omnino dormire bonum, aut uigilare. Sed hæc duo temperari debent, & maximè ubi cruditas est. Somnus enim concoquit: uigiliæ uerò digerunt, fuso calore in habitum



## LIBER SECVNDVS

tum corporis, atque ita repurgatis fumosis excrementis, de quo xii. Method. medendi.

Habenda quoque morborum ratio. Est enim, cum non ita dormiendum est, sed quantum vires requirunt. Quod in peste dictum est. Ac febres omnes somnulosas plenas esse periculo iam ante diximus. Item quæ per uigiles sunt. Vtriusque ergo accidentis causa inuestiganda est. In febribus calor, siccitas, dolor, ferè uigilias inferunt: hinc celeriter vires cōcidunt, & facies illa Hippocratica inducitur. Nares acutæ, &c. Palpebræ uix se attollunt pulsus ad instar chordulæ extensæ. Huic itaque malo anacolematis, uinculis, odoribus, potionibus, mature succurrendum.

Græci sub horam somni, manus & pedes ad articulos uinculis constringunt, dum defatigentur. Soluunt uincula, subducunt lumen, imperant silentium. In ratione uinculorum animaduertendum, ne corpus arthriticum sit, aut sint ulcera ad articulos. Sic enim ad alia remedia confugiendum est.

Anacolemata, quæ frontalia appellant, ex olei rosacei unc. i. aceti dr. ii. cum oui candido. Aliud.

R. olei uiol. & ros. ana ℥. s. aquæ ros. unc. ii. agitentur cum oui albumine. Fortius erit, si Gr. vi. uel eo plus opii addideris, aut dr. ii. populeonis. Sed in usu anacolematū habenda ratio naturarum. Nam pueris & mollioribus corporibus eiusmodi refrigerantia stuporem inferunt, læduntque memoriam in reliquam uitam. In his uerò, qui remedia sustinere possunt, innouanda sunt sæpius: statim enim incallescunt.

• R. capita iii. papaueris. In pul. redacta cōmisce oui albumini. Bene fiet, si albumen oui ex aqua rosacea prius agites, & despumes. Aliud.

R. olei papaueris albi unc. i. s. populeonis unc. s. albuminis oui, ut antè, despumati unc. ii. lactis muliebris ℥. s. Præferunt in hoc lac muliebre, si nutritrix albo colore est, & puellam nutrit. Frontale siccum.

R. quatuor sem. frigidorum an dr. i. sem. papa. ℥. ii. florū nenupharis, uiolarum, anethi ana P. i. fiat ex omnibus

*ad supphas  
uigilias:*



bus puluis, qui inuoluatur in linteo duplici. Deinde perfumetur cum aqua rosarum, & betonicæ, aut cum uino albo diluto his aquis. Aliud.

R. nenupharis, rosarum, uiolearum an. P. i. corticis radicis mandragoræ drac. i. s. sem. papa. albi, coriandri an. drac. i. conquassentur crassiuscule, inuoluantur & perfumentur, ut prius.

Potiones.

R. syrupi papaueris, de nenuphare an. dr. vi. decoctio nis lactucarum unc. ii. Capiat hora somni. Aliud.

R. lactucarum P. i. dactylos tres, caput unum papaueris. Fiat decoctio ad unc. iiii. Cum unc. j. syrupi rosati fiat potus, uel.

R. dactylos duos cum capite papaueris, fiat decoctio ad unc. iii. In col. dissol. sacchari rosati unc. iii. Conuenit ubi distillatio in pulmones cum uigiliis: ac ferè commiscemus ea, quæ astringunt, ubi fluxio est, ut in Dysenteria.

R. syrup. de papa. unc. i. diacodion sine speciebus  $\bar{z}$ . s. aquæ ferratæ  $\bar{z}$ . s. Detur hora somni. Conuenit & syrupus rosatus, aliàs per se, aliàs cum aliis. Olfacere oportet oleum de semine lactucæ, de nenuphare, uiolearum, cuturbitæ, aut ex his nares inungere. Alioqui refrigerantia, ut lactuca, flores uiolearum, nenupharis semē & capita papaueris, semen album hyoscyami coquuntur aqua: uapor auribus & naribus excipitur: spōgia in his immersa & expressa subinde naribus admouentur. Conueniunt molles frictiones plantæ pedū, linteamina bene munda, instratum cubile, refrigerantibus susurri facti, idētidem infusa aqua. Sunt qui abraſo capillo humectant caput spuma feri lactis feruefacti. Alii è floribus croci, dēptis staminibus, aquam distillant, eius aquæ ad unc. iiii. totū propinant ad horam somni. Quidam etiam probant manus & pedes ablui ex decocto refrigerantium. Bonum quoque fuerit hordeata, lac amygdalarum dissoluere ex decocto lactucarum, capitum papaueris & similium iuscula alterari cum multa lactuca, nodulos quoque fieri, qui iusculis incoquantur, ut.

R. qua.



## LIBER SECVNDVS

**R.** quatuor sem. frigidorum maiorum, portulaca ana-  
drach. s. fiat nodulus. **V**bi uero nimium somniculosi  
sunt, exprime succum e radice fœniculi, & indes nari-  
bus, aut spongiam imbues aceto, in quo prius concisa  
radix fœniculi, hyssopus, nux moschata, aut quid simile  
coxerit.

## De siti.

**S**itis fit ab humido deficiente, aut calido superante.  
Calori aliquando coniuncta est siccitas, ut in ardo-  
ribus: aliquando humiditas, ut in Hydropicis, & cum  
pituita salsa uentriculo inhæsit. Nascitur autem uel ita  
alterato toto tempore, uel certis partibus: quales sunt  
gula, stomachus, uenter, uiscera, primum intesti-  
num, pulmo. Sitis quædam est, quæ nullo potu expleri  
possit, ideoque dipsacon Græci uocant. Etenim non ali-  
ter quàm qui à dipsaco serpente morfi, inexplibili siti  
ardent. Idque aliquando in morbo contingit, de quo  
cap. de profluio urinæ: Aliquando id contingit iis,  
qui ueteri uino indulgentius sese ingurgitarunt: aut  
uina alioqui calida largius hauserunt: uel qui mari-  
nam aquam dulcis inopia, diutius biberunt. Qui de-  
nique salis & medicatis alimentis, uel etiam pharma-  
cis idipsum contraxerunt. Vbi humidum effervesceat,  
biliosi succi, salsæ pituita in uentriculi tunicis im-  
bibita est, hoc idem accidit. At uerò ex contrariis  
causis sitis nulla est, uel quia sentiendi facultas de-  
mortua est in uentriculo. Hoc uerò in febribus ma-  
ximis & ardentibus exitium denunciat. Est cum, ut  
ad sit iusta causa sitis, non sitiunt, tamen qui febrici-  
tant: tum quia ut modò dicebatur, extincta est sen-  
tiendi facultas uentriculi: tum quia à capite humidi-  
tas defluit, atque inde irrigatis partibus, unde sitis  
incendi solet, non sitiunt. Vitiosa quoque sitis est,  
cum scilicet alienos potus appetimus ex natura hu-  
moris uitiosi imbibiti tunicis uentriculi, qualis est pica  
circa cibos, id est absurda mulierum appetentia, quæ  
uterum gerunt. Hæc itaque prius distinguenda sunt,  
quàm de potu fideliter decernas: Neque permitten-  
dum



dam est, ut diutius sitiant, maxime in febribus: atque ubi siccitas est. Quin & in declinatione cogendi sunt ut bibant. In accessionis principio & augmento potus prohibendus, ne ueluti in fornacibus fabrorum suffusa aqua aut alio liquore febrilis calor uehementius incendatur: sed tum sitis fallenda est madefacta lingua, uel etiam conuoluta folio lactuæ, acetosæ, aut linteolo in aqua frigida madefacto. In uigore collutionibus iam utendum, & gargarismis, qui ubi inclinatur, & uehementer sitiunt, largiter ac confertim bibendum, quantum, uidelicet, haurire possint. Sic enim fit, ut subito motu & contrarietate potus excitatus calor foras dissipetur.

Somnus sitim sedat à siccitate, declinationibus tempestiuus. Sanguinem enim intro colligit, unde siccitas temperatur. Vigilia uero sitim lenit à calore: calorem enim foras excludit. Ideoque quicumque merum largius hauserunt, ac per fumos & uapores calidos sitiunt, his non modò frigida potus, sed etiam uigilia remedio est. Sedanda sitis ardentium, & eorum, qui calido & sicco laborant, conueniunt, quæ refrigerant & humectant: quale est dilutum oxycratum, id est, aceti modicum, eiusque tenuis & bene puri, multæ aquæ mixtum, ut facile bibi possit. Acriore enim utendum erit, ubi pituita falsa est, aut alioqui humiditas iuncta calori, ut in Hydrope.

Aqua frigida, si neque infirmitas uisceris, neque cætera prohibent, tempestiuè data, efficacissimè sitim extinguit, quam calor & siccitas faciunt. Quod si ab aqua frigida noxa metuitur, quinta parte tepida uini aquosi, in lepi uiolati, aut rosati, parte subdecupla sacchari temperari potest. Aliud.

R. seminis lactuæ & cucumeris ana unc. s. liquiritiæ recentis & rasæ unc. i. bulliant in vi. lib. aquæ. Aqua refrigerata per se uel cum modico aceti ut prius, aut aliis proximè dictis, bibatur. Hordeatum mundatum & ex-corticatum in quadrupla aqua bibitur. Ptisana uulgaris bene cocta ex hordeo mundato, recenti succulen-

to,



LIBER SECVNDVS

to, excorticato, & glycyrrhiza similiter recenti, & rasa, utilissima est. Sed hæc Medico animaduertenda sunt, alioqui sitim facit, non extinguit. Cydonia & pira humidiora, cucurbita, cucumer in rotulas conciduntur, immittuntur uase aqua frigida pleno, uas in puteum ita demittitur: usus tempore aqua bibitur, cum uehemens ardor est. Mel rosatum more Veterum præparatum, aut saccharum rosatum, sæpius refusa aqua rosacea factum, in octupla aqua dissoluitur. Cydonia, pruna, extrema lactuæ ac portulacæ, capreoli uitis, ramenta cucurbitulæ & cucumeris, aqua plantag. uel rosacea macerantur & ore continentur. Similiter & granatorum succus, sirupi uiolacei unc. in unc. iiii. decoctionis lactuæ. Iulepus uiolatus rosatus, uel ex aqua & saccharo factus saccharo quidem communi, uel uiolato. Vinum granatorum, syrupus limonum & similia cum aqua hordei, decocto glycyrrhizæ & similibus propinantur. Pilulæ sunt ab Antiquis commendatæ sub lingua retinendæ.

R. semin. cucumeris dr. iiii. gummi tragacanti dr. ii. gummi dissoluatur oui albumine, semina trita commisceantur, fiant pilulæ.

Siccentur in umbra, paulatim deglutiantur.

Circa guttur inunctio ex oleo rosaceo cum aquis, aut succis semperuini, solani, umbilici ueneris, lactuæ, acetosæ, portulacæ, mucilaginé, psilii, aliquot granis camphoræ, in quibus linteolum subtile & rarum subinde madescat ac frequenter apponatur. Conueniunt & ea, quæ contra æstum dicta sunt cap. de Febre ardente.

*De lingue scabritie & nigredine, totiusq; oris.*

**L**ingra tunica uestitur, quam communem habet cum toto ore, palato, larynge, gula, stomacho, internoque uentriculo: tum etiam angustissimas uenas, per quas uisceribus communicat, ita fit, ut ex colore lingue de uiscerum, uenarumque habitu coniciamus.

Humores enim, aut certè uapores è reliquo corpore eo sublati, ubi iam non habent, quò ultra progrediâtur, in spongiosa lingua cōsistunt, & corpus lingue afficiūt,  
ind u-



inducunt scabritie, nigredine, fissuris, siccitate, aliisque id genus. Eadem quoque affectio totum os, quin & alpe-  
ram arteriam & œsophagum occupat. Scriptum ab Hip-  
pocrate 4. Aphorif. & 6. Epide. Quibus plurimum sicce  
tusses leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, non  
multum sibi infestantur, neque iis lingua exurit. Ali-  
quando enim tenuis humiditas in os & linguam defluit,  
uel frequente tussi è uicinis corporibus glandulosis ea-  
dem humiditas excutitur. Pars quoq; in partes defluit,  
unde hæc omnia humectantur, ex quo neque multa sitis,  
neque exultio. Pessimum signum est, ubi nigrescit lin-  
gua, & nimis scabra est. Hic igitur in primis prohibendi  
sumi sunt, qui à reliquo corpore attollunt coriandris  
præparatis, saccharo rosato, interceptis uis, ut postea  
dicitur. Lingua scabra hydrelæo tepido sæpius fouenda  
est: Sed oleum dulce sit, & bene lotum aqua pura, nulla  
qualitate uitiosa. Alioqui tantum aqua tepida utendum  
est, in qua, si uis, præcoxerint semina cydoniorum, al-  
theæ, maluæ. Posteaquam uerò abluta lingua est, scabri-  
ties & humor qui in hæsit, satis aspero linteo, spongia,  
cæruleo panniculo, cochleari argenteo, uel ad id parato  
instrumento detergenda, abradendaque. Sæpe enim ue-  
luti nigra fulgine obducta est lingua, quæ pertinacius hæ-  
ret, nisi abradatur. Idque serè fit adulta bile, & sursum la-  
ta, unde iis & deliria, & profluvia sanguinis serè contin-  
gunt. Aurelianus spongia aqua tepida imbuta absterget  
simul, & humectat. Quod si humectandi consilium uin-  
cit, quia siccior lingua est, lini semen, cidoniorum, al-  
theæ, maluæ, psilii, portulacæ, myxaria seu sebesten, al-  
theæ radices, aliaque eius generis, quæ humectant &  
emolliunt, in aqua prius coquendæ sunt, in qua molle  
linteolum subinde inculcabis, atque ita linguam remol-  
lies. Vbi uerò scabrities uincit, atque ideo abstergendum  
magis asperiore linteo, panniculo illo cæruleo, extremi-  
tate baculi alligato, uel spongia uteris, & in præscripta  
aqua aliquid sacchari candi dissolues, atque ubi satis hu-  
mectatum, atque repurgatum os fuerit, frigida colluen-  
dum est. Cautione Phreneticis & delirantibus dum os  
abluis,

curo.

hydrelæo  
tepidaremolio  
scabrities:humectantia  
linguam:abstergentia  
linguam:



# DE FEBRIBVS.

abluis, in hoc digitum inducas. Mordicant enim & digitum abscindunt. Cornelius Celsus penicillo è conserpto linteolo & constructo, ne dissipetur, linguam deterget, quam prius aqua calida inculcat: deinde melle ungit, & oleo rosaceo Mel enim purgat & deterget. Rosaceum reprimat, & siccescere non finit.

Alioqui butyrum recens sapius ex aqua rosacea abluet, cui deinde saccharum commiscebis. Quod si sola ariditas, cerato rosaceo liquidiore utitor. Saccharum candi retentum ore humectat, & deterget. Paulus Celsus ferè consentit, & rosaceum concorporatum melli plurimum commedat. Sumach incoquatur mulla, hinc scabritiem detergebis. Pruna damascena & sebesten in cocta aqua rosacea humectando conueniunt, & reprimendo; succus portulacæ, eiusque folia ac reliquæ id genus herbæ prius enumerate, Cap. de siti.

Archigenes sale indo utebatur: nos saccharo candi. Auicennas baculo rusci, aut salicis deterget, oleo amygdalino cum modico saccharo optimo humectat & deterget. Quod si oleum odiosum est, lacte amygdalino utendum erit. Sed aliquando profundius scabrities inhaeret, cancerum vulgus appellat. Tum Chirurgo uti oportet, qui depressa lingua instrumentum ad id conueniens profundius immittat atque detergeat, ex quo gargarismis utendum est.

R. aquæ hordei aut ptisanæ bene præparatæ unc. iiii. sacchari uiolati, sacchari candi ana unc. s. uel.

R. hordei mundati unc. i. tragacanthi albi, sem. cydoniorum sem. malux, liquiritiæ recentis mundatæ, succi eiusdem ana unc. s. Fiat decoctio in aqua purissima. In expressione dissolue penidiorum unc. ii. Fiat gargarismus, quo tepido utatur. Alius.

R. sacchari candi, tragacanthi albi, gummi arabici ana dr. ii. sem. psylli, cydoniorum, portulacæ ana dra. s. conseruæ uiolarum unc. s. Vniantur omnia: deinde dissoluta in iulepi uiolati quantitate sufficiente, gargarismum faciunt contra scabritiem arteriæ, totiusque oris interioris. Cellum uerò, qua maximè parte uenæ sunt &



& arteriæ, illinatur subinde hoc unguento.

R. olei uiolati sæpius loti in aqua uiolarum unc. ii. butyri recentis sæpius loti ex aqua rosarum unc. s. Fiat unguentum. Vulgus utitur foliis linguæ canis quæ collo circumponit, aliisq; herbis plurimis. Frequens quoque illi est aqua caprifolii & arnoglossæ, similiter & omphacio aliquando utitur. Decumbere oportet in alterum latus; supinis & ore hiantibus celerius lingua exarescit. Sternutationes linguam humectant, quia uiolento motu è uicinis partibus humidis humiditas in os exprimitur.

*De dolore capitis in febribus.*

**D**E dolore capitis iam multa dicta sunt, quæ in hunc locum referri possunt. Peculiariter in capitis doloribus, quæ cum febre per initia inuadunt, *Prima aut secunda remissione sanguinem mittito*, si uires & cætera permittunt. Verum priusquam de Phlebotomia decernas, uidendum ne dolor hic propter astrictam auium, aut uapores uentris, non quia materia in capite est, excite-  
tur. Hic enim quod ad dolorem attinet. Phlebotomia necessaria non est, sed clyster sufficit: *ut si post septimum diem dolor primum inuasit, sanguis quidem detrahendus nõ est: sed aliud liberaliter mouenda est, uel pharmaco mediocri, uel rhabbaro, catholico, uel clystere acriusculo.* Quod si nec clysteri quidem, aut pharmaco concedit dolor, cucurbitula occipitio, uel ceruici defigenda est: sine uulnere quidem, si tantum uapor est causa: cum uulnere, si qua materia capite continetur.

Veteres raso capillitio aspersioibus plurimum utebantur, & ex alto infusi liquoribus in eas partes capitis, qua per suturas anteriores humor in caput descenderet. Utebantur ferè oxyrhodino, rosaceo cum aceti modico si quidem calidior febris, talisque aeris conditio.

Frigidiore uerò corporis habitu, & Hyeme chamæmelino cum aceti quinta parte, quod prope fiet si dr. ii. aceti olei unc. commisceas. Sed nunc ferè anacolæmatis, seu frontalibus utimur, quæ frontem & tempora comprehendant ex eadem materia. vel.

§ R. olei

*storia:*



# LIBER SECVNDVS

R. olei rosarum unc. ii. olei communis, uel chamæmeli unc. s. Aestate frigidis, atque ubi feruentior febris est ubi uerò mitior febris, nec cœlum feruet, modo tepidis, modo calidis utendum est. Aliquando proximæ mixturæ succum polygoni commiscemus, nōnunquam capita papaueris in oleis elixamus Aestate, & uehementiori febre; alioqui serpillum, mentham, betonicam, saluiam, anethum, peucedanum, & similia.

Perseuerante dolore cataplasmata fingenda sunt.

R. farinæ hordei M. ii. malaxentur cum succis scæniculi, & olei rosacei ana quantum sufficit. Fiat cataplasma, quod in totam frontem & tempora extendatur. Quod autem & subinde remedia commutari priusquā nimium incalescant, quòdque olea nec rancida, nec grauius olentia, nec falsa esse oporteat, iam sæpe dictū est.

Cornelius Celsus rosas in aceto macerat, fascia in eo aceto madefacta maceratas rosas inuoluit: fronti, & temporibus apponit, sæpe innouat: alioqui lana in eo aceto inculcata uim remedii conseruat, quod & in aliis remediis fieri potest, ne celerius incalescant, sæpiusque commutanda sunt.

Alii pane ex psylli & similium succo subacto cataplasmata fingunt. Nonnulli eandem micam panis cum foliis hyosciami conterunt, uel papaueris recentis, deinde oxyrhodino commiscunt. Abstinendum uerò assidua potatione, collutione immodica, luce, calore, colloquiis, ingratis odoribus & uaporosis, clamoribus, strepitu, & uehementi animæ motu. Auicennas & Arabes hac irrigatione ueniunt.

R. flor. chamæmeli M. s. furfuris, uiolar. ros. an unc. s. F. decoctio, materia sacculo excipiat, qui subinde madefactus in decocto exprimatur, deinde frōti ac temporibus apprimatur. Neotericorum formulæ sunt.

R. olei rosarum unc. s. oser uiolarum & lactis mulieris ana dr. ii. aceti albi dr. i. panniculus in ea mixtura inculcatus applicetur fronti & temporibus. Aliud.

R. aquæ rosarum & damasci ana unc. i. aquæ nenupharis unc. s. misce, similiter utere.

Viris



Vitis capreoli & folia concisa, & imposita dolorem sedant, & somnum conciliant, similiter & reliqua materia, quæ refrigerat. Videndum tamen, ne nimium refrigeremus, ideoq; & aceto & aliis eiusmodi, sed illo maxime interdictum est, ne quis, uidelicet, solo utatur. Nā præterquàm quòd nimium refrigerat, nervis etiam inimicum est. Atque iis multò magis abstinendum est in pueris, mollioribus corporibus, & cælo frigido.

Auicennas in dolore capitis à febre abstinet stipticis refrigerantibus, quia timet ne inde materia compingatur, & crassescat nimium. Alioqui materia exprimitur, ubi catarrhus calidus est.

*De sudore.*

**S**udor excretio est serosi humoris per poros corporis. Causas habet efficientem quidem calorem, materiam uel uaporem, uel humiditatem. Vapor à calore, qui humores resoluit, deinde in superficiem corporis attollit, relaxat poros: sed uapor occursum cutis resistit, atque hic in humorem conuertitur, non aliter quàm in aere pluuiam, in ollis coquantariis humor è uapore sublato, si quid solidum opponitur. Humor uero eo modo materia est sudoribus, ut etiam urinis. Atque ut in his aliquid etiam bilis emungitur: ita & in sudoribus tenuior bilis expurgatur. Sed uenosum genus per urinas magis, habitus corporis per sudores expurgatur. Est cum calor externus attrahit humores, liquefacit, ac resoluit, quod in balneis & uaporariis intelligitur. Aliquando etiam medicamenta quædam partium tenuitate & calore humores liquefaciunt, ac celeriter in habitum corporis penetrant, secumque liquefactos humores rapiunt, unde sudor. Atque interim imbecillitate caloris natiui, ac prope dissoluta natura diffluit sudor, isq; ferè frigidus, ut in malignis febribus. Nōnunquàm etiam præ copia humorum aut alimenti sudor fit, de quo scriptum ab Hippocrate. Sudor multus à somno factus sine causa manifesta, corpus uti pluri cibo significat. Quòd si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet, quòd indiget euacuatione. Et ex copia humo-



## LIBER SECVNDVS

rum perpetuus fere sudor est in febriu generibus, quas Typhodeis, & Eleodeis appellabamus.

*Sudor optimus*  
*Feb. 95.*  
*Sudor pessimus*  
*95.*

In febribus sudor est optimus, qui fit die critico, praecedentibus signis coctionis, qualitate tepens, toto diffusus corpore, substantia tenui, nullo graui odore, cum pulsu bono & undoso, & a quo leuatur febris, & egerque incipit habere salubrius: contra uero pessimus est ei contrarius. Quod si ante crisin aut accessionem fit, malus est. Etenim ut excernitur, exprimiturque. Post crisin & accessionem fuso calore, laxato corpore, natura uincente salutaris est. Qui circa ceruicem tantum & thoracem, aut toto quidem corpore sed exigua naturam languidam, uel copia grauam significat. Deerior tum est, ubi in supernis tantum partibus. Nam si tum natura infirma est, syncopem denunciat: quod si etiam frigidus est, iam syncope est. Alioqui si non ita infirma natura est, partem unde effluit sudor, grauam copia coniciens, uel aliter affectam, qua parte sudor, ibi morbus, inquit Hippocrates, ut & hoc frigidi sudores cum acuta febre mortem, cum mitiore morbi longitudinem significant. Haec omnia in febribus distinguere oportet, ut intelligamus, qui sudor bonus, quiue malus sit, qui reprimendus, & rursus quem excitare oporteat. Est & genus sudoris incogniti antiquis, qui paucis diebus hominem resouit, fere similis ei sudori, quem cardiacum dicebamus. Vocatur autem Anglicus, quia in Anglia anno millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto populariter grassari coepit, quo correpti itomachi & capitis aestuoso dolore eruantur, toto corpore sudorem foetidum effundunt, sitiunt, intra uiginti quatuor horas animo deficiunt & moriuntur. De quo iam multa scripta sunt. Sed qui eo tempore uixerunt, afferunt praecipuam causam mortis, quod loco stare nequeant acri, pedes, manusque ad refrigerium iacent, ac suppresso sudore moriantur.

Itaque cautio fuit Anglis, ut qui interdum corripere tur, statim cum ueste decumberet, foveret sudorem: qui uero noctu, sese colligat, bene cooperiat ut effluat modicus



modicus sudor. Potu utatur qui temperet sitim, cibo si  
cariere potest, bene est: sin minus, frugaliter utatur, nec  
se dimoneat lecto, nec iacet membra ad refrigerium.  
Est enim lethale, ut uix centesimus quisque euadat: aut  
si qui euadant, in morbum bis terque relabantur, & tan-  
dem concidant. Hæc ex Chronicis Angliæ, quas scripsit  
Polydorus Virgilius.

Sudores uero in febribus aliàs cohibere, aliàs excita-  
re oportet. Critici, si quidem resistunt, excitari debent.  
ac fere resistunt, uel quia copiosior materia est, uel qua-  
litate crassior, & lentior: alioqui externa causa est. Pro-  
pterea consuetudo est, ut syrupum acetosum cum ptisa-  
na, uel aqua hordei calida imperent: Alioqui ptisanam  
ual aquam hordei saccharo conditam. Atque hæc calida  
imperentur, ut citius penetrent in corpus.

In summa quæcumque uim habent aperiendi, nec adeo  
calefaciunt, mouendis sudoribus imperari debent.

Atque ubi materia crassior est, minusque uiscida, de-  
coctum hyssopi, thymi, pulegii & similium, uel oxyme-  
liti, uel syrupo acetoso miscendum est.

Verum in sudoribus etiam criticis modus quidem  
esse debet, quemadmodum & in reliquis omnibus criti-  
cis excretionibus.

Modus uero tibi indicabit pulsus, qui per eiusmodi  
excretiones uehemens & magnus. Quo igitur tempore  
talis permanet, nihil ab excretionem tibi metuendum est:  
ubi uero cœpit imminui & languescere, sistenda hæc ex-  
cretio est. Historia est apud Gal. Imperitus quidam Me-  
dicus sudantem adolescentem in balneum deduxit, &  
extinxit præter modum citatis sudoribus.

In syncope copia grauante, inflammationibus uisce-  
rum principis morborum acutorum sudores mali. Et-  
enim naturæ imbecillitate, non robore effluunt. Ab ani-  
mi quoque molestia, conuulsionibus, magnis doloribus  
sudores commoti cohiberi debent, ut etiam qui resola-  
to corporis habitu diffuunt. In sudoribus remissis ne-  
que satis fluentibus melius est aquam guttatim cadere,  
quàm tenuiter & parce corpus madefacere.



## LIBER SECVNDVS

Diapasmata Græci uocant, quæ ad sudores insperguntur, ut Alipasmata, quæ inungunt, magisque cohibendis sudoribus. Diapasmata ex materia refrigerante & astringente, ut est rosarum siccarum puluis, terra samia, cimolia, creta, alumen scissile, plumbum exustum, gypsum lotum, mala punica. Hæc singula commixta, uel per se subtilissime trita corpori asperguntur, uel astringente oleo commixta inunguntur.

Ad sinistram mammam, & totum uentrem remedia adhibenda sunt, ac subinde mutanda sunt. Cæterum ubi tumor præter naturam in hypochondriis, astringentibus abstinere oportet, utendumque pane ex rosaceo subactio. Alioqui farinam uolatilem ex aqua, uel rosaceo subactam hypochondriis impones. Atque remedia, quæ sudores cohibent, fugere oportet.

Aetius cataplasmatibus refrigerantibus sinistram mam-  
mam & totum uentrem comprehendit. Smegmatibus uerò aut Diapasmatibus, id est, puluisculis collū, thoracē, alas, inguina cōspergit. Corpus quoque uentilandum est, atque leuandum stragulis. Possumus succo plantaginis, portulacæ & similium media corporis irrigare. Vniuersum corpus ceratis ex oleo astringente inungere.

Paulus resistentem sudorem criticum, aut remissum fotu, quiete, calido clystere, sorbilationibus, somno denique adiuuare.

Sudores ab animi molestia, conuulsione & similibus, extremitatum ligatura, fotu extremorum, uestimentis laneis compescit.

In summa nullus sudor ui exprimendus est. Sed ubi natura eam excretionem molitur, tum quidem adiuuanda est. Certissimum indicium salutaris sudoris est pulsus colliges, qui magnus & undosus esse debet, si quidem sudor salutaris futurus est, ac præter cætera animaduerte, quæ sudoris causa extiterit.

Si enim præter naturam est, qualis est dolor animi, molesta conuulsio, interior inflammatio, & similia: sudor quidem resoluit corpus, non leuat: itaque cohibendus est: Contrà uerò si naturæ uictoria est, pulsus ma-  
gnus

*indiciū et huius  
simi sudoris  
salutaris.*



gnus erit & undosus, neque tum sudor cohibendus: sed si resistit, incitandus, dum incipiat pulsus languescere. Signa prognostica, è quibus præfagias sudorem, iam ante descripta sunt cap. de febre ardente.

Sudor qui grauitè olet, putridam, corruptamque materiam ostendit. Suspectus est, qui nō soluit febrem, qui non minuit symptomata, qui alio die, q̄ critico, existit.

*De morbo Regio.*

**Q**Vibus in febribus morbus regius ante diem septimū accidit, malum, inquit Hippocrates. Tum scriptum ab eodem primo de morbis popularibus, multos seruatos, quibus die quarto morbus regius accidisset, & lib. de rat. uictus acutorum. Morbus regius ante 7. si cum horrore, salus: si sine horrore, mors. Quæ quia pugnare uidentur, meminisse oportet morbum regium ante septimum ferè exitiosum, nisi sequatur excretio, qualis est fluor sanguinis è naribus, alui profluuium, urina multa, sudor, uomitus, & similia.

Alioqui naturæ infirmitas ostenditur, grauis intemperies, aut obstructio hepatis, eiusdem inflammatio, aut scirrhus. Quod si initio morbi natura concidit, exigua spes reliqua est.

Post 7. uerò, si quidem criticus est, salutaris est.

Post 7. significare sudorem scripsit Hippocrates lib. de Iudicationibus.

Si igitur post 7. morbus regius fit, & criticus est, expectanda salus: multò magis, si qua excretio critica coniuncta est: unde leuetur natura, minuatur febris, eiusque symptomata.

Verum aliquando & morbus regius fit, & sequitur excretio, & mori contingit. Ita Herminippus in epidemius cum à morbo regio abundè excreuisset per aluum, mortuus est.

Panagoras tertio die auriginosus nihil excreuit, mortuus est.

Heraclides & alii permulti 3. die auriginosi seruati sunt. Quibus secuta per uesicam purgatio, turbata aluus est, uel profluit sanguis è naribus.

§ 4 Præter



auro :

Præter remedia, quæ proprio capite de morbo Regio descripta sunt, conueniunt, Balnea dulcia, unctiões ex oleo chamæmelino, anethino, irino, aut cui rosmarinus incoctus sit.

Potiones, quæ aperiant, rarefaciant, moueant sudores, quæque partim capite de uariolis, partim capite de sudoribus descripta sunt. Atque ubi extincta febris est, liberior usus est aperientium. Oculis conueniunt fots ex aqua tepida, in qua summitas sceniculi, flores chamæmeli, anethi, rosmarini efferbuerint. Atque eadem aqua, & facies, & corpus uniuersum ablui potest.

Oxyfaccara, Granatorum succus cū modico melle albo, uel sacch. oculis inungitur. Errhina imperantur.

Albutio faciei ex aceto albo tepido. Errhinorū usus in balneo ex aceto acerrimo scyllitico, succo nasturtii, maioranæ, betæ, sceniculi, rosmarini, Elaterii momentum in lacte muliebri dissolutum.

*De dissoluta appetentia.*

**A**ppetentiæ ideo consulendum est, quia longiore inedia uires dispercunt. Itaque quantum morbus patitur, curandum ut æger aliquid appetat. Neque omnino denegandum est, quod æger appetit, etiamsi non ita morbo conuenire uideatur.

Scriptum est ab Hippocrate, Parum deterior potus aut cibus. &c.

*in deiectione appetentia aliqui cum melle elixiribus qd nutriant:*

Atque interim coguntur uti clysteribus, qui nutriant, ubi nimium deiectione appetentia, nihil assumit eger, aut omnia reuomit. Similiter & cibum non sentientibus, & cardiacis, iuscula caponum, pullastrarum cum modico saccharo, hordeatum & amygdaloga.

Oribasius alicam, triticum, far, fursures, panes coquit & decocta infundit nutriendo, & stercore duriora excludendo. Meliusque fuerit, priusquam nutrientem clysterem iniicias, alio clystere intestinum repurgare, ac quantum fieri potest, & paulatim & in profundum nutriendi clyster infundatur.

Actius oua confracta in ptisanæ cremore, aut alicæ iniicit uacuo intestino, hoc est, bene repurgato ueteri stercore.



stercore. Nunc vitellum oui in hordeato, lacte amygdalino, iure carniū dissoluemus. Potus sit iulep rosatum, distillatum: sed quia dulcia sunt, quarta pars vini granatorum adiici debet. Gelatina cum eodem uino uel granis acidi granati, granatum quoque acidulum, cum modico saccharo exhibeatur. Iulepus factus ex succo depurato, capreolorum uitis. Syrupus de agrella cum aqua cocta frigida. In conualescentibus saepe humor aliquis reliquus est imbibitus uentriculo, unde deiecta appetentia. Scripsit Hipp. egere uacuatione.

*potus*

*IN. 2. de  
ctione appe-  
titis iudice  
scitib;*

Vacuatio olim ex hiera: nunc ex rhabarbaro. Optimū fuerit, uacuans medicamentum imperare est decocto eorum, quæ detergent, & maxime cicerum rubrorum, absynthii, hordei & similium. Cinamomum aceto scyllitico maceratur: estur matutino.

Incidit aliquando febricitatibus uomitus superfluus.

Quæ remedia ex capite de cholera & uomitu.

Incidit fluor sanguinis e naribus, cuius signa prognostica capite de febre ardente. Remedia cap. de sanguine fluente e naribus.

De singultu, syncope, tussi, delirijs, urinae retentione proprio cap. prius descripta sunt remedia.

Aluus durior mollienda clysteribus, ex iis, quæ partim ardorem attemperant, quæ remolliant, & si fuerit opus, aliquid attrahant.

Profluentis alui remedia proprio loco dicta sunt.

De tremore cordis similiter, & de cardiaca febre.

#### *De Varietibus.*

**V**arix uena est dilatata, nata primò imbecillitatis uitio ex sanguine crasso, melancholico, interim pituita mixta.

Quæ ab atra bile, atriores cutem reddit: Quæ uerò à pituita, albiorè. Nascitur plurimum in cruribus, interiori tibia. Aliquādo in testiculis, uentre teporibus. Supposita uulneri prohibet, ne uulnus coalescat. Itaque primum hoc modo curanda est.

Consultis ægri uiribus, cæterisque ad phlebotomiam consilium adhibitis, ex axillari brachii eiusdem lateris cum



LIBER SECVNDVS

cum crure, in quo uarix est, sanguinem detrahes, nisi uittio lienis uarix intumuerit. Tum enim ē sinistra axillari sanguis detrahendus est.

Misso sanguine uires reparandæ alimentis boni succi, ex quo imperandum pharmacum, quod una melancholiam & pituitam expurget, adhibita tamen ea ratione, ut ex colore uaricis, tū et aliis humorē redundāte iudicemus. Vterq; humor cum sit crassus, primū incidendus est & attenuandus, tum per interualla repturgendus.

Inciderur oxymelite, in quo hyssopi, aut rad. fœniculi aliquid maduerit, si qdē pituita redūdare uidebitur.

Si uerò atra bilis, eodē oxymelite, in quo cortex radicis capparidis, aut ramarisci bullerit, adiectis interim seminibus anisi, apii & similium.

Pituita repurgatur agarico ad ℥.iiii. in eiusdem oxymelitis ℥.iii. infuso. Senna atram bilem repurgabit ad ℥.s. aut dr.iii. in eodem oxymelite, aut sero lactis infusa, adiectis ℥.iiii. cinamomi. Efficacior quoque potio, si dra.ii. eius pul. cum absynthii decocti unc.iii. propines, aut epithymi tantundem loco sennæ.

Vtrunque humorem, qui ferē mixtus est in uarice, hoc syrupo purgabis.

R. betonicæ, cichoreæ, florum cordialium ana P.i. liquiritiæ, anisi, cuscutæ ana ℥.iiii. passularum mundatarum ℥.i.s. polipodii quercini unc. s. agarici trocif. dra. vii. folliculorum sennæ electæ unc. ii.s. Fiat decoctio ad quartaria tria. In ea dissolue sacchari albißimi quartarium. Fiat syrupus mediocriter coctus, capiat unc. i.s. per interualla cum unc.iii. seri lactis, ptisanæ, aut aquæ hordei iam secta uena, & purgato corpore, uaricem in longum scarificabis, iniectionis uinculis supra genu, ut tumeant magis, ita sanguinem e uarice exprimes. Vbi satis uacuaueris, ei ipsi uenæ sectæ uaricosq; medeberis eo modo, quo uenas uulneratas curare oportet.

Itaque curato uaricis uulnere, tum demum ad maligni ulceris curationem redibis. Hæc ex. 4 κατὰ γινῶ.

IACOBI



46

IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI

De Peste, Libellus.



**P**ιθημία, morbus est aliquo anni tē-  
pore, certisq̃ue locis inualefcens,  
qui si multos rapit, λοιμώδης, id est,  
Pestilens appellatur, & λοιμός Pe-  
stis est, hoc est, ἐπιδημία populari-  
ter grassans multosq̃; interimens.  
Suntq̃ue eiusmodi morbi ab aere  
omnino distinguendi, ab iis, quos σποραδικοὺς appellāt,  
quibus antecedens uitæ ratio causā est. Atque impri-  
mis animadvertere oportet, unde primū clades eius-  
modi publicæ oriuntur. Nam & ad curandi rationem  
pertinet. σποραδικοὶ uniuscuiusque proprii sunt, tantum  
q̃ue uexant populi uulgus, ac fere quo tempore præces-  
sit fames, cum uidelicet obuiis quibusque alimentis se  
se ingurgitant, unde humorum corruptela asseruatur.  
Quod si ferax annona sequitur, etiam solito magis sese  
replent. Sed non pura corpora quanto plus nutriuntur,  
tanto læduntur magis. Quod enim bene succosum est,  
multitudine aceruati uictus priore uita corrumpitur.  
Ab hoc enim non adeo metuenda contagio. Alterum  
genus, quod in aere est, contagiosum magis, nulliq̃ue  
parcit: temperatos, scilicet, & alios corripit, quia com-  
muniter nobis diem hauriendus aer est. Ac ferè Austrū  
ac maritimi flatus, constitutio calida & humida pestem  
inuehit. Causam alii ἐκ τοῦ οὐρανοῦ requirunt & decretis syde-  
rum. Alii in antegressæ causæ inuestigatione minus se  
torquent,



## LIBER SECVNDVS

torquent, multò magis enitendum, ut presentes causas declinemus, hoc est, aeris afflatus alioqui corrigamus, & in hęc pessima lue quantum arte & consilio conceditur, nobis & aliis salutare auxilium afferamus. Aer enim alias eadē hominum & strage, alioqui animalium, itagnantibus putridisque aquis, aut maligno terrę halitu, noxiis uentis, pestifero denique influxu syderis, sorde mechanicorum, ut coriariorum, corrumpitur.

Corruptus eadē lue nos inficit, ac deinceps publicē nos inspiratu & expiratu inficimur. Sed si accedit humorum corporis intemperies, & spiramentorum cutis raritas promptius subdit lues in arterias, corq; prahendit. Astrologorum placita sunt, Saturni coniunctione cum Marte pestem inferri.

Porphyrus scriptum reliquit, cometas orientes talem pestemque mortalibus inferre, quibus occurrere non liceat. Sed Astrologi semel observato fidere legem statuūt. Porphyrus idem sequitur. Sed meminisse oportet, ut sua cuique elemento uis insit & perfectio, à cœlo alterari. Verum quia è cœlo petuntur causę nondum satis cognitę, sed coniectura quadam capta, quam inuexit semel oblatus euentus. Et aliis saluber Oriens, aliis pestifer. Toti Italię ac ferè Septentrioni pestiferi Austri sunt, Aphricę salutare. Quodque apud nos Etesię faciunt, à media regione Aquilonum & Orientis afflantes, id Ausler efficit Aphris. Tanta uis in eiusmodi Etesijs, siquidem Grecis Medicis credimus, ut uim maiorem pestiferamque anni præcedentis omnino corrigant, si cuique regioni inspirant tempestiuē. Febricula ferè leuis est, ut stent, nec decumbant agri. Hinc etiam uulgus somnum prohibet, motum imperat, idque didicit longo usu, quod confirmat ratio. Etenim lues intro ad partes principes appetit. Reuellenda uerò atque foras auocanda est, quod statu, motuque melius fit, quam quiete: ac somno in ima corporis colligitur. Uri na sanis interdū persimilis, alias aquosa, biliosa, nigra, melancholica: dolor capitis multus, excrementa alui crassa, grauiter olentia, multum biliosa, spumosa: uomitiones



tiones biliosæ, nigræ, inquietudo, nausea, fastidium cardialgia, sitis, lingua scabra, ardor parte interiori: hypochondrii contentio, respiratio magna, alta, dispnœa, syncope, sudor foetidus. Frigent extrema, conuulsio fit, syncope, mors.

*Ex anno & alijs.*

Signa futurę pestilentie, ignes in aere uolitantes, cometa uergens ad Orientem, Austrorum magna anni parte flatus, alijs orientibus, alijs occidentibus, aer turbidus, nebulosus, siccus.

*Aestate futuræ.*

Vere pluuia rara, frigus, postea austrini flatus, unde aer conturbatur, tum serenitas breuis sequitur, noctis frigus, uehemens calor interdum & ardor, uariolę exanthemata, autumnalis æstus, ignes, inæqualitas caloris, frigoris, sereni & nubuli cœli. Ranarum & reptilium eorumque, quę ex putredine gignuntur, prouentus. Latibula refugiunt mures, talpę, glires & similia, quę sub terra uiuunt.

*Addita inter signa.*

Nulla interdum febris sensibilis: diastole minor, quàm systole signa peculiarum humorum corporis sequitur color.

Diaria febris pestilentialis intra 30. horas interficit, sentiuntque uires paulatim exhalare, sæpeque neque bubo, neque carbunculus apparet: sed totum uenenum in corde hæret. Alia febris in 4. diem protrahitur. Omnia bona signa suspecta sunt. Cœlum calidum, humidum, secundum uentos in Epid.

*Præseruatio.*

**C**Orpus uacuum sit excrementis, non plethoricum. Obstructiones & astrictiones declinentur, ut bene transpiret.

Cognoscenda causa est. Nam si cadauerum halitus aerem inficit, omnino procurandum, ut uel cremantur, uel sepeliantur: deinde frequenti rogo aer repurgetur. Quod si uirus exalat è terra, omnino præcludenda uia est, atque intercipienda flamma. Sed & aquarum stagnantium



LIBER SECVNDVS

gnantium residentiumque uapor declinari debet. Aeris uerò pestifera conditio multo maximè, cum is & turbidus & meridionalis est, aut maritimus multo igni ea parte structo, qua uenti importatur, deinde etiam compitatum domi & priuatim temperanda est. Constat experientia Medicorum inspiratum halitum ignis, esse antidotum contra pestem & putredinem. Nota est hystoria Hippocratis. Nam cum ex Aphricæ Aethiopixque locis pestifer halitus per medium mare Athenas inueheretur, consuluit ignes incendi, atque ita magna illa ciuitas lue uindicata est. Hoc idem Empedocles Græcis & acron quidam consuluit. Possunt ignibus adhiberi iuniperus, laurus, rosamarinus, myrrha, cinamomum, acorus, herbæ odoratæ. Potest excitari aceto fumus, ex uino & aqua rosarum, &c. Ac priuatis ædibus multo magis eadem fiant. Vestes quoque, stragula omnia, uel simili fumo, uel aqua rosarum, aut similibus, quæ post decurunt, perfumari possunt. Rosæ & similia, acetum, &c. spargantur solo. Optimum uerò ac breuissimum remedium secedere in salubre cælum, tenere corpus bene mundum & uacuum excrementis, haurire aerem Aquilonium, qui uentorum saluberrimus est, atque fenestrix huic apertæ sint. Victus sit mediocris. Neque enim tolleranda fames & sitis, sed omnia incontinentia uitæ fugienda est, alimento siccante ac refrigerante quæque putredinem arceat. Itaque utendum & omphacio, & acetosa, granatorum succo, limonum, citriorum, citrangulorum. Acetum, cappares, passulæ, cichorium, endiuia, in summa quæcunque uel acidula, uel subamara putredinem prohibent. Quanquam in horum usu ratio anni partium, temperamentis & aliorum ineunda est. Est etiam cur uino optimo, cinamomo, musco, aliisque calefacientibus aromatibus utamur. Auiibus, piscibus saxatilibus, fructibus, cerasis, prunis, uua & ficu Iunio mense uti oportet. Hyeme, passulis & ficibus siccis, pomis aut piris odoratis, amygdalis. Sed omnia Aestate, aqua rosacea: Hyeme, uino odorifero suffocari possunt.

Exercitatio domi sit pro consuetudine: alioqui mediocris,



diocris, aut in uicinis hortis, cœlo bene puro, atque ubi sol non euerberat. Sit exercitii locus non suspectus, non decliuus, non uaporosus, in sublimē positus, quique ab Aquilone potius affecto, aut eo uento, qui loco sit salubris. Aliis enim Zephyrus, ut Italiæ: Aliis Sub solanus, ut nobis & Hispaniæ salubrior est. Quin & qui pestifer nobis Austro est: multis partibus Africæ salutaris est. Atque hinc salubres suos Etesias expectant. Videntur colloquia cum suspectis, abigantur canes, catti, eiusmodique animalia. Exercitio eiusmodi corpus excrementis repurgatur, putroq; spiritu uegetari potest. Venus rara, hylaris uita, & sine animi curis.

Somnus & uigilia pro consuetudine mediocria. Atque imprimis resiccandum corpus, hoc est, declinanda plenitudo & excrementa sepe purganda sunt. Itaque ubi uenæ tument, utile est aperta uena aliquid sanguinis detrudere. Excrementa quotidie repurganda, reddita aluo molliori exercitio. Ac singulis hebdomadibus Russi pillulis utendum est, quæ non uno modo à Græcis & Arabibus describuntur.

R. aloes lotæ in aqua endiuixæ, uel acetosæ ℥.ii. myrrhæ, croci ana Gr. xv. cum uino al. fiant pillulæ. Dosis dr. i. aut ℥. ii.

R. terræ sigillatæ, boli armenæ ana dr. s. ex succo cyperi fiant pill.

R. aloes lotæ scrup. iiii. boli armeni dr. s. croci, myrrhæ ana scrup. s.

R. aloes, croci ana dr. s. myrrhæ dra. ii. ex aceto fiant pill. Dosis dr. i.

Alioqui impera pillulas duas communes.

R. aloes dr. i. myrrhæ, ammoniaci ana scrup. i. aut ammoniaci æquum pondus cum aloe.

Bolus armenus à dra. i. in uino albo tenui & aqua buglossæ, calandulæ, acetosæ.

R. aloes lotæ in aqua scabiosæ dr. ii. myrrhæ lotæ in aqua acetosæ, croci, mastiches ana dra. i. fiat massa. Meliores sunt, quæ aliquot iam diebus confectæ, quàm quæ recentes.

Antidoti.



Pompeius in sanctuario, uictu Mythridate hoc reperit, nullo ueneno lædi, qui hac antidoto uteretur. Nuclei duri, ficus totidem, rutæ folia. 20. salis granum. Teruntur omnia, mane excepta deuorantur. Aut conspersa uino mane ieiunus deuoret. Ex Plinio, Dioscoride, Sereno. Actius alii tribuit, quàm Mythridati. Ficus diuidatur, nucleus nucis tritus indatur, folia 5. ruthe & granum salis, torrefiant leuiter in igne, conspergantur uino & ita deuorentur.

Theriaca & Mythridatium dra. s. scrup. ii. dra. i. ex aqua rosarum &c. & modico aceto rosaceo.

Cucumeris siluestris radix in mortario teritur cum foliis tenerioribus semperuuii, apii, coriandi bene triti. Mel additur, & puluis cinamomi aut 9. granis piperis. Omnia mixta stanneo uase seruantur. Vteris ieiunus castaneæ magnitudine ex uino tenui, albo, diluto aqua conuenienti. Poteris cum lue correptis uersari, aut iam correptus statim sanescis.

Theriaca & mythydatium nullis remediis cedunt. Datur his in hebdomada à scrup. i. ad dra. i. ex liquore conuenienti. Quales sunt distillatæ aquæ, buglossi, borrag mellissæ, calendulæ, rosmarini, maioranæ, absynthii, uiolarum, rosarum, citrei mali, limonum, acetosæ, portulacæ, cichorii, cerefolii, hyperici, enulæ, raphani, aristolochiæ, gentianæ, laureolæ, agrimonix, marrubii, hyssopi, scabiosæ, tormentillæ, capparorum, citrullorum, scordii, uerbenacæ, iuniperi, & similia. Nam & herbe per se aut earum maceratio in uino, aceto, aut liquore conuenienti, qui pelli prodest.

Alii caput egressuro domo præmanditur, uini odori modicum unc. ii. superbibitur, atque inde os colluitur, eodemque excepto manibus facies abluitur.

Valgus enulæ radice in aceto prius macerata, deinde linteolo conuoluta, sæpeque inspirata naribus recte utitur.

Urina propria alii utuntur.

Stercoris columbini dra. i. trita ex aqua buglossæ.

Syrupus



Syrupus de acetosa, acetositate citri, limonibus.

R. coperosæ albæ bene lotæ in succo limonum & siccatæ in eodem succo scrup. i. pul. tormentillæ, rad. dictami albi, gentianæ, enulæ, herbæ turcicæ, scordii ana scrup. s. fiat pul. detur cum aqua scordii.

In oleo scorpionum magna uis est. Nam si quis arterias temporum, manuum, pedum inungat, correptus præterea occiput, gulam, pectus & uicina buboni illinat, magnum auxilium sentit.

Fit oleum scorpionum ex unc. viii. olei & 50. scorpionibus. Fiat ebullitio. Sed hoc melius, Aristolochiæ, gentianæ, cyperi, corticum radicum capparum an. unc. i. amigdalorum amararum lib. i. conquassata reliqua in oleo coquantur, & aqua, si uis, conuenienti, uel uulgari. In colatura x. uiui scorpiones immergantur: contineatur uas in furno pistrinali, unde subtractus panis, bene clausum. Deinde loco salubri subiecto affere reponatur.

Taxo barbato magna uis inest. Nam in animalium natura docuit contra uenena posse.

Mustella enim decertans cum serpente, si uirus sensit, statim eam herbam quæritat & mandit, atque ita instaurat pugnam, & experimento uulgi certum est succum ex ea herba expressum in uino tenui & odoro, non solum præseruare, sed liberare correptos.

Aqua è papauere, rheade distillata maximè probatur rusticis.

R. electuarii lætificantis dr. ii. margaritarum splendida rum scrup. iiii. ossis de corde cerui, coralli rub. an. scrup. s. unicornis Gr. vi pul. pillularum communium dr. i. Omnia dissoluantur in syr. de limonibus & acetositate citri an. dr. vi. aquarum scabiosæ, & absinthii an. unc. ii. fiat potus. Puluis per se cum bolo armeno misceri potest, & iu cocleari sumi cum nino tenui & odoro.

Coriandrum præparatum ieiunis, & à cibo.

Lac, à quo extractum & butyrum.

Mânæ granatæ, mell. al. an. unc. iii. terebinthinæ unc. i. s. pulparum granati acidi libr. s. cort. citri conditorum unc. 3. aquæ scabiosæ, mellissæ, borrag. acetosæ an. unc. 2.

uini



# DE PESTE

uini optimi libr.s. Per noctem distemperentur in liquoribus, postea distillantur in alambico.

R. supradicti distillati unc. iiii. passetur per manicam hyppo. cum cinamomi dr.s. sacchari borraginati unc. s.

Aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, gentianæ, myrrhæ an. 3. s. Omnia trita excipiatur melle. Dosis dr. i. s. cum uino aut decocto berberis, passularum & similium.

Superstitiosum est & è regibus Persarum sumptum. In hæmatite lapide insculpatur homo genibus flexis, cinctus serpente, ut dextra manu caput: sinistra, caudam teneat: tum in aure in annuli capsula subiiciatur serpentariæ herbæ folium: deinde lapis eadem capsula fideliter indatur.

Oleum citriorum, seu ex eorum granis laudatur: grana trita ex decocto berberorū & syrupo de limonibus.

R. boli armeni dr. i. uini unc. ii. aquæ acetosæ unc. i. ante somnum & ieiuno.

R. theriacæ ueteris dr. i. include in cæpa & coque cæpam in furno pistrinali: ubi cocta fuerit, calidam iniicias in uini granatorum aut berberis unc. iiii. expressionem bibes. Eadem cæpa cum theriaca, succo tormentillæ iniicitur, & addita parte 4. syr. de limonibus propinatur herba turtica.

Ouum utrinq; perforatur, tota substantia uacuatur. In uacuam testam 3. vii. croci immittuntur. Traiecto per foramina baculo tenui ouum testæ igni assatur dum uegementer caleat testæ: hæc cum croco ad summam tenuitatem teritur, tritis æquale pondus aut unc. i. theriacæ adiicitur & 3. ii. granorum sinapi. Tota massa diuiditur in duas partes æquales, utranque partem in 7. 10. uel. 11. pillulas formandam, si euomuerit, rursum dato alteras: si non euomuerit, saluus est. Sed post dabis.

R. saluæ, hyssopi, lauandulæ, foliorum quercus, ana M. i. bulliant in pinta uini ad consumptionem trium partium, uinum propinatur.

R. mastiches dr. i. euphorbii drac. s. spicæ 3. i. fiat puluis, detur ex aqua gentianæ, scabiosæ, &c.

Aquarum endiuæ, nenufaris, acetosæ ana unc. i. s. aceti



aceti dr. ii. theriace ℥. i. aqua scordii.

R. corticum citri unc. s. ficus duas, scord. berberis ana  
P. i. fiat. decoctio in aqua calendule ad unc. iii. expressio  
ni adde theriacæ dr. i. boli armeni dr. s.

R. succi aceto sc̄ depurati ℥. ii. uini granatorū & berbe  
ris an. ℥. i. theriacæ ℥. ii. uel triferæ sarracenicæ unc. s.

Ac perpetuo meminisse oportet, distinguenda inter  
curandum calida à frigidis, ut rectè utaris. Frigida sunt  
rosæ, uiol. camphora, acetositas citri, uinum granato-  
rum, berberorum, lac acetosum, acetum, nenupharis flo-  
res, aqua rosarum acetosæ, &c. Succus limonum, citran-  
gulorum, omphacium.

Calida, moscus, lignum aloes, caryophylli, &c.

Ex quibus iulep parari debet.

*Pulueres.*

Trochisci camphorati, dragacanti albi, spodiis e-  
lecti, gummi arabici albissimi, seminis psilii ana drac. s.  
Sacchari candi, liquiritiæ mundæ, seminibus cucurbitæ,  
citrulli, portulacæ an. dr. i. penidiarum unc. s. camphoræ  
℥. i. succi citranguli, panis sacchari ana quāt. sufficit, fiāt  
troc. Dosis magnitudo lupini cum iulepo Alexandrino.

R. sacchari rosati, triasantali, diatragacanthi frigidi  
an. unc. i. pannorum auri puri numero 5. margaritarum,  
iacynthorum, ossis de corde cerui ana Gr. 16. fiat pul.

Boli armeni dr. i. ex uino tenui, oxycrato, aqua cōue-  
niente. Alii prius abluunt: alii tritum conspergunt aqua  
conuenienti, siccant, & tertio ita terunt ac siccant.

R. terræ sigillate dr. ii. teratur, suprafundatur uinum  
tenue odoriferum. Siccetur: secundo ac tertio ita fiat.  
Deinde adde baccarum lauri tritarum dr. i. rad. ireos &  
tormentillæ ana ℥. ii. cinamomi dr. s. croci Gr. vi. cum  
acetositate citri fiant trocisci ponderis dr. i. Dentur cum  
succo conuenienti.

R. boli armeni, ut suprā descriptum & præparatum  
℥. i. rad. tormentillæ, tunici, diptamni, santalorum rub.  
an. dr. i. rasuræ eboris, spodii, corticum citri. ana drac. s.  
margar. splendorum scrup. ii. fragmentorū rubini, gra-  
nati, smaragdi, saphiri, hyacinthi an. scrup. i. rasuræ cornu  
unicornis



## DE PESTE

unicornis dr. s. fiat pul. Detur unc. s. in uino subtili dilu-  
to aqua acetosæ. Alioqui addatur sacchari albissimi in  
aqua rosarum muscata, uel camphorata. Dissoluitur &  
siccatur. Dosis ad scrup. iiii.

R. supradicti pul. unc. i. sacchari lib. i. misce. Deinde.

R. succi acetosæ & pomorum odoriferorum ana unc.  
vi. bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis sem-  
per despumando: dissoluto saccharo finge trociscos pon-  
deris drag. ii.

Vel ad singulas libras sacchari pone dr. x. pulueris,  
& facias conditum.

R. setæ nouiter tinctæ lib. i. immergatur per diem in  
aqua rosar. acetosæ, & pomorum redolentium ana lib. i.  
Deinde bulliat, donec aqua rubeat, in qua dissol. sacch.  
lib. iiii. & cum fuerit debite coctum, adde pul. unc. iiii. Si  
bolos facere uolueris, uel si opiatam, unc. iiii.

Possunt quoque pul. syr. aut conseruis misceri. Syr.  
de granatis acetosis, dulcibus, limonibus, persicis, aceto-  
sitate citri, de prunis, de succo acetosæ, de ribes, berbe-  
ris, de succo cucurbitæ, de pomis odoriferis, rosat. uiola-  
tus. Iulep de buglos, borrag. mellissa, rosatus, uiol. de a-  
qua uiol. bor. scabiosæ, pimpinellæ, succo cydoniorum.

Conseruæ ex iisdem, & confectiones commodæ de-  
aurantur pro diuitibus.

R. Boli armeni ut prius unc. i. s. cinamomi unc. i. rad.  
dictami & tormentillæ ana unc. s. radice tunicæ, corian-  
drorum preparatorum ana dr. iiii. rhabarbari electi dr. ii.  
s. zinziberis, terræ sigillatæ, corticum citri, been albi, &  
rub. corall. rubri, sandalorum citrinorum, limaturæ ebo-  
ris, margaritarum ana dr. ii. carabe, macis ana dr. i. semi-  
num acetosæ, endiuia, portulacæ, spodii, ligni aloes, ol-  
sis de corde cerui ana scrup. ii. setæ combustæ dr. s. auri  
& argenti limatorum an. scrup. i. ambræ Gr. vi. spicæ nar-  
di Gr. 4. musci Gr. i. uel instar loci, musci, camphoræ Gr.  
vi. & addatur unicornis scrup. i. melius fuerit. Fiat pul-  
uis. Diuinus appellatur à Saracenis.

R. tormentillæ, diptami, tunicæ an. unc. s. sem. citruli,  
boli armeni an. dr. ii. ossis de corde cerui, coralli albi &  
rub.



# LIBER TERTIUS.

51

rub. trium santalorum an. drag. s. rhabarbari dr. i. s. spicæ nardi. Gr. camphoræ dr. i.

R. cinamomi unc. s. zedoariæ dr. ii. boli armeni præparati dr. vj. sem. acetosæ, & citri, corticis citri an. dr. iiii. rad. tunici, diptami, tormentillæ, limaturæ eboris an. dr. i. s. ossis de corde cerui dr. i. fragmentorum smaragdi, rubini, granati & saphiri an. scrup. i. fiat pulvis qui incorporetur cum conferua acetosæ & buglossi an. unc. 3. sacchari lib. i. s. uel lib. 3.

## *Paruulis uerminosis.*

R. centonici in aceto fortissimo per diem infusi, boli armeni in aqua absinthii infusi an. unc. i. rad. diptami, rasuræ cornu cerui adusti, seminis caulium an. dr. ii. sem. citri, corticum citri, radicis tormentillæ, tunici, terræ sigillatæ, margaritarum splendidarum, coriandri præparati ana dr. ii. s. fragmentorum saphiri, smaragdi, hyacinthi, granati an. dr. i. corall. rub. dr. s. setæ combustæ, sem. plantaginis an. scrup. 2. ossis de corde cerui, rasuræ eboris an. dr. s. unicornis scrup. i. ambræ dr. i. fiat pul. detur stomacho uacuo cum aqua portulacæ, uel uini limphati cum aqua acetosæ uel portulacæ. Lactantibus, cū modico lactis.

R. sem. iuniperi dr. 2. s. garyophyllorum, macis, nucis moscatæ, zinziberis, zedoariæ an. dr. 2. utriusque aristolochiæ, radic. gentianæ, tormentillæ, diptami, tunici, herbæ, rad. enulæ an. dr. 2. saluiæ, ruthæ, balsamithæ, pullegii an. dr. i. baccarum lauri, doronici romani, sem. acetosæ, sem. citri, cinamomi, macis, olibani, boli armeni, terræ sigillatæ, spodii, ossis de corde cerui, rasuræ eboris, margaritarum, fragmentorum saphiri, smaragdi, coralli rub. ligni aloes, santali rub. & muscatellini an. unc. s. conferuæ rosarum buglossi, nenupharis, theriacæ an. unc. i. panis sacchari lib. 3. fiat electuarium cum aqua rosarum & scabiosæ.

R. rad. tormentillæ recentis lib. i. rad. enulæ unc. 4. radicis herb. betonicæ & diptami an. lib. s. acetosæ cum seminibus lib. 2. uel acetosæ unc. xx. seminis eiusdē unc. 4. buglossæ & borraginis cū floribus ros. rub. siluestrium

3 an.



## DE PESTE

an. libr. i. pimpinellæ & scabiosæ an. libr. s. succi limonũ  
 lib. i. theriacæ libr. s. aquæ uitæ ex optimo uino factę &  
 sæpius distillatæ unc. ii. santali albi & rub. spodii, ben al  
 bi, & rubri, margaritarum splédidarum an. unc. i. s. offis  
 de corde cerui unc. i. rasuræ eboris unc. s. croci dr. ii. cā  
 phoræ unc. ii. foliorũ auri unc. s. folia auri in porphiro  
 uel marmore plurimũ agitabis cū modico mellis, ut om  
 nino coniuncta sint, & repone in ampulla uitrea bene  
 clausa cū aqua uitæ. Sic dimitte p̄ dies 15. Item margari  
 tas tritas repone in alia ampulla cū supradictis, libra suc  
 ci limonũ, bene obturetur per 15. dies. Radices optimo  
 uino laeuentur, terantur, deinde siccentur cum herbis &  
 floribus loco bene mundo in umbra. Reliqua omnia re  
 ponantur in uase uitreato, & superfundatur aqua uitæ,  
 succens limonum & c. bene obturādo, ne quid exalet. Vas  
 fouea tripedimea sepelies, locus sit humidus, calce uiua  
 instratus, cui infideat uas. Deinde circumdetur & coope  
 riatus uinaceis, uel fimo equino, aut uaccino omnino te  
 gatur. Tum infundatur aqua, ut par sit humiditas loci.  
 Illic permittite xij. dies. Sed sæpe, ut 4. quoque die uina  
 cea & fimum commuta. Tota materia transponatur in  
 alambicum uitreum bene sigillatum, ne quid expiret.  
 Fiat distillatio lento igne, & sine fumo. Aqua rursus inii  
 ciatur in relictum magna & iterum distilletur, ac tertio  
 sine secibus distilletur in balneo mariæ. Reponatur fide  
 liter uase uitreo. Dosis coctare unum.

*Gestata profunt.*

Carbunculis, bellayus, rubinus, granatus. Hic et si  
 non in pretio sit aliis generibus præferendus, saphirus,  
 iacynthus, agathus, & c.

R. aceti albi unc. vi. aquæ ros. & uiolarum an. unc. i. s.  
 camphoræ scrup. i. musci Gr. i. s. abradatur camphora &  
 muscus conterantur, cum spongia sæpe odorentur.

Lib. ros. rub. lib. 3. uiol. lib. i. aceti fortissimi lib. 2. cā  
 phoræ drac. 3. misce scrup. 2. cōquassentur omnia simul,  
 & ponantur in alambico uitreo. Distillentur, quod de  
 stillauerit iterũ ingeratur in magna, & rursus distille  
 tur. Loco rosarũ & uiolarum, si recentes haberi non pos  
 sunt,



sunt, imperabis rosa. & violarum an. lib. i. aquarum eandem an. lib. s. Potest cortex citri adici, & muscus & camphora minore dosi tamen immitti, cum eadē calet. Distillata bene reponatur aqua, & idē facies abluatur, & spongia imbuta sæpe inspiretur. Poteris quoq; addere ambra, ligni aloes an. dr. 2. aut solas aquas condire eiusmodi aromatibus, deinde commisce aceto albo.

Sed quia fortasse maculas faciei mulierum inferrent.

R. lithargiri argenti libr. s. optimè tritum decoquatur in lib. ii. aceti albi optimi vsque ad consumptionem medietatis, semper cum spata commiscendo. Deinde per filtrum distilletur, & in vase bene mundo reponatur.

Deinde.

R. camphoræ dra. 3. aluminis rochæ, bortacis an. dr. vi. misce Gr. 4. terantur omnia, quibus adde olei tartari unc. i. s. Et omnia pone in libr. ij. aquæ rosarum. Bulliant ad consumptionem tertiæ, semper commiscendo, & postea per filtrum distilletur, & in ampulla bene clausa vsui reseruetur.

Pomū styracis, calamitæ, corticis citri an. dr. 2. been albi & rub. mentæ siccæ, cariophyl. ligni aloes, cardamomi, valerianæ, calami aromatici, myrtillorum an. dr. j. santalorum citrinorum, mastiches, camphoræ an. dr. j. s. macis, nucis moscata, cinamomi, ambra an. dr. s. musci G. i. ladani puriss. unc. 3. s. cū aqua mellissæ. f. pomū.

Aestate uerò florum nenupharis, uiolearum buglossæ, ros. rub. santalorum rub. & citrinorum, spodii an. unc. i. s. camphoræ dr. iii. corticis citri dr. ii. macis, nucis moscata, maioranæ, calendulæ, marrubii, styracis calamitæ, cardamomi, masticis, zedoariæ, ligni aloes, cubearum an. dr. s. ambre scrup. i. musci scrup. s. ladani unc. iii. conquassentur cum aqua rosar. Postremò addatur ambra & muscus, fiat pomum perforatum.

R. salis communis usti, marmoris albi, punicis, corallorum alborum an. dr. i. corticis citri ana dr. i. s. masticis dr. i. musci Gr. iiii. fiat pul. subtilissimus.

Cura.

Rasura pumicis albi ex miscellauini, & atramenti  
iumenta



umenta persanat.

Videndum imprimis, ne uenenum cor appetat. Celer enim morbus est.

Videndum, ne uitalis facultas deficiat. Initio ergo utrumque præstandum est, tum his quæ antidota sunt, tum motu, frictione & similibus, quæ foras euocant. Sed quia aliquantum uigilia, motu & frictione spirituum inanitio fit, habenda perpetuo uitæ ratio. Nam ut naturalis & animalis facultas integræ sunt, uitalis concidit. Initio igitur detur aliquot supradictarum antidotorum, uel.

R. rad. tormētillæ, betonicæ, dictamni, gētianæ, morsus diaboli, cum rad. & herba croci an. dr. i fiat pul. Dos unc. ii. cum uino, aqua rosarum lymphato. Et ut sunt uires, Distillatum cum uino granatorum, berberorum, aqua tormentillæ, &c. Expressiones, collatitia, alterata, ut dictum est. Tum de uacuatione cogitandum.

Phlebotomia, si omnia permittunt. Alioqui purgatio, ut in humoribus.

Ellebori dr. i. pomo concluditur. Pomum conuoluitur stappa, aqua rosarum prius madefacta & expressa & ita in cineribus coquitur. Abiicitur elleborus. Pomum conspersum puluere aliquo salutare datur fortioribus quidem. Nam debilioribus secundo pomo iterum coquitur. Secundum pomum datum. Iulep è uino granatorum, berberorum, aqua hordei cum saccharo, ex aquis intibi. Aqua saccharata cum iulepo uiolar. aromatic. pul. supradictis.

Cibus è media materia, qui facile coquatur.

Aer obiectus aut salutaris sæpe commutatus, ut cubile molle, &c. somno abstineat, nisi uires dissolutæ uideantur.

*Auicennas dabat hoc.*

R. aquæ rosarū unc. ii. uini albi, aut clari, tenuis, odoriferi unc. i. boli armeni triti subtilissimè drac. i. Si euomat, malū est. Sed abluatur os uino. Deinde repetatur antidotus. Debet enim, ut etiam non reuomat, sæpius iterari. Quanquam qui retinent, ferè euadunt.

Clyst.



Clysteribus, balanis lenibus, cathartice quotidie al-  
uus lenienda.

Epithemata cordi ex aqua rosarum, uiolarum, bu-  
glossi. &c. cum aceto, uino granatorum, camphora, tanta  
lis, &c. & modico uini.

*Bubo.*

Constat experimento phlebotomiam nocere iam  
cuenta bubone, & utendum attrahentibus, cucurbitulis,  
cauteriis, potu, bezoardico, frequenti quidem si reuo-  
mant. Iteretur tertio.

Phlebotomia à uena cephalica, si sub auribus, uel  
extrema manus, si sub mento: aliàs eadem. Deinde à  
uenis linguæ. Si sub alis, à media: si inguinibus, à sa-  
phena sciatica extremorum pedum κατ' ἑξιν. Ita & cu-  
cubitulæ.

*Bezoardica.*

Laudatur plurimum theriacæ dr. i. cepa cauata conco-  
quitur & apponitur loco.

Alii ita coctam cepam aceto immergunt. Alii uini  
granatorum, & syr. de acetositate citri an. unc. i. s. Atque  
ita succum exprimunt. Cumque dr. ii. aquæ tormentil-  
læ, uel succo propinant. Materiam emplastri modo bu-  
boni apponunt.

R. Valerianæ libr. s. rad. ebuli unc. iii. leuistici cū rad.  
unc. i. Bulliant in aqua & oleo chamæmill. an. quantum  
sufficit. Deinde pistentur cum dicto oleo, & superponan-  
tur, uel addatur radix diptami.

Diachylon unc. ii. ammoniaci, galbani an. unc. s. Cum  
oleo Scorpionum incorporentur.

Utendum quoq; sanguisugis, cucurbitulis cum scarifi-  
catione &c. Alii omnino circuncidunt & extrahunt.

Cauteria, si uires ualent. Tenaculis etiā candētibus.

Calcis uiuæ libr. ii. cineris purgati & cribrati, alumi-  
nis rochæ ana libr. s. De quibus fiat lixiuium. Sed ita ut  
materia induretur, quantitate paræ auellanæ unguen-  
to alicui misceatur.

Catulli, gallus &c. Pulmones animalium.

Scabiosa teritur. Tribus horis retenta carbonem rita-  
rat.



## DE PESTE

rat. *Lysimachia* similiter.

Cum oleo de *Scorpionibus* anagallis malaxetur : ad datur aliquid myrrhæ aut ueteris theriacæ. Alioqui maturandum apostema. Maturatum sagipta aperiendū, uel theriaca uetere, qua parte acuitur, & mollius est apostema. Si quidem hinc uia sit puri, fiat apertio ad modum folii mirthi uel oliuæ. Caueantur uenæ, arteriæ, nerui. Secta parte si dolor oriatur, lana in oui albamine intincta ponatur. Sic per diem maneat. Si dolor contingat, deterge prius & intinge in oui liquore, & modico olei rosati.

Escharra tollatur, modico butiro, oui uitello, farina triticea mixtis in uncia olei rosati, & uitellus oui simul agitetur.

### *Carbunculus.*

*Carbunculus* à melancholico sanguine est, uelut clauus quidam paruus, qui malignior factus pustulas quasi ab igne urendas, Escharram, ardorem, dolorem intolerabilem facit, rubens, uiridis, niger. Parui, oblongi deteriores, uicinia liuet, ardet in partibus carnosiss & uicinis nobilium.

Bezoardica. Emittantur feces uentris, mittatur sanguis etiam ad lypothimiam. Phlebotomia ut prius, habita ratione uirium &c. Scarifica punctim, emplastrum è pane medio malaxatur cum succo plantaginis, quæ discutiunt modicè & refrigerant. Vel ex plantagine, lentibus pane cibario coctis in aqua. Granata acida aceto cocta ad putrilaginem & lintheolo expensa initio ac statu.

Liliorum radix recens emplastri modo: Deinde superpone folia caulium, betæ &c.

Bonus armentorum fimus, ficcus ex aqua subactus.

Quidam practici maturant Gal. prohibet uti pus mouentibus, quia non maturant, sed putrefaciunt.

Scabiosa, cauda equina, Saphirus circumacta carbunculo, deinde retenta è directo. Albertus Magnus multos carbones uidit una saphira curatos. Tapsus barbatus, Theriaca, Mithridatium. Sed remedia celeriter exarescunt.



rescunt. Subinde itaque commutanda.

Sanguisugæ, gallinæ.

Defensua circa locum, ol. ros. unc. iii. aceti ros. unc.

i. boli armeni quantum sufficit ad inspissandum.

Vnguentum populeum, olei rosati, & myrtillorum  
ana unc. ii. uini granatorum unc. i. s. boli armeni, terræ  
sigillatæ ana quod sufficit.

Possunt emplastra malaxari cum succo plantaginis.

Cotula fœtida trita circumponitur.

Supra uerò sterqus humanum calidum, uitellus oui  
recens agitetur cum sale bene trito.

Nasturtium uel urtica cum sale terantur & malaxen-  
tur cum ol. de lilio. Alium tritum per se, uel cum pipe-  
re, & auel lanarum nucleo detracta pelle.

Terebinthina cum nitro, carne passularum cum sale  
uel stercore passeris, columbarum.

Mel & ol. cum sale trito cocta.

Cor turturis recenter detractum & deuoratum sin-  
gulare remedium. Fodus ante scarificationem & alia.

Chamæmillæ unc. iii. spicæ celticæ unc. ii. maioran-  
unc. ii. bulliant in aqua cum spongia, fiat fodus. Deinde  
uentosæ affigantur cum multo igne. Fiat idem fodus,  
tum scarifica punctim & cucurbitula apponatur, ubi  
res urget.



IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI  
MEDICI PARISIENSIS.

*In libros Galeni de Compositione Medicamentorum κατὰ τὸ πρῶτον.*



Rea genus est Alopecia, & Ophiasis. Vtriusque causa vitiosum alimentum capillorum. Ophiasis familiaris pueris, ab occipitio incipit duorum digitorum latitudinē non excedens, serpit ad aures & frontem, donec utrisque fines quasi caput, & cauda committantur, ut serpentem representet: unde nomen. Sponte sua aut leuioribus remediis curatur. Alopecia magis accidit adultis, difficilius curatur. In utraque, quod omni modo marcescit & emoritur extrema pellicula capitis, unde conspersa, glabrata, pili primum extenuantur, deinde excidunt. Locus expers cruoris apparet, qui si configitur, sanguinem liquidum & malè olentem reddit. Alopecia sub qualibet figura serpit. In capillo & barba uterque affectus differentias habet, quia uel incipiunt, uel facti sunt, uel iam inueterati. Inueteratorum signa, cutis densa, subpinguis, in totum glabra, & quæ foris, frictione, exasperatione non rubescit, aut ægerrimè curatur.

*Curatio.*

In ratione uitæ, purgatione totius corporis, deinde capitis cura quadam per frictiones, & similia circa caput, topicis remediis. Rationē uitæ præscripsit Aesclepiades abstinentiam uini, leguminum, lacticinorum, casei, carniū & eorum, quæ uel plurimum nutriunt, uel flatu



# MEDICAMENTORVM.

55

flatus & uapores gignunt. Exercitium sit moderatum, rarum balneum, rarus sudor, alimenta, quę parum nutriunt, tenuem succum & bonum gignunt, atque omnino repugnant uitio. Purgatio corporis, ut est uitium humorum in pituita, Pillulę coccia, assaieret, turbith, agaricus, puluis hierę diacolocynthidos, diaphenicum, diacarthami, qualis erit hæc dosi. Pillularum cocciarũ dr.s. pulueris hierę diacolocynthidos, agarici ana. ʒ.j. cum expressione scr.j. turbith gummosi infusi in oxymelite, fiant pillulę. Poterit loco agarici aliquid misceri diacarthami. Diaphenicum autem dabitur ad unc.s. Vigentibus etate poterit tamen acui addita dr.j. diacarthami, aut expressione dr.j. pulueris hierę diacolocynthidos, aut dr.ij. agarici. Infusiones fiant in oxymelite. Vbi uerò bilis uitium gignit, utemur pillulis aureis, elect. de succo rosarum, diapruni laxatiuo, rhabbarbaro, myrabolanis citrinis. Augebitur uis eorum medicamentorum duobus, trib. uel quatuor granis diagredi. In Melancholico succo pillulę de fumo terrę, de lapide lazulli, diassennę, confectio hamoch, electuarium indum. Horũ uis augetur adiecta infusione scr.s. ellebori nigri, aut scr.j. Iam uerò uitium humorũ ex colore cutis, tẽperamento totius tum corporis, tum capitis & anteausta uita depræhẽdes. Caput seorsum purgabitur errhinis, & apophlegmatismis. Cura circa caput eiusmodi est. Primum caput rade, idque sæpius, quotidie, ut malum est contumax: rarius uerò, ut est leuius: deinde perfricabis linteo aspero, folijs ficus, osse sæpię urticę folijs, pumice. Perfricabis autem mollius aut durius, ut est malum cõtumax, atque contumaci ita perfricabis ut inde cruor mouetur. Vtemur quoque sinapismis, punctionibus ex articulis, scarificationibus & cucurbitulis, quę omnia pro magnitudine mali temperanda sunt.

Herbis manẽ & uesperis, uel eò sæpius in graui affectu. Ante cibum facienda sunt. Sequitur ut topica adhibeas, in quorum usu hoc uidetur, ut non solum illinatur, sed diutius affricando imbibantur, ut altius in profundum subeant, quod in omni affectu faciendum est, ubi cunq;

*exercitium moderatum*

*purgatio si pituita ita purgetur*

*purgatio in bile citrina*

*cognitio humorum in capite purgatio capitis*

*hęc*

*Topica*



# DE COMPOSIT.

ubique unguentis utimur. Medicamenta è pingui-  
 bus, & medicamentis aridis in puluerem tritis, natura  
 acri, tenuium partium, quæ humorem uitiosum discu-  
 tiant, & alimentum regenerandis capillis attrahant,  
 atque ita calefaciant, ut neque urant, neque præter  
 modum resiccent cutem. Pingua sunt oleum carynum,  
 anethinum, sinapinum, terebinthinum, & alia, quæ scri-  
 pta inuenies cap. 2. de attrahentibus libro primo de ma-  
 teria Chirurgica, Adeps uiperæ, ranarum, axungia ue-  
 tus, sed præcipuè derafa axibus rotarum, & alia quæ  
 eodem capite scripta inuenies. Viscum quercinum, gū-  
 mi elenii, terebinthina ueneta, uel uulgaris, fex ampul-  
 læ lucernarie, pix liquida aut sicca, sed oleo liquefa-  
 cta, ceratum picatum, resinatum, galbanum, mel enula-  
 tum, diachilium, ireatum, ceratum de uigo & similia  
 oleo soluta. In pinguibus puluisculi excipiuntur è ma-  
 teria prædicta ea facultate quæ dicta est. Medicamenta  
 hæc sunt, euphorbium, tapfia, arsenicum rubrum, pul-  
 uis angelicus, aut mercurialis, tithymalorum cinis, na-  
 sturtii semen, sinapi, erucæ, sulphur, borax, nitrum, arun-  
 dinis cortex & radix, ueratrum, radix ari & aristolo-  
 chiæ, cinis muscarum, murium, ranarum, scarabeorum,  
 ostreorum, falsorum, piscium, amygdalarum amararum,  
 atque hæc uruntur, quòd ustura adstrictionem relin-  
 quant, & tenuitatem partium acquirant. Eodem modo  
 erinaceorum cinis, stercora uolatilium, murium, fex  
 cremata, thus aceto tritum, cortex auellandarum, ficus  
 cremata, cantharides ustæ, usti scarabei. Sit autem pro-  
 portio horum medicamentorum tritorum ad pingua  
 subquadrupla, subsextupla, suboctupla, subdecupla,  
 subduodecupla, quale sit, Euphorbii dra. i. olei lauri-  
 ni unc. i. s. Hic subduodecupla ratio est. Quod si tan-  
 tum unc. i. olei miscueris, sub octupla: si solam semiu-  
 ciam, subquadrupla. Bis in die hæc medicamenta illi-  
 nuntur, uel eo sæpius ea ratione, quæ prædicta est, cum  
 rasura, frictione & cæteris. Medicamentum fortius do-  
 lorem & ardorem excitabit: imbecillum nihil immuta-  
 bit: cutem moderatum moderanter calefaciet, & ueluti  
 pruriginem



pruriginem quandam commouebit. In malignis affectibus & contumacibus, fortioribus utendum erit ac saepius repetitis. Leuioribus, leuiora: mediocribus, mediocria miscenda sunt. Hoc erit forte. Gummi elenii unc. s. axungiae ueteris lotae ex aqua uitae in sole unc. ii. olei de terebinthina & laurini ana dra. vi. Liquefiant simul omnia, & probè misceantur in calidis cineribus. Deinde insperge euphorbii subtilissimè triti, thapsiae ana dra. i. sulphuris uiui, seminis sinapi an. dr. s. cineris tithymali, & cantharidum ana scrup. i. Hic ferè est suboctupla proportio. Fortius erit, si imminueris modum pinguium, uel auxeris modum puluerum. Clementius contra, si pulueres minueris, uel auxeris pinguia. Eadem ratione ex descripta materia infinita pharmaca miscebis.

*medicamentum forte.*

*De profluuio Capillorum.*

**A** Morbo saepius, rarius sine morbo capilli defluunt, partim inopia alimenti partim raritate cutis. Hic ergo usu alimentorum salubrium & succi optimi renerandis pilis materiam comparabis: cutem adstringes medicamentis, quae modicè calefaciant, & leuiter adstringunt, atque ita corroborent cutem & poros constringant. Calidiora alimentum capillorum in halitum discutiunt. Quae nimium adstringunt, eandem materiam repellunt, & saepe etiam nimium adstringendo uias intercipiunt suturarum, per quas uapor inutilis quotidie exhalat. Atque ita retentis excrementis dolores capitis, fluxio in nares, fauces, & reliquum corpus commouentur. In usu medicamentorum sub Hyemen quidem & Hyeme detondendus pilus est: sub Aestate & Aestate ipsa omnino radi debent. Veteres ante balneum, & à balneo medicamenta illinebant. Nunc exoleta consuetudine balneorum utemur fotu ex decocto absynthii, stechados, sarmetorum uitis, & uocatarum capillarium, adiectis interdum myrthi foliis. Conquenda in æquis partibus aquae & uini rubri. Medicamenta iusta consistentia esse oportet, neque tam crassa ut inhereant, neque tam liquida ut defluant. Iusta est mellis



DE COMPOSIT.

mellis, crassitudo. Hyeme paulò calidiora & liquidiora tantum detruso pilo. Contrà Aestate. Olea conueniunt rosaceum, myrthinum concoctum omphacio, extremitibus rubi & rerum huiusmodi, quæ adstringunt, atque his calidiora oleum de absynthio, de spica nardi, costinum. Medicamenta oleis miscentur, ut ladanum, herba uocata capillares, grana myrthi, semen brassicæ, mastiche, & alia id genus. Singulare hoc. Polytrici, capillorū veneris an. M. s. foliorum myrthi, rosarū, absynthij an. P. ij. decoquantur in olei dulcis & uini rubri austeri an. quartarijs tribus, donec uinum consumptum sit. Omnia colentur, exprimantur, expressum oleum reponatur. Iam R. huius olei unc. iij. ladanij unc. j. s. mastiche unc. s. ladanum & mastiche subigantur in mortario pistillo calido, paulatim oleum infundendo, deinde consperge & probè misce pulueris capillorum veneris scrup. iiii. Al.

R. ladani unc. ij. subigatur in mortario, calido pistillo paulatim infundendo uinum austerum, donec mollescat; deinde misce duplum olei conuenientis. Aliud.

R. ladani, absynthij ana unc. s. baccas iuniperi rufas & ligentur linteo: deinde per dies quinque macerentur in oleo conuenienti: exprimatur linteum in oleum. Hoc illitum & profluuium pillorum prohibet, & furfures. Item brassicæ cinis oleo myrthino miscetur ad mellis cōsistentiam: similiter abrotonum in puluerem tritum, & hoc quoque Græcis & Arabibus probatum.

Corticum cannæ & auellanae uistarum, granorum myrthi an. unc. s. absynthij, gallarum an. dr. ii. Terantur omnia in puluerem: misceantur oleo myrtillorum, donec fiat mellis crassitudo & consistentia.

De tinctura capillorum.

**C**anities fit consensu Philosophorum & Medicorum non à siccitate, sed humiditate cruda, quam natiuus calor non concoquit, externus corrumpit atque putrefacit. Naturis humidioribus celerius ex anteriore parte capitis, quæ humidior est. Qui uiuunt capite plurimum operto. rarò detecto & persato, aliquando ætate, nonnūquam morbo, sed præcipuè uirilagine. Quibusdam de repente



repēte pilus exalbuit uapōre hydrargiri, aut cura graui.  
Habenda itaque cura, ut mali causa cognoscatur. Pur-  
gandum corpus, siquidem egere uideatur, & ut nigre-  
scat pilus, medicamentis duorum generum uti licet, cali-  
dis: quale est apud ueteres cedriū oleū ex cedria, pix li-  
quida oleo mixta. Aliud genus medicamentorū terreū  
est, adstringit & habet aliqd tenuiū partiū permixtū, ut  
in profundū penetret. Sed ab horū usu cōstrictionis spi-  
raculis capitis, per quæ uapores exhalāt, frigidi morbi  
capitis, corruptelæ dentium, fluxio in pulmones & reli-  
quū corpus, tabes, mors aliquādo insequūtur. In usu me-  
lius est primū extergere caput. Veteres utebantur terra  
cimolia. Nos sapone commodē utemur, ac sapo commo-  
dē poterit confici ex consuetis seuis, ouillo, caprino, hir-  
cino, pice liquida addita lixiuiū parato ex iis quæ, par-  
tim detergent, partim nigrefaciunt, ut ē cineribus corti-  
cum salicis. Diuitibus poterit cōdiri sapo moscho & am-  
bra, quā ambram griseam uocāt, atque intermisceri atra-  
mentum sutorium, nigretam uacant, aut puluis lapidis  
nigri, quo iam passim calceos denigrant, & illustrāt. De-  
nigrat enim & adstringit. Aliquid quoque atramenti  
impressorii, uernicis, ut magis hæreat sapo. Item pesti-  
ne utendum staneo, plumbo, corneo intrinseco medicamē-  
tis, quæ nigrefaciant. Capparis cortex aqua incoquitur,  
ut Dioscorides, lacte asinino: bubulo, ut Archigenes, uel  
(ut alii) coquitur ad tertias dum putrescat, atq; ita illi  
nitur. Similiter cortex radice ilicis, quā rustici (houx)  
appellant, coquitur dum putrescat. Decocto tergetur ca-  
put, cortice uerò illinitur: item myrthi nigræ folia, se-  
mina betæ, folia ficus nigræ, mori, nigræ, nucamenta  
seu catuli nucium, cortex fructus nucis nondum matu-  
ræ, cortex salicis, faba fabacea, galla, sumach. cinara, su-  
ber aridum, plumbum ustum, excrementum ferri. Alia  
coquuntur in aqua pluuiæ, quædam in aceto. Succus ex  
aliis exprimatur: alia teruntur in puluerem: quædā cre-  
mantur, ut inde fiat lixiuium. Sūt ex ueteribus Medicis,  
qui præcipiant prius caput radendum. Sic enim melius  
subeant intro medicamēta. Ex tritis in puluerē & succo  
aliorum



# DE COMPOSITIS.

aliorum fit mellis crassitudo. At flauos capillos reddūt lupini triti addito nitro ex aqua illiti, uel eadem aqua macerati, uel lixiuio. Experimēta sunt mulierū. Lixiuū parant & inde caput detergēt, lauantque, & ita exponūt soli. Aliæ madidos capillos statim conuoluunt suis lintheis, ut spōte sua siccescant. Lixiuio addūt stramen triticeum, glycirrhifam, ramenta buxi. Veteres ramenta loti arboris decoquebāt. Fex uini ueteris usta cū oleo mycellino. Illinitur radix eringii & uerbasci, flores lixiuio macerantur, & aliquid herbe luteæ, quam geldam uocant, adiicitur. Singulare est hoc ad flauitiem capillorū.

R. olei tartarei & persicarum an. dr. ii. commisceantur & uerberentur fortiter in sole, quater in die. Continuetur, donec sint bene flauī. Item accipe radicē ireos, siccetur in sole, admisceatur lixiuio, inspergatur & fiat, ut suprā. Item limaces rubri sale concidantur, ex quorum aqua, abluatur caput & capilli.

## De furfuribus.

**P**Ytiriasim uocant. Morbus est extimæ cutis capitis cum leui scalptu, quasi furfures excutiantur. Ferē à pituita salsa, nonnunquam ab altero bilis genere. Remedia sunt conueniens dieta repugnans uitio materie. Purgatio corporis, ut in Alopecia, Apophlegmatismi & Erihina, que per os & nares pituitam ducant. Medica menta topica, que discutiant, uel tergeant. Vrinę quoque & sudores utiliter moueri possunt: Materia comparatur ex siccatis tritisque faba, hordeo, fœnugræco, orobol, lupino, cineribus betæ, brassicæ, abrotani, cucumeris agrestis, parietarię, puluere absinthii, enulæ, ireos, aristolochiæ, staphidosagriæ, bryoniæ, ari, sulphuris, lapidis calaminaris, & generis terræ, quæ iam uenalis circunfertur, ex siccandis scripturis recentibus, pumice, osse sepię, foliis ficus. Conuenit itē sapo, & diuitibus pomata. Ad hæc fex uini, calx, argēti spuma. Cōposita fiūt ex his. Nam arida incorporantur succo betæ, brassicæ, ireos, enulę, cucumeris agrestis, bryoniæ, oleo amygdalarum amararum, fraxini, rutæ, ut sit crassitudo mellis. Fex omnia fient melius rasis capillis, præmissaque frictione.



atione ex linteo asperiore. Possunt & pulueres per se as-  
fricari & iisdem cineribus. Lixiuum fit, quod conuenit.

R. argenti spumg, olei rutacei, aceti an. Misceantur ca-  
lidis cineribus. Aliud.

Pulueris ireos & abrotani an. unc. s. succi enulæ & be-  
te quod sufficit ad crassitudinem mellis.

*De morbo pediculari.*

**P**thiriasim appellant. Interioris cutis capitis mor-  
bus est ab humore calido illic collecto, unde putre-  
dine pediculi gignuntur. Post habitam rationem totius  
corporis, recte institutam uitam & alia, ut prius, medi-  
camentis siccantibus, detergentibus, attrahētibus ex al-  
to, ac si uis amarore præditis uti, conueniet staphidosa  
gras tritæ unc. s. aloes dr. ii. aceti scillitici, & olei amyg-  
dalarum amararum, ut sit mellis crassitudo. Aliud.

Pinguedinis crasē ē lardo falso unc. ii. aloes subtilissimē  
tritæ unc. s. cum aceto scillitico fiat unio. Aliud.

R. aloes, herbe pedicularis tritæ ana unc. s. olei fra-  
xini & succi genistæ quantum sufficiat, ut fiat mellis  
crassitudo. Aliud.

Pillularum communium drac. ii. pul. contra uermes  
tantundem: cum succo Athanasie fiat linimentum. Sa-  
po cum aloe compositus, aloe mollis addito oleo itino  
in muriam & lixiuū, uel sanguinem carniū aut pi-  
scium iniicitur, & inde affricantur partes. Lixiuū sue-  
rit fortius ē cineribus Athanasie & truncorum cynaræ,  
id est, articaulis. Licebit uti & iis, quæ faciunt contra  
uermes. Sunt qui arsenicum misceant. Vulgus hydrargy-  
ro utitur. Sed in pueris & mollioribus naturis, neque  
hydrargyro, neque aceto utimur sine periculo.

*De Achoribus.*

**A**choras, Saphati uocant Arabes: uulgus Thineam.  
In achoribus cutis ab acrisanie primū prurigine  
irritatur: deinde exulceratur, & saniem reddit, subest-  
que aliquando humor lentus, crassus & uiscidus, unde  
sanies, tineæ species. Remedia sunt uita recta. In pletho-  
ra, phlebotomia: in cachochymia purgatio totius cor-  
poris: deinde per Apophlegmatismos capitis. Sequuntur  
remedia



# DE COMPOSIT.

remedia topica, quæ distingui debent ut uitium magnū est, uel exiguum, recens, confirmatum, inueteratum, superficialiale, uel profundum. Denique ut est natura corporum, exiguo uitio, leuia remedia sine purgatione aliquando satisfaciunt. In recenti, repellentibus utendum est. Discutientia commiscantur, eaque mediocria. Confirmato uitio & inueterato magis, quæ magis discutiūt, tergent, incidunt. Leuiora remedia superficiali Tineæ: maiora profundæ comparari debent. Acetum ui repellendi, incidendi, discutiendi præditum, & propterea eximium. In hoc morbo pueris, mollioribus naturis, & corporibus noxium. In remediis olea sunt, axungia, succi, medicamenta arida, quæ liquidis & pinguibus permiscantur. Olea quædam repellunt, ut rosarum myrthinū, cydoniorum, salignum, id est, è salicibus. Alia uerò tergent & discutiunt, irinum, de cucumere asinino, amigdalibus amaris, iuniperinum, fraxinum, de serpentibus, de frumento, medio cortice sambuci, de nucleis persicorū. Axungia in alopecia scripta succi borraginis, fumarie, scabiosæ, parietarie, betæ, anagallidis, enulæ, aristolochie, ireos, sambuci, absynthii, ebuli, centaurii minoris, marrubii, cucumeris agrestis. Arida sulphur, cinabrium, sales torrefacti, arsenicū, ærugo metallica. Acrida, & ea quæ scripta sunt in Alopecia. In usu radendum caput est, & perfricandum succo aut liquore conuenienti. Succis, iam scripti liquores conueniunt, lixiuium, urina, salugo, quibus acetum permisceri potest. Postremo medicamenta illinuntur. Aceti loco mixtura uini & lixiuii utendum est. Vinum sit austerum, ubi repellendum: acre & uetus, ubi discutiendum est. Leuia sunt creta, argilla figularis, rubens sapo, pomata dissoluta a ceto, in pueris & mollioribus corporibus, uino austero, & lixiuii, spodium, antispodium, pompholix, lapis calaminaris miscetur initiō. Sinapis uulgaris repellit, ui aceti incidit, deterget uirtute sinapi. Sales torrefacti & diu cum hydrargyro triti, donec nigrescant, utiliter permiscantur. Mediocre est, axungia ueteris bene lota in aqua rosarum unc. iiii. sulphuris uiui triti in aceto acerrimo 3. i. salis, ut dictū est,



LIBER TERTIVS.

59

est, torrefacti & triti, pul. sinapi, plātaginis an. drac. i. Aliud. Sulphur ninum aceto acerrimo maceratur in uase æneo collocato ad solē. Deinde siccatur in eodem aceto.

Ouum cum sua testa triduum maceratur. Vitellus extrahitur, crematur testa, omnia permiscuntur. Aliud.

Radix lapathi acuti & enulæ cesa in taleolas in aceti & lixiui partibus æqualibus ad putrilaginem coquitur: deinde permiscuntur axungia ueteres: consperguntur sulphure, ut prius, preparato. Aliud, colla fabrorum, gūmi cerasorum simul in aceto macerantur: deinde coquantur in eodem aceto, atque hoc abiecto oleum de frumento uel de sulphure miscetur, ut fiat satis liquidum euchristum. Postremò sulphuris & cinabrii partes æquales miscentur.

Aliud.

Succi borraginis, scabiosæ, lapathi acuti, ireos an. ʒ. ii. fecis olei ueteris, aut olei quod cōueniat unc. 3. aceti, quod sufficit. Bulliant simul omnia. Deinde subductis igne, misce pul. ellebori albi & nigri, sulphuris uiui, lythargiri auri, auripigmenti, cinabrii, calcis uiuæ, alluminis, gallarum, fuliginis picis, unde fit atramentum impressorium, cineris è fece uini usta, eruginis an. dr. ii. eo plus minusue. Acre est Aliud. Pix aceto coquitur: abiecto aceto, oleo conuenienti miscetur. Sulphur, cinabrium, sinapi tritum permiscuntur. Vidimus tineam, in quam lues uenerea degenerauerat, eaque nullis aliis remediis potuit curari, quæque solent usurpari in ea lue.

*De Psýdracia.*

**P**sydracia, pustulæ sunt duræ, subalbidæ, quæ expressæ saniem reddunt, ubi enulato, unguento citrino, lacte uirginali, saliuā limacum, priuata, theriaca, radice enulæ, & lapathi acuti, in aceto cocta, & cum axungia mixta utendum est.



# In libr. 2. Galeni de

## COMPOSITIONE PHAR-

macorum κατὰ τὸν οὖν.



APV T dolet intemperie, aut solu-  
tione continui. Intēperies alia sim-  
plex, alia composita. Vtraq; cū ma-  
terialia composita. Vtraq; cum ma-  
teria, uel sine materia in toto cere-  
bro, in solis uenis, arteriis, membra-  
nis, nervosis corporibus. Solutio cō-  
tinui acri humore, erodente, putri, bilioso, salso, grauis  
dolor excitatur distentione. Distendit autem humoris  
copia uel flatus, uulnus, casus, concussio in eodem sunt  
genere. Galenus ex uarietate causarum efficientium,  
ex partium laborantium natura, ex loco, ex qualitate  
propria doloris, dolorum genera distinguit. Causæ ef-  
ficientes, internæ, & externæ, æstus, perfrictio, ebrietas,  
casus, concussio, uulnus, fumus, uapor aliquis uirulen-  
tus, ut grauis odor, uel alius quidam suauis, sed hinc in-  
fectus. Sic Medico non solum communis, sed unicui-  
que propria & particularis natura, quæ sua cuique est  
cognoscenda. Causæ internæ sunt naturalis intempe-  
ries, aut contracta morbo, quantitas, qualitas materiæ,  
mala conformatio, obstructio. Obstruunt ferè humor  
crassius, & uiscidus, aut uapor eiusdē naturæ. Obstruun-  
tur uig future capitis, ossa palati colatoria, uia ad nares,  
aures, oculos, ad spinam, uenæ & arteriæ. A partium na-  
tura, Nervosorum corporum dolor magis pungit, di-  
stenditque, arteriarum pulsât. In uenis & substantia ce-  
rebrī stupidior est. Loco, periostio superficialis: altus  
in menyngibus. Intra caluariam inclusus dolor sæpe  
pertingit ad radices oculorum. Ex propria qualitate  
hoc modo. Grauis dolor est in plenitudine & copia, in  
acri humore, & uapore simili rodit. Sed in uapore acri  
distentio maior, minor rosio. Contrā in humore, disten-  
tio



tio cum pulsu membranarum, inflammatione. Sequitur cum gravitate copiam membranarum conceptam: sine gravitate & pulsatione, copiam crudi frigidiq̃ue flatus. Dolor diuturnus & contumax uel totum caput occupat, ut in Cephalea: uel alterum latus, ut in Hemicrania. A sanguine ferè in frontem, à pituita, in occiput, à bile flaua in dextrum latus, à melancholia, sinistrum decumbit. Sed & ex proprietate dolorum humor aliquando intelligitur. Nam ferè moderatus est à sanguine, à pituita, coniunctus est frigiditatis sensui, stupori, somnolentiæ, tarditati. Functione animæ, ubi & facies decolor est, à melancholia uaria phantasmata & imagines animæ offeruntur, à bile, calor maior, pallida facies, uigiliæ. Sed his omnibus adiungenda est antea acta uita, requirendūque quo modo habeant uiscera, & reliquum corpus. Humior enim & uapor, qui dolor, non facit, aliquando generatur in ipso cerebro. Sæpe ab alijs partibus corporis & toto genere uenoso transmittitur. Sunt quibus arteriarū intemperies multum sanguinem spirituosum colligit, unde uehemens pulsansq̃ue dolor. Quibusdam, quod rarū scribit Auicēnas, & memoria nostra uisum est, uermis procreatus in cerebro, graues dolores excitat, & hoc quoque rarius, quod cuidam ex frequenti odoratu basilici scorpio in cerebro genitus, graues longosq̃ue dolores, & tandem mortem attulit.

*De dolore capitis ab æstu.*

**D**utius iter facientibus, in sole commorantibus, in thermis, aut uaporariis calidis, calidiores uapores aut fumos excipientibus, dolor excitatur, ubi caloris sensus est in capite, fronte, temporibus, sæpe etiam post aures, uigiliæ, oculorum rubor. Hic ergo cum sit sola intemperies, contrarijs pugnare oportet. Ea uerò sunt refrigerantia & repellentia, in quibus tamen uitanda sunt, quæ nimium refrigerant & insigniter adstringunt. Declinandus splendor solis, instituenda quies somnis, aquæ potus, alius moliri debet, bene perspirata habitatio, & auersa è solitariis radiis, uita frugalis, alimenta, quæ refrigerant & humectant.



## DE COMPOSIT.

Vitetur clamor: strepitus, motus animæ, corporis, & præcipuè mandibularum. In topicis hæc sunt obseruanda, in declinatione, quo iam tempore lenitur dolor, medicamenta leuiter digerentia, & refrigerantibus miscenda sunt. Deinde, ut Apollonius consulit, fasciæ & lana, uel, ut nunc, cottone circumligandæ fronti, omninoque prouidendum, ut ne liquor, qui capiti adhibetur, parte aliqua in oculos, uel os defluat. Raditur caput aliquando, & rasis paulò crassiora, ut detrusis liquidiora medicamenta fingenda sunt. Vnimur autem oleis, succis, liquoribus, foliis floribus & germinibus plantarum mucaginibus, farinis mixtis, in succo conuenienti. In oleis conuenientissimum rosatum recens sine sale, & ex oleo omphacino comparatū, alioqui in oleo albo, hoc est uirginali uocato, uel eloto multæ rosæ aliquoties commutatæ madeant, aliquando rosatum non ita laudabile, sæpius lauamus aqua rosarum: quod si omnino desideratur legitimū rosatum, Nenupharino, uiolaceo, papauerino, aut alio id genus refrigerante utemur. Sed ut addatur adstrictio, aliquid olei cydoniorum, alit myrtillorum intermiscemus.

Succi sunt è portulaca, lactuca, semperuino, umbilico ueneris, millefolio, poligono, & alijs eiusdem naturæ. Sed hæc recentia esse oportet, nondum æstate duriora & sine succo. In liquoribus acetum, sed interdictum pueris, & mollioribus corporibus. Folia uitis, salicis, nenupharis, & herbarum præscriptarum. Flores nenupharis, rosarum, uiolarum, papaueris, capreoli uitium, fruticis, rosarum, rubi. Farinæ fabarum, hordei, quæ in succis prædictarum herbarum, adhiberi possunt: aut iisdem tritis commisceri. Muccagines pylis, cydoniorum, aliquando semina contundimus, paulatim effusa rosacea, donec fiat crassitudo aliqua: quale hoc remediū. Arabibus probatum & nostris usitatum.

R. seminis papaueris albi, hyosciami albi, lactucæ, portulacæ ana dr. j. semi. cucumeris, & cucurbitæ an. 3. ij. cōtundantur paulatim affusa aqua rosacea, donec fiat crassitudo: unde frons, & tempora illinantur. Oxyrrhodium



dinum in frequenti usu est, ex quinque partibus olei rosati, una aceti, aliquando aliquid aquæ rosarum permiscemus. Ceratum Galeni rosatum, ex ceræ tribus partibus, duodecim aut decem olei rosati conficitur, subigitur cum succo herbarum dictarum. Multa cerota conficiuntur mutato rosaceo in aliud genus olei conuenientis. Cera fit alba, prius mollita in aqua tepida, lota quæ: postremò subacta aqua rosarum. Sic enim maior uis inerat cerato, ad maiorem refrigerationem. Tota nocte sub dio collocantur, inclusa uase, hinc sepeliuntur puteis, aut aquis frigidissimis immerguntur. Licebit uti conseruiis rosæ & uiolearum, & nenupharis, emplastri more adhibitis. Oxyrrhodino, oxycrato, camphora quoque topicis immiscetur. Lac muliebre cum tantillo camphoræ naribus inditur. Nodulus è rosis madefactis in aceto, & aqua rosarum, naribus admouetur. Spongia quoque in decocto rerum quæ conueniunt, immergitur, exprimitur, admouetur. In declinatione, quæ concoquunt, ut mucago seminis althææ, extracta in aqua chamæmeli, oleum chamæmelinum repellentibus misceri debent. Initio adhibita ut refrigerent, quia celeriter incallescunt, subinde innouari debet. Ratio uitæ frugalis, aquæ potus, somnus, quies, perflatum cubile, & auersum à solis radiis, tranquillitas animi, quies corporis, & mandibularum, propterea in omni dolore capitis uehementi, interdiciuntur duris alimentis. Debet alius esse mollis, quod procuratur iusculis è lactuca, oxalide, borragine, beta, iusculo prunorum, sero lactis, cassia, catholico, & omnino leuioribus medicamentis. Dolor à perfrictione: cõcidit facies, sed est decolor, pigri sensus, pigræ animæ functiones, frigidis læduntur, utendum calidis, oleo rutaceo, irino, costino, nardino, quibus Hieme frigida, & maiori perfrictione, styracem calamitam, benioin, mithridaticum, theriacam permiscemus, euphorbium quoque oleo subdecuplum, uel sub duodecuplum. Possunt olea confingi è maiorana, thymo, serpillio, origano, satureia, mentha, rore marino, & alijs id genus calidis plantis, in oleo & uino coctis ad consumptionem



## DE COMPOSIT.

ptionem uini. Affectu perseverante, raditur caput, aut detonditur, paulò crassiora medicamēta quàm in æstu adhibentur. Fiunt capitella seu pileoli, ex aluta, quæ in terior, parte inducta sit mollibus emplastris, calfacientibus, ut mithridatio, theriaca, aut unguentis crassioribus ex præscripta materia. Sinapis quoque usui est. Abstinentum phlebotomia, cathartici fortibus, cucurbitulis, multo magis eo genere curandi, quod usitatum in lue uenerea, quod genus tantum locum habet in dolore longo & pertinaci, à crassis multis, & uiscidis humoribus. Alimenta sunt boni succi, quæ moderate calefaciunt, uinum tenue, calidum cubile, illitus narium, infusio in aures, in materia præscripta, oleis & alijs.

### *Ab Ebrietate.*

Ebrietas grauissima affert symptomata, alia quidem subito, alia post tempus, quale est illud scriptum ab Hippoc. apho. 5. lib. 5. Si ebrius quispiam obmutuerit repente, & quæ Gal. commemorat. Cap. 5. lib. 5. de locis affectis. Moderatum symptoma est, dolor capitis, in quo uidendum, an uinum crudum, & crapula restiterit in uentre, sic enim uomitus imperandus, confirmandus uenter, alioqui uteris iis quæ contra ebrietatem faciunt, quorum duo sunt genera, alia quæ refrigerant & repellunt, iam descripta in dolore capitis contra æstum, ut rosatum, & peculiariter polygonum: alia naturali quadam proprietate, aut certe non ita manifesta ratione, ut hederæ folia alligata fronti, ruta, decoctum centaurii minoris, amygdala amara, ceruinum cornu, brassica, quam scripsit Theophrastus naturali quodam odio dissidere cum uite, ut uim huius succumque eliciat, si seruetur in uite, atque inde uitam corrumpit. propterea Andracidem usum brassica contra ebrietatem. Quod autem uulgo persuasum est crapulam uino elui, non caret ratione. Si quidem bene puro uentriculo & distribato priore uino bibitur. Hoc enim uapores crassos discutit, quos genuit crapula. Quod & Hippoc. & Gal. ostendunt. In dolore oculorum ab huiusmodi uaporibus, co apho. ubi scripsit Hippoc. Dolores oculo-

rmm



rum meri potio soluit. Appollonius somno, inedia, quiete, uomitu uel uacuatione utitur, sed hæc conueniunt, ubi crapula grauatur uenter, alioqui inutilia. Alimenta sunt pauca. & boni succi, quæ facile concoquantur, pullastra, pulli columborum, capus iuuenis, alæ & testiculi gallorum, pisces saxatiles molli carne, oua sorbilia, hordeatum, aquæ potus, siquidem inde non læditur uenter, sic enim uino bene diluto hydrosaccharo, cum uino granatorum, iulepo Alexandrino uti licebit. Secunda mensa, cydonia, uux passæ, pira, & mala leuiter adstringentia, in uapore cocta, conueniunt. In declinatione diutius & paulò celerius ante cibum obambulant. Post duas, aut tres horas à cibo breuius, & lentius. Atque hic balneum conuenire potest, & refrigerantia topica commutanda, in ea quæ moderanter calfaciant, quale chamæmelinum est. Superstitio est in usu amygdalarum amararum, contra ebrietatem. Voluit enim septem esse numero, 9. aut 11.

*De dolore capitis ex ictu, uulnere, aut contusione.*

**I**cto capite, contusio, aut uulnerato, spectandum est, an malum ad pericranium extendatur. Sic enim membranam usque ad os diuides cultello, aut scalpello, detraso osse, linamentis uulnus replebis, sed in primis omnia aduertenda sunt signa, cum præsentia, tum ea quæ ueluti accidentia recens illato ictu superueniunt. Leges itaque cap. 4. lib. 8. Celsi. Alioqui si temerè uulnus factum solidabis, aut contusionem negliges, grauissima accidentia consequentur, ut mortes, felle, fracto, aut aliter læso subiecto osse. Itaque in magna contusione, si quidem nullum uulnus est, aut exiguum, tutius fuerit, injecto clystere detracto sanguine ex cephalica respondente in crucem interfecare, cutem contusam, & uulnus breuius ampliare. Sic enim facilius probamus, nūquid os læsum sit, uulnus linimento implendum est. Inducendum splenium, aut complicatum linteam medicamento, quod inflammationem prohibeat, quod reprimat, ex oleo rosato, albuminibus ouorum, bolo armeno,



# DE COMPOSIT.

no, puluere myrtillorū, alijsque id genus, & supra lanā succidam, uino, aceto uel tinctā, uel oxycrato impones. Postremò fasciola omnia colligabis. Iam tertio die, confusio uel omnino discutienda, uel in pus uertenda est, quod si magna diuisio fuerit, iam tentato osse, & membrana futuris, uulnus coniungendum est. Sed ita ut inter duo fila, iustum spaciū relinquatur, & parte de cliui magis pateat, qua scilicet pus commodius defluat, quod alioqui collectum aut arrodit caluariam, aut per futuram fluit. In caput interius, & grauius adfert periculum. Dolor autem ferè excitatur ab inflammationem. Hic ergo leniendus dolor est, & extinguenda inflammatio. Vtrunque fit mistis medicamentis, quæ sine adstrictione, & calore laxant: quorum materia, abundè descripta in lib. de materia Chirurgica, cap. de dolore. Iam sublato metu inflammationis, lenito dolore, pus omnino conficiendum est, medicamentis suppurantibus. Repurgandum uulnus, detergenda sanies, tuncque glutinandum, ubi benè purum uulnus fuerit. Hoc autem fiet prius regenerata carne, per medicamenta quæ peculiariter appellantur cæphalica. Deinde tam tecto osse, per ea quæ uocant glutinantia, utraque materia, ex monumentis ueterum, & obseruatione recentiorum, descripta est à nobis lib. 2. de materia Chirurgica. Est & aliud quod Galenus colligit de usu aceti. Siquidem membrana quæ dura menynx appellatur, nudata est, omnino abstinentum ab aceto. Si uero ab osse incolumi ea omnino tecta est, distingues hoc modo: nam si grauis est inflammatio, & grauis dolor, hic abstinebis. Vel utrumque malum leue est, ita uteris & medicamentis, quale rosatum est, permiscebis, ut tenuitate partium, uim aliorum medicamentorum deducat in altum. Retinenda uitæ ratio, quam Appollonius instituit, quies corporis, subtractio alimenti, uacuatio quæ fit, uel phlebotomia, ut ante dictum est, & medicamentis purgantibus, & clysteribus, noxiarum abstinentia, soleis, balnei, uini, neque uini solum, sed & potum qui inebriat, salforum, acrim, acidorum, clamoris, strepitus, motus animi



animi, corporis, præsertim mandibularum.

*De diuturnis capitis doloribus.*

**C**Ausa ferè intemperies cum materia frigida, in genere intemperies, uel solutio continui. Intemperies ut dictum est de dolore capitis sine materia, quæ ægerri-  
mè curatur. Vbi confirmata est, uel cum materia, atque hæc uel biliosa & flatuosa, uel quod sæpe fit, frigida, crassa, uiscida. Atque hanc quoque statim flatuum copia sequitur, unde distentio, & dolor, quasi contun-  
denti similis, & ad instar maleoli ferientis. Signa ex dictatis antea, repetenda. Altera causa est solutio conti-  
nui uulnere, contusione, casu, distensione à flatibus. Iam uerò flatus generatio medico intelligenda est. Genera-  
tur enim inopia caloris, atque hæc inopia duobus mo-  
dis intelligitur, quia uel singulariter calor imbecillus est, uel non simpliciter quidem, sed ut ad materiã refer-  
tur. Atque in hac comparatione materiæ quãtitas eius, & qualitas cõsideranda: quãtitas quidem, qui copiosior est, quàm ut à calore etiam integer confici potest. Qua-  
litas autem quia natura sua flatulenta est, quod in mul-  
tis alimentis contingit, & humore frigido qui facilè in flatus resoluitur. Atq; hi flatus continuitatem soluunt,  
quia membranas & sensilia corpora præter naturam di-  
stendunt, & ui quadam futuras relaxant: unde & diade-  
matis, & fascijs arctius colligatis remedia inuenta sunt. Graue malum est, ubi materia putrescit, unde febris in-  
flammationes & phrenitides.

*Curatio.*

Recta uitæ ratio instituat. Alius lubrica, aquæ po-  
tus, media aut parcissima uita (nisi à bile malum ori-  
tur) temperamentum. Aetas, cœlum, consuetudo, & re-  
liqua repugnent. Vitetur omnis uehemens motus cor-  
poris, & animi. Alimenta acria, acida, salsa, & omnia  
quæ uapores gnignunt, clamor, strepitus splendor ma-  
gnus, nocturnus aer, sed is præsertim, quæ illustrant  
radij lunę. In intemperie pura, neque phlebotomia,  
neque purgationibus utendum est, cū materia hæc se-  
quitur. Si plenitudo grauis, obstructio, inflammatio,  
febris,



# DE COMPOSIT.

febris, contusio, insignis factura, uulnus, ac denique si intolerabilis dolor est, uenam secato. Celsus phlebotomiam superuacaneum remedium putat, ubi intolerabilis dolor non est: quem sequi non oportet. Nam citra hunc in propositis conditionibus necessaria est. Vena cæphalica aperienda, aut si malum ab inferiori corpore, mediana, paulatim digito indito, expressa cæphalica. Deinde perseverante malo, uenæ capitales, in fronte, temporibus, post aures secare oportet, Itaque Medicum animaduertere, ut qua parte dolor magis urgeat, maior sit rubor, tumor, pulsatio, secetur uena capitalis. Arteriotomia conueniet, ubi à sanguine calido & spirituosio dolor natus est, de qua lege 13. Meth. Medendi, & 6. de sanitate tuenda. Setis quoque porcinis, folio arundinis, aut festucae, irritandæ sunt uenæ interiores narium, ut sanguis profluat: nam & inde sanguis sponte naturæ motus, dolores capitis dissoluit. Alii utuntur sanguisugis, fixis in pinnis narium. Sed ante phlebotomiam, siquidem resistit aluus, clystere aut leui pharmaco purganda est: quia è fece intestinorum sublatus uapor sæpe dolorem mouet. Cucurbitulæ occipiti, uel paulò inferius in ceruice adhibentur, etiam cum scarificatu, nisi eger uideatur opportunus Paralisi. Purgationes instituuntur, ut est materia, ex ratione quæ in Alopecia descripta est. Animaduertendum tamen in dolore, qui à flatibus excitatur, num flatus ab alimento generentur, aut à materia: nam si ab alimento, frustra purgatio est. Si à materia, id ipsum distingui debet. Nam si pauca, & solo capite inclusa, aliis remediis deduci debet. Si multa uel etiam toto corpore collecta, purganda est. Sed si crassa, & frigida, incidentibus & concoquentibus prius præparanda est, quæ si tota potest concoqui, & pituita dulcis est non eger pharmaco, si salsa, putris, aut corrupta, necessariò purganda est. Post habitam rationem totius corporis, & capitis, per rationem uitæ, uacuationes, purgationes, ad particularem uacuationem capitis, per errhina, sternutatoria, masticatoria ueniendum est Errhina & sternutamenta maximè conueniunt,



niunt, incisa prius & concocta materia, siquidem crassa est & uiscida. Sternutamenta peculiariter conueniunt, ubi caput multis uaporibus repletum est, utraque præferenda ubi pars anterior capitis purganda est, quemadmodum διαμασσηματα caput posterius melius repurgât. Illa tamen, errhina dico & sternutamenta suspecta esse debent, ubi imbecilliores oculi, uel iam laborant: adhæc quibus nares aut polypis aut ozænis aut aliis id genus ulceribus uel iam laborant uel opportune sunt, multò magis si materia repurganda uirulenta est, id quod sæpe accidit in lue uenerea. Hic ergo masticatoriis potius utendam est. Masticatoriis similiter abstinendum, ubi fauces, palatum & reliquæ oris partes pulmones quoque, uel iam laborant ulcere uel ulceri opportuna sunt, hæc autem, ne fiat consuetudo, & ulcera iam facta irrigentur, quæ resiccati oportet, uel quæ in metu sunt, moueantur, neque contrà. Nec facit quod quis obiciat, materiam illectam, & deductam masticatoriis hiatu oris, & decliui capite, repurgari: quia in transitu ulcera irrigantur, & per somnum consuetudine facta iam non repurgatur materia. Errhina, alia sicca, alia liquida, alia uero euchrista, ut quæ illinantur. Succis utendum in maiore copia humiditatis, eoquæ corniculo uel fistula infusa prius subtilissimè trita insufflantur, alioqui inspirantur attrahuntur.

Aliquando solus uapor satis est, ut nares scilicet admoveantur pyxidibus, in quibus illa reposita sunt. Liquida uel uola manus, uel cocleari excepta, tepida quidem inspirando attrahuntur. Quæ uero iam consistunt euchrista, digito, penna, uel alia re simili, illinantur. Errhinorum materia, acris, amara, falsa, nitrosa, clarum, piper, sinapi, elleborus, melanthium, cyclamen, maiorana, centaurium, pyrethrum, hyssopus, thymum, thlaspi, satireja, anagallis, beta, soldanella, sales torrefacti, amoniacum, nitrum, & alia id genus. Liquida ex iisdem exsuccatis, uel liquori mixtis. Plurimus usus est succi betæ, hederæ, mercurialis, parierariæ, maiora-  
næ, anagallidis: contunduntur herbæ, & ut facilius red-  
dant



# DE COMPOSIT.

dāt succū aliquid aceti, aquæ uitæ, uini, aquarū maiora  
næ, parietariæ, & simillū instillatur: intermiscemus quo  
que aliquid zinziberis, piperis, nucis moscatæ, eorū quæ  
prius sunt dicta. In siccis errhinis, quorū si multū est suc  
cus permixtū, aqua hyssopi, maioranæ, uitæ & similium,  
aliquādo ex iisdē friguntur, inuoluuntur linteo raro, &  
calida naribus admoventur. Ab imbecillioribus inchoā  
dum ad fortiora, ut elaterium, & euphorbium, atq; hæc  
temperantur lacte, mucagine altheæ, psilij, lini & simi  
lium. Hæc omnia melius a balneo, siquidem hoc usita  
tum est, alioqui matutino, laxato corpore, aquam autē  
continemus ore, aut lac, ne dum hæc immittuntur nari  
bus, aliquid in os decidat, quod os exulceret, uel deno  
ratum lædat. Si inde nares incaluerunt, lacte uel aqua  
tepidā immissa naribus, medendum est. Eadem seruanda  
sunt in masticatorij, quorum materia eadem, quæ errhi  
norū. Sed excipiantur ferē mastiche, uua passa, ficu,  
ceta, alioqui errhinorum materia uino incoquitur, ad  
gargarismos. Sternutamenta subtilissimē tritis errhinis  
siccis commouentur, sed maximē acris, elaterio, elle  
boro, castorio, zinzibere, pipere albo & aliis id genus.  
Sequuntur topica, ea repellunt & refrigerant, quæ con  
ueniunt initio. Cōcoquant & tenuant, quæ incrementis  
misceri debent repellentibus.

Quæ discutiunt, maximē cōueniunt in declinatione.  
Dolorē leniunt, quorū maximus est usus in uigore. Cor  
roborantia locū habent, iam discussa materia, & pacatis  
doloribus. Itaque rato prius uel detōso capite, remedia  
adhibenda sunt paulō crassiora, ut dictū est. Liquidiora  
hæc sunt ut melius penetrēt pharmaca. Laxetur cutis,  
declinetur tediū, quod relinqueretur, inquinatis capil  
lis. Atque dum his utimur, uel pharmaca repetenda, uel  
qui hac parte plurimum conueniant, clysteres acres inij  
ciendi, frictionibus partium inferiorum utendum est.

Materia repellentium in humore, uel uapore frigido  
& crasso tepida applicatur, multō magis Hyeme, & tem  
peramento frigidiorē. Contrā uerō in materia calida &  
biliosa, frigida sunt repellentia. Verum dū hæc aguntur,  
proui-



providendum ut ne caput nudatum pilis, frigore lædatur, multò magis Hyeme & cælo frigidiorè. Itaque cucullis uocatis, & cottone caput muniendum est, consuetis quoq; pileolis, qui è materia conuenienti profumati possunt, benioin, stiracè, caryophyllis & aliis id genus. Puluis quoq; ex conuenienti materia intermisceri potest. Cucuphæ ex cottone, alioqui emplastra aluta inducimur, ex qua fiat veluti pileolus. Materia remediorum prius descripta est, in dolore capitis ab æstu, ebrietate, perfrictione. Legenda est historia apud Aeginetam de muliere, quæ contumaces huiusmodi dolores curabat decocto radicis cucumeris agrestis, & foliorum absynthii in hydræleo: expresso oleo, quod relinquebatur, fouendum caput, & irrigandum. Materia uerò emplastrimodo applicanda, potest medicamentum augeri Hydreleo facto ex oleo conuenienti, chamæmelino, irino, & aliis prius descriptis, cui oleo olibanum, opopanax, galbanum, benioin, & alia huiusmodi misceri possunt. Quæ paratur ex atramento, parabile est, sed uulgari scriptorio utendum magis circa initia, post initia uerò, impresforio. Democritus utebatur arida fæce atramenti, quam diem integrum terebat ex aceto, deinde addebat octauam partem opii. Neque omittendum remedium, quod maximè conuenit vaporibus crassis, dum retinetur anima, seu respiratio, ligatur collū, ut his artibus sanguis una cum calore & spiritu, colligatur sursum in uenis & arteriis capitis, atq; ita collectus uaporem tenuet atq; discutiât. Extrema remedia sunt, emplastrum de Vigocum hydrargiro, in pileolo aluta capiti inductum, & toti ceruici affixum: Hoc remedium in crassis & uiscidis humoribus tempestiuè & conuenienter adhibitum, plurimum potest. Adhæc sinapismus, diocopregias medicamentum, dropax, quæ scripta inuenies cap. de Pyroticis 3. de materia Chirurgica. Adhæc cauteria ~~maxi-~~ <sup>maxi-</sup> ~~oris,~~ quæ uocatur setum in materia frigida, crassa. Hæc postrema remedia conueniunt non in calida.



# In libr. 3. Galeni

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ.

*De aurium dolore.*



Vribus aeris sensus à natura datus, descendente à nervo à quinta coniugatione, cum dura menynge, fusoque ac disperso in meatum auditorium. Causæ dolorum in genere, intemperies, morbus instrumentalis, solutio continui, particulatim refrigeratio, calfactio, densatio, obstructio, spiritus flatulentus, humor crudus, frigidus, & viscidus illic inclusus, humor mordax, sanies acris, inflammatio tum propaginis membranæ, tum nervi auditorii ulcus. Dolor autem in ambitum auris, propter circumpositas latebras extenditur. Refrigeratæ auri, & inde dolenti calorifica conueniunt, fel tauri cum adipe anatis, ut Arabes & Græci cum succo porri, quod remedium præterquam quòd calfacit, aperit quoque obstructions, terget, incidit. In hoc quoque remedio consensus est Arabum & Græcorum. Cæpa præsertim rubra, ampla excavatur, in cavitatem oleum conueniens cum succis conuenientibus & medicamentis, immittitur. In calidis cineribus aut furnis vulgaribus super tegula coquitur, excipitur liquor. Oleum ex cæpa exprimitur, mixtura auri instillatur. Olea conueniunt, in quibus folia ruthæ, lauri, eisdem bacca, aut iuniperi, maiorana, origanum, rosmarinus, hyssopus, calamus aromaticus, piper, galanga, zedoaria, grana paradisi, zinziber, gariophilum, & similia coxerint. Oleum de spica, de cinamomo, euphorbio, uel in quo uigesima quarta pars euphorbij mixta sit, oleum è castoreo, de piperibus, de scilla, de scor pionibus de ben seu muscellinum, de nucleis persicorum, amygdalarum amaram, auellanarum, de galbano, ammoniaco,



moniaco, & alia id genus. Plurimum utendum est succis ruthæ, baccarum lauri & iuniperi, canabis uiridis, centaurij minoris, brionis, ari, dracunti, persicariæ, & rerum amararum: ubi præsertim frigiditati coniuncta est frigida materia & uiscida, qua detergent. Materia sicca castoreum, elleborus, calamus aromaticus, cardamomum, galanga, zedoaria, & alia in oleis memorata. Sacculi ex eadem materia implentur, incoquantur uino acri & cretico seu maluatico aut alio uino generoso: exprimuntur, admoventur calidæ auri, ut inde uapor excipiat. Dolens auris cottone clauditur, ut uocant, muscato pileolis cõsuetis omnino uia ad aures frigori præcluditur. Ex oleis cõmemoratis unguenta sũt pretiosa benioin trito, mometo moschi & ambaris, i. ambrę grise addito.

*De dolore auris à Calore.*

**G**AL. utilissimum remedium putat in inflammatione & calore ouum crudum rosaceo subactum. Arabes liquore oui tenuis subacto ex aqua rosarum, nenupharis, uiolearum, lacte muliebri, succo parietariæ uel polygoni cum rosaceo utuntur. Materia remediorum, quæ refrigerant & dolorem leniunt. Item quæ calefaciunt, amplissimè descripta cap de dolore, lib. 3. de materia Chirurgica. Quo loco remedia quoque inuenies narcotica, quale est philonium cum muliebri, semina papaueris albi, hyoscyami albi, lactucæ, cucumeris, trita omnia affuso succo è folijs & floribus papaueris, nimphæ, hyoscyami, uel aqua rosarum, uiolearum, nenupharis, trocisci stelle dissoluti sapa uel in lacte muliebri. Trocisci de croco descriptione Mesue. Finges pastillos narcoticos ex opio, castoreo, Synapi, calamo aromatico, pipere, & omnino addita materia, quæ concoquat, incidat, calefaciat, eritque aliorum proportio ad opium dupla, quadrupla, sextupla. Vniuntur pastilli sapa, uino, in usu dissoluuntur lacte muliebri, uitello oui. In obstructionibus à crassis, uel flatibus uel humoribus purgat corpus pillulis coccis, assaiaret, & de hie ramixtis, incorporatis cum expressione dr. s. agarici trociscati infusi, in oxymelite, sitque dimidium dragmę

1 2 coccia-



# DE COMPOSIT.

cocciarum, aurearum an. scrup. i. Purgato corpore er-  
rhinis, masticatoriis utendum est, cucurbitulis in cerui-  
ce & scapulis. Ratio uitæ præscripta in dolore capitis  
eiusmodi materia, remedia topica, eademque in dolore  
aurium à frigore nisi quod debent seligi, quæ detergēt,  
discutiunt flatus, tenuant.

## De ulceribus aurium.

**H**umor interdum è capite in aures defluit mole-  
stus primum & plurimus, qui deinde putrescit,  
consuetudinem facit, ut iam nihil molestus sit. Vbi  
ex Hippocrate purgandum corpus, affigendæ scapu-  
lis cucurbitulæ: errhina, masticatoria sunt imperanda  
ad reuulsionem: detergenda sanies, siccandum ulcus.  
Sed primum leuioribus utendum est. Veteres remedijs  
utebantur, quæ iam exoleta sunt, quorum hic ordo est.  
Primum utebantur glutio ex aceto, deinde pastillo Po-  
lidæ, post Andronio, tum bythinio, uel è charta, postre-  
mò è scoria ferri. Pastillos describit Gale. 6. κατὰ γιν.  
Paulus 7. Scorium ferri uariè præpararunt. Gal. primū  
terit ex aceto acerrimo 9. de simpl. medicamentis dein-  
de ex eodem coquit. Arabes melius præparant. Terunt  
scoriam, ex aceto lauant, & deinde siccant in latere ca-  
lido uel feruente sole: siccant rursus ex aceto terunt:  
imbuunt aceto, siccant ut prius. Idque septies repetunt.  
Post hæc in tenuissimum pollinem resoluunt, coquunt-  
que longa coctione ex aceto acerrimo, dum sit mellis  
crassitudo, atque ita siccant. Remedium hoc maximam  
nim siccandi habet: epuloticum est, quod non nisi bene  
puris ulceribus, iisque inueteratis & duris corporibus  
usurpandum est. Sunt qui frigrant osties in sartagine ex  
aceto, deinde cum aceto coquunt, miscentque rosa-  
ceum: alii more Gal. tantum terunt, & aceto quadru-  
plo coquunt. Clementius est remedium hoc modo. Sco-  
ria ferri in frustula diuisa fistili crudo coquitur, dum  
uas percoctum sit: deinde extinguunt lacte. Idque bis &  
ter repetunt, cremant, extinguunt, tū in mortario terunt  
affusa aqua uel fontana, uel rosarū, uel plantaginis, uel  
simili, ubi diu uersant, purgant, siccant: tum repetunt

scoria ferri varia  
preparatio:



In mortarium, uoluantq; affusa pluuia: postremò sic-  
cant. Singulare auxilium, ubi citra morsum siccandum  
est. Recentiores abluunt mulsâ. Ablues & remediis scri-  
ptis cap. de Purgantibus, 2. de materia Chirurgica. Post  
ablutum ulcus, succum parietariæ, anagallidis, sanicu-  
læ, buglæ, centinodiæ, plantaginis, bursæ pastoris, mil-  
le folii cum melle coques, & hoc uteris. Similiter mel-  
le rosato, syrupo de absinthio uel succo eius cum mel-  
le rosato. Eodem modo. Apii succo, ubi metus est pu-  
tredinis, addes puluisculum aloes & mirrhæ, centaurii  
minoris, gentianæ, sarcocollæ: ægyptiacum quoq; solu-  
tum uino vel œnomelite. Remedium est ueterum & re-  
centiorum. In siccantibus ulceribus aurium alumen u-  
sum ex uino, uel ut sit fortius, ex aceto tritum. Alii uri-  
na pueri impubis utuntur cum œnomelite. Forte est,  
ærugo trita cum œnomelite scillitico. Sed quibus reme-  
diis abluas, tergeas, sicces, inuenies cap. de Purgantibus  
& epuloticis de materia Chirurgica.

*Ad dolorem ex inflammatione & sine ulcere.*

**S**anguinem detrahit: interdicito uino: nutrito, ut in  
febris. Sanguis ex cephalica eiusdem lateris detra-  
hitur, clystere uel leui medicamento prius instituto.  
Circa initia lenientibus medicamentis sine calore do-  
lorem sedas. In quibus præstantissimum credidit Gal.  
ouum crudum ex rosaceo subactum molliter imissum  
auri: Rosaceum sit legitimum, quod magna præcautio-  
ne admonuit Gal. Ouum sit recens. Licet uti rosaceo  
cum tantillo aceti. Arabes hoc remedium leuiter co-  
quunt, tantillum caphuræ adiiciunt, quale fuerit rosacei  
optimi unc. i. aceti dr. 2. leuiter bulliant in aqua calida:  
deinde misce caphuræ Gr. 4. Utendum quoq; muscilagi-  
ne seminis psilii & cydoniorum extracta in aqua rosa-  
rum. Hæc muscilago per se uel mixta prioribus medi-  
camentis usui est: lac quoque muliebre conuenit instil-  
latum auri. Quòd si nimis urget dolor, & inde pericu-  
lum ægro imminet, ad narcotica prius descripta con-  
fugere oportet. Iam remissis doloribus ad concoquen-  
tia simul & lenientia ueniendum. Sed dum hæc fiunt,



# DE COMPOSIT.

omnino procurandum ut uel clysteribus, uel leuibus pharmacis moueatur aluus. Leniunt itaque & concoquunt muscilagine seminis althæ, lini, fœnugreci, gummi arabici. Extrahuntur in aqua bismalux: adduntur pinguia, butyrum, œsopus, adipēs gallinæ, anseris, adeps suillus recens & sine sale. Postea basilicum & diachilon paruum oleo anethino, amygdalarum dulcium, chamelino, irino dissoluimus & alijs medicamentis leuioribus, quæ cap. de suppurantibus scripta inuenias. Farinis etiam hordei, fabarum, althæ, lini, fœnugreci coctis rosaceo uel oleis memoratis, uti conueniet. Aliquid indetur auri. Magna pars totæ auriculæ & ambitui in linteis applicabitur.

## De uermibus aurium.

**V**ermes innascuntur ex putredine, quibus remedio sunt amara, qualia hæc, olei persicorum, amygdalarum amararum an. unc. j. succi oppij, centaurij minoris, an. unc. aceti dr. ij. Coque in calidis cineribus, deinde adde myrrhæ, aloes an. scrup. j. Addito felle fiet efficacius. Aliud. Foliorum persicariæ, ablynthij, graminis, athanasix, matricariæ, horum unius uel duorum. unc. ij. succi extracti ex nucleis persicorum addito pauco aceto dr. ij. olei de fraxino unc. s. ellebori nigri dr. s.

## Observationes quedam in doloribus aurium.

**I**n his obseruandum nequid durius, asperius, frigidius, calidius, grauius ex alto cadens dolorem exalperet. Liquidum sit medicamentum, tepidum, quod molliter instilletur, uel corniculo uel crassiore penna secundum longitudinem diuisa in duas partes, extremo molli uel lana obuoluto, ut per cavitatem alueoli molliter influat medicamentum. Aliter hapso cottonis, lanæ, serici imbuto prius medicamento & molliter expresso efficies, ut medicamentum leuiter influat. Vapores inseruntur auribus, sacculis (ut ante dictum est) tepidis expressis, spongiis complicatis, linteis in conueniente medicamento inculcatis, expressis, admotis. Alii ter ueteres lenticulas implebant decocto conuenienti, claudebant orificium uel lana pauca, uel raro linteo, per



per quæ exhalaret uapor. Orificium admouebant auri. Aliter quoque corniculum auriculare fingi potest, altero extremo latiore, quodque sit satis comprehendendo orificio lenticulæ. Altero angustiore quod auri inditur: uocant per embotum. Sed corniculum cum sit inflexum, commodius est: alioqui emboto uocato utendum erit. Quod si inflexo collo iisdem corniculo auri inditis, & ab alio exuctis flatus & alia corpuscula extrahuntur auribus, uel instrumentis, quæ similia sunt uulgaribus siringibus exsufflatio ab ore, & naribus efficiet, ut uapor melius attrahatur & excidant, quæ resisterunt in auribus.

*De corpusculis, quæ incidunt in aures.*

**A**Qua, lapilli, festuca, animalcula, faba, & alia id genus incidētia auribus periculū graue afferunt, nisi maturè excludātur. Nā inde dolor grauis, distētio, surditas, inflātio, febris, conuulsio, mors deniq; consequitur. Iubebis ergo uel corniculum, uel stipulā, uel plumā cōparari, quæ aperta extremis partibus, altera quidē in aurē immittatur: altera cōprehēdatur ore, ut fiat suctus & inde quod lædet, extrahatur. Alii extremā partē infarciunt itupa, qua incensa orificium externum claudunt. Incenditur autem extrema parte, quæ foras prominet: alioqui iuncum lucernarium, medullam sambuci, cereā candelam, uerniculum ferreum uel argenteum extrema parte inducunt uisco, glutine, terebinthina, ac re omnino uiscida quam immittunt auri, ut quod lædit, agglutinet, in materia duriori eiusmodi instrumentorum molli lana extrema mollienda sunt, atque dum eiusmodi instrumenta induntur auribus, omnino prouidendum ne quid diffingatur, quod relinquatur aure. Quod si quid uiscidum post extractum corpusculum inhæsit auri, detergente decoctione eluendum est. Iubendus æger ut inclinata aure celeriter descendat ē gradibus, aut mōte insiliat pede, qui auri læsæ respondet, t. fiat. Sternutatione utendum, atq; aliquando cietur sternutatio, ut uiolēto motu, quod lædit, excludatur. Nonnunquam eadem prohibetur præhensis clausisq; naribus, ut aure, ut re-



## DE COMPOSIT.

tentus spiritus impetum faciat in aures. Tabella illa, cuius meminit Gal. uiolentum remedium est, concussio puerorum prehensio pede, herniæ periculū facit in molliore corpore, & quod ei malo opportunum est.

### *De graui auditu.*

**I**N læso auditu uel præcipuum instrumentum læsum est, uel quæ partes ei seruiunt, uel cerebrum ea præsertim parte, ubi oritur quinta neruorum coniugatio à qua neruus auditorius est. Præcipuum instrumentum auditus extremitas est iterna meatus auditorij, ubi neruus cum dura menynge exporrectus attingitur. Læduntur autem intemperie, similari morbo & solutione continui. Intemperies rebus externis & morbo contrahitur, animaduendumque qualis præcesserit morbus, calidusne an frigidus, ut inde cognoscatur intemperies.

Morbi instrumentales hoc loco ab obstructione, quia non potest esse communicatio aeris externi spiritus auditorij. Obstruitur meatus à tumore præter naturam, tuberculis, aut carunculis adnatis, crassiore pure, crassa & uiscida materia, copia sordium, corpusculis incidentibus. Solutio continui, ut in ulcere. Intemperies curanda contrarijs, calida frigidis, frigida calidis, quorum materia superius descripta est. Obstructio liberanda remedijs conuenientibus, ut si ab inflammatione, ijs, quæ contra inflammationem scripta sunt. Si ab œdematæ, incidentibus, attenuantibus, detergentibus. Similiter si à crasso pure aut pituita. Materia autem in dolore scripta est contra flatum & crassam pituitam. Scyrrus mollientibus, incidentibus, tenuantibus & ea ratione, quam scriptam inuenies cap. de malacticis. Tubercula, uerrucæ maximum negocium faciunt, & uix nisi ferro aut eo genere remedium, quæ excedunt supercrescentem carnem, curari possunt. Corpuscula exprimenda ijs artibus, quæ proxime dictæ sunt, sordes auriscalpio & detergentibus infusionibus expurgandæ sunt. Quibusdam uero tonitru, bombardarum, campanarum laborat auditus, quibus, uox lenis, tarda, exigua, numerosa aut musica similis musicorum instrumentis remedio est. Peculiariora quædam remedia sunt



sunt contra læsum auditum, qualia quæ sequuntur. Castoreum solutum aceto & mixtum oleo amygdalarum amararum, baccæ lauri uel iuniperi: teruntur paulatim, affusa aqua uitæ: singulis uncijis expressi succi, dimidiū drachmæ ellebori nigri permiscetur. Subtilissimè trita colocynthis oleo conuenienti permiscetur, uel eadem oleo & uino addita parte aceti. Coquitur oleum. Vsuū est. Vtile balsamum artificiale & acopa, quæ scripta inuenies cap. de dolore. Suffumigia fiunt per corniculum ex caryophilis, ligno aloes, baccis lauri, ramentis iuniperi & rorismarini, maiorana sicca. Meliora fiunt, si in aceto scillitico macerentur, ut ex omnibus fiat suffumigium. Fiunt quoque trocisci ex elleboro albo, castoreo, pipere, calamo aromatico, borragine iunctis aceto. Trocisci usui sunt suffumigijs, uel soluti in oleo conuenienti ex adipis anguillarum uncia una, olei muscellini semiuncia, succi caprifolij & Iouis barbæ dr. ij. aceti dr. j. ouis formicarum, quantum capiat dimidia testa nucis. Coquantur omnia in uase testaceo: collatura utriq; auri infunditur, atque omnino materia conuenit prius descripta contra dolores aurium à crassis & uiscidis humoribus. Desperatis alijs auxilij decoctum ligni sancti, & emplastrū de Vigo toti ceruici adhibitū & post aures. Singulari remedio est, uerū cognoscendū est inueteratum malum esse immedicabile, atq; inueteratum putāt post duos annos, & ubi æquabilis surditas est, neq; angescens, neq; remittens sese, aut ubi scyrrhus tuberculum interius iam intercipit meatū auditoriū, ubi in interiore meatu solutio continui est in neruo auditorio. Medicamenta liquida esse oportet, tepida, quantitate modica, subinde commutata ut tertia quaq; hora. atque priusquam noua immitantur, detergenda auris atq; repurganda. Iaceat æger in autem sanā, ut medicamentū influat. Sed quia iniecta in aurem cohibita sæpe corrumpuntur, & præsertim quæ sunt pingua, & propterea suffumigia & uapores præferunt iniectionibus. Quod scripsit Hip. cessare surditatē biliosis deiectionibus, de surditate critica uel symptomatice in morbis intelligendū est.

De



# DE COMPOSIT.

## De Parotidibus.

**A**bscessus sunt glandularum, sed auribus sæpenu-  
 ro pestilentes. Omnino pestiferi, nonnunquam ma-  
 ligni, quales scribunt viguisse, multosque rapuisse an-  
 no 1510. Nonnunquam clementes sunt, quales uigue-  
 runt anno 1545. & præcipue Vere. Nonnunquam sunt  
 critici, qui si intrò redeunt, lethales, nisi alui profluuiū,  
 uel insignis excretio subsequatur. Alii tardius erūpunt:  
 alii celerius. Quidam cum dolore & inflammatione:  
 quidam sine his. Itaque ubi uel dolor grauis, uel inflam-  
 matio, clystere molli vel leui pharmaco moueatur al-  
 uus: deinde auferatur sanguis ē cephalica eiusdem late-  
 ris, tum medicamentis, quæ leniant, utendum est. Cata-  
 plasmata ex farina hordeacea cocta hydræleo, cerato ua-  
 riè comparato ex oleis, quæ non reprimāt quidem, sed  
 refrigerent, qualia scripta inuenias cap. de dolore: qui-  
 bus muscilago psilii misceri potest, præsertim ubi calor  
 coniunctus est. Abstiniendum hoc loco, ut in toto gene-  
 re parotidum, medicamentis, quæ reprimāt. Pacato do-  
 lore digerentibus nec ita calefacientibus utendum est,  
 ut si fieri potest, materia resoluatur. Quòd si resolui nō  
 potest, & ad suppurationem vergit, suppurantibus uten-  
 dum est, qualia sunt farina tritici hydræleo cocta, buty-  
 ro uel axungia mixta. Acetosa non ita manifesta ratio-  
 ne cocta sub cineribus suppurat. Potest pinsi cum bu-  
 tyro, radici liliorum coctæ permisceri. Similiter licebit  
 uti radice lapathi acuti, althææ, liliorum cocta & cū bu-  
 tyro pista. In calore hyosciamo cum butyro uti licet.  
 Archigenes diu fouebat tepida: deinde cataplasma fari-  
 na hordeacea adhibebat, quod scriptum inuenies, ut a-  
 lia multa, cap. de suppuratibus. Vbi iam pus factum est,  
 uel ferro declini parte, uel ruptorio uocato uomicam  
 aperis. Vteris medicamentis, quæ pus exhauriunt. Ma-  
 teria describitur cap. de resoluentibus, de uomicæ ape-  
 rienda, de pyroticis. Vbi apertus est abscessus, ulcus suo  
 more curandum est & purgandum sordibus, incarnan-  
 dum & cicatrice ducendum, ac fit aliquando in malè cu-  
 ratis parotidibus, ut fistulæ ducantur, contra quas inci-  
 piunt.



piantes, Gale. uehementer probat pharmacum quod sequitur, Olei uetustissimi alioquin ricinini, anethini, caryni, cocti in sartagine unc. 6. aceti fortissimi tantūdem, lythargiri unc. 4. Bulliant simul, coquantur per diē semper agitando, donec nigrescat pharmacum, splendeatq; . In mitibus parotidibus, hoc medicamentum sufficiet. Olei chamæmeli, liliorum, butyri recentis ana drac. 6. croci grana 6. Fiat linimentum, superponatur lana sordida. Quòd si paulò durior uideatur abscessus, admiscebis & tetracharmacum, uel dialtheas, uel diachylon paruum de muscilaginibus, resumptiuū, uel aliquod id genus, qualia multa inuenias cap. de Malacticis, ac primum crassiusculis linimētis, postea compage mollium emplastrorum, præsertim si dolor abest, uti conueniet, ut si durities relicta fuerit, uteris remediis contra scyrrhos ex cap. de Malacticis.

*De narium affectibus.*

**I**N nares propago à dura menynge, neruus à tertia coniugatione descendit, patet & foraminibus exterioribus & altero angustiore quod ad māmillares processus, & anteriores uentriculos cerebri pertinet. Altero ampliore, quod ad palatum & os diuertit. In naribus polypi fiunt & ozenæ. Polypus tumor est præter naturā duriusculus, similis substantia carunculæ polyporum pisciū. Ozena vlcus est malignū, qđ ab acri fluxione & aliquando putrilaginosā nascitur, atq; putredinis signum est, quod grauitè olet, neq; oē ulcus narium Ozena est. Nam sæpe à pituita salia vlcera concitantur in naribus, quæ crustulas ducunt & facile curantur. Ozenis malignitate respōdent ulcera in lue uenerea suborta, quæ & aliquādo, ut ozenæ, cancrū referūt, quod ubi fit, magna desperatio est neglectis eiusmodi ulceribus. Os nasi cariē ducit, atq; corrūpitur, unde forma naturalis nasi deprimitur & deperditur. In ozenis & polypis hæc sunt communia. Vacuandū corpus aliquando phlebotomia, & cephalica: deinde ē ē uenis, quæ ad labra perueniūt: deinde purgatione, ex quo reficiādum caput optima uite ratione, & medicamentis. Idemq; corroborandum est in medi-

*polypus qđ.*

*ozena qđ.*

*N.*

*curō.*



# DE COMPOSIT.

medicamentis, quæ resiccent caput & corroborent. Cuius  
cussa sint cottone intertextæ & conspersæ puluisculis,  
qui siccent & corroborent, quales sunt è ligno aloes  
Caryophilis, macere, moschata nuce, stœchade, saluia,  
maiorana, mentha, rore marino, betonica, lauendula &  
alijs id genus. Præterea frictio è spongia à sincipite ad  
occiput & latera ducta. In medicamentis, quæ raso ca-  
pite adhibentur, emplastrum barbarum, tum quod de-  
scriptum inuenies cap. de Hæmorrhagia tum quod cap.  
de glutinantibus, uel quæ sequuntur. Myrrhæ, thuris  
ana unc. j. duo oui albumina, limaces triti cū suis testis  
numero sex, rursus terantur omnia in mortario & lin-  
teo inducta capiti quæ affixa 9. dies sinantur. In medica-  
mentis topicis differentia est, quia ozenis conueniunt,  
quæ repellant & discutiant. In polypo, qui ab humore  
crasso & uiscido nascitur, quæ adstringant, incidant,  
tergeant, discutiant. Atque in ozenis alia quidem reme-  
dia leuia sunt: alia uerò acria, quibus in rebelli malo,  
serpente & putrido utendum. At mediocria ex utroque  
genere fiant, ubi malum erit mediocre. Lenia sunt rosæ  
ficcæ inspersæ. Plantago ficca, herba uocata scorpioi-  
des: clymenum uulgare, malorum granatorum trium ge-  
nerum succus leniter coctus, uel cum melle in uase æneo  
ita coctus, ut crassitudinem habeat. Mel uisulatum cum  
succo plantaginis, cum puluere ireos, myrrha, aloes. For-  
tia sunt aquæ fortes, metallica acria, pulueris dracun-  
tij, uatrachij & quæcunque acria sunt. In lenibus uero  
metallica, quæ sine morfu siccant, quale est plūbi recre-  
mentum, lythargiros, cerusa, pompholix, puluis malico-  
rij, & magma illud Galeni ex contusis granatis. Cete-  
rum cum omnis ozena ulcus sit, ordine quidem curāda  
est, purganda sordibus, incarnanda & claudenda cicatri-  
ce. Purgabitur hydromelite è decocto marubij, centau-  
rij, gaiaci apij, absynthij, agrimonix, mixto aliquando  
sero lactis, unde acrimonia lactis retundatur. Alijs quo-  
que abunde scriptis cap. de purgantibus. Purgatū ulcus  
aqua forti, qua aurum separant, aqua sublimati attingi  
debet, mel hispanicum tostum, addito puluere corticis  
gaiaci

medicamenta  
lenia ozenis

decocto



gaiaci, purgat, incarnat, & cicatricem ducit. Recrementum plumbi tenuissime leuigatur equali parte uini aufteri, deinde adiecta æquali parte olei myrthini ad spiffitudinem coquitur, pſoricum Meſue huic rei utile eſt. Aegiptiacum ſiccatur, & inde puluiſculo facto aliquid ariltolochiæ admifcetur, gentianæ & ſimilium. Gal. paſtillis Andronis, Polyide & ſimilibus utebatur, quos ſcriptos inuenies cap. de Hæmorrhagia. Sed quia medica .N.  
 mentorū uis ſubinde affluēte humore diluitur, ſubinde cōmutare oportet. Negotiū fit maius, cū ulcera ea parte ſunt, qua foramē eſt nariū ad pallatū. quia non tā facile medicamenta adhiberi poſſunt. Iubendum ergo, ut æger maiore uī inſpiret, ubi medicamenta inmittuntur. Alio qui os ampliffime aperiat demiffa lingua, ut ſpecilli extremo medicamēta ad ulcus adducātur. Sunt qui firmū aſperumque filum, uel e ſetis textum in nares mittant. impellantque, ut æger magno inſpiratu attrahat, & alterum extremum in os perueniat. Itaque utroque extremo filum prehenſum diducitur, ut aſperetur ulcus, & ſanguinem reddat: deinde filum medicamenti illinunt, ut inde contingat ulcus. Nec deſunt, qui acum plumbeū eo filo tranſigant, ne filum reduplicet. Reſupinato ca- .N.  
 pite & naribus eſſe oportet, cū medicamenta inmittuntur iubemusque aliquando ut uel muliebri lac, uel aliud, uel aquam ore contineant, ubi acia medicamēta ſunt lethalia, nequid tranſlatum in os deuoretur.

**I**N polypo particulatim conueniunt ceratum myrthi Cura poly-  
 num, ceratum ex cera rubra cum oleo myrtillorum. pi.  
 Sed oportet ceratis addere ſextam, octauam, decimam, duodecimam partem ægiptiaci, uel æruginis. Alioqui tantundem alicuius pharmaci generis eorum, quæ cathartica dicuntur, quorū materia & deſcriptio eſt cap. c. 95.  
 de pyroticis. Ad idem facit pſoricum Meſue, Macerionis emplatrum, retrapharmacum cum duodecima parte æruginis, lamponis medicamentum, quæ omnia ſcripta inuenias lib. de materia Chirurgica, & quomodo ſit eis utendum. Ex argenti ſpuma & ceruſa, uino, aceto & myrthino oleo coctis ſunt unguenta, quibus aliquid pulueris



# DE COMPOSIT.

pulueris malicorii, rosarum, balaustiorum, aluminis & similium misceri potest. Puluis & succus dracuntii, cum foliis, radicibus, seminibus, medicamentis miscetur, ut proximis unguentis, succo granatorum mixtura fiet, ut sunt corpora & cōtumax malum est. Malicorium tritum, coctum cum parte trociscorum albiadici efficacissimum remedium est. Describuntur cap. de Pyroticis. Quod si crustæ fiunt uel in ozenis, uel polypis, medicamentis siccantibus resiccare oportet, qualia sunt epulotica, unguentum de cerusa, & alia id genus ex cap. de epuloticis. Deinde uel uolsella molliter commouēda, ut leui motu decida. Nonnunquam enim ui excutientē sunt, nisi iam resiccata non ita hæcant. Veteres ster nutatorio utebantur, ut maturæ crustæ deciderent. Alii emolliunt butyro, adipe anseris, aut gallinæ, muscicaginis tragacantę gummi arabici, ut emolliat cadant crustæ. Remedia resupinato capite alia quidē instillantur: alia corniculo insufflantur: quædam specilli nucleo capta inseruntur naribus, uel ē pixide, cocleari, uola, inspiratu trahuntur uapores ē uasis angustioris orificii ad moti naribus. Excipiuntur in ulceribus narium a lue uene rea remediis, quę contra hunc morbum adhiberi solent: illitu, emplastris mercurialibus utendum est.

De hæmorrhagia non agemus hoc loco, propterea quod de ea abunde a nobis actum putemus Cap. 4. lib. 3. de materia Chirurgica. Illinc petantur remedia.

DE




72

# De topicis Medica-

## MENTIS OCVLORVM

### LIBER QVARTVS.



**M**EDICAMENTA ocularia alia sunt *α'ν'δυνα*, quæ & *λοσιπόνια* appellant, eaque dolores leniunt. Alia repellunt, sed leuiter, & adstringendo roborant. Nonnulla sunt, quæ concoquunt & extergent, discutunt, molliunt. Plurima quoque ex crescentem carnem consumunt: quædam peculiariter confirmant oculos, conseruant uisum & aciem eius intendunt, Hieracia, & oxidorcia. Ulcera oculorum peculiararia habent medicamenta: sed leuiora alijs ulceribus, quæ uidelicet, extergent, siccant, incarnant, cicatrice tegunt, aut crassiores cicatrices exterunt, quorum alia mitiora, ut citra morsum siccant: alia paulò acriora, de quibus omnibus ordine dicendum est.

*De dolore oculorum.*

**D**olores oculorū, inquit Hippocrates, meri potio, balneum, fomentum, uenæ sectio & epotum medicamentum soluit. Meraco uino utimur, ubi bene puro corpore uenæ oculares, quæque vicinæ sunt, crasso sanguine uel eiusmodi uapore repletæ sunt. Sit uinum uetustum: tenue, giluum, odorum, non adstringens, quod vel in cibo, uel inter cibos propinetur. Nam ieiuno datum vehementer nocet, & quanquam ab Hipp. scriptum est meri potus: consuetis tamen & natura biliosis, adolescentibus quoque leuiter dilui potest, sed minus solito. Ac quidam ex ueteribus calida diluebant. Phlebotomia ubi corpus pletoricū est, & dolor grauis excruciat. Eligitur uena primum basilica in plenitudine uel mediana, deinde cephatica: postea in fronte: postremo ex angulis oculorum, nisi ulcuscula, quæ phlyctenas uo-

*quæ utimur*

*uino meraco*

*in dolorib; oculor;*

*phlebotomia:*

*cornesq; mēbra*

*ne in oculo aff-*

*siuula exasperans*

*de phlyctenas:*



# DE COMPOSIT.

cant, aut profundius ulcus cū inflammatione adfit. Tūc enim reprobanda phlebotomia in minoribus uenis, sed uenam amplo foramine aperire cōuenit, ut sanguis crassior effluat, & maturius sequatur animi deliquium quod in asperrimis doloribus magnam uim habet, ut ex aliquot historiis licet colligere. Balneum usui est uacua to corpore, cocta inflammatione. Vbi acris fluxio est, fo mento uteris, initio quidem ut tentes num corpus reli quum, uel caput laboret. Sic enim adhibito fomento do lor fluxioque augebitur. In incremento & uigore, ut le nias: in declinatione, ut discutias & corroborea. Verum fomenta in mollibus linteolis & leuibus applicentur, nequid uel grauitate, uel aspredine, uel duritie lædat. Propterea Hipp. sacculos reprobat. Medicamentū epo tum in cacochymia pro natura uitii, quod redundat. Sed præter hæc frictions, cucurbitulæ occipiti & cerui ci affixæ, uincula reuellendo dolores leniunt: leues quo que inspiratus comprehēso ore medicamēto, quod uim habeat leniendi, dolores sedant. Medicamenta topica duorum sunt generum. Alia re uera leniunt: alia stupefa ciunt. Sed stupefacientibus non temere utendum, qua lia sunt collyria è cerusa lota, amylo, opio, & breuiter, quæ opium aliaque id genus recipiunt. Nam uehemen ter fluxiones reprimere non possunt: sed excerni prohi bent, unde erodi corneam contingit si acris fluxio est: ut si multa, magis irritari aut uehementer intendi, nisi me dicamentum fuerit uehemēter narcoticū. Intolerabilis dolor remouetur, sed stupefacto, aliud malum sequitur. Nam uis oculi omnino læditur, ut in posterum uel ni hil, uel hebetius uideat. Hinc quoque relinquitur dura quedam dispositio tunicarum, quæ non facilè corrigi tur. Hæc Gal. qui non solum his, sed & in leniendo dolo re emplasticis pinguibus, nimium adstringentibus, absti nendum putat. Emplastica poros infarciunt, nequid ex halare possit. Adstringentia immodicè eosdem constri ngunt, atque ita interceptis uis, per quas debet fluxionis materia discuti, eadem retenta, in oculis dolores exaspe rat. Sed præter hæc adstringentia tunicas nimium relic cant,



cant, & inde uisum hebetant. Pinguis uerò propterea  
prohibet Gal. oleum & alia id genus, quia in uehementi  
ardore oculi facile incenduntur. Eadem quoque sordes  
faciunt & omnino ulcerum initia sunt. Tutior itaque  
usus est, eorum medicamentorum, quæ reuera anodyna  
sunt, qualia sunt fomenta ex sola aqua tepida, ex de-  
cocto meliloti, chamæmeli, fœniculi, anethi, fœnigræci,  
rosarum, absynthii. Quod si calor multus cōiunctus est,  
ex decocto psilii, foliorum mandragoræ, hyosciami, pa-  
paueris, uiolarum, rosarum, similiter liquor oui, aqua  
rosarum, muscilago seminis cydoniorum, medulla costi  
cydonii, uel pomi alicuius costi in uapore aquæ. Mo-  
derata est muscilago althææ, tragacanthæ, gummi ara-  
bici, lac muliebre, fœnigræci bene lothi, prius infusi  
diem integrum, deinde costi ut prima & secunda a-  
qua abiiciantur, penidia, alphenic, diatragacanthon  
frigidum, amyli muliebri lacte dissoluntur, lenien-  
do leuiter, & citra morsum extergendo, creta simili-  
ter uti licet. Anodynon est oui liquor cum suo uitel-  
lo. Aliquando caphuram miscemus, ut in hoc quod  
lenit & coquit. Muscilaginis seminis psilii, & traga-  
canthæ extractæ in aqua bisimaluæ. unc. ii. liquorum  
oui unc. s. croci scrup. s. camphuræ Gr. vi. atq; meminis-  
se oportet recētibus muscilaginibus & succis utēdū quia  
tino atq; altero die acescunt, atq; corrumpuntur. Quæ  
collyria anodyna dicuntur, ferè opium recipiunt, qua-  
le est diarrhodon nylī, quod etiam ingentes dolores le-  
nit, tenues fluxiones acresq; sistit. Rosarum resectis un-  
guibus dr. s. croci. dr. ii. gummi arabici dr. i. spicæ nardi,  
opii an. scr. s. Cū aqua fit collyrium. Usus tempore lacte  
muliebri, uel liquore oui liquidissimè diluitur. Ano-  
dyna enim liquidissima esse oportet. Arabes hoc colli-  
rium, si est rosatū uocant, atque ita conficiunt. Rosatū  
resectis unguibus dr. xv. croci. dr. 18. gummi arabici dr.  
19. spicæ opii an. dr. ii. fiat. si est cum aqua pluuia. Habēt  
& si est alba, quibus plurimum utuntur, quale hoc est  
in principij inflammationum & dolorum. Gummi ara-  
bici, tragacanthæ, amyli an. dr. s. cerusæ lotæ dr. vi. opii  
dr.

*sa mēta uere  
anodyna :*



# DE COMPOSIT.

dra. j. opium in sapa aut uino dulci temperatur deinde reliquis inūgitur in oui albumine. In usu diluitur lacte muliebri. In augumento hoc conuenit. Sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri, aut asinino dr. s. amyli, diatragacā thi an. unc. s. cerusæ lotæ dr. vi. olibani dr. i. s. opii drac. i. confice cum aqua pluuiā.

*Alexandri mirabile in calida ophthalmia  
& dolore.*

**C**Admiæ ustæ, lotæ drac. x. cerusæ lotæ unc. i. scorizæ ferri vstæ, lotæ unc. s. gummi arabici, tragacanthæ ana drac. 4. olibani, opii ana dr. 2. croci scrup. s. confice cū aqua pluuiā. In declinatione sarcocollæ nutritæ dra. x. croci, spicæ, aloes ana dr. j. Teruntur omnia ex musci lagine sem. sœnugræci. Linimenti modo adhibētur. Sed quia in ocularibus remediis sæpe cadmiæ ustæ lotæ quæ & sarcocollæ nutritæ mētio fit, utriusq; ratio explicanda est. Cadmia itaq; quæ & Cathinia dicitur, uel cuius loco lapide calaminari utimur, ui siccandi & extergēdi prædita vritur & lauatur hoc modo. In frustula magnitudine grani hordei confringitur, melle optimo cōspēgitur, concluditur fictili crudo, cuius orificium operiendo clauditur, lutaturq; . Sed operculū uno uel pluribus foraminibus peruium esse oportet, ut fumus exhalet. Vas autem, ubi coctum est, subiecto igne uel in fornace figulari, iā ignita cadmia & uaporibus nigris in albidos commutatis, qui. f. per foramina operculi exeunt, tollimus, & ablato operculo cadmiā uino austero extinguimus, & mortario terimus, siccāmq; ad medicamenta re seruamus. Aliter quoq; ueteres. Cadmia inclusa fictili uase, puro igne crematur, deinde lacte asinino extinguitur: secundo ac tertio uritur atq; extinguitur lacte: iam tertio usta extinctaq; i mortario affusa aqua fontis diutissimè uersatur, purgatur, siccatur, siccata secundo ac tertio in mortariū repetitur, uersatur ut prius, & siccatur.

Postremo cum aqua pluuiā in mortario circumagitur, siccatur, iam omnis qualitatis expers, ex qua fiat collyrium planè diuinum, ubi dolor sedandus est.

Vlcera implenda, siccanda, hypopia, ubi sistenda est acris

*quo lauit et  
urit cadmia:*



acris fluxio & leniēda calida lippitudo, ubi pruritus, ar-  
dor, ustio, sed peculiariter, ubi detergendū & ficcandū.  
R. *endmia*, ut ante, preparatę unc. 2. *cerusæ* è lacte  
lotæ sæpius dr. 2.s. *Cerusa* cū *cadmia* sæpius miscetur,  
& 15. diebus in mortario ex aqua pluuiā uersantur. Po-  
stremò *tragacanthæ* lotæ & purgatæ unc. s. succo *scœnu-*  
*græci* per noctē imbuitur, ut multum succum imbibat.  
Postridie uniuntur omnia: reponuntur uase uitreo o-  
perto tenui linteo, loco subdiali, & bene puro. In usu  
dissoluitur oni liquore, uel muliebri lacte. *Sarcocolla*  
citra morsum siccatur, coquit. Digerit leuiter, amaricat.  
Trita itaq; maceratur in aqua rosarum tribus diebus,  
tum siccatur & pluribus diebus in succo rubi maceratur  
siccaturq; Postremo infunditur in lacte muliebri, sic-  
cataq; blandissimum medicamentum fit.

*De Repellentibus.*

**R**epellentia duorum sunt generum. Alia leuiter re-  
pellunt, quæ conueniunt oculis, eaq; uel leui frigo-  
re, uel corroboranti adstrictione reprimunt. Alia uerò  
uehementer adstringunt noxia oculis, quia poros con-  
trahunt, tunicas resiccant, exasperant, dolores creant,  
uisum interturbant, quibus tamen aliquando, ut in pro-  
cidentia oculi, sed aliis mixtis utimur. Leuiter repellūt  
rosarum succus, flores, folia nardi, spica, crocus, hypo-  
cistis, oui candidum, muscilago p filii, sumach cydonio-  
rum, aqua rosarum, plantaginis & quod ex mororū suc-  
co preparatur. Succi mororum rubri quartarium unū.  
Siccetur in sole, subinde agitando. Vbi fuerit siccatus,  
imbue liquore oui, & sine siccati in sole. Postremo con-  
sperge lacte muliebri, & fac siccari. Puluilo utere solu-  
to liquore oui, ut lenias & reprimas. Repellunt quoq;  
*cadmia* usta, ut prius, & austero uino extincta: deinde  
trita è pluuiā, & quæ metallica citra morsum siccant.  
Deinde hæc, quæ leniunt quoq; , farinæ capitiū papa-  
ueris & meliloti ana P. j. pul. rosarum P. s. panis albis-  
simi unc. 2. Fiat decoctio in lacte mixtis pulueribus in  
fine decoctionis. Deinde transferantur omnia in mor-  
tarium, & subigantur cum ouo integro & croci scrupu-  
lo.



DE COMPOSIT.

10. In doloribus oculorum abstinendum à multis lin-  
teis, uinculis arctioribus, grauibz sacculis aut cataplas-  
matis: sed tenuissimis linteolis medicamenta continen-  
da sunt, uidendumque ne remedia, quæ adhibentur, do-  
lorem creent, & priusquam siccentur, commutanda  
sunt. Et quia in doloribus oculorum multa fere lachry-  
matio est, quæ uim medicamentorum diluit, propte-  
rea subinde commutanda sunt remedia.

De ulceribus oculorum.

una

Vlcus in alba tunica cornea, genis, angulis oculorū  
à re externa fit, ut stylo, gladio, uel aliter. Præterea  
ab acri fluxione, cui prudentissime occurrendum est, a-  
lioqui ne una procidat & sequatur cæcitas, periculum  
est. Hoc ulcus in genere quidem communem habet  
curationem cum reliquis ulceribus. Vult enim repur-  
gari, sicari, impleri & cicatrice claudi. Peculiariter ta-  
men ex natura partis clementiora remedia desiderat,  
multò magis, si proprietate indiuidui acerrimo sensu  
& purissimo spiritu præditi sunt, quales fere sunt oculi  
cærulei. Declinanda itaq; tū quæ exasperando terget,  
tum quæ mordicando siccant & nimia adstrictione exa-  
sperant, atque hæc ulceri, qua ulcus est, propriè conue-  
niunt. Nam & in collyriis & remediis ocularibus sæ-  
pe mixta inuenias, quæ sunt acria, ut in malignis & ni-  
mium sordibus ulceribus, quæ dolorem leniunt: ut in  
dolentibus, quæ molliunt: ut in callosis, quæ pluri-  
mum adstringunt: ut cum magno impetu irruit fluxio  
in oculos, uel à prolapsu, unde mixtus est. Quæ omnia  
ut nō statim ulceri conueniunt, conueniant tamen per  
accidens. Itaque in fluxionis impetu stalticis uocatis, id  
est, sistentibus utimur, quæ materiam recipiunt frigi-  
dam & adstrictoriam, quale hoc est singulariter prædi-  
catum. Aeris usti, cadmiæ ustæ lotæ quæ ana unc. iiii. myr-  
rhæ, opii ana dra. iiii. acaciæ, gummi arabici ana dr. vii.  
Ex aqua fingitur collyrium, quod liquore oui dissolui-  
tur in ipso uigore, quando sordes & maturatio tum in  
ulcere, tum in lipitudine apparet. Sed hic animaduер-  
tendum, quod sit commune omnibus ocularibus reme-  
diis,



diis, oculos parum affuetos medicamentis sæpe irritari, cum primum medicamenta adhibentur. Quò si contingit, tepefacto liquore oui, dolor sedandus est: deinde medicamentum adhibendum, donec affuescat oculus. Cõueniunt & collyrium prius descriptum in præparatione cadmiæ, additis rosâ, hippocistide, acacia, & drachma una opii in dolore uehementi. Aliud Philoxeni, quod impetum fluxionis reprimat, caput siccat, lenit & stupefacit. Rosarum dr. ii. semin. hyosciami albi, olei unc. i. thuris dr. iii. myrrhae unc. s. farinæ uolatilis, uel hordei tosti unc. ii. s. oui tosti luteum unum, succi mandragoræ, uel hyosciami, apii ana unc. s. croci drac. ii. ex uino austero fit collyrium. Si quid inest duritiei, thus pingue, myrrha, bdellium, galbanum, ammoniacum, similia miscentur collyriis: sed ad sistendas fluxiones, quæue siccescunt, ulcera prohibent & dolorem commouent. Anacolematibus, frontalibus uti conueniet, quorum hæc sit materia, è fabis, febris, tosto hordeo, auena fit farina. Assumitur quoque farina uolatilis: subiguntur autem ex ouorum albuginibus: admiscetur sanguis draconis, bolus armenus, thus, mastiche, gumi, rosarum puluis, fiuntque satis crassa & hærentia cataplasmata. Sed quæ peculiariter extergent siccantque ulcera, alia quidem liquida plurima sicca sunt: liquida lac serosum, uel dilutum suo sero. Seri autem plus miscebitur, ut plus est sordium, uinum conditum, saccharo, diluta malsa, decoctum plantaginis, uel aqua eius addito melle, decoctum scenugraci, quod conuenienter præparatum per se purgat ulcera, nisi sordidiora sint. Nam si tantillum mellis adiicitur, uel pulueris diatragacanthi frigidi, diaireos & similia, sicca pompholyx usta lotaque seu tuthia præparata, endiuia uel lapis calamitaris usta lotaque, ut prius, terra sigillata, lapis hæmatites, recrementum plumbi & ferri ustum lotumque, spodium, antispodia, cerusa, amylum, lac in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitatum donec crassius nigrescat, sarcocolla nutrita, pumex ustus & lotus, ostreorum cinis, ossa sepiæ, gemmæ tritæ, puluis absyn-



# DE COMPOSIT.

thii, plantaginis, bardanæ, clymeni, herbæ scorpiadis, buglæ, saniculæ, herbæ Paridis. Sed melius erit ex his succum exprimere, subigere in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, donec crassities & liuor contrahatur: de inde sicari oportet & ita uti puluere. Cornua cerui, capræ, usta lotaque, antimonium ustum lotumque, uehementiora sunt æs ustum lotumque, scamma æris, uitreolum, cuperosa, arsenicum, sandaraca, erugo: sed his in malignis & plurima sorde madentibus uti conueniet. Ex hac materia concoquentibus, myrrha, thure, croco, galbano, castoreo, fiunt collyria ferè ex succo fœnugræci. Vtimur quoque saccharo cando, penidiis, alphenic, diatragacanta frigida, solutis lacte & liquoribus, qui extergent.

Sic enim lenies, extergebis, & ulcus ad carnem comparabis. Parietaria, anagallis, centaurium minus, absinthium, plantago teruntur in mortario paulatim affuso lacte: exprimitur succus, qui ut prius uersatus in mortario plumbeo ad crassitudinem siccatur, ut fiat puluis è cornu cerui, collyrium expurgat, incarnat, exterit cicatrices. Cornu cerui vsti loti, thuris, plumbi vsti loti ana dr. ii, scamme æris, vstæ lotæ dr. i. opii dr. s. gummi arabici ꝑ. i. cum aqua pluuia fiat collyrium.

Sed hic meminisse conuenit duplicem esse aquam pluuiam in præparandis metallicis: vna enim hyberna est & inutilis: altera æstiuæ & tonitruosa, utilis. Aliud.

Sarcocollæ nutritæ in lacte dra. x. pulueris diatreos simplicis, gummi arabici, tragacantæ ana dr. ij. pumicis vsti lotique in lacte dr. i. ex muscilagine fœnugræci fiat collyrium. Atque hic meminisse conuenit in ulceribus nimium madentibus puluisculis utendum esse: in aliis collyria liquoribus dissolui: lac autem conuenire dissoluendis collyriis, ubi est leniendum & breuiter extergendum: succum uero fœnugræci, ubi detergendum magis. Quod si copiosius quoque detergendum, ueteres succo fœnugræci tantillum mellis addiderunt. Aliud. Pumicis vsti lotiq; dra. ii. gummi arabici, tragacanthæ, an. dr. i. pulueris diatragacanthi frigidi dr. s. cum succo fœnugræci



fenugreci fiat collyrium. Absterget plurimum, ut etiam aspredines & albugines tollat. Vrina pueri impubis æneo uase diu uersatur pauculo melle adiecto, donec sit crassitudo. Materia siccatur, fit puluis, ac primum ut consuescat oculus, muscilagini tragacanthæ, deinde fœnugreci permiscetur, eritq; quadrupla muscilago. Licet uti collyrio diuino antea descripto è cadmia præparata. Ad hæc diarrhodum Nili deterfo ulcere regeneranda caro. Implendis ulceribus oculorum cōueniunt terra sigillata, sarcocolla nutrita, thus, cortex thuris, māna, aloë lota, myrrha, gummi arabicum, tragacanta, metallica, quæ citra morsum siccāt, & alia scripta c. de sarcoticis, quale hoc. Corticis thuris, myrrhæ, aloes, sarcocollæ nutritæ an. fiat puluis Collyrium è cornu cerui antea descriptum & Cleonis plurimum usitatum ueteribus, quod incarnat & cicatricem ducit. Spodii loti, plumbi usti loti an. dr. ii. batiuræ calibis, uel serraturæ eius ustæ & lotæ, croci ana dr. s. gummi dr. i. confice cum aqua. Vsus tempore diluitur liquore oui & lacte, aqua infusionis tragacanthæ, muscilaginis tragacanthæ extractæ in aqua plantaginis, sief de plumbo incarnans & cōsolidās, plumbi usti, antimonii usti, loti, tuthiæ lotæ, æris usti, gummi tragacanthæ an. dr. ii. opii Gra. viii. cum aqua pluuiæ. Aliud, quod incarnat, reprimat, uestigia corrigit & lenit. Tutia, cadmiæ, præparatarum, ut decet, cerusæ, antimonii, olibani an. dr. ii. myrrhæ dr. i. sarcocollæ, sanguinis draconis, aloes, opii an. dr. i. s. ex aqua collyrium è thure, quod mollit, lenit, coquit, incarnat: Thuris dr. x. antim. sarco. an. dr. v. croci dr. ii. ex muscilagin. fœnugr. pleno ulcere cicatrix ducenda est p̄ ea, quæ uocant epulotica medicamēta, quæ citra morsum siccant, qualia inuenias c. de Epuloticis & quod sequitur. Antimonii, blatæ bisantiæ an. dr. x. acaciæ dra. iii. aloes, sarcocollæ nutritæ an. dr. i. confice cum succo rubi. Sarcocolla, ut prius, nutrita cicatricem ducit.

*Hebes usus.*

**V**Isus hebes senio, morbo, frigiditate humorum, & spirituum crassitie immodica, tenuitate spirituum, inopia



# DE COMPOSIT.

inopia utriusque contrahitur. Sed à senio & inopia spiritus uel humorum difficillimè instauratur: In tenuitate spiritus leuiter adstringentibus & refrigerantibus utendum est. Huius rei manifestum argumentum est, quod interdum & in splendore solis statim disperso spiritu & quasi eualescente parum acutè uident. Nocte uero iam cogente & leniter refrigerante, spiritus acutissime cernunt. Id quod uidere licet in felibus, leonibus, pardalibus, & pleroque genere animalium, quibus ueluti igne micant oculi in tenebris. Contra crassitiem humorum & spirituum, detergentibus & incidentibus leuiter quæ corroborantibus utendum est, oxidorchia & oxidorchitas uocant Græci medicameta, quæ hebetudini uisus citra manifestam occasionem ortæ medentur, quorum magna pars e materia constat, quam contra crassitiem facere diximus, quale est Anthonij Musæ, Fellis perdicis siluestris partem unam: succi parietariæ, succi centaurii minoris, mellis optimi ana. Aliud.

Fel gallinæ ueteris succo centaurii pari miscetur, quibus mel sextupla ratione adiicitur. Aliud. Larg. Succi radices fœniculi unc. ii. pari melli commiscetur, reponitur area pyxide. Alii parem modum succi chelidonie permiscetur. Obscuritatem quamlibet persanare scribit Gal. gruis fellis unc. i. succi marrubii & mellis optimi an. unc. ii. Aliud. Fellis tauri, succi fœniculi ana unc. i. mellis optimi unc. ii. Aliud. Mellis scillitici, succi marrubii an. unc. ii. succi granatorum dulcium unc. s. fellis accipitris unc. i. fortiora sunt collyria antea descripta uisum perditum extergente, quæ metallica extergentia recipiunt. At quæ hactenus præscripta sunt, in crassis uaporibus & humoribus conuenire possunt. Conueniunt etiam suffusionibus & maculis oculorum ex detergente, digerente, leuiter corroborante materia. Quod sequitur, maxime probatum est ueteribus, quod maxime iuuat. Scriptores, Pictores, Lectores, Aurifices & quicunque contenta oculorum acie plurimum laborant. Succus exprimitur ex granis punici accidi, ut Aetius: dulcis, ut Octauius. Is succus æneo uase reponitur, quod sit opertum tenui



tenui linteo, quòque exponatur soli, donec crassescat succus. Succo iam crasso par modus mellis additur, miscenturq; & fistili reponuntur. Illinitur medicamento oculus hora somni.

*Ad albugines.*

**I**N albuginibus atque omnino morbis oculi, ubi medicamentorum uim subire profundius uelimus, balnea frequentia imperamus: alioqui iubemus, ut uapor humidus ex aqua primum tepida excipiat oculis: deinde uapor è materia, quæ extergeat: postea medicamentum leniter diuq; affricando adhibemus. In albuginibus sagapenum cum melle distillatum, uel solutum cum melle liquido, uel, ut sit fortius, cum oxymelite scillitico singulare remedium est. Succus anagallidis, parietariæ, chelidoni, amygdalarum amararum cum melle, ac breuiter earum rerum, quæ detergent. Addunt succum papaueris rubri, & quæ gersa serpentaria uocatur, è radicibus dracutii descripta cap. de sarcoticis soluta lacte equino plurimum iuuare potest. Aliud. Fel hirci aut cuiusuis alterius animantis exsiccat in uase æneo, adiecto syrupo de artemisia, ruta, calamento ubi inde puluis factus est, succus marrubii, anagallidis & similium miscetur, & quod inde molliter applicatur oculis. Aliud. Ossis sepię dra. ii. salis ammoniaci, cerusę an. dra. i. ammoniaci sagapeni ana scrup. ii. Fiat puluis. Aliud. Rad. draguntii, aristolochiæ, chelidoni ana unc. s. concidantur in taleolas reponantur in uase æneo. Superfundatur urina pueri impuberis: exponantur soli: siccantur, terantur: tritis adde salis ammoniaci unc. ii. mellis torrefacti tantundem. Fiat puluis. Ammoniacum, saluia matris subigitur & illinitur albuginibus infantum. Mirum est, quod scribunt, butyrum per se illitum mirabiliter conferre in contumacibus. Metallica miscemus uel extergente prædita & collyria, quæ inde comparantur. Aerugo crematur: diu teritur ex aqua plantaginis Capitur unc. s. cui additur cerusę lotę in lacte unc. i. gersę serpentarię dra. ii. trita omnia cum muscilagine seugræci illinuntur.

*Ad*



DE COMPOSIT.

Ad Hyposphagmata.

**I**n oculo resudat sanguis tenuis, atque effunditur in oculum unde rubor & aliquando dolor & inflammatio. Taifati uocant Arabes. In dolore & inflammatione recurrendum ad remedia prius descripta. Quod autem attinet ad remedia propria hypophlegmatis, initio utendum iis, quæ reprimant & leniant: deinde iis, quæ digerant: postremo quæ digerant & corroborent. Primum itaque liquorem oui illinito, & lanam uel linteolum molle in eodem inculcatum adhibeto. Lac quoque muliebre similiter adhibetur. Veteres magnam uim in sanguinibus posuerunt. Alii sanguinem hirundinis primo loco statuerunt: deinde palumbæ, uel turturis: tum columbæ, sed masculi, prætulerunt. Tenellæ pennæ extrahuntur plenæ suo sanguine, & molliter oculis sanguis infunditur. Gal. 10. de simplicibus medicamentis parui facit eiusmodi controuersiam de sanguinibus, utiturque succo scenugræci post initia cum collyriis primum Democratis è myrrha, diasmyrnum: deinde quæ in multo thure fiunt: postremo quæ è croco. Quæ collyria scripta inuenias septimo Aetii, & Pauli, & quarto κατὰ τὸ πρῶτον. Rosas uel rosarum magma aqua rosarum & uino incoques, & tepida oculis admouebis. Nam & tepidum oui liquorem & reliqua remedia tepida adhibemus. Alii bolum armenum, terram sigillatam, argillam ex liquore oui dissoluunt & adhibent. Post initia lini semen teritur cum butyro, totum uehementer exprimitur, & pingue expressum illinitur. Mirum est, quod scribit Archigenes, Hysopi coma trita & linteum inuoluta, deinde inculcata in aqua calida, si inde foueatur oculus, sanguinem diffusum ita extrahi, ut si linteum exprimatur, sanguinem reddat. Arabes plurimum utuntur arsenico bene loto, sublimato rursus loto ex aqua coriandræ, præsertim ubi iam hyposphagma liuorem duxit. Leue collyrium digerens. Thuris dr. iiii. diligentissimè conteruntur: deinde in collyrium uniuntur cum aqua sequenti. Salis ammoniaci, salis gemmæ, an. dr. i. liquecant in aqua pluuiæ, qua thus uniatur. In usu dissol-



solvitur aqua, uel succo coriandri. Fortius est quod sequitur. Thuris, myrrhæ, croci, ammoniaci ana drach. j. sublimati bene loti cum succo uel aqua coriandri dr. s. cum eodem succo uel aqua fiat collyrium, quod adhibeatur cum eodem succo, uel aqua. Fortius. Arsenici bene loti sublimati prius, deinde rursus bene loti & confricati cum aqua coriandri drac. ii. sarcocollæ, piperis, ammoniaci, lapidis lasuli ana dr. j. cum aqua, in qua drac. s. salis ammoniaci dissoluta sit. Fiat collyrium. Fiunt foci in declinatione ex decocto absynthii, meli lori, chamæmeli, fœniculi, hyssopi, & remedia adhibentur, quæ scripta in albugine.

*Ad œdemata oculorum.*

**A** Pituita, quæ in oculis diffluit, mollis, laxus & indolens tumor circa oculos nascitur, genas ferè occupans, qui bene purgato corpore, his remediis dissolvitur. Primum fouetur locus ex aqua tepida cum spongia molli. Faba, lens, cicer in aqua cum tantillo aceti. Horum unum, uel omnia percoquunt: deinde trita pressaq; cribro culinario transcolantur, mel adicitur, cataplasmatis modo adhibentur. Postea uerò, ubi magis discutiendum est, hyssopus & pars radicis figilli beatæ Mariæ cum dictis leguminibus coquitur: alioqui creta oxycrato uel lixiuio dissolvitur, aliquid mellis additur, & ita illinitur.

IN



# In libr. 5. Galeni

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ.

*De Hypopiis.*

Υ

ωπιου per ω in secunda syllaba  
& in penultima, sugillatio est, quæ  
ferè fit sub oculis genere ecchino-  
matū, id est sugillationum cōprehē-  
sum. & παπυς, verò per υ & , in penul-  
tima, ocularis morbus, cum pus fu-  
sum cornea includitur. Differt hy-  
popiū, quod est sugillatū, ab hyposphagmate, quia hoc  
in oculis: hypopium uero, in genis & malis. Conueniūt  
autem remediis. Nam ubi graue malum est, phleboto-  
mia, clysteribus, purgationibus, apophlematismis, sed  
senioribus, communiter utendum est. Quod ad topica  
attinet, primū quidem leuiter repellentibus, mixtis  
modice digerentibus, multo magis in hyposphagmate  
utendum est. Initio ergo caseo recenti: diarrhodum Ny-  
li soluto in decocto meliloti, alijs quoque similiter re-  
pellentibus & leuiter digerentibus utendum est: ac bre-  
uiter, quæ in hyposphagmate descripta sunt circa ini-  
tia, non inueteratis hypopiis conueniunt. Recentiores  
rosaceo, oui candido, insperso puluere myrtillorum  
utuntur: deinde speciebus sanguinis, quæ descriptæ sunt  
in hyposphagmate, farinis fabarū, hordei coctis in oxy-  
melite. Egedem farinæ saluia subactæ tergent, leniunt,  
discutiunt. Fotus ex aqua tepida, ex decocto chamæ-  
meli, meliloti, althææ, ac tandem sœnigræci, oui luteum  
cum melle, faba, uino macerata leuigata. Item quod  
sequitur. Litargiri, cerusæ ana unc. i. cum melle subi-  
gantur, nutritum primū rosaceo, deinde chamæme-  
lino, dissolutum unguentum rosatum tantillo syrupi de  
absynthio mixtum iam nigricantibus hypopiis, nux-  
tancida & iam oleosa cum melle subigitur, & supine  
decumbente agro ne excidat, hipopio tribus horis ad-  
hibetur, quæ cum excidit, alia reponitur. Panus in-  
culca.



culcatus oleo de kerua, oleo de nucibus, uetere, de ricino & similibus, panis diu mansus & salina subactus, cuminum nodulo includitur & feruenti aqua salsa immergitur, & ita imponitur. Serpentis exuium melle uel aqua marina subigitur & imponitur. In remedijs precipua sunt, iam plurimum nigricante hypopio, raphanus, radix bryoniae: dracunculi, sigilli Mariae, quae primum cum butyro, deinde per se adhibentur. Quod si inde ardor & mordicatio excitatur, tepida locus foueri debet. Si locus uehementer intumuit, fotu tepidae exspongia plurimum utendum est, deinde inungendum anethinum. In inflammatione diu foueto calida, & farinas coctae fabae & leguminum scriptorum in Hypophagmate colatorum, ut prius, cribro culinario cum melle imposito. Quod si fissura quaedam coniuncta est, ad remedia glutinatoria, qua parte uulnus est, decurrendum.

*De Aegilope.*

**A**egilops paruus est abscessus inter os nasi & maiorem angulum oculi, periculosus, propterea quod excarnis locus est & uicinus oculo. Primum itaque Aegilope nascente repellentibus ualide utendum est: facto uero aegilope, diaphoreticis, primum citra morsum: deinde fortioribus utendum est, adhibita cura, ne quid diffuat in oculum. Ac breuiter inflammationum modo curandus est. Propterea neque phlebotomia praetermittenda est e cephalica, neque purgatio, si fuerit opus. Cucurbitulae quoque & masticatoria usui sunt. Vbi uero suppuratio facta est, ampliandum uulnus ut pus effluat, & non corrumpat. Os aperto abscessu purgandum mellicrato, melle rosato, & alijs id genus. Purgatum ulcus abluendum e uino, implendum sarcoticis Aristolochia, manna, thure, aloe, myrrha, resina, sarcocolla, chamedri, ruta, & alijs, quae scripta inuenies cap. de sarcoticis. Ex quo epulotico citatrix ducenda est. In Aegilope difficultas spirandi, in laeso osse, sed iniuria leuis tantum asperato: maior uero iam carioso; maxima, ubi iam ad colatorium os & malas corruptelas transijt, ubi fistula ducta est, & muscosa caro

atque



# DE COMPOSIT.

atque corrupta. Hic ergo ueterum & Recentiorum consilium est. Diuidendus angulus, in triangulum, ut apex trianguli uersus radicem nasi: litera uerò & basis ad oculum uergât. Quòd si caro corrupta, aut callus prohibet, catharteticis utendum erit, quæ scripta inuenies cap. de pyroticis. Ampliatum uulnus primum implendum uel spongia, uel medulla sambuci intorta, ne scilicet, coalescat. Quòd si tantum asperatum os est, rasura sufficit: si cariosum, tenui & retuso cauterio utendum est: quod cum sit, muniendus oculus spongia, quæ sit imbuta aqua frigida. Sed priusquam cauterium imprimatur, uidendum, quòd perueniat ossis corruptela. Aliquando enim sursum ad colatoria uergit nonnunquam ad malas. Atque quocumque uergat, cultello aperiendus locus est, ut fiat uia cauterio. Iam repurgato osse, ægyptiaco mixto cum melle rosato, & syrupo de absynthio utendum est, quod medicamentum etiam os purgare potest, siquidem leuis est iniuria. Veteres cephalicis utuntur, scriptis cap. de sarcoticis. Archigenes inurebat plumbo liquefacto per infundibulum missio. Recentiores aquis Alchimistarum fortibus utuntur. Sed primum permiscet lacti, uel muscilagini althææ, lini, scœnogræci, uel tragacanthæ extractæ in aqua uite: postea solis aquis os attingunt. Utuntur purgantibus & incarnantibus ex succo agrimonie, apij, absynthij, ruthæ, melle rosato, syrupo de absynthio, aloe, mirrha, sarcocolla, usto alumine, antimonio, mixtis in putri carne puluere ægyptiaci, mercurij cum alumine usto. Superponunt emplastrum diachalciteos, quod sit recens factum & repellens, partem per ambitum fouent uino rubro decoctionis ros. chamæmeli. Supponuntque lintea inculcata in dicto uino post adhibitum emplastrum diachalciteos. Parant & mundificarium, quod uocant ex farina fabarum & hordei cocta in prædictis succis addita, in terebinthina lota in uino albo. Purgato ulcere ueteres probant alumen ustum terebinthina, uel tri subtilissimè triti puluisculum, rutam pistam cum uino granatorum. Discutiendo uerò nucem rancidam coactatam, & appositam, camomili folia uel mansa, sub-

acta



aſta cum ſaluia ſaſſa.

*De Onthis ſeu uariis.*

**O**nthi, quod ſint ſimiles, *ὄνθι*, id eſt, ſimo, & faciem conſpurcent, appellati. Vari à Latinis tubercula parua, dura, in cute faciei à crallo ſucco orta. Remedijs egēt ut Galenus ſcribit, mollientibus, quia dura: diſcutientibus, quia alienam materiam in ſe continent. Veteres Medici incidentia & tergentia uidentur miſcuiffe. Fricabis, ergo mixtura pari mellis & aceti, amygdalis amaris aceto piſtis, lithargiro ſubtiliſſimè trito, concorporato terebinthinæ liquidæ, & butyro. Poteris intermiſcere aliquid fellis caprini, uel ſimilis. Liliæ radix uel panis porcini melle ſubigitur, lapis calaminaris ſubtiliſſimè teritur, maceretur in aceto, & ſiccetur, quadruplo melli permiscetur. Saponis unc. ii. olei amygdalarum amararum unc. i. aceti unc. s. offis ſepiæ triti & pulueriſati dr. ii. Pomata oleo ouorum, uel de tritico diſſoluitur, aceto albo addito, & illinitur. Gummi arabici album, ſal torrefactum, utrunque ſubtiliſſimè tritum acri aceto diluitur. In calloſis & inueteratis Variis ammoniacum, ſapo, galbanum, opopanax, & alia id genus aceto diſſoluta prædictis miſcentur. Qui ſi contumaciores ſint, aliquid metallicorum acrium detergentium intermiſcetur, quemadmodum & in tumoribus ſiſcoſis, ulcerofis, ſubrubris, rotundis dolentibus. Vnde principium impetiginis, mentagræ aut lichenis agreſtis, quæ materiam habeant craſſam, permixtam ichoribus acribus. Nam hæc ubi tranſierint in impetiginem, rarè niſi acribus permixtis & medicamentis ecdoriis, id eſt, excoriantibus curantur. Primùm tamen leuioribus utemur: dein de contumaciori malo tranſibis ad ecdoria, id eſt, in materia impetiginum. Hæc ſunt acetofitas citri, aqua uitæ, elmi incluſa in folliculis, aqua fabacearum, florum fabæ, centaurii minoris, parietariæ, enulæ, gentianæ, ranunculi, ari, bryoniæ, anagallidis, & his fortiores aquæ ſublimate & uocatæ fortes. Oleum ex eadem materia, de tritico, de ſulphure, de uitreolo, de ouis, de fraxino. *Εκδορῖα* ſunt metallica acria, æris ſquamma, lapis calaminaris,



## DE COMPOSIT.

minaris, sulphur, ærugo, arsenicum. Diu teruntur ex aceto acerrimo. Pastilli fiunt, qui ceratis liquidis permiscuntur. Cetera fiunt ex cera fulua, uel, ut fortiora, uiridi, oleo conuenienti, & ut hæreant magis, terebinthina mixta superponitur, uesica bubula, aut eius membrana suilla uel simili. Medicamentum tota nocte finitur, uel ad horas multas, lacte, sero lactis, aquis memoratis tepidis facies abluitur: repetuntur medicamenta, donec exarescant, pustulæ & ulcera in medicamentis leuioribus, sanguis leporinus illitus, salina præmanso sale, ouum integrum triduo maceratur. In mixtura sulphuris & aceti post triduum abiecta testa, ouum ex ea mixtura subigitur & illinitur. Gummi cerasorum, aceto dissoluitur & illinitur, radix enulæ & lapathi acuti coquantur in aceto ad putrilaginem, tepido aceto, permixto melle affricatur locus: deinde radices pistæ cum axungia uiperarum illinuntur. Psoricum Melue, salina ieiuni hominis, & liquido melle dissoluitur. Fraxinus uiridus crematur, salina excipitur, quam extrema reddunt. Sublimatum & cinabrium, aliaque ecdoria in mucagine gûmi arabici, uel tragacathæ, uel muscilagine sænugræci illinuntur. Sed in usu *ἐκδορῶν*, extremæ partes impetiginis, & quæ sanæ uicinæ sunt, medicamento repellente, & quod inflammationem prohibeat, muniendæ sunt, cinabrium, thus, mastiche, æqualiter miscuntur cum aceto. Fiunt pastilli, unde fumus excitatus loco impetiginoso excipiendum munitis oculis, ore, & naribus. In his omnibus meminisse oportet, priusquam adhibeantur, habendam esse rationem totius corporis, ut scilicet, aliquoties repurgetur, atque medicamenta, ut facilius subeant, malaxata impetiginosis partibus adhibentur. Malaxantur autem dococto maluæ, bisinaluæ & similia.

### *De dentium affectibus.*

**D**entes uiris serè triginta duo: mulieribus, uiginti octo. In utroque dentium ordine quatuor acuti & lati, ut prehensum cibum solidum incidant, unde *τομῆς* & *τέμναι*, iidem *χλασῖνοι*, quod in risu sese maxime profe



proferant. Inter quos duo medii & præcipui columelares exoriuntur ferè primi septimo mense, quanquã aliis tardius. Hos ad latera canini duo sequuntur acuti qui dè, sed nò lati, ac potius in cuspidè acuti. Configunt dura uì maiore & diuidunt duo numero in utroq; ordine. Ad decimum ferè mensem aut nonum enascuntur. Sequuntur maxillares plani, firmis radicibus defixis, in quibus, qui genuini uocantur & postremi erumpunt, tardissimè apparent, uix anno uigesimo, ut Aristoteles uoluit, aut post genituræ profusionè, ut Auicenna. Varro anno ferè septimo. Reliqui maxillares ante secundum annum & secundo anno producantur. Primores uulgius maxillares parum deflexa uoce, maxillarios. Crescunt dentes, quia nutriuntur, & assiduo teruntur mansu. Excidunt omnes ætate, sed postremi maxillares neruos subfratos habent à tertia coniugatione, qui affecti imaginè præferunt laborantis dētis, quò & gingiue. Dentes aut in propria substantia & sentire & dolore cōtra multorū sniam affirmat Gal. 16. de usu partiū, & 5. κατὰ τὸ πρῶτον. Hyistoriā dentium scribit Aristoteles 4. cap. 8. lib. 5. de gene. animalium: ca. 1. li. 3. de Partibus animalium: ca. 1. 2. 3. 4. lib. 2. de Hyistoria animalium: Gal. undecimo de usu partium. Plinius ca. 37. lib. 11. Celsus, cap. 1. lib. 8.

Sunt autem affectus dentium communes reliquis ossibus, quia exasperantur, roduntur, perforantur, cariem ducunt & rubiginem, nonnunquam quoque ab affectione, quæ sit similis inflammationi, liuentque omnia à saniosa, acri, & uirulenta materia. Proprius affectus dentium neque communis reliquis ossibus dolor est. Itaque in corruptela dentium tria genera sunt remedium. Nam dens corruptus & uitiosus ferro extrahitur, uel medicamentis acribus, siccatur, tabescit, ut deinde spōte sua excidat. Tertium remedium, ut quod est incolume relinquatur. Instrumentum quo dens extrahitur, ὀδονταγωγὸς à Græcis Medicis appellatur, forceps (ut dicat quispiā) dētarius. Sed de extrahēdo dēte nō satis cōuenit inter ueteres Medicos, quanquã magna pars

Λ

uitiosum



DE COMPOSIT.

uitiosum & corruptum dentem extirpandum credidit. Erasistratus non temere extirpandum putat, eiusque rei testimonium adducit, quod apud Belgas in templo Apollinis ὀδονταγωγὸς, forceps dentarius, plumbeus suspenderetur, quo significaretur non esse tollendum dentem, nisi uacillet, ut plumbeo forcipe excludi possit, id est, nulla ui, qui si qua parte scariosus fuerit & uitiosus, uitium scalpo atteratur relinquatur quod est sanum. Ac re uera nō temere euellendus dens est, sed si corruptus, totus tabidus, uacillans, si nerui subiecti inflammatio, à qua periculum imminet. Sic enim ex cluso dente liberatus neruus iam non apprimitur, sed transpirat & remedia conuenientia admittit. In corruptela uidendum quanta ea sit. Aliquando enim superficialis est, aut extremæ parti insedit, quomodo in ossibus asperis & cariosis non os totum excindimus, sed alveolam & cariem scalpro deradimus. Ita in dente aut pars quædam deciditur lima, radice incolumi. In medicamentis autem, quæ hæc faciunt, exsiccant & tabefaciunt, acria sunt omnia, Lac tithymali, exuium serpentis. Gummi hederæ vulgo cognitum est remedium, quod religione quadam colligitur post medium Augustum, & intra idus Septembris eoque utuntur ad dolores dentiū. Exuiū uero serpentis remedium est memoratum ab Antiquis. Gal. 11. de simplicibus decocto eius utitur contra dolores. Archigenes cōburit, miscet oleo, & melli, illinit ægro denti, minutis cera, uel re simili dentibus uicinis. Idem quoque nō vltum denti admoget, ut excidat, pyretrum, aut radicem cucumeris agrestis in aceto acerrimo triduo maceratā teres. Indes purgato denti. Id ad tres aut quatuor repetes, ut dens excidat.

Adeps ranæ uiridis dentē depellit. Licet quoque uti cauteriis per canaliculum denti impositis, atque cauteria modo è ferro, modo è testa nucis, radice gentianæ & similibus comparantur. Sunt qui oleum calēs uel aquas fortes denti immittant, ut excidat.

*Contra uermes.*

**V**ermes aiunt subnasci dentibus & hos arrodere, à quibus

*que extrahant  
gummi hederæ*



quibus dolor nō ita fortis, pruriginosus, nulla aut pa-  
ca saluatio. Hi amaris rebus enecātur, decocto cētaurii  
colocyntidos, pilulis cōmunibus, aloe, mirrha, semine  
cappæ, porri, ceruino cornu, puluere contra uermes &  
aliis id genus. Quod autē uulgus sibi persuadet, & ab  
Antiquis Medicis scriptum est de suffumigio ē semine  
hiosciam, uidetur fabulosum. Nam inde aiunt manife-  
ste uermes excidere. Reuere incenso semine euolāt tā-  
q̄ uermiculi, ēt si nō attingat fumus uermiculosum den-  
tē. In doloribus dentium remedia multa sunt. Phlebo-  
tomia, ubi inflammationis suspicio, præsertim in neruo:  
purgatio totius corporis. In uitio humorum, clysteres  
acres, cucurbitulæ in ceruice & scapulis, extremarum  
partiū frictiones, errhina, masticatoria, & quæ uia flu-  
xioni intercipiunt. Anacolemata, id est, frontalia, foris  
malarū & faciei, periamata quæ uel ē collo suspendun-  
tur, uel alligantur carpo, Topica denique dēti adhibi-  
ta. Horū materia fere incidēs, digerēs, calefaciēs, quia  
fere a crassis humoribus & flatibus doloris excitatur,  
mixtis aliquādo adstringētibus, rosis, galla, mallicorio  
& similibus. Ac fere collutiones sunt materia in aceto  
cocta. Itaq; origanum, hisopos, satureia, calamenum,  
nasturcium, maiorana, pulegium, thimum, saluia, adhuc  
pyrethrum, qui pes Alexandrinus dicitur, Galanga, pi-  
per, & alia id genus aceto coques ac inde collues, uel fu-  
mum ore excipies mixtis circa initia rosis, malicorio,  
balaustijs, ubi non uidebitur caput nimis redundare ex  
crementis. Post colutionem hianti ore si fiat æger pitui  
tam defluere. Hipp. 7. Epid. catoreo, pipere concoctis  
uino, diuque contentis ore dolores dentium & gingi-  
uarum coniugis Aspasii liberat. Mentastrium cum radi-  
ce euulsum & in peluim datum, conspersaque aqua ca-  
lida fumū reddit, qui obuoluto uestibus ægro exceptus  
ore dolorē mirabiliter sedat, præsertim si æger in lecto  
bene coopertus quiescat, & moueatur sudor. Dioscori  
des radici altheæ uel hisopo coctis in aceto, ut inde fiat  
collutio, magnā uim tribuit in doloribus dentiū. Ranæ  
uirides in aqua & aceto coctæ simile ius reddunt. Ace-

*ad dolores dentiū*

*topica & doloris  
dentiū*



## DE COMPOSIT.

tum scillicitem colluitur. Dens caninus vltus tritus co-  
quitur in aceto ad collutionem. Allium tritum respon-  
denti carpo alligatur. Ranunculi similiter folia alligan-  
tur, sed exulcerant. In dentientibus pueris lac caninum  
gingiuis abluitur, cremor lactis, butyrum recens, sub-  
actū ex aqua uiolarū. Cerebellū leporis phisicū est ap-  
pensum pueris, cornu ueteris cocleæ, ubi dolor a calo-  
re ortus est, aqua rosarū cum caphura colluitur. Deco-  
ctū papaueris, uel radice mandragoræ & hiosciam, so-  
lani, pillulæ de cinoglossa, quæ contra omnes morbos  
dantur, leuiter solutæ butyro induntur denti. Materia  
Anacolematū, errhinorum, masticatoriorum prius de-  
scripta, similiter sacculorum, cataplasmatum & fomen-  
torum in materia oculorum.

### Ad dentes mobiles.

Senibus consumptis dentium stabulis, ictu concussis  
dentibus, neruo, qui dentes firmat, emollito dēs mo-  
bilis uacillat. In senibus collutio ex adstringentibus co-  
ctis austero uino. Eadem collutio ictu concussis. Sed in  
neruo, qui multa pituita mollior ac infirmior est, om-  
nibus modis uacuanda pituita est pharmaco purgante,  
errhinis, masticatoriis. Deinde ad collutiones siccantes  
& adstringentes veniendum, alioqui adstringentia ex-  
cepta melle rosato, syrupo myrrillorum, conserua rosa-  
rum, cornorum & similium adhibentur denti. Acetum  
scillicitem confirmat dentes, & constringit gingiuas, lac  
asinum similiter; vltimi cortex & ramuli in uino cocti,  
ut inde colluas. Materia adstringentium sæpius descri-  
pta est, describeturque in stomachicis.

### Ad corrosos dentes.

Materia uacuanda medicamento purgante, quod uel  
bilem flauam, uel atram, uel pituitam falsam pur-  
get. Eiusmodi uitium aliquando nascitur communi  
uitio totius corporis: aliquando assidua fluxione e cere-  
bro: nonnunquam hepatis aut potius lienis uitio. In re-  
mediis localibus consensus est Græcorum & Arabum,  
nigella romana torrefit, teritur ex aceto acri, denti im-  
ponitur, zinziber, radix capparis, angelicæ vel silphii,  
tormentillæ



tormentille vel lapathi acuti in aceto coquitur, acetum colluitur, coctæ radix adhibetur denti, benioin, opopanax, soluta oximelite adhibetur denti. Sal ieiunio sub lingua liquatus & retentus ore dentem prohibet à putredine & erosione. Sal cum alumine uritur, extinguatur aceto, acetum colluitur, materia denti applicatur.

*Ad dentes malè coloratos.*

**Q**uæ dentes præseruant, sunt materia eorum, quæ siccant & abstergent, unde sunt dentifricia, sal torrefactum cum melle, puluis parietariæ, amigdalæ amaræ, cornu cerui, margaritarum puluis, rasura eboris & coralli, gersa serpentaria, iris florentiæ, marmor tritum, pumex ustus, os sepia, lana succida colligata linteolo cum tertia parte salis. Vritur cinis capitis vulpini & leporini, quibus pulueribus aromatica miscentur, santali rosæ, cinamomum, lignum aloes & similia arida dentibus affricetur, concorporentur melle rosato, uel anthozato. Materia uino decoquitur ad ablutiones & collutiones dentium, sed & ex ea materia, quæ ad collutiones doloris dentium, coquitur, remedia parantur, præsertim quæ aromatica sit: Repurgatur dens uirga roris marini uel lentischi. Contra uero corrumpit dentes, quæ nimium calida, nimium frigida, sed præsertim ubi deinceps & interiecta pauca mora nunc calidis, statim frigidis attinguntur dentes. Adhæc pinguis, acerba, dulcia, uiscida, frequens uomitus, dura, lactis multus usus, magni pilces & pingues, raphanus, porrum, brassica.

*quæ corrumpit  
dentes.*



# In libr. 6. Galeni.

κατὰ τὸ πρῶτον.

*De oris affectibus.*



INflammatiō oris, ut affectus indicat, post habitam rationem totius corporis initio eget repellentibus medicamentis, quale est mulsā, in qua rosā coxerint. Ac mulsā melior fuerit cōparata ē rosatio melle, aut mixtura aquæ & cōserua rosarū. In cremētis & uigore miscenda, quæ concoquunt, ficus, unæ passæ, myrrha crocus. Postea quæ discutiunt, sulphur uiuum, nitrum, sal ammoniacum, & quæ eius sunt uirtutis. Ex natura partis repellentia & digerētia leuiora sunt, quia cutis oris reliqua cute corporis mollior & rarior est. Deinde in ea materia seligi debet, quæ nihil graue oleat, aut sapiat, quæque nihil mortiferum habeat. Præter hæc, ab his omnibus metus est, non solum propter os, sed propter subiectos pulmones & uentriculum, ad quos ab ore patens uia est. Alia quoque ratio ex natura corporum, quia pueris, mulieribus & omnino mollioribus corporibus leuius medicamentum comparandum. Propterea Galen. diacaryon simplici in his utitur, sed sine adstringentibus pulueribus, acris & aliis. Sed hoc quoque considerandum in mixtura mellis. Medicus enim aliquid concedit saporī & ori: deinde in acri & tenui fluxione minus intermiscet mellis, ne, scilicet, mel fluxionem attenuet, & propterea acriorem reddat. Diacaryon medicamentum ex succo primū & melle cocto Galen. conficit. Sit autem inodus mellis subduplus, subquintuplus. Mamiis, qui dulcibus gaudent, & ubi crassa materia est, plus mellis: in contraria conditione minus, miscendum est. Propterea mirandum non est quod aliter Paulus, Aetius, Alexandrinus, Nicolaus diacaryon conficiunt.

Paul.



Paul. Succicortium exteriorum nucis expressio Iulio  
mese ante maturitatem nucum heminas, quinque mel-  
lis, heminam coque ad dimidium: deinde adde myrrhe  
dr. ii. croci, aluminis an. dr. i. in declinatione nitri, sul-  
phuris an. dr. i. pro hemina succi unc. x. accipies: pro he-  
mina mellis unc. xiiij. cum dimidia, quod magis conue-  
nit in crassa materia. Succipercolati heminam unam,  
mellis heminam unam, glicirrhizæ unc. i. coques primum  
glicirrhizam cum succo, deinde mel adicies. Alexand.  
succil. vi. mellis lib. i. s. coque ad spissitudinem in ua-  
se stanneo duplici. Coctis adde mirrhæ drac. iiii. croci,  
omphacii an. drac. ii. aluminis scissilis dr. i. Illinitur me-  
dicamentum cynanchicis & faucibus exulceratis, uel  
oximelite colluitur, aut prædicta mulsa, in qua rosæ præ-  
coxerint. Nicol. succil. iiii. bulliant una ebullitione.  
Adde tunc mellis lib. ii. coque ad spissitudinem. Tum  
adde initio pul. rosarum, balaustiorum, aluminis an. dr.  
i. in incrementis & uigore glycirrhizæ unc. s. croci, myr-  
rhæ an. drac. i. In declinatione, boracis, nitri, salis ammo-  
niaci an. drac. s.

δια μω'ρω.



# In libr. 7. Galeni

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ.

δια μύρων.



Ororum duo genera. Alterū celsū ,  
domesticū ferē & esculētum. Alte  
rū bati, id est, rubi. Ex utroq; dia  
morō fit. Sed quod ex succo moro  
rum rubi fit, uocatur diabatinō. Ini  
tiō inflātionum oris solo succo  
uti licet, sed ex rubentibus, necdū  
maturis exprimi debet. Nunc aliquid syrupi myrtillo  
rum, uel rosarum siccarum succo misceri pōt. Ad usum  
verō, ut seruetur succus melle concoquitur. Efficacius  
fuerit, si uel myrthinum, uel rosatum loco mellis com  
munis misceas. Parari potest cum saccharo rosato atq;  
succo ad mel quadrupla, quintupla, sextupla, proportio  
est, præsertim ubi per multos menses seruandum non  
est. Succus seorsum cōquitur: deinde mel, aut saccha  
rum adiicitur. Coquitur in uase æneo stannato ad syru  
pi crassitiem. Octavius in diamoron bati, batina mora  
collecta triduum asseruat, priusquam exprimat succum.  
Initiō, ut magis adstringat medicamētum, omphacium,  
omphax, rosæ siccæ, balaustium, malicorium, & breui  
ter quæ adstringunt, misceri debent. In uigore, quæ mi  
tigant, decoctum ficuum pinguium, passularum munda  
tarum, glycirrhizæ, decoctum bisinaluæ, quo hoc medi  
camentum dilutius esse debet. In declinatione permi  
scetur multa in qua coxerit ea materia, quæ descripta  
est in dolore dentium a materia frigida. Varia autem  
est mixtura. Hieræ succi lib. vj. mellis lib. j. uini austeri  
vnc. x. croci drac. j. mirrhæ dr. ij. omphacii drac. j. alum  
nis dr. s. Gal. succi lib. v. seorsum coquantur. Mellis lib.  
j. adiiciatur. Coctis & ab igne depositis adde croci, myr  
rhæ ana drac. j. s. omphacii dr. j. siquidem ut heras auste  
ri



ri uini unc. x. medicamento permisceas. Quod si citra uinum, omphacii unc. j. duas, uel tres permiscere potes loco omphacii, uel succi rhu, uel uinum granatorum austerorum misceri potest. Quoadmodum & balaustrum & malicoria, si quando, miscentur ex austeris malis puniceis meliora sunt. diamoron bati, ut Alexandrinus, Succimorum bati lib. ij. mellis lib. j. sapæ lib. s. coquantur omnia lento igne, uase æneo stannato ad syrupi crassitudinem. Seruetur medicamentum eodem uase. Nicolaus in antidotario miscet succi mororum celsi lib. s. succi batinorum lib. j. sapæ unc. iij. coquit, ut Alexandrinus. Aliter quoque Mesue. Sed mixtura Galeni & ratione semper utendum est.

*Diapason, ex granatis.*

**G**ranatorum tria genera. Austerum, quod adstringit: dulce, quod lenit: acidum, quod altius penetrat. Ex his succus exprimitur, uel integris cum suo malicorio, ut magis adstringat: cum nucleis, ut mediocriter: cum pulpa sola, ut minus adstringat. Quod adstringit magis, initio coctum per se conuenit sine melle, quia tum resolutione nihil est opus. Atque ut ualentius adstringat, aliquid adstringentium puluerisatorum concoqui potest: ut sit iucundius medicamentum quarta pars syrupi rosæ de siccis, uel myrthorum, uel cydoniorum misceri potest. Postea quoque mel rosatum, aut sine his conserua rosarum siccarum & similia. Mel autem adiciendum magis, cum digerendi locus est. Coqui debet in uase æneo stannato, rudicula agitari ex materia, quæ adstringat, qualis est rubi. Succus ita coctus, ros ab Arabibus appellatur. Incrassatur aliquando sole. Aetius hoc modo confecit ex Galeno. Ex tribus generibus granatorum lib. 3. mensura nostra aut pondere exprimuntur. Galenus addit exprimi oportere cum suis corticibus tuis: Aetius addit glycyrrhizæ unc. j. decoquit ad spissitudinem tum addit mellis unc. 13. 14. 15. contra inflammationes oris, fastidia ciborum, & alui fluxiones. Medicamento, addi possunt, quæ in medicamento diamoron, & diacarrion



## DE COMPOSIT.

tion dicta sunt. Eodem modo è succo cotoneo cum prunorum acerborum, qualia quæ uulgò dicuntur (prunelles) & genus quoddam, quod tardissimè maturatur, berberorum, cerasorum adstringentium, grosellarum (gallicè groselles) cornorum, sorborum, mespilorum omphacis, agrestæ, stomachica conficies, Sed ut acerbitas uincit, ita plus mellis miscendum est in his stomachicis. Quædam parantur ex materia esculenta, & hæc non solum inflammationibus oris, sed fastidia ciborum, fluxionibus alui, & uomitionibus conueniunt. Alia ex materia non esculenta, ut quod paratur ex corticibus nucum, quæque alumen, sulphur, calcanthum & similia recipiunt. Hæcque solum stomachica sunt.

### *De Gargareone inflammato.*

**G**argareo defluxu humorum aliquando nimis relaxatur, ut quasi flacidus concidat, quod malum medicamentis adstringentibus & siccantibus curandum, casum. Vuluam appellant, quanquam uuæ morbus uel uulua, abscessus est in extremo gargareone eo modo, quo si digitus inflammatus in extremam sui partem materiam inflammationis transmitteret, uel ea parte tureret magis. Initiis inflammationis clystere, uel potione mollienda aluus, sanguis è cephalica detrahendus, cucurbitulæ ceruici affigendæ. Diuidendæ uerò, quæ sub lingua sunt, quies, inedia, alimenta sordida imperanda sunt. Interdicendum uino, acris, duris. Topica initio repellant: in statu misceantur, quæ mitigent: in declinatione, quæ discutiant. Abeunte malo in uuam appellatam, animaduertendum an rubeat doleatque. Sic mitigatoriis & discutientibus, ubi liuescit, præcidere oportet. Nonnunquam exulceratur, ubi ad curationem ulcerum recurrendum, ut purges, in carnes, cicatricem ducas. Sed in materia, quæ hæc efficiat, esculenta, aut quæ nihil habeant uirulentum, eligenda, quanquam aliquando ubi ea ulcera serpunt & putrida sunt, calcantho & similibus metallicis uti licet. Sed ne deuorentur, prouidendum, atque ea materia ex secundo de materia Chirurgica repetenda. Quæ repellunt, alia sunt leuia, sapore



sapore austero, aut leuiter adstringētia, palmulæ, rosæ, capreoli uitis rubi genera, cytini, id est, hypocistidis, austera mala & pruna. Talia cerasa, pyra, radix mori & similia. Alia uerò media, myrthus, myrrha, illicis & quercus folia, glandes, mēspila, cotonea, castanea, echini. Fortia sunt thu, melicorium & balauſtia, ex austeris punicis galla, alumen. Materia incoquitur aqua uel oxocrato ad gargarismum. Leuigatur uel aspergatur gargareoni: ex leuibus & fortibus uaria proportione infinita miscentur medicamenta. Eodem modo temperatis mediis cum leuibus aut fortibus. In duriore corpore & maiore fluxione fortioribus utendum ita & aliis utris pro ratione. Ex eadem materia succus, si licet, exprimitur, qui liquidus usui est. Siccatur ut inde puluis inspergatur, qui si uiscidus permanet, diluitur. Mitigant glycyrrhiza recēs, althea, uue passæ, iuiube, pruna, scabellum, ficus pingues. Horum utimur decocto, uel eadem adstringētibus concoquitur. Digerunt autem id prius commemorata origanum, hyssopus, & similia. Atque diacaryon, diamoron, dabalion, dia reon, & aliis id genus conscripta prius ratione in inflammatione gargareonis utendum est. Præcidendi gargareonis ratio ex 3. lib. Prognost. Hipp. vi. Pauli, & Celso petēda est. Vritur, scarificatur, præciditur. Sed uidendum ne maior pars, quam oportet, auferatur. Sic enim uox perit, & spiritalia nimium refrigerantur.

*De Aphthis.*

**A**phthæ Græci, Alchola uocant Arabes. Serpentina oris ulcera uertunt Latini. Aphthicos uocatur, qui laborat. Aphthos morbus est familiaris pueris, ut ex 3. Aphor. lib. licet colligere. Est autē, quod superficiem oris occupat. A gingiuis sæpe incipit, serpit in palatū, descendit in uiam & fauces, periculosissimum pueris, & quod sæpe eos consumit. Galenus duplex genus facit 3. Epid. Aliud est mitius, aliud cachoetes & malignum. Hoc uitium ferè cum ardore & Erysipelate. Causa autem duplex: in pueris quidem mollities oris, quod ait Gal. quasi bryodes propter mollitiem à sero lacteo patitur,



# DE COMPOSIT.

titur, & insuetis generibus cibi & potus. Altera causa, quæ grauius malum facit, excrementorum acrimonia, unde maligna ulcera & depascentia sæpe commouentur. Hoc uiris & mulieribus aliquando accidit. Sūt & Apharum differentiæ materia sumptæ. Aliæ enim rubent à sanguine: à bile flauescunt: albicant à pituita salsa: nigricant ab atra bile. Remedia inde euariāt. Deinde quia in mollioribus & nimis maligna affectione clementioribus utendum est. Itaque ardor refrigerandus est. Quod autem exulceratum, cicatrice claudere oportet. Itaq; in pueris prouidendum nutrici, ut primū quidem purgetur: deinde nutriatur alimētis partim refrigerantibus, partim adstringentibus loco pulticularū quæ farina tritici, lacte, & sale uulgo pueris coquūtur. Hordeato utendum est cum saccharo rosato. Os colluatur iulepo rosato, myrtino, addita parte succi granatorum, & eorum, quæ prius commemorata refrigerant & adstringunt. Similiter ex materia, quæ leuiter adstringit, rosis, capreolis uitiū, & cæteris aqua coctis collutiones fiant, inde pulueres ulceribus. Inspirantur, quæ uel mediocriter adstringunt, quæque fortiter, præscripta sæpius ratione usurpanda sunt in igneo feruore, lactuca, intibum, solanum, portulaca, plantago, cétinodium & similia. Coquuntur aqua ad collutionem, quæ aqua etiam alimētis misceri potest. Utimur quoque aquis inde distillatis caphura addita, granatorum succo, ribes, oxiacanthus, cerasi, mali, pyri, materiæ adstringentes, quæ ut dulciora sunt saccharo rosato condiri possunt. Miscetur quoque diamoron, diacaryon & alia prius cōmemorata ac mellita. Miscere conuenit in initio, & fine adstringētia. In prærubris utendum his, quæ leuissime adstringunt: in albidis, adstringētibus magis, postea his, quæ citra rosionem digerunt: in subflauis refrigerantibus magis: in nigris, magis discutietibus. Vbi vero sordida admodum ulcera sunt, & serpunt nimium ad remedia malignorum ulcerum ueniendum, ut purges, incarnes, cicatricem ducas, quorum materia ex secundo de materia Chirurgica repetenda.

De



**V**T uitia uocis intelligamus, qua ratione uox naturaliter perficiatur, intelligere oportet. Materia uocis spiritus est, inclusus in thorace & pulmonibus non quomodocunque exclusus, sed uehementius, quam in expiratione. Spiritum eo modo uehementius exclusum exsufflationem uocant. Exsufflatio itaque materia uocis est. At hoc esse non potest sine actione musculorum intercostalium, à neruis etiam, quæ à respondentibus spinæ uertebriis intercostalibus spatiis describuntur: uim nerui accipiunt à cerebro. Itaque cerebro læso, nec nimis demittente in neruos cessabunt musculi intercostales. Nec erit efflatio, nec uox similiter radice læsa neruorum intercostalium, aut musculis essentiali morbo laborantibus. In uulneribus thoracis: quæ in cauum penetrant, quantum spiritus per uulnus efflatur, tantum materiæ uoci detrahatur. Ut aliquando uel obscura, uel quasi dimidia, uel certa uox nulla relinquitur. Atque de materia. Iam uero spiritus ille aliquando interceptis uis intercluditur, ne ad asperam arteriam & laryngem perueniat, aut non conuenienter perueniat. Ita Asthmaticis, purulentis uox sæpe læditur. At ubi efflatio libero transitu ad arteriam & laryngem peruenit, aliæ causæ læsæ uocis requirendæ sunt.

Ac causa sæpe & in tunica, quæ meliori parte arteriam uestit, communi quidem atque continua, & tunica, quæ rotum os interius, fauces, linguam, palatum, & œsophagum inducit. Ea ergo tunica cum longa, multa, irrigatur distillatione, uocem adimit: moderatè uero humectata raucedinem facit. Irrigatur autem ferè à distillatione, cui accedit quoque humiditas è pulmonibus, uel Asthmaticis & purulentis. Sed hæc quoque in spirato aere frigidiore, uocem corrumpit: uel aere ueneno, aut maligna qualitate prædito: quod aliquando accidit his, qui metalla curant, aut halitu quodam è speluncis, uel ab animante uenenato, quale fortasse est, quod de lupo scribunt, Lupi Merim uidere priores. Sed nimium resiccata ea tunica uox uitium trahit, & fit clangor:



## DE COMPOSIT.

gor: uel in febre uéheménti ardente, causa post longas uociferationes, multasque, uitium contrahit simile lassitudini, quæ phlegmonode appellatur. Vulnerata quoque arteria & ita efflato spiritu, materia uocis, uox perit, nonnunquam quoque potu meraciore. Sed larynge læsa maxima uitia accidunt uoci, sed præcipuè ubi musculi aperientes uel claudentes laborant. Neruis quoque uocalibus læsis, uox grauiter læditur. Sæpe etiam aboletur gargareone, epiglotide, faucibus, musculis, qui arteriam coniungunt cæsophago. Oesophago respondente, spina, & maximè, ubi intro luxata est neruis sextæ coniugationis, qui carotidibus assidèt in collo, ac denique cerebro læso uox lædi potest. Itaque priusquam de remedijs uocis statuatur, uidendum de causa, & an remedijs locus sit. Incisis enim neruis sextæ coniugationis, gargareone, musculis, uel aperientibus, uel claudètibz desperatur curatio, quemadmodum inueterata raucedo, quæ uel annum, uel duos annos superat. Incurabilis à multis iudicatur, ac Medici arteriaca uocant medicamenta, quæ uel musculis laryngis, uel membrana, quæ arteriam succingit, medeantur, quorum triplex genus est. Primum leuigat, minimè mordax, emplastica natura, quo genere utuntur in raucedine, aspredine, initijs inflammationum. Secundum genus est facultatis citra rofionem abstringētis, in quo genere, ut reliquis distinguenda sunt, quæ magis aut minus id faciunt. Tertium genus eorum, quæ siccant discutiunt.

Itaque ordo est in usu horum medicamentorum, ut primum lenientibus utare, donec moderatior fuerit inflammatio: postea leuiter abstergentibus, ut paulatim abstergendi facultas augeatur, tum siccantia permiscentur, postremo acria. Magna pars horum medicamentorum in hippoglottidas, hoc est medicamēta, quæ tenentur sub lingua fingi debent, ut paulatim illiquefiant, & deglutiantur, tumque omnino cohibenda tussis, ne materia defluens in arteriam reiciatur. Etenim hære ne cesse est. Præterea uiscidis ferè medicamētis colligatur materia. Primi generis oua sorbilia, butyrum, amyli, tragacanta,



tragacātha, terra sigillata, gummi arabici, glycyrrhiza, sorbitio vulgaris ē tritico, ex hordeo, lac mustum dulce, coctum, ius passularum bene coctarum, dactylorum veterum & dulcium, iuiubarum, sorbitio, ex pineolis recētibus, quomodo sit ex amygdalis, decoctum nucis pineæ, esus pedum animalculorum coctorum ad putrilaginem, gelatina, furfurum cremor, semen lini, althææ, & inde muscilagines. Muscilago psilii, seminis cucurbitæ excorticati, citruli, violarum, melonis. Hæc eadem fient secundi generis, additis saccharo, alphenic, diatragacantho frigido, penidiis, pilulis albis, saccharo violato, ac tandem melle. Iam in secūdo genere præter hæc decoctum amygdalarum, caricarum pinguium. Num acres & aridæ ad tertium genus sunt referēde, syrupus uiolatus, iuiubarum, prunorum dulcium, nenupharis, de papauere, de floribus & foliis althææ, è decocto nucis pineæ resinosa, è decocto passularū pinguium. Terti generis hyssopus, thymum, filicis radix, semen ormini, urticæ, cinamomū, casia lignea, piper, spica, & alia id genus aromata acria, thus, crocus, myrrha, mastiche. In concoquentibus numerantur terebinthina, coquit, terget, siccatur: amygdalæ amaræ detergent, & his magis farina orobi, ormini semen, radix iridis. Diaireos salomonis facit ad abscissam uocem à frigore, similiter, & diaireos simplex, uel diatragacanthum, ubi à calore uitium est. Nam in hæc tota materia distinguenda, quæ refrigerant, contra causam calidam: similiter quæ calefaciunt, contra frigidam causam. Galenus ex Hippocr. in raucedine, siue sit à distillatione, siue à frigore, non putat utendum medicamentis purgantibus, quāquam hoc tempore & casia & catholico sine periculo uteris. Voce clangosa leuigantibus, quæ refrigerant, utendum est. Balneum quoque in læsa voce conuenit, ubi vel à calore, vel immodica vociferatione contractum vitium est. Consensus est veterum vocis studiosos plurimum iuari, si plurimum panem siccum ederint, priusquam bibant, aut liquida sorbeāt. Mixture trium generum concorporatis aridis, vel diaireos cum vitello oui, cum butyro



DE COMPOSIT.

cyro, syrupis, mucilagibus, infinita remedia constitues, ut res exiget.

Reliquo hoc libro de Tussi, reiectione sanguinis, & spirandi difficultate agit Galenus, ac plurimum utitur medicamentis narcoticis, quorum usus est bene purgato corpore, ubi nimium tussis urget, & uigilia in narcoticis. Itaque syrupus est de papauere, cui proximi sunt syrupus de nenuphare, & uiolatus recens. Galenus plurimus est in descriptione diacodion, quod ita confici debet, decem capita 7.8. aut nouem loco neque squalido, neque palustri colliges, ut sint ea capita neque molliora, neque sicciora. Magnitudine uero mediocria capita ista selecta unum diem sines. Neque statim exempta coques post horas 24. qui dies unus est, sextario aquæ puræ & sinceræ uel pluuiæ, uel fontanæ, quæ non ducatur per canales plumbeos, incoques. Est autem sextarius quantum capit chopina Parisiensis, adiecta quarta parte. Coques autem dum capita intabescant. Sic autem capita exprimes in aqua, in qua coxerint, animaduertesque ad materiâ decocti, ut dimidium uel sapæ, hoc est, uini cocti è musto dulci in morbis thoracis: ex musto adstringente, in dysenteris & ubi uigent uigiliæ, tenuiorque fluxio est, uel mellis: ubi partim sistendum, partim educendum, nec ita uigent uigiliæ nec acris, aut tenuis fluxio. Alioqui & sapæ & mellis utriusque parem modum in conditione, decocto adicies. Coques autem dum sit spissitudo syrupi. Aliquando glycyrrhiza adicitur loco mellis, diatragacanthum frigidum in calore & siccitate diarcos simplex, ubi educendum. Saccharum quoque loco mellis misceri potest. Datur cocleare delingendum. Aliud est medicamentum narcoticum, quod Philonium ueteres & Recentiores Medici appellant, quod variè conficitur. Græcum hoc modo. Piperis albi drac. 20. s. seminis hyosciami albi tantundem: opii drac. 10. croci dr. 5. spicenardi, euphorbii, pyretri, an. dr. i. uniantur omnia melle cocto. Detur dimidium drachmæ, scrupulus unus. Arabicum hoc modo. Papaueris albi, hyosciami, an. dr. xx. aut fortasse loco papaueris piperis scribendum est:



est: opii, terre sigillatæ an. dr. x. lapidis hematitis an dr. v. pyretri, castorei, spicæ, euphorbii, margaritarum non perforatarum, carabæ, sodoanæ doronici, galliæ muscatæ an dr. i. camphoræ scrup. i. Incorporētur omnia melle rosato colato, Dosis a. dr. s. ad dr. i. cum succo arnoglossæ in sputo sanguinis uino dulci, adiecta parte rosarum. Ratis aliter Piperis, ameos, foliorum mentastri, castorei, baccarum lauri, cymini an. dr. i. opii, mandragoræ, seminis hyosciami albi an. dr. s. mellis q. s. Dosis dr. i. aut scrup. ii. quia hoc Philonium leuissimum est: Græcum fortissimum: in medio uerò Arabum Nicolaus proxime describit ad Philonium Galeni. Alexandrinus quoque, Actuarius, sublato castoreo. Alexandrinus aliquot descriptiones Galeni facit. Compositio describetur lib. 9. Sunt & alia narcotica, Pillulæ de cynoglossa, Athanasia, diapente, & antidotū, quod & Pleuriticis prodest, Empyicis, Tussiculosis, ut una potione liberet: castorei, opii an dr. iiii. succi baccarum lauri, mandragoræ, cinamomi, spicæ, cardamomi an dr. ii. croci, castiæ dauci, an. dr. i. s. costi, mirrhæ, galbani, piperis albi an. dr. i. Vniuntur melle. Datur castanæ magnitudo cum tepida.

*De Asthmate, Orthopnea, difficultate spirandi.*

**I**N his omnibus difficultas est spirandi: sed hæc in genere tres causas habet, quæ ad recte curandum recognoscendæ sunt. Itaque difficilis spiratio est, uel propter vehementem æstum conceptum in thorace & pulmonibus, ut in Peripneumonia, graui Pleuritide: altera causa est, angustia partiū spiritaliū, quæ uel pure, ut in Tabidis & Purulentis: uel crassa & uiscida pituita, ut in Asthmaticis: uel tuberculo aliquo, abscessu uel incluso in partibus spiritalibus. Tertia causa est, imbecillitas partium, quæ respirationem faciunt, atque hæc distinguenda suis notis, quas scriptas inuenies cap. v. viii. lib. 4. de locis affectis. Galenus hoc libro alias differtias difficultatis spirandi relinquit. Tantū agit de Asthmaticis & his qui, quia periculo suffocationis, quasi recti coguntur decumbere erecta ceruice, Orthopno-

*p. ca. Difficilis spi  
rationis  
2. ca*

*3. ca.*



DE COMPOSIT.

*ca. asthma  
et orthopnoe*

*Curo :*

*boni habitus*

*uidetur  
incidendi*

*mel squilliticum quo  
parat a Gal.*

ci appellantur. Asthmatis itaque & Orthopnoe causa, angustia est a crassa & uiscida materia bronchiis pulmonis, atque huius mali initium ferè est a perpetua distillatione. Itaq; imprimis habenda ratio totius corporis: deinde capitis; postremò liberandus pulmo ea materia, quæ iam inhæsit. Quod ad uacuationem totius corporis attinet, Phlebotomiæ quidem aliquando locus est in Plethoricis, bene habitis corporibus, aut in quibus suppressa est solènis aliqua sanguinis uacuatio. Et quia hic morbus senibus, corporibus natura frigidis, conditione pituitosa ferè nascitur, non temerè detrahendus sanguis est. Quod ad caput attinet, uacuandum per errhina potius, quàm masticatoria. Tondendus est capillus, corroborandum caput est per ea, quæ prioribus libris descripta sunt: parca cœna, usus uini tenuis, alimentorum, quibus uis insit tum incendi, tum detergendi. Galenus 6. Epidimion ex Hippoc. sententia abstinentium putat acribus, ut allio, sinapi, his, quæ difficulter coquuntur, ut suilla, bouilli, ouilla, alimentis mali succi, quæ descripta inueniēs lib. de Euchy. Postremò his omnibus, quæ uehementer tendunt, aut mouent, qualia sunt exercitia, cursus, clamor, ira, uociferatio, & alii id genus affectus animi. Medicamentorum facultas incidat, abstergat, sed citra insignem calorem, non adstringat, non refrigeret, non sit narcotica. Hoc quoque uult Galenus. Medicamēta quæ natura sua siccant, diluit, ut facilius crassitiem humorum diuidāt, & nec præter modum siccant. Propterea & multum potum concedit, unde crassities materiæ diluatur. Sed talis sit multus potus, ut iuuat quidem & non noceat. Nocet potus a quo repleri potest caput uaporibus. In remedijs maximè probat, quæ parantur è squilla, qualia sunt mel squilliticum, acētum & oxymel squilliticum. Galen. idem mel squilliticum hoc modo comparat. Squillas aridas uase, in quo mel repositum fuerit, reponit sub canicula, exponit soli, subinde obuertens uas calori solis, & prohibens frigore Aquilonis. Inde resudat liquor, qui melli mixtus efficacissimum remedium est, ubicunque crassus humor



humor incidendus, & uiscidus detergendus, ut in Asthmaticis, Epilepticis, & aliis id genus: alioqui squilla coquitur, exprimitur succus & miscetur melli; uel e cruda succus expressus concoquitur melli. Dosis a semissa drachmæ, ut in pueris ad dr. 2. Acetum & mel scylliticum describuntur a Nicolao. Loach de squilla respondet melli squillitico. Purgationes autem totius corporis subinde reuocandæ aliquando ex casia, catholico, sed præcipuè agarico, Materia aristolochia, gérana, enula, centaureum, radix maioris centaurii, melanthium, iris, organum, thymum, hyssopus, satureia, pulegium, semē urticæ, irionis, asellorum puluis, & qui e limacibus torrefactis e præparato pulmone uulpis, uermibus serici, ericio, lacertæ stercore odorato, quod uulgu moscum appellat, uermibus subiectis urticæ, interioribus oculis philomenæ. Adde sulphur uiuum, foenugrecum. Ex aliorum decoctis oxymel fit vel melicratum, pulueres butyro, melli squillitico uel liquidis permiscuntur. Alioqui decocto ficuum aridarum. Laudatur decoctum rubæ, galli fatigati luta, cocti cum herbis esculentis, quibus uis insit siccandi, incidendi, detergendi; cucurbitæ in scapulis, cruribus, sub mammis. Thorax primum munitur sordida lana, prius imbuta oleis amygdalarum dulcium, de lilio, & similibus. Postea quoq; dropaces, sinapismi, & quæ exulcerant, adhibentur; theriacæ & mithridatis usus conceditur interuallis; decoctum quoq; satis dilutum ligni garaci, aut concoqui debent passulæ, ficus, glycyrrhizæ. Videndum tamen ne quis fallatur, ut putet causam Astmaturum crassam & viscidam pituita, cum sit abscessus. Hic enim paucus potus conuenit. Medicamenta uerò, quæ incidant & siccant, in quibus maximè probantur a Galeno, quæ aromatica sunt.

iura

Decoctu ligni  
guaiaci.



# In libr. 8. Galeni

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ.



Alenus in hoc libr. 8. agit de stomachicis, & lecorariis. Stomachici dicuntur, qui imbecillitate stomachi laborant: quanquam ab accidentibus, quæ imbecillitatem sequitur, aliquando stomachicos dicunt, qui uel subuersione uentriculi, quam uocant *ανατροπή*, uel supinitate, quam appellant *πλάσμις*, stomachicos nominant. Atque omnino, ut ante scripsit Galenus 2. lib. Imbecillitas stomachi, hoc est, oris uentriculi & uirtutis concoctricis totius uentriculi, maximam uim habet acernandis excrementis. In his affectibus deiicitur appetentia: nausea quædam est: aliquando uomitio & diarrhæa, atque aliquando ea humiditas fluitat: nonnunquam imbibita est biliosa: nãquam sine uitio, quæ omnia ad curationem reuocanda sunt. Ac præterea, ut uentriculi affectibus artificio medeamur, cognoscenda ea, quæ scribit Gal. 3. & 6. libr. de morbis & symptomatis, cap. 5. de locis affectis 6. de sanitate tuenda. 7. Methodi & signa in arte parua. Intemperies si sola est, contrariis euinci debet. Nam ubi ælhuat, refrigerandum: ubi friget, calfaciendum: si squallescit, humidandum: ubi multa humiditate laxatur, siccantibus atque adstringentibus utendum. Hæc autem omnia signis ostenduntur, quæ inuenies in arte parua. Atque remedium duplex genus. Alterum in alimentis, quæ sua qualitate morbo repugnant: alterum in medicamentis, quæ partim deuorantur, partim adhibentur foris. Quæ foris adhibentur, linimenta sunt. Alia cataplasmata: quædam emplastri formam habent. Sunt & fomenta. Atque hæc omnia partim interiori parti, ubi sternon est: partim ad 12. uertebam dorsi applicari possunt. Sed quæ à dorso applicantur, aliquid tenuium partium habeant,



beant, ut per densitatem viæ penetrare possint. Itaque in linimentis, quæ refrigerât, ceratum est rosaceum Galeni, ex ceræ parte una, tribus aut quatuor partibus olei rosacei, quod legitimum sit, liquatis in uase duplici: deinde subactis cum succo omphacii, uel simili adstringente. Hoc enim dictum sit in uniuersum, medicamēta que stomacho adhibentur, egere adstrictione, quæ, scilicet, corroboret. Quanquam in adstringendo modus esse debet. Nam quæ nimium adstringunt, nimium siccando nocent. Conuenit & unguentum rosa. ceratum santalinum rosaceo dissolutum, recentes rosæ, uel in austero uino parum uinoso decoctæ. Item oleum cydoniorum, myrobalanorum, comparatum ex uitium capreolis, & aliis rebus id genus, quæ & adstringunt, & refrigerant. In eadem intemperie ueteres plurimum usi sunt medicamentis, quæ ex succo cydoniorum comparantur, quæ etiam secuti sunt recentiores, ut in syrupo acetoso, de cydoniis.

R succi cydoniorum depurati per residentiam, sacchari an. lib. i. aceti. unc. 3. coque ad spissitudinē. Datur cum aqua. Conuenit stomacho calfacto. cōfirmat, facit appetentiam. Poteris tamen inuenire modum sacchari, ut erit calor. Eiusdem generis sunt Myuæ, ut myua Rafis. Siquidem sine uino & aromatibus comparetur. Nā cum his refrigerato stomacho conueniunt succi cydoniorum depurati per residentiam lib. i. sacchari lib. i. s. uini ueteris lib. s. Coquatur, & despumetur in calido medicamento. Infundatur nodulus sequens.

Zinziberis, spicæ, cinamomi, gariophyllorum, an. dr. ii. mastiches ℥. iiii. Inuoluantur in nodulo. Alias Miuas describemus in intemperie frigida. Eodem modo oxy-sacchara, syrupo de granatis, de ribes, de grossulis, de agresta uteris: hæc enim ad refrigerium uentriculi faciunt, corroborant & appetentiam excitāt. In his autem qui abhorrent a syrupis, materiam horum immiscuis alimentis, uel quod sit, coques & condies saccharo inuocatis uulgò Tartinagiis. Ceterum hoc semel dictum fuerit, alimenta & medicamenta, quæ imbecillo uentri-

*Formula sine  
spicy qd quærit  
miua cu spicy.*

*X.*

culo



## DE COMPOSIT.

tulo adhibentur, oportere uel calida, uel frigida esse, quia tepida robur dissoluunt. Abstinentum tamen nimium refrigerantibus, ne inde natius calor offenda-  
tur. Et quia frigida intemperies sæpius accidit, propte-  
rea multo plura medicamenta descripta sunt ab Anti-  
quis, quæ faciunt contra intemperiem frigidam, quan-  
quam & horum quædam contra declinantes inflamma-  
tiones uentriculi ad resoluendum, uidelicet, scripta sunt,  
quale est laudatum a Galeno, & quod stomachicum Ga-  
leni uocant. Sed iam parari non potest inopia nardini  
unguenti & ceræ ponticæ, aut alioqui amaræ. Hoc mō  
tamen conficietur utile, & accedens ad medicamentum  
Galeni.

Comparabis itaque optimum oleum nardinum, aut  
ex his aromatibus, quæ calfaciant & corroborent uno  
pluribusve, cinamomo, ligno aloes, muscata nuce, mace-  
re, spica, cypero, lauandula, menta, maiorana, roremari-  
no, stechade, cardamomo, squinantho, & aliis id genus,  
quæ quidem olea hac arte cōficiēs. Parem modum olei  
& uini permiscebis: coques deinceps, & ordine iniectis,  
quæ uel breuiorem, uel longiorem coctionem sustinēt.  
Coques autem ad uini consumptionem, comparato o-  
leo hoc modo miscebis.

R. ceræ citrinæ unc. 4. olei unc. 3. s. Liquefiant in ua-  
se duplici. Tum addes succi omphacii, sumach, uel alte-  
rius id genus dr. 3. aut 4. confice ceratum. Quod si uide-  
tur esse durius, aut grauius, in usu diluetur conuenienti  
oleo, ut sit uel liquidius, uel spissius. In liquidiore in-  
tingens uel cotto, uel lana dibaphatica (uulgò Escarlac-  
te) & calidum medicamentum admonebis. In declina-  
tionibus inflammationum, loco medicamenti Galeni &  
meliloti, utemur emplastro nostro de meliloto dissolu-  
to in oleo conuenienti, ut de spica, de lauandula, & aliis  
comparatis ex præscripta materia. Humidior uentri-  
cus siccantibus & adstringentibus curari debet: siccior,  
humectantibus. Meminisse tamen oportet semper inter  
miscenda, quæ adstringendo, corroborant, quales sunt  
rosæ, succus cydoniorum, prunorum non dulcium, &  
aliorum



aliorum id genus. Aromate uerò, ubi frigiditas coniuncta est: sed ferè fit, ut ad intemperiem sequatur excrementorum prouentus, unde ferè fiunt & Anatrope uocata subuersio, & hyptiasmos, hoc est, supinitas. Anatrope hæc habet accidentia, cibi fastidium cum nausea, aqua uomitus aliquando, rosio, uolumilia, aut canina appetentia, fastidium, quale est repletis è cibo. Sæpe accedit multitudo uitiosi succi alioqui paucae, uel nullae humiditatis. Hyptiasmos aliquando ab intemperie citra humorem: aliquando cum humore multo quidem, sed non maligno. Is humor aliquando fluitat ferè tenuis, nonnunquam crassus & uiscidus imbibitur ori & tunicis uentriculi: nonnunquam cum signis caliditatis, æstu, siti: aliquando sine siti, ubi frigiditas coniuncta est. Eiusmodi humiditas appetentiam deiicit & ea commouet, quæ in Anatrope dicta sunt. Hæc autem affectio dissoluit tum os uentriculi, tum uentriculum ipsum. Quò uincula, nerui, membranæ imbibita omnia multa humiditate laxa, uicta & quasi omnino dissoluta redduntur. Eget hæc affectio primum quidem uacuatione: atq; ubi humor fluitat & tenuis est, partim uomitu, partim leuibus medicamentis uacuari potest: deinde siccantibus, adstringentibus, & corroborantibus curari potest. Quòd si crassa & uiscida materia est imbibita profundius, oxymelite uel simplici, uel composito ex decocto radicis scæniculi, cinamomi & aliorum id genus, quæ, scilicet, incidunt, tenuant, præparari debet. Hyera simplex, ut medicamento efficacissimo aliquoties utendum erit, ut quid uim habeat incidendi, detergendi, corroborandi, purgandi, & præsertim quæ sunt in uentriculo & primis uenis. Dentur dr. ij. aut eò plus cum hydromelite, uel oxymelitis. Repurgata materia, corroborantibus utendum erit. Vbi uerò humiditas frigida est, siccandum, detergendumque. In humiditate neque crassa, neque uiscida in alto posita, sola adstringentia satis esse possunt: quanquam tutius fuerit pillulis communibus, uel ante cibum datis uacuare materiam. Alioqui pillulis ex rhab. & agarico. Alioqui terebinthina utemur. In intemperie frigida &



## DE COMPOSIT.

humida, tum quæ purgat, tum quæ astringunt, inimicæ sunt, utendumq; medicamentis, & alimentis, quæ calefaciunt, & siccant. Medicamenta in hoc libro descripta ad Anatroas & Hyptiasmos ferè composuerunt ueteres ex rebus adstringentibus & detergentibus, succo puniceorum acido, cotoneorum, sorborum, mespilorû, myrtorum, dactylorum recetium, & quæ vulgè (prunelles) dicuntur: Adde, si uis, grossularum, & similium, quorum compositionis hoc sit exemplum, addito melle, quod ad moderatas omnes affectiones uentriculi scripsit Galenus, nisi sint cum uehementi æstu.

Succi cotoneorum depurati sextarii duo (hoc est nostro more semisextarioli quinque, uel libræ duæ cum semisse) mellis despumati optimi sextarii duo, id est, semisextarioli quinque, uel libr. iiii. cum 4. quartariis, aceti acris sextarius unus, hoc est unc. xx. uel non ita acris sesquiseptarius, hoc est unc. xxx. Coque ad spissitudinem. Quod si frigiditas cõmunicata est, iam coctis adde zinziberis unc. 3. Piperis albi dr. 8. Leuigata coctis aliis permiscetur. Aliud.

Eiusdem carnis cydoniorum, mellis ana lib. i. aceti albi tantundem. Bulliant simul, & agitentur: tũ adde, Piperis, zinziberis an. unc. i. Petroselini macedonici unc. s. In frigiditate cõuenit diagalaga, dianison, diacuminũ diatrio pipereõ, zinziber uiride, nux muscata, condita diuitibus, ut chebuli cõditi. Cõfectio anacardina, theriaca, mithridatũ & maxime ubi refrigerato uentriculo plurimi flatus excutiuntur, unde periculũ hydropisis imminet. Et quæ apud ueteres, tũ et Recentiores Medicos absynthiũ sepe memoratur, de eo sic habeto. Utendum itaq; absynthio aromatico, nõ eo, cui horribilis sapor est. Itaq; decoctũ absynthii biliosa deterget & subducit. Si quidẽ altius nõ fuerint imbibita. Maior uis inest syrupo de absynthio, aut melicrato parato ex decocto absynthii: Infestissimũ uero absynthiũ, quibus pituita in uentriculo inhæsit, nisi decoctum eius condiatur aromatis, incidetibus, calefacientibus, & melle uel saccharo, quod detergeat. Emplastro usitatissimo, eodemque effi-

cacif-



cacissimo ex mastiche, cerato stomachico Galeni, carne cydoniorum sic uteris. Mastiche & ceratum, stomachicum utrunq; corroborat, & discutit, cydoniatum, caro cydoniorum, deterget, & corroborat. Tria hæc pondere æquali permiscuntur, singulorum unc. j. iunguntur cum oleo mastichino, de spica, & aliis. Aliquando ubi discutendum magis, neque ita adstringendum, plus mastiches & cerati minus miscetur, cydoniati aliquando ex sola mastiche, aut cerato emplastrum conficitur. Augendus modus cydoniati, ubi uel uomitio, uel diarrhæa uexat: sed duplex cydoniatum est. Alterum sine speciebus, quod ubi calor est, usurpandum, alterum cum speciebus quod in sensu frigiditatis conuenit.

*Ad dolorem stomachi.*

**S**tomachus vegetissimo sensu peditus est, ppter neruos illos insignes à sexta coniugatione. Archigenes in magno dolore uentris, uenâ secat, extrema ligat, cucurbitulas circa stomachum affigit, lenietibus fomētis utitur, glande aluum subducit potius, quam clystere, quia à clysteribus metuit, ne inde sublatus uapor dolorem augeat. Secunda autem interna & perseuerante malo, utriusq; brachij, & hoc magis, si grauis dolor est: si *scilicet* repentinus, si difficilis ructus, & spiritus, si febris est, si *scilicet* dolor in dorsum & scapulas extenditur. Historia est. 9. Epidimion de muliere quadam, quæ in uehementissimo dolore stomachi nullis adiuta est remediis: ducto tandem sanguine ex utraque manu seruata est. Cucurbitulæ, ut Archigenes, circa stomachum & alii umbilico, uel ad latera umbilici affigendæ: dextra quidem parte, si ab hepate: sinistra, si à liene in uentriculum fluxio est. Sunt qui affigant ad 12. uertebra dorsii. Purgationis usus est, si ab acri sanie, aut humorum prauitate dolor est excitatus. Atq; omnino in affectionibus stomachi & uentriculi, ubi purgandum est, utendum purgatione omnino leui, & q̄ nō attrahat à reliquo corpore, nisi confluente ad uentriculum materia ab uniuerso corpore dolor moueatur. Post hæc topicis & sumptis pos leniendus dolor est, alimentis quidē ea qualitate pręditis, q̄ faciant cōtra causam



## DE COMPOSIT.

fomita  
narcotica  
 sam morbi. Similibus quoque medicamentis, sed odor-  
 ris & aromaticis. Stomachus enim gaudet odore, subuer-  
 titur contrariis. Vtemur uerò fomentis ex chamæmeli-  
 no, meliloto, aneto anthos, rosis, menta, absynthio, cy-  
 pero mixtis simul anodynis & his, quæ corroborant.  
 Modus autem fouendi est, ut coquantur aqua, adiecta  
 uini parte, & inculcatis in decocto linteis pars foueatur.  
 Alioqui uesica impletur ad dimidium, & stomacho ad-  
 hibetur: In æstu, frigida: In frigore, calida: oleis quoque  
 prius commemoratis. Sed ubi ardor coniunctus est, fo-  
lia uitis, papaueris, hyosciami, mandragoræ, flores inde  
& semina concoquenda. Aliquando ubi à doloris uehe-  
 mentia periculum imminet, narcoticis utendū, opii gra-  
no uno, leuiter feruefacto, in syrapi rosarum & absyn-  
thii an. sesquuncia. Sit autem tantum una ebullitio, quæ  
 deinde misceatur vnc. 3. iuris pulli. Detur in potu. Ali-  
 oqui Philonii in causa frigida, in causa calida, Requei  
descriptione Nicolai, drachmæ semis in vnciis duabus  
uini odoriferi.

### Ad Vomitum.

Vomitus subuersio quædam est copia uel qualitate  
materiæ: alioqui incitatur uentriculi imbecillitate. Va-  
cuanda copia, purganda praua materia: imbecillitas, ut  
prius, corrigenda. Ac fere uomitus excitatur, qui perse-  
 ueret, imbecilliore stomacho. Nam si quid excludendum  
 robusto quidem stomacho, sed imbecillo vêtre per de-  
 iectionem excluditur. Contra uerò re habente, per vo-  
 mitum. Vehementer cohibet vomitiones ceratum prius  
descriptum ex partibus æqualibus mastiches, cydonati  
& cerati stomachici Galeni iunctis cum oleo cydonio-  
rum, rosarum, mastichino efficacissimum remedium cō-  
tra perseverantes uomitiones, similiter uini odoriferi  
potus & in calore in lep rosatū adiecta parte octaua ui-  
ni granatorum, berberorum, & similium, quæ tantillo  
cinamomo condienda sunt. Plurimum quoque confe-  
 ret syrupus de agresta, uel omphacomeli ueterum.

### De Singultu.

Singultus ab acri & rodente, uel materia, uel sanie, &  
 reple-



repletionem, inanitionem, frigiditatem excitatur, aut, ut breuius Hippocr. ab inanitione & repletionem. Itaque; ubi repletio, uel acris materia est, purgare conuenit. Galenus uehementer probat usum hieræ picræ. Arabes proprietatem quandam ascribunt rhaborbaro, in edendo singultu. Post purgationem corporis uino odorifero cum tantillo cinamomi & galangæ utendum est, fomentis, quæ incendant, calefaciant, abstergeant ex materia in dolore frigido præscripta. In inanitione, unde singultus, etiam si desperata res uideatur, iuuandi tamen distillatis, collatiuis, iusculis expressis, gelatina, sorbilibus ouis, inungendus stomachus & dorsum ad 12. uertebam hydreleo, ex æquis partibus aquæ & olei violati. Neq; tum adstringentibus utendum, sed rarefacientibus, ut materia transpiret. Conueniunt & quæ antea commemorata sunt, diagalanga, dianison, & similia. Anisum peculiari ratione singultui medetur, propterea & anisum sæpe imperant & oleo anethino fouent.

*purgo.*

*anisa.*

*De ulcere uentriculi uel œsophagi.*

**E**ulceratur à causa externa & manifesta, uel etiam à causa interna humore acris, pharmaco acuto, & aliis rebus acutis: tum etiam præcedente abscessu. Signa sūt, quia dolor fit ulcerata parte, sed præcipue si quid acre, ut sinapi, siquid calidius aut frigidius deglutitur, & inde facto dolore intelligimus qua parte ulcus sit. Pure etiam uel uomitu, uel deiectione exeunte. Ardor quoque in ea parte percipitur. Lingua sæpe inficitur: sapor redit in os, angustia est spiritus & ferè fastidium. Sed ubi in orificio uentriculi, grauiora symptomata commoueri solent, animi deliquia, extremorum frigus, dolor crudelior: cap. 4. lib. 5. locorum affectorum Galenus scribit omnes fere interire, nisi ætatis beneficio seruentur. Ad hæc legenda quæ scribuntur. 4. Method. Utendum est alimentis, quæ medicamentosam qualitatem habeant, detergentibus, incarnantibus & cicatricem ducentibus, quæ seligenda sunt. 2. lib. de materia Chirurgica. Abstinentum omnibus acris acerbis, salis, acidis, quæ scilicet ulcus exasperant: mitigantibus utendū, quæ



# DE COMPOSIT.

quæ etiam detergeant, glutinent, incarnent, cicatricem ducant, atque in gula paulatim deglutiendum, adiungendumq; aliquid uiscidum, ut uis medicamenti obiter inhaereat. Lac itaq; tepidum conditum saccharo, diatragacantho frigido, lac amygdalarum, hordeatum, limaces, cocleæ, gelatina. Sed maxime oua sorbilia, aut paulò magis cocta concipiendis medicamentis idonea sunt, Porus quoq; hydromel, uel hydrosaccarum, syrup. uio. Iuiubarum. Deinde etiam myrtillorum & rosarum de siccis. Utimur quoq; saccharo rosarum mastiche, tragacantho, & aliis id genus, farina fabarum, hordei tosti, admixto puluere balaustiorum, malicorii, sanguinis draconis. Exercitatio & frictio partium inferiorum: sed aliquando non ulcus, sed tuberculum in œsophago nascitur, à quo defluens potus aut cibus resistit in uia sine dolore. Rarum est, quod tamen post 4. mensem accidit. Puella quædam deuorato multo pulmone ueruecino, & inde grauato uentriculo post nausæa uomuit frustum pulmonis. In œsophago restitit parte superiore, unde grauiter conflictata & periclitata conualuit successu, cucurbitulis affixis & ferramentis in œsophagum inditis. Nihil deglutiebat intercepta uia. Ex antecedente de malo coniectura facta est. Inflata eius pulmonis portio œsophagum obsederat.

## De Voulimo.

Voulimum quasi πολλή λιμὸς appellatur. ὅς partícula in hac uoce, ut alijs multis: πολλή multum aut magnū significante. Est autem genus quod ab ingente fame nomen habet. Vocatur & phagedena ab insatiabili edendi cupiditate. Sub hoc genere continetur canina appetentia, affectio appetitricis facultatis, id est, stomachi in quo affectu repletus assatum uenter paulò post omne reuomit aut deiecit uirtute non sustinente. De hac canina appetentia lege. 5. & 6. de locis affectis, 4. de sympto. causis. Causa est cum os stomachi penuria, imbecillitate, & refrigeratione afficitur, 5. de simplicibus, à frigiditate & siccitate, unde curari putat calfacientibus & humectantibus balneis & alimentis. A fame inchoat,



choat, quæ postea definit. De quo lege Aphorismum  
2 1. lib. 2. Galenus de usu respirationis refrigeratis par-  
tibus thoracis, & quæ vicinæ sunt: lib. uerò de Thera-  
ca, Helmini uermi hoc aliquando attribuit nobili hy-  
storia de uirgine quadam, quæ cum multum comede-  
ret, perpetuo tabescebat uerme illo perpetuò exsugen-  
te chylum & alimentum quod deberet distribui corpori.  
Legendus commentarius Aphorismi, Famem thorex is  
& uini potio soluit. Elenii uini usus plurimum lauda-  
tur à Galeno, sed neque uacuo uentriculo, sed modico  
pastu, neque multum semel, nisi uehementer sitiunt,  
sed breuibus interuallis Archigenes eos qui ingenti fa-  
me in uis delinquant, reuocat odoramentis aceti, pule-  
gii, terræ aceto maceratæ, pomis, malis, piris, & aliis,  
quæ ad manum sunt. Dat panem intinctum uino, postea  
suillam affatam & ea, quæ multum nutriunt, & odore  
sunt bono. In paroxismo extremæ partes cōstringantur  
maxillæ pungantur, pili uellantur, & aures. Reuocatis,  
ab animi deliquiis, panem dat imbutum uino diluto.  
Alimenta, quæ affatim nutriunt, oua sorbilia, bulbos,  
cotleas & similia.

*De Hepaticis.*

**H**epaticos definit Galenus, qui ex imbecillitate he-  
patis aliquo uitio laborant, etiam si neque febris  
neque inflammatio, & sine hac imbecillitas esse potest.  
Nascitur imbecillitas ab intemperie. Intēperies est uel  
uisceris, uel humorū, qui uenis & arteriis continentur,  
unde uel alteratrix, uel retentrix, concoctrix, uel excre-  
trix malè suo munere fungitur. Sed hoc quomodo di-  
stinguendum, intelligendum ex lib. 6. de Symptomatis.  
& morbo cap. 6. 5. de locis affectis, ubi malum insidet  
Galenus in uitio alteratricis, cum scilicet, hepar attra-  
hit, sed quod attrahit, non sanguificat. In quo uitio ege-  
runtur similia loturæ carnium, ut in historia illa Sicu-  
li Medici, cuius meminit Gal. 5. de Locis affectis. In ca-  
lida intemperie humores uisceris, deinde uiscus eliqua-  
tur, uacuaturque per aluum bilis olida admodum, cras-  
sa insigniter tincta, mordax & spumans in frigida. Neq;  
frequens,



frequens neque copiosa deiection, sed longior affectus  
 est, color pallidus, tardus pulsus, urina tenuis, ubi siccitas  
 contracta, spissa, ubi humiditas ac paulatim retenta  
 materia calorem succendit & febriculam, quæ uix appa-  
 ret, & Medicum fallit, nisi diligenter obseruet, tū quæ  
 crassiores, feculētæ & limosæ excretiones feci sanguinis  
 uel limo similes. In calida intēperie leuibus, pharmacis  
 utendum est, non ut intemperiem cures, sed ut uacues  
 excrementa, quæ per intemperiem collecta sunt. Vte-  
 ris ergo cassia, catholico, syrupo uiolato, recenti rosa-  
 to laxatiuo, quibus dilutum rhabarbari misceri potest,  
 sed non ita magna quantitate dilutum dr. i. sufficiet. In  
 calida intemperie refrigerantibus modice roborantibus  
 utēdum, cichorio, endiuia, scariola, adiantho, capillorū  
 fumaria & aliis id genus. Melitis rebus non ita utendū  
 quia in calida intemperie mel exsiccat, & amarescunt.  
 Itaque in decocto harum rerū sufficiet decima pars sac-  
 chari, alioqui dissolues, decimā partem syrupi de portu-  
 laca, de limonibus, de acetositate citri, de granatis, oxi-  
 faccaræ simpl. & similium. Acetosæ magna uis inest re-  
 frigerādo hepati, similiter & lactucæ. Itaque altera uel  
 utraq; plurima incoquitur iusculis. Ius acetosæ exprimi  
 tur, in quo carnes intingātur, panis hordeatus, aqua hor-  
 dei, hordeatū. Huic malo maxime cōueniūt æstius quo-  
 que fructus, cerasa, ribes & similia. Vino nō nisi diluto  
 plurimū utendū est, elixis potius, quàm assis. in frigida  
 uero plurimum laudatur electuarium de uino Arabum,  
 quod in hoc libro Gale. ex Andromacho describit, pau-  
 lulum uariante formula, & siphoides appellat. Passula-  
 rum mundatarum uncia tres, croci dr. i. calami aroma-  
 tici dr. 2. s. bdellii unc. s. cassiæ lignæ drachmæ due se-  
 mis, cinamomi dr. s. spicæ dr. iii. mirrhæ, terebinthinæ  
 an. dr. 4. iunci odorati, squinanti dr. ii. s. filiquarum,  
 uel carubiarum dr. ii. mellis unc. 2. uini tenuis, odoriferi  
 quantum sufficit, fiat electuarium. Sed quia difficilis est  
 hæc compositio, melius fuerit passulas mundas ad libr.  
 semissem incoquere uino subtili, odorifero, donec sit  
 crassitudo: deinde admiscere cōseruæ anthos 3. 2. cina-  
 momi



momī dr. ij. cassiæ, spicæ, ligni aloes ana dr. s. croci, scrupuli dimidium. Concorporare omnia & exhibere semunciam pondere cum uino tenui & odorifero. Materia ferè conuenit, quæ penetret propter angustias uiarum seu uenarum, cyperus, schinanthum, crocus, iris florentiæ, quæ aperiât, marrubium, absynthium, pistacia, radix petroselini, quæ concoquat & leniat, passulæ, ficus, uinum granatorum dulcium, uinum dulce, quod abstergeat, mel, saccarum, quod roboret, eupatorium, squinatum, absynthium, rosa, spica, quæ præseruet a putredine, cinamomum, cassia lignea, quæ siccet, spodium, rasura cornu cerui, eboris a proprietate conuenit, uelut rhabarbarum quod inde uitam hepatis appellant, spicam, lupinum iecur, coclearum carnes & limacum, atq; inde distillatas aquas, passulas, quas tota substantia familiares hepati etiam Galenus agnoscit. Tantum adstringunt, quantum opus est uisceri, concoquunt, roborant, malignitatem corrigunt, nec facillè corrumpuntur, uino quoque magna uis tribuitur. Roborat coquit, putredinem prohibet, intemperiem frigidam & humidam hepatis emendat. Contra uirulentam materiam Cinamomum, primas tenet: deinde cassia lignea, tum aromaticum omne genus, nardus, iuncus odoratus, calamus aromaticus, myrrha, electrum, crocus, aspalatus. Ex eiusmodi materia in puluerem trita ad drac. ij. electuaria fiunt cum saccaro, uel melle quadruplo, quintuplo: alioqui in passulato melle incorporatur. Mel passulatum fit coctis prius passulis ad crassitudinem syrupi, coctis, inquam, in uino adiecto saccaro. Exteriora uerò sunt oleum rosaceum, aliquando adiecto chamæmelino, ubi calida intemperies est. Nam in calida intemperie abstinendum his, quæ nimium refrigerant, & leuiter refrigerando laxanda cutis est, ut transpiret uapor. Licet quoq; uti unguento rosato, cerulo sandalino in rosaceo dissoluto, uel cum eodem pisto & admoto. Alioqui cerato refrigeratio Galeni subacto cum succo cichorij & tâtillio acetii albi. In frigida oleum de absynthio, de aspici, de maiorana & quæ in frigidiore uentriculo descripta sunt. Nā



DE COMPOSIT.

in hoc conuenit hepar cum uentriculo, quod utrumque eget his, quæ adstringendo corroborant, nisi quod magis adstringendum in uentriculo è chamæpithi. Mediũ sit medicamentum similiter ex radicibus graminis sile-  
ris. Ad quãtitatẽ decocti opus est unc. x. & ʒ. i. sacchari. Duo sunt reliqui affectus quorum meminit Galenus hoc libro, humiditas hepatis & scirrhus. Itaque immodica humiditas uires hepatis dissoluit, quomodo uincula & neruacea corpora nimio humore imbuta dissolui solent. Signa humidi hepatis & humidioris ex arte parua Gal. petenda. Curatur autem astringentibus & ea materia, quæ prius in humidiorẽ uentriculo descripta est. Hoc tamen differt hepar, quia minus adstringentia desiderat. Humiditati aliquando frigiditas, aliquando caliditas coniuncta est. Itaque in frigidityte, aromata, plantas, & materiam, quæ adstringendo corroboret & calefaciat, miscere oportet, quale, exempli gratia, fuerit cydoniatum cũ speciebus. In frigidityte & humiditate plurimum conuenire scribit Gal. uinum sed hoc sit tenue odoriferum & natura calidum. Vteris fotu de absynthio, irino, de spica, & aliis. In frigidiore & humidiorẽ uentriculo memoratis eisdem oleis malaxatis. Emplastrum de meliloto, diaculum ireatum, mixto cydoniato cum speciebus dabis in potu, dianison, diacuminum, diagalanga, diatrio pipereõ, Institues assas carnes confixas gariophyllis, & oĩno ea alimenta, quæ siccant & calefaciant: caliditate uero iũcta fouebis oleo rosarũ, de cydonii, myrtillorum aceto addito, sandalis, spodio, succo earum herbarum, quæ hepar refrigerant, senecionis, hepaticæ cichorii, intiborum & similia. Atque iisdem herbis pistis ex eisdem oleis, puluere rosarum, sandalorum, spodii addito finges uelut cataplasmata. In potu conueniet electuariũ diarhodon abbatis, rosas sandalis & spodio additis. Videndum tamen, ut ne nimium refrigeremus. Nimium refrigerantibus læditur hepar. Cerato sandalino plurimum utuntur, quod addita parte cydoniati sine speciebus melius fiet. Malaxabuntur cum oleis prædictis paulo



lulo aceto albo addito. In oī humiditate hepatis & totius uentris uehementer laudatur coclearum caro, & li-  
macum: sed si coniuncta est caliditas, frigidis condimen-  
tis & aceto temperantur. Contra uero in frigiditate.  
Contrahit scirrhum hepar propter uenarum angustias.  
Scirrhus tumor est durus dolens, initio & quam diu cu-  
rabilis est, cuius materia humor crassus, uiscidus, frigi-  
dus, a quo nisi curetur, periculum imminet hydropisis.  
Morbi regii sunt & longæ febres & tabes corporis. Ita-  
que summa diligentia curari debet, & quia durus, mol-  
lientibus eget: ratione materiæ crassæ, incidentibus: fri-  
gidæ, calefacientibus: uiscidæ, detergentibus. Itaque  
mixtio medicamentorum, contra scirrhos hepatis mol-  
liat, incidat, tergeat, calfaciat, sitque tenuium partium.  
Verum ratione partis affectæ in mollientibus eligetur  
ea, quæ id moderatè faciunt, ne nimium mollientibus  
substantia uisceris dissoluatur, ac rursus oportet propel-  
lere, quæ tenuium partium calfaciant, & incident: à  
quibus tamen periculum est, ne parte scirrhi dissoluta  
reliquū lapidosum & incurabile relinquat. Propterea  
ut dictum est, mollientia misceantur, foveatur scir-  
rhus ex oleis malleicis, deinde superponantur empla-  
stra malleici, de meliloto, ceratum hisopi, daculam,  
ireatum & similia aceto mixto aromatibus ad unc. i. em-  
plastri dra. ii. aut sesquidrachma tritorum aromatatum  
misceri potest. Acetum additur ut penetret, ut inci-  
dat. Materiam scriptam inuenies cap. de malleicis,  
nisi quod ea seruanda a ratio malleicorum & in-  
cidentium, quæ perscripta est. Hoc enim habet pe-  
culiare scirrhus hepatis. Veteres plurimum uteban-  
tur caricis pinguibus, ol. irino uel simili inunctis &  
tepidis admotis in foru. Hoc aduertendum, ne nimi-  
um frequens, ne longius adhibeatur. Nam inde pe-  
riculum imminet relaxationis uisceris. In potu eadem  
ratio seruanda est, ut scilicet, aliquid malleicū miscea-  
tur his, quæ incident & renuent. In malleicis esculētis  
efficacissimum est decoctum ficuum pinguium & simi-  
lium, passularum, recentis quoque camepитеos, In eius-  
modi



# DE COMPOSIT.

modi decoctis miscebuntur ea, quæ in morbo regio & hydropisi describentur. Consensus ueterum & recentiorum, ammoniacum tum fortis adhibitu, tum in catapotis deuoratu plurimum facere ad scirrhos & opilationes uiscerum. Itaque ex ammoniaco & pul. hietæ, cuius uis magna est calefaciendo, incidendo, pillule fingi possunt, non quæ tam purgent, quàm quæ scirrho curando conueniunt. E terebinthina quoque & eodem puluere utilia catapotia formari. Aliméta, partim quæ molliant, partim quæ incidant, tenuent & tergeant, propterea cōdiméta, sicca. Acetum passulatum misceatur, aut in quo diu insolato ficus, uux passæ, gariophyllum, cinamomū aliquoties commutata maduerint.

## De morbo Regio.

**M**Orbum Regium uocant, quia lasciuiis, cantu, delitiis, mulsa, uita soluta curis, & ut ait Serenus, Mollior hic quoniam celsa lætetur in aula. Causæ sunt obstructio, inflammatio, intemperies hepatis, aliquando lienis, uesicæ fellis, porrorum, per quos flaua bilis ad ieiunum descendit, aut per quos sex sanguinis ab hepate ad lienem fertur. Oportet itaque interrogare ægros qua parte uel dolorem, uel grauitatem, uel tensionem sentiant. Aliquando criticus est hic morbus, flaua bile è uasis diffusa in corpus: aliquando uenena hunc morbum faciunt. Sed in inflammatione necessario febris est, & alia accidentia, quæ se proferunt in inflammatione. Quæ est citra febrim & inflammationem, tensio est, & grauitas in dextro ferè hypochondrio, excrementa albicant, cinericea sunt, & argillosa: urina specie crassa admodum, crocea, aut nigra, cum spuma eiusmodi coloris. Pulsus neq; celer, neque languidus, crebrior tamē. minor, & durior. Galenus morbum Regiū citra febrim cum grauitate in dextro hypochondrio hac ratione curat. Primum enim cibis & pharmacis aperientibus obstructiones utitur. Deinde medicamentis purgantibus, atq; hic meminisse oportet ī grauib; obstructionibus, quales sūt in morbo regio periculosas esse ualidas purgationes, nisi prius liberantibus medicamentis obstructions



Etiones vias aperuerint. Propterea Hippocrates corpora, quum quis purgare uoluerit, oportet fluida facere. Intelliges medicamenta aperientia & purgantia aliquid effecisse, cum iam pro albicantibus, & cineritiis excrementis alui cœculea & admodum flaua deiiciuntur, cumque urinx ad colorem naturalem proprius accedunt. Aperiant oxalidis folia & radix, gramen, asparagus, cichoreum, eupatorium, apium, adianthum, herbæ capillares, calamentum, calamintha, ancusa, fœniculum, gentiana, iris, aristolochia, cinamomum, & aromata, melanthium, securidaca, fumaria, camepithis, rosmarinus serpillum, marrubium, asarum, anisum, hyssopus, petroselinum, absyntium, cappares, radix tamarisci, asparagi, rusci, capparis. Concoquuntur hæc uel perse, uel cum aliis ut inde fiat oxymel conditum cinamomo. Hinc quoque syrupi fiunt, quanquam plurimum utuntur syrupis de endiuia, de cichorio, capillis ueneris, de bizantiis, de duabus uel quinque radicibus. Utuntur quoque uermibus terrenis, asellis, musco, qui in tegulis nascitur, & uocatis ardesiis, rasura eboris, cornu cerui, pudendo uiuerræ (uulgò un furet.) Sed uehementer laudant & iusta quidem ratione ammoniacum, cui ad miraculum usque uim inesse uolunt liberandi obstructions, ut certò euadant, quibus iam à morbo Regio imminet hydropisis. Teritur ammoniacum, datur in hydromelite uel oxymelite. Soluitur oleis camæmelino, amygdalarum amararum, fraxino & similibus, aut Alcantarum arte oleum inde distillatur quod illinitur & bibitur.

Potiones plurimum probant à balneo, iubentque ægrum epoto medicamento decubere in latius dolens. E materia quoque descripta fiunt puluisculi, qui conditi aromate & saccharo exhibentur in potu, alioqui inde fiunt electuaria, aut pars miscetur electuario diarrhœdum. Sunt & aquæ distillatæ, quæ cōueniant; endiuia, cichorii, luporum, cuscuthæ, fumarie, capillariū, acetosæ, terebinthinæ, graminis, raphani, apii, fœniculi, lappræ, rubræ tinctorum, tribuli, libistici, drurgii, rusci, asparagi



## DE COMPOSIT.

spargi & similia. In alimentis sæpe utetur radicibus  
esculentis ut acetosæ, petroselini, graminis, cichorio, ci-  
cerum decocto, capparibus, asparagis, liporum extre-  
mis, stipulæ articulis, quas uocant Luteriæ (Cardes) ui-  
no tenui, quod uel aquis memoratis, uel decocto roris-  
marini dilui potest. Quod ad phlebotomiam attinet,  
ubi uidebitur sanguis redundare, aut fuerit suppressa ali-  
qua uacuatio, liberius detrahes sanguinem e basilica de-  
extra, aut uenis extremæ manus.

Resistentes menses, aut hæmorrhoidas excitabit. Ga-  
lenus usu eiusmodi aperientium & pharmaco purgante  
sæpe uno die curauit ægros. Quod si contumax uideba-  
tur malum, utebatur ualidius tum aperientibus, tum pur-  
gantibus. Constat experientia decoctum ligni sancti  
multis profuisse. Color sœdus relictus frequenti balneo  
curatur, ubi iam causa interior sublata est. Galenus ute-  
batur diagridio. Vtemur agarico, puluere hieræ diacolo-  
cynthidos, rhabbari mistis & diaphenico & diaprano  
in intemperie: aut morbo regio, qui est a crisi, neq; pur-  
gantibus, uacuantibus aut aperientibus utendum est in  
intemperie. Redeundum ad ea remedia, quæ descripta  
sunt in imbecillitate hepatis. Ab intemperie calida in  
crisi res est committenda naturæ, nisi quod balneis la-  
xantibus & detergentibus cutem, humidiores uictu & di-  
luente utendum est. In primo genere quidem ab obstru-  
ctione clysteres acres plurimum possunt, qui, scilicet,  
naturam trahunt, ut iam non effundat bilem in corpus,  
sed ad intestina mittat. Aliquando est hic redeundum  
contra scirrhum hepatis. In uenenis initio quidem uo-  
mitus, si eò uertit natura: si ad intestina, clystere acris. In  
habitum corporis cucurbitulæ cum flamma & scarifica-  
tu. Danda autem per os, quæ contra genus ueneni fa-  
ciant.

## De Splenicis.

Splenicis uocant, quibus lien induruit: addunt alii ab  
humore melancholico. Multa sunt indicia, quæ sple-  
nicos arguunt, grauitas & circumscriptus tumor in sini-  
stro hyppocôdrio, difficultas spiritus, sitis, siccitas oris,  
pedum



pedum & pudendorum inflatio, color malus, plumbeus, decubitus in sinistrum latus, grauis dolor ad iugulum sinistrum tendit, ubi grauior tumor. Quibusdam scitent pediculi, noctu sudor grauis, halitus foetet, erumpit sanguis e naribus, & alijs partibus, gingiue & dentes corrumuntur magis parte sinistra, uenae ad lienem nigricant, scilicet cutis est, maximè ea parte, scicra maligna, in cruribus cicatrices nigrae, alius adstringitur. Horum aliqua, uel omnia splenicos ostendunt.

Imprimis leui pharmaco, uel clystere mollienda aluus, detrahendus sanguis, repetita bis uacuatione in duos dies (inquit Gal.) è basilica sinistra, satis amplo foramine: alioqui è uena medij digiti, uel minimi. Alii uenam post aures diuidunt, uoluntque plurimum prodesse, si eo sanguine, qui effluit, statim illinatur regio lienis. Cõstat quoque ratio quidem experimento uenas apertas, quae ad lienem turgent & nigricant, splenicis plurimum profuisse. Distinguendum quoque qua parte uisceris tumor constitit. Nam si superiori parte, pharmacis purgantibus per interualla utendum erit: si inferiori, clysteribus acribus uti conueniet.

Sed pharmaca & clysteres per interualla imperantur, quibus interuallis, medicamentis aperientibus, incidentibus, mollientibus utendum erit, ut præparata materia melius sequatur. Itaque & ea, quae prius descripta in scirrho hepatis, hæc peculiariter conuenient, & cortex radicis capparidis, radix tamarisci, polipodium quercinũ, scolopendrium, & omnes capillares, rosmarinus, semen agni casti, endiuia, scariola, portulaca, acetosa, cuscutha, semina frigida maiora, & minora cortex & radix salicis, fraxini, genestae, flores hipperici, rorismarini. Abstinendum deinde iis, quae nimium calfaciunt, nisi frigidis temperentur.

Ex omnibus in aqua coctis oxymel comparetur.

Purgationes ex epithimo, cuscutha, folijs senae, polypodio, diasenae, catholico, agarico, diaprano, confectio-  
ne hamech, electuario indo, syrupo de fumo terre in

cortex rad.

capparidis:

Radix tamarisci.

W.

purgones



# DE COMPOSIT.

oxymelite, sero lactis, decocto scolopendrij, ut melan-  
choli~~am~~ purges & pituita. Laudatur aqua fabrorum  
consumendo scyrrho, in qua ferrum fuerit saepius ex-  
tinctum: praeterea aqua depurata, & bene collata, quae  
collibus defluit in alueolos eorum, qui acunt gladios  
& enses, lixiuium sarmentorum, oxymel, acetum scilli-  
ticum, syrupus acetosus, capillorum ueneris, de dua-  
bus & quinque radicibus, de fumo terrae de scolopen-  
dria, de pomis, de epithimo.

Diluuntur syripi in oxymelite simplici, uel Galeni;  
in sero lactis, in qua cuscute, acetosae, boraginis, fu-  
miterrae conuenit. Frequens capparum usus, asparago-  
rum, extremitatum lupuli conditorum, florum gene-  
stae, & uiolarum, cardorum (sunt autem cardi, caules cy-  
narum, qui per hiemem eduntur.) A proprietate conue-  
niunt lien bouis, asini syluestri, uespertilio decolatus  
& siccatus, splen asini domestici, pulli egurini creman-  
tur in testa, puluis drachmae pondere potionibus, quae  
conueniant, inspergatur. Laudant poculum e fraxini  
ligno. Quod autem ad topica remedia attinet, ea arte  
fient in molliendo & resoluendo scyrrhum, quam in-  
uenies capite de Malacticis. Peculiariter conuenit  
ammoniacum dissolutum aceto, deinde pistum cum  
oleo de capparibus, uel liliorum, quo quidem  
ammoniaco eo modo utendum, qui dictus est in  
scyrrho hepatis.

Vteris similiter emplastro de melliloto, dialthea, ce-  
rato hyssopo, diachillum descriptione Philagrii. So-  
let conspergi puluis ceterach, corticis radice cappa-  
ris, scambe, calibis leniter remollito scirrho. Venien-  
dum ad ulum aceti descriptum capite de malacticis, ad  
uehementem dolorem splenis, tumorem, punctionem,  
duritiem. Mirabilis puluis diacapparum. Corticis ra-  
dicis capparum nnc. i. feminis acetosae dr. vi. corticis, ra-  
dicis tamarisci dr. 3. terentur in puluerem. Datur dr.  
media nocte, & inter pallus cum oxymelite. Oportet  
agrum in sinistrum latus decumbere, quemadmodum  
in alijs potionibus spleniticis, tres horas a medicamen-  
to

usus capparum  
et asparagorum  
que conueni-  
unt a pro-  
prietate

remedia  
topica:

squamae

puluis mi-  
rabilis:

accubitus.



ro sumpto ieiunare. Conueniunt & trocisci de eupato-  
rio, & de capparibus. Quod si uidebitur rugitus quidā,  
& flatus, intermiscendum quæ flatus discutiunt, piper,  
cuminum, ruta, daucus, anisum, apium, carui, petroseli-  
num, libitlicum, galanga, & alia id genus.

*De colicis remedijs*

**Q**uæ hic scribuntur uel anodina sunt, uel ad dolo-  
res colicos à frigore & flatibus referuntur. In nar-  
coticis plurimus est usus Philonij, quod antea descri-  
ptum est capite de sputo sanguinis. Vrimur quoque pil-  
lulis de cynoglossa, quæ contra omnes morbos dicun-  
tur. Ad hæc Hoccis suspensis de filo, & immixtis recto  
intestino glandibus seu suppositorijs. In phlegmatica  
utendum incidentibus, detergentibus, & calfacienti-  
bus, qualia descripta sunt in frigidioris uentriculo &  
hepate. Plurimum laudatur quod sequitur parabile, Pi-  
peris grana 3. salis scrupul. i. trita dentur cum uino in  
iure ueteris galli. Allia coquantur & adiecto pipere  
sorbetur ius. Sunt qui uel capū uel pipionem, uel alau-  
das nucleis allij infarciant & ita iubeant edendas  
aues. Alexandrinus tres bulbos allij uespere sumptos  
flatus discutere, & phlegma deducere scribit. Sunt qui  
plurimum tribuant uino maluaticio diluto aqua maio-  
rang aut nepithæ additis scrup. 2. castorei. Alij lauri bac-  
cas nouem aut undecim terunt, & cum uini tenuis & o-  
doriferi unc. 4. s. facto experimento propinant. Item  
folia raphani cum septem granis piperis decoquunt &  
inde melicratum parant, quod mirabiliter facit ne-  
phriticis, colicis, & quibus urinales uie obstructæ sunt.  
Ol. ruta. nardino, lauri. de cado, raphanino, napino, de  
piperib. lanas inculcāt & calidas adinuent uentri, alio  
qui in eisdem ol. quartam partem galbani dissolunt,  
adduntque aliquid cistæ & croci, & ita illiunt. In  
flatuosa eadem remedia conueniunt, & affixæ, cucur-  
bitulæ umbilico. In calida, & biliosa, inedia, quæ alios  
colicos iuuat, uehementer ledit, ubi narcoticis potis-  
simum utendum est, clysteribus mollibus ex radice  
althææ & folijs, malua, uiolaria, muscilaginibus se-  
minis

*Narcotica*

*in flig.*

*in flatuosa*

*in calida & bilio-  
sa narcoticis  
potiss. utenda*



# DE COMPOSIT.

minis lini, althæ, psilii, cydoniorum adiectis capitibus papaueris, uitel. oui, uiolato, unguento rosato. Aliquando clyster iniicitur ex hordeato liquidiore, adiecto syrupo uiolato, de papauere, nenuphare. In calida colica, cataplasma conuenit Alexandrini, farinæ lini & or. ana M. ij. coquantur in ol. chamæmeli. fiat cataplasma. Alioqui.

R. ol. chamæmelini & ros. ana unc. j. ceræ dr. s. fiat ceratum. Muscilaginis seminis lini dr. j. cum farina fabarū subacta ex uitellis oui fiat cataplasma. Sunt qui experimento laudant hanc potionem. Seminis uiol. scr. 4. dantur ex uino diluto. Phisica remedia sunt coralli triti coeleare. Datur ieiunis per triduum cum uino. Item ster-  
cus lupi cum aqua tepida, cornu cerui ustum. Particula incisi umbilici infantis nuper nati, aurea uel argentea ar-  
milla includitur & circumfertur, cingulum ē corio lupi gestatum, masculi maribus, fœminæ fœminis, stragulæ quoque lectorum inde fiunt. Alii pellem gestant, aut e-  
iusdem lupi ster-  
cus nucula includunt, suspendunt ē col-  
lo, ut ad uentrem perueniat. Suspendunt autem ligula ē  
corio ceruino aut filo texto ex ouilla lana, sed ouem uo-  
lunt interfecit a lupo. Alii uerò euasisse a lupo. Lau-  
datur & anguillæ sanguis & cristatum alaude genus, ster-  
cus galinæ, quæ exercetur & nutritur pabulo sicciore,  
tunica interna uentriculi erinacei: masculi quidem in ui-  
ris: fœminæ in fœminis & mulieribus. Hæc quidē scri-  
pta a Græcis & Arabibus trita in puluere aliis miscen-  
tur, quæ aperta qualitate iuuant, piperi, castoreo & aliis  
id genus. Dantur ex melicrato.

## De Priapismo.

**P**riapismus, qui & Satiriæ dicitur, affectio est, cum  
minusculum pudendum inuitò tumet & inflatur, uel  
ut 6. de locis affectis, cum colis in longum & circuitum  
augetur nullo desiderio ueneris stimulante. Addit hoc  
9. libro, oportere inflationem eiusmodi esse stabilem.  
Quibusdam enim supinè decumbentibus, aut aliter con-  
calfactis renibus inflatur colis, sed affectio non est per-  
manens. Nomen ductum a Priapo deo hordorum, cuius  
colis



colis ita fingeretur. Causa mali spiritus insinuaturs fistuloso neruo, qui penem constituit. Addit quoque 6. de locis affectis amplas coleras, quę ad pudendũ perueniunt, concepto multo spiritu hoc symptoma efficere. Aliis locis Galenus generationem huius ita describit. Materiam facit humorem crassum & uiscidum, qui a calore languido motu resoluitur in crassum spiritum: licet aliquando tam crassus, & uiscidus humor sit, ut uel a calore naturali in crassum spiritum non resoluator: initium huius mali præcedente palpitatione intelligitur. At ubi ab arteriis amplioribus malum est, non præcedit palpitatione. Sed usu alimentorum acrium, longa abstinentia ueneris assuetis, diutius præcinctis tentigo frequens mouetur, & hinc flatibus deorsum motis arteriæ ampliantur. Idem accidit acrimonia humorum, sed præcipue his qui multum sanguinis & seminis colligunt atque imaginationibus ueneris indulgent. Sic iis, qui iam a pubertate ueneri indulgent, & sæpius imaginantur, frigidior colis esse solet: contra uerò robustis Athletis. Rarò aut nūquam coeuntibus uel uenerem imaginantibus rugosus & exiguus colis esse consueuit. De priapismo 14. Methodi, 6. de symptom. & morbis, 6. de locis affectis & hoc libro. Initio sanguinem detrahes præsertim iuuenibus, quibus hoc malum familiarius. In humorum acrimonia purgabis. Uteris clysteribus, ad hæc frictionibus, inedia, balneis, uomitionibus, quas præfert Galenus purgationibus, ac breuiter eo genere uacuationis uteris, quod & morbo & naturæ ægri magis cõuenire uideatur. lubebis ægrum defugere omnino imagines ueneris, & quæ uenerem excitant. Initio non oportet membra calfacere, sed leuiter refrigerare, primum quidem cerato rosaceo in aqua concassato, unguento rosato, cerato comparato ex cera, oleo nenupharino & camæmelino. Postea cerato camæmelino, atque tum lumbis, tum pudendis illini debent & perineo. Institues tenuantem uictum citra caliditatem manifestam, & ea quæ incidunt materiã crassam, & uiscidam detergent, quale est oxymel, & alia iam multis locis descripta, imperabisque ea, quæ a proprietate contra



## DE COMPOSIT.

contra morbum faciunt, nympheam, eius semen uel radicem, semen uiticis, id est, agni calti, & post aliorum usum rutham.

### *De Hemorrhoidibus excitandis.*

**H**æmorrhoidibus non est assuescendum, nisi ad curationem, uel cautionem grauioris mali, Epilepsie, Melancholice, Incubi, Quartane & morborum id genus. Si quando tamen excitandæ sunt, sanguisugis bene purgatis & electis facile irritantur, exasperantibus medicamentis, ut folio ficulneo, pumice, medicamentis acerbis, capâ rubra, præsertim pipere, nitrois, sale torrefacto, alumine: uel tergentibus & acerbis, felle taurino, staphideagria, absynthio, centauryo, ciclamino, athanasia, matricaria & aliis id genus. Talia teruntur in puluerem, alia teruntur & exsiccantur, pulueres succis permiscentur ad crassitudinem iustam luti, aut melle concorporantur, & circulo sedis illinuntur.

### *De uitij sedis & pudendorum.*

**V**lcera harum partium iisdem medicamentis ferè egent, sed in sede difficilis curatio, & quia uegetiore, sensu prædita est, non fert, quæ uel austeritate uel acrimonia exasperat, quia humida & calida facile putrescit. Deinde quia eò peruenientes uenæ multæ sunt, quæ illic desinunt, fluxiones retinet, unde humidiora ulcera, callosa & fistulosa fiunt. Præter hæc naturalibus excrementis sæpius naturali excremento madescit, quod & illita excrementa deterget, unde omnino difficilis curatio. Commune est auxilium sedis & pudendi ulceribus a medicamentis quæ siccant citra morsum. Ea materia iam descripta in ocularibus medicamentis, & quæ peculiariter conueniat, cap. de sarcoticis & epuloticis. At in ulceribus malignis partim ad ea, quæ supradictis capitibus, decurrendum contra maligna, depascentia, & putrida ulcera: partim ad ea, quæ iam uisitata sunt, ad ægyptiacum, puluerem mercurii, ceratum de uirgo, mista parte, uel ægyptiaci, uel pulueris mercurii: similiter ad aquas fortes; ad illitum quoque in fine spinæ & inguinibus exunguentis mercurialibus.

De



*De ijs, qui noctu permingunt stragulas.*

**A** B infirmitate musculi, qui uesicam claudit, mollitie neruorum accidit pueris, ut noctu permingant stragulas. In quibus remedia sunt, partim quę qualitate musculū corroborant, partim quę occulta proprietate morbum tollunt. Itaque & perineum, & spinę extremum, & radix colis decocto earum rerum, quę corroborant, fouenda sunt. Deinde unguentis & emplastris, quę id efficiant, utendum. Itaque decocto menthę, rosarum, absynthii, calamenthę, saluę, stecados, lauēdule, maioranę, rorisimarini, pulegii, polii, camæmeli & similibus fouendę partes. Decoquantur uino ex eadem materia, uino & oleo cocta ad uini consumptionem. Olea parantur ex oleis: addita cera subquadrupla, mastiche, thure, suboctuplis cerota fiunt. hisdem oleis molliuntur emplastra de melilorho diachilum, iride adiecta & mollia in aluta prædictis locis affiguntur. Proprietate conueniunt eritii caro, cerebrum aquilę, renes & testiculi leporis: quę omnia edi possunt, uel uino incoqui, ut bibatur uinum: ad hæc pulmo hædi, lingua anseris, guttur galli, uesica tauri, caprę, ouis exsiccata, tritaquę in puluerem. Dantur ex uino dormituri. Probant & enulam & calamintham, thus, ben, ciperum, coriandrum præparatum, myrrham, mentham, galbanum, castoreum, seseli, lac ouillū & caprinum. Vulgare remedium est esus murium. Sunt & qui cinamomum, lignum aloes, spicam, saccharum rosatum, rosas polueribus, quę a proprietate iuuant, permisceant.

*De præfocatione uteri. uide sup. p. 101.*

**P** Ræfocatio uteri grauisimum malum est & periculosum, nasciturquę ferè tribus de causis, quę in unam coeunt, hoc est, uehementem refrigerationem totius corporis. Primaria causa suppressio mēstrum: altera suppressio seminis iis præsertim, quę prius omnino ueneri indulgebant: 3. causa quum quę ante concipiebant, iam non concipiunt. De præfocatione uteri lege caput 6. de locis affectis. Sensu motuquę priuari solent & respiratione, aut certè tam obscura est respiratio, ut non appareat:

*3. c. p. p. solonij  
ut x. quę i  
un. coeunt  
et f. refriger.  
respirationis  
cor  
poris.*



# DE COMPOSIT.

utero pforonig  
uteri i puro  
lismo.

terebinthina

blaste

appareat: uox quoque deficit. In leuiore malo motus, sensus, ratio, uox, & respiratio seruantur. In paroxismo extremorum uincula & frictiones maximè crurum, cucurbitule inguinibus affixæ, odorata utero: grauitèr olètia naribus admouentur, ut calioceum, galbanum, gaggates lapis, bitumè, pix liquida, pili combusti cremati pāniculi, cornua uista, plumæ crematæ, euphorbium, quo ferè uulgus utitur. Veteres soleæ calcetorum crematæ, quas & potui dare solent: frequenti experimèto ruthā naribus admouent, quam & Galenus probat, capam & allium. Odorata uerò, quæ utero adhibentur, ciueta, cotton muscatum, ol. de spica, de costo, gariophilum, galia moscata, alypta moscata. Hæc in puluerè trita oleis dictis permiscètur, ut fiat luti crassitudo, & ita sinui pudoris illinuntur. In suppressis mensibus sanguis detrahi potest. In potionibus post paroxismos ueteres probant agaricū ex uino. Datur & terebinthina & puluis hieræ diacolocinthidos. Laudantur semen & succus plantaginis, semen agni casti, rutha, radix nimphæe, in iis, qui nimio semine abundant. Præterea uomitiones imperant, sternutationes, cucurbitulas inguinibus, coxis, ilibus, deinceps affixas cum multa flamma. Hippochôdria fasciis ligat, & cōstringūt, globuli filii inculcati oleo anethino calido alternatim pectini adponuntur, propināt puluerè betæ bisantia. Post alia quoq; remedia dropaces & sinapismi extremæ spinæ adpositi, balnea naturalia, frequens coitus.

Ad Rhagadas.

ART

**R**hagades ulcera sūt uteri & sedis diducta in fissuras. sed alia humida & saniosa, alia callosa, quædam cācrofa sūt. Saniosa abluunt sero lactis, multa deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinunt. Postea medicamentis consolidantibus, quæ paratur è lithargiro, Callosa egēt molliētibus, cespito, radice lilii, terebinthina, ad mista parte iridis florētis; alioqui uitellū oui assum cū lacte muliebri pistū adpones. In suspensione cātri diapopholigo Nicolai mollito, liquido cerato rosaceo illines. Quod si callus est cōiunctus, adicies aliqd molliētū, butyri, adipū, & muscilaginū ubi calor, uitellus

conter. oui



oui permiscetur: unguento quoque de cerussa, de plumbo, tutia, & aliis, quæ contra cæcos scripta sunt, uteris.

*De Nephriticis.*

**N**ephriticos proprie uocant, quibus calculus in renibus concreuit. Galenus hoc loco extendit nomen ad eos, quibus renes inflammantur aut exulcerati sunt. Dicemus primum de calculo, atque ut distingatur nephriticus dolor à colico, legendus est liber de locis affectis, caput primum & 2. sexti libri eiusdem operis. Sepe enim fallit colicus dolor, ut putetur esse nephriticus, & contra propter connexionem communem renum & colli per peritoneum. Itaque ex dictis locis distinguere oportet. Calculi signa & curationem, breuiter describit Hippocrates 6. epidemion his uerbis. In renem dolor grauis cum cibo, hoc est, stercore replentur. Stercus enim resistens in cæco intestino & colo renes opprimit. Sequitur, Vomuntque pituita. Exasperatis doloribus æruginosa pituita primum euomitur, quæ in uentreulo generatur & ad primos impetus educitur: deinde dolore commotis humoribus non solum æruginosa, sed & biliosa. Subdit Hippocrates, Facilioresque sunt subducta, scilicet, parte materiæ, quæ ad dolentem locum confluebat. Sequitur, Soluuntur cum cibo uacuantur) hoc est, stercore iam non oppressis renibus, ut prius: arenulæ fulvæ subsident, sanguinolentum mingunt. Eiusmodi arenulæ ferè rufæ ac rubentes, certissimum signum faciunt calculi. Mingunt sanguinolentum iam renum facultate retentrice imbecilliore, uel renibus exulceratis, scemoribus, quod è directo est, stupor per consensum, non neruorum, ut quidam uoluerunt, sed uenæ causæ, & propterea dolor stupidus. Subiicit curationem Hippocrates. Quiescere non confert, sed exerceri) mediocriter, scilicet, ut materia, quæ calculum cogit, & concoquatur, & celerius uacuetur. Non repleti) Repleto enim corpore cruditas ad dolentem locum confluit. Iuuenes helleboro purgare) nunc non helleboro, sed, leuioribus medicamentis & clysteribus purgamus. Poplitis uenâ secare repleto corpore,) basili-

cam

*sig. et uero  
calculi renu  
fm hippo*

*uero hipp.*



# DE COMPOSIT.

cam prius secamus, & maximè ubi magna imbecillitas re-  
 num est. Cientibus urinam purgare non perpetuò, sed  
 iam bene purgato corpore, & ubi nulla inflammationis  
 suspitio est. Attenuare crassam, uiscidam, & coactam ma-  
 teriam emollire hoc est mollia & laxa reddere tum re-  
 nes, tum corpora, per quæ calculus deducatur foras: sic  
 enim laxatis uis & mollitis, facilius, & nulla ui, uel mi-  
 nore exhibit calculus, atque in iis duobus tenuando ma-  
 teriam calculi, molliendo corpora, per quæ excludatur,  
 non solum efficies ut exeat calculus, sed ut ne postea re-  
 generetur. Hæc ex Hippocratis & Galeni sententia, qui  
 post Hippocratem mollibus & anodinis clysteribus le-  
 niunt dolores & aluum subducunt. Phlebotomia simili-  
 ter & purgationibus utuntur, nunc casia, catholico, rha-  
 barbaro interim addito, similiter tenuantibus, incidenti-  
 bus, detergentibus & mollientibus medicamentis utun-  
 tur, balneis quoque uias molliunt, cucurbitulis detra-  
 hunt calculum, quas ipsis affigunt. Ad hæc omnia syru-  
 pis utuntur, potionibus & pulueribus, quæ tenuent, inci-  
 dant, & molliant, in quibus plurimum cōuenit syrupus  
 comparatus ex floribus, foliis, seminibus, & radicibus al-  
 theæ, additis radicibus graminis, acetosæ, seminibus cu-  
 cumeris, saccharo & melle. Laudantur & conserua ex iis-  
 dem floribus & foliis cōparata, oxymel, decoctū glycir-  
 rhyzæ, betonicæ, lupulorum, capparis, scolopēdrizæ, her-  
 barum capillarum, quibus fortiora sunt, quæ parantur  
 è scilla, iride, enula, aristolochia. A proprietate iuuant  
 sanguis draconis, lapis hematites, ol. de scorpionibus,  
 bestiolarum, quæ in lapidariis fodinis, quasi uerrucæ lapidi-  
 bus herent pellis leporis cremata, lepus, uel decolatus,  
 uel integer crematus, eiusdem renes cremati, cinis ungu-  
 læ equi, testa cocleæ & cancrorum, terreni uermes, asel-  
 li, auis quæ caudate mula dicitur, calculus, quem quis  
 primum exclusit, urina capræ montanæ, lac excornis &  
 nigræ capræ, cicadæ aridæ, decoctum galli lassati. Hæc a  
 proprietate conueniunt. Qualitate uero manifesta parie-  
 taria, valeriana succus portulacæ siccatus, cucurbitæ se-  
 men, perforatæ, lini, cucumeris, malux, foenugræci, apii,  
 seseleos,

*purgat purinam  
 quæ debet  
 fieri.*

*sy.*

*que conferat  
 proprietate*

*que conferant  
 qualitate manifesta*



feseleos, radix damazonii, ciperi, asari, rusci, asparagi, capparisi, tamarisci, cynosbati fructus detracta interiori lanugine, senellæ uocatæ, gummi & nuclei cerasorum, persicorum, cortex uiridis corilli, testa auellanæ, sarmenitæ uitis uisita, extincta in oxymelite, ut colatura bibatur, electrum, lapis spōgiæ, saxifragum, & alia propè infinita. Ex decocto alliorum paratur oxymel; hydromel, sacchar; alia trita in puluerem. Addantur decoctis, uel per se bibantur; ex ol. de scorpionibus, & cuniculorum adipe, lumbi, perineum, ilia, pubes illinuntur: conueniunt aquæ camemillæ, betonicæ, genistæ, parietariæ, camemeli, fabaceorum, raphani & ex materia commemorata. Aqua & ol. è terebinthina, è ciceribus & bimalua. Et hæc quoque pillulæ laudantur lapidis iudaici, lincis, spongiæ an. dr. i. nuclei mespilorum drac. s. tragacanthæ, gummi cerasorum, & persicorum. Teruntur omnia & incorporantur in unc. i. terebinthinæ, pro tribus dosibus. Conuenit & litontripon uocatum & iustiniæ, alcecanthi semina, baccæ lauri & iuniperi. Coguntur hæc cum glycyrrhiza & radice, enulæ decocto, melle uel saccharo, propinatur.

alcherciggi.

*De inflammatione & exulceratione renum.*

**I**N inflammatione renum clysteribus potius, quàm medicamentis purgantibus utendum. Paratur autem initio ex remollientibus, scilicet, decoctione remollientia: deinde etiam mistis lenientibus, ut camemelo & similib. Olea sint uiolaceum, nenupharinum, papauerinū: postea quoque butyrum recens. Oportet autem modum clysteris esse ad quartaria tria, aut lib. i. Molliora aluo detrahendus sanguis è basilica, quæ inflammato reni repondeat, quæ aliquando procedente malo, iteranda est. Arabes iterant è cephalica, uel poplite. Cataplasmatum primum utendum è decocto maluæ, bismaluæ, rosarum, uiolaris, in quo postea coquatur farina hordei ad crassitudinem. Deinde cum ol. rosaceo, oui albumine & uitellis tantillo aceto, fiat cataplasma. Procedente morbo puluis camemeli, farina lini & foenugreci, puluis absinthii & alia, quæ leniunt, coquantur discutiunt,



# DE COMPOSIT.

scutiunt, miscere conuenit. Postea quoque cucurbitule affiguntur lumbis & ilibus cum scarificatu. Utendum fotu e uesica hydreleo plena, quod hydreleum ex decocto & ol. conuenientibus paratum est. Initio iis, quæ circa initia conuenire dicta sunt: postea uerò mutata, ut prius, materia. Initio abstinendum uino & mellitis, quales sunt syrupi, hydromel, oxymel, &c. Atque diureticis nutriendus iusculis e pullastro, lactuca, acetosa, portulaca, borragine & hordeatis. Bibet aquam hordei. Postea apparentibus iam urinis crassis & sedimenti boni, quæ prius tenues, aquosæ uel rubentes apparuerint, diureticis utemur: applicabimus emplastrum de musci laginibus, pistum ol. camæmelino uel irino. Postea quoque emplastro de meliloto. In exacerbationibus dolorum, incessionibus ex decocto bisfmalæ, malæ, uiolaræ, camæmeli, anethi, meliloti, sceniculi atque urgentibus, doloribus nimium & ungilibus decocto papaueris, cuius semen miscbitur hordeatis, philonio & aliis potionibus narcoticis utendum erit. Sed aliquando non coquitur per urinam, scilicet, sed suppurat: itaque signis apparentibus suppurationis, fotu, incessione, emplastris, cataplasmatibus, clysteribus utemur. Clysteribus ex materia suppurante, quam scriptam inuenies capite de Suppurantibus, atque contingit aliquando suppurationem resistere, ubi acerbis clysteribus irritare oportet, dandumque in potu hydromel comparatum ex decocto fenugreci, parietariæ, althææ, semine cucumeris. Quod si dolor urget, incessionibus utendum ex materia mitigante, hordeatis, lacte uel emulsionem amygdalarum. Iam eunte pure animaduertendum, quale pus sit. Nam si liuidum & grauiter olens, pauca spes est: alioqui bene sperandum, utendumque syrupo de althæa, de iuiubis, lacte asinino, melle, diatragacantho frigido, diaireo simplici, alphenic, & similibus, ut uel dolor uel necessitas urget, lacte amygdalino cum multo saccharo, tum purioribus urinis euntibus, lacte bubulo & ouilo potius, quam aliis utendum est, atque aliquando asinino, equino, caprilo. Bubulo quidem utendum est, sed adie-

sta

cibus.  
potus.

mixture



Et quarta parte feri, conueniunt quoque sorbitiones usitatae ex lacte & vitellis ouorum, atque omnino multus sit usus lactis, nisi corrumpatur. Vbi sanguis fluit, hisque sanguinem sistunt & astringunt, utendum erit. Resi- stente alio pillulis ex aloe, & rhabarb. terebintina, cas- sia, cum multo diatragacantho, utendum, & quia dolores saepe urgent, semicupia, id est, incessiones, comparanda ex decocto rerum, quae leniant. Simili forn & sacculis uti oportet. Pulueres quoque, quos cordiales, uocant, alimen- ta boni succi omnino instituenda sunt, quia animi deli- quia saepe capiuntur, & plurimum emaciantur. Itaque ad animi deliquia, morbum, & maciem plurimum fa- ciet decoctum ex passulis, adiectis aliquot iuiubis, sicu- bus, glycyrrhiza, semine cucumeris. coquantur autem ad crassitudinem syrupi. Deinde misceatur diatragacanthum frigidum, diaris simplex, tabulae utriusque, dia- margaritum, de gemis, lactitiae Galeni & similia: coque utatur saepius in cocleari. Quod si urgetur siti, optimum hordeum coquatur ad putrilaginem: deinde emulatio aliquot tritarum amygdalarum adiecta parte eius aquae decocto misceatur. Condiuntur omnia saccharo & dia- tragacantho frig. Poterit uis augeri adiecto nodulo ex seminibus cucumeris, medulla seminis cucurbitae. In remissione mollibus frictionibus utendum, mollibus stragulis, & omnino alimentis boni succi.

*De Arthritide.*

**N**omine Arthritidis Podagram, chiragram & Mor- bum coxarium includimus. Nam aliquando haere- ditaria. Ferè autem intemperies, imbecillitas partium & affluxus humorum. Itaque in uacuando & roborando cu- rationis summa posita est, ac praecedat quidem uacuatio totius corporis, in plenitudine per phlebotomiam, quae in coxario morbo, primum in cubito: deinde in maleolo fieri debet. Arabes initio coxarum morbi Phlebotomiam laudant, & intervallo annularis & parui digiti. In poda- gra & chiragra & opposito membro è directo uena secan- da est. In cacochimia purgationibus utendum, uomitioni- bus, clysteribus, deinde etiam sudorificis & diureticis. In

§ topicis,



## DE COMPOSIT.

topicis, initiò repellentibus utendum. In coxario morbo abstinendum iis & statim mitigantibus utendum, quæ neque multum calfaciant, neque refrigerent. Repellent ceratum rosaceum nutritum solutum rosaceo, unguentum rosatum, ceratum de psilio, & alia quæ scripta inuenies cap. de repellentibus, quemadmodum & quæ mitigant dolores fatus, ol. cerota, acopa, miracopa capite de dolore. Aliquando narcoticis utimur, primum quidem leuioribus: deinde fortioribus eadem ratione, quæ eodem capite de dolore præscripta est. Celebratissimum epithema Asclepiadis, quod illic scriptum inuenies. Sed quia humor in iis morbis ferè crassus est & crudus, uiscidus, paulatim mitigando, incidendo, attenuando, discutiendo, & in coxendice etiam attrahendo malum euincendum est. Vacuatio uniuerso corpore, præparata materia plurimum confert commotus sudor, præsertim ex ea parte, ex qua malum est. Facile repleto uase mouebitur aqua calida, & uino in quibus ea coxerint, quæ sudores mouent, discutiendi & roborandi uim habeant camæmelum, melilotum, anethum, ebulus, camæpitis, hyssopus, saluia, rosmarinus, origanum, calamintha, absynthium, folia & bacca latri & iuniperi, semen anisi & fœniculi. Materia cocta cum oleis anodinis & discutientibus contundi potest & linteo composita calidaque admoueri parti. Decoctum autem inclusum uase bene clauso & constricto orificio plantæ pedis, ubi in crure uel ischio dolor est: uolæ manus, ubi in brachio, admoueri debet, donec inde commotus sudor, uapor attingat partem & moueat sudorem. Detergendus sudor diligenter & locus affectus lanis sordidis inculcatis ol. mitigante, resolvente, corroborante contegendus est. Vacuata materia, corroborare conuenit emplastro diachilo ireato, thure addito, mastiche, sanguine draconis pistis, & unitis omnibus cum ol. anethino, laurino, de absynthio & aliis id genus. In inueteratis ubi iam dolor quietus est, saluia, sal, uino austero & ol. camemelino incoquenda sunt, fiat fortis expressio, seruetur ol. quo sæpe articulus infirmus



firmus affricetur. Multi longa abſtinentia uini curati ſunt. Sunt, qui plurimum probat decoctum baccarum iuniperi, glycyrrhiſæ, uocatarum ſcinellarum, radicis enulæ & ebuli, decoctum gaiaci incidendo, mouendo ſudores: atque ita uacuando conferre poteſt. Pellis lani-  
nina bene macerata & comparata cum materia aſtrin-  
gente, galla, alumine, & aliis, quæ coriariis uſitata ſunt,  
geſtata plurimum ad cautionem. Græci & Arabes plu-  
rimum tribuunt hermodactilis, ac uarias pillulas inde  
conficiunt miſtis ſeminibus aniſi, fœniculi, zinzibere.  
Apud Nicolaum maiores ſunt in frigida cauſa: mino-  
res, in cauſa calida. Utendum erit deſcriptionibus adie-  
ctis iis, quæ conuenire uideantur, agarico, maioribus:  
Rhabarbaro, minoribus. Contingit & curatione malè  
inſtituta tophos concreſcere in articulis, quibus conue-  
niunt, quæ incidunt, tenuant, molliunt. Emplaſtrum  
de uigo & meliloto, de muſcilaginibus miſta parte ce-  
rati hyſſopi deſcriptione Philagrii, galbano pingui &  
aliis, quæ ſcripta ſunt cap. de malaſticis, de uitiis of-  
ſium, de piroticis. Sciendum tamen eiufmodi tophos  
aliquando ita induruiſſe, ut nullis Remediis cedant:  
aliquando quoque figuram membri commutare in ῥ-  
ῥυλον, & ῥυλον, quorum affectum remedia inuenias  
capite de uitiis oſſium & neruorum. Sciendum quoque,  
quod ſcripſit Hippocrates, dolores eiufmodi ſæpe pro-  
trahi ad diem 40. ut nihil ſit mirum aliquando adhibi-  
tis conuenientibus Remediis, tardius curari.

FINIS.

6 8



# INDEX RERVM SCITV DIGNARVM, QVAE TOTO OPERE CONTINENTVR.

Litera maiuscula, ut C. significat libros de Chirurgia.  
F. de Febribus, κατὰ τὸν ὄντος, & de Peste Vbi nulla prae-  
figitur, Praxim & Scolia intelligimus.

A		Aloe	C.40
Abscessus.		C.76	C.80
A Absynthii succus	C.31	Alui fluxiones, 120. & deinceps	120.125
Accidentia manuum in graui pleuritide & peripneumonia	C.78	Ambusta	C.49
Acetum	C.4.6.1.15.91	Ammoniacum	C.14
Achores	F.58	Amylon	C.40.45
Acorus	18	Anethi radix & abrotoni	C.45
Acopa	C.83	Angina 52. & deinceps. eius	56
Acopon Asclepiadis	C.83	Species	160.161
Acopon Democratis ad mebra tabida	C.68	Ani exitus	C.77
Adeps	C.14	An seruato motu pereat sensus & contra	C.24.25.26
Aegyptia Andromachi	C.66.55	Animaduertenda in usu ferri & ignis	C.80
Aegyptiaca recetionum	C.36	Anodina	C.57
Aegri non cruciandi	C.28	Anserini	C.98
Aerugo	C.35.41	Antimonium	C.39
Aes ultum	C.45.98	Antispodia	F.44
Agaricus	32.35	Appetentia dissoluta	C.28
Agrippa pedum intolerabili cruciatu aceto liberatus	C.89	Aperientia medicamenta	C.90
Alchadicon	C.102	Ad aperta	11.12.13.14
Album Actuarii	C.49	Apoplexia	C.67
Album Galeni	C.49	Apostolicon	C.4.20
Album Rasis	C.50	Aqua	6
		Aqua frigida	Aqua



# INDEX.

Aqua in folliculis ulmi	C.54	Boulimus	83
Aquæ fortes	C.103	Brasica	C.9
Aquæ & aceti usus	C.53	Butyrum	C.9.20
Arcanum Albucalis	C.87	Butyri uis	43
Ardor urinæ	136.137	C	
Archigenes ad Aegilopas	C.101	Cadmia	C.44.48
Area	F.53	Cadmia & scorix præpa- ratio ad multa	C.88
Aristolochia	C.35.38.40	Calculis	132
Asclepiadis	C.64	Calculus uesicæ	135.136
Arteriotomia	6	Calida quæ adstringunt.	C.3
Arthritis.170.& deinceps	168	Callus	C.64.99
Asthma 54.& deinceps	57	Callus distortus	C.68
Astrictio	C.3	Callus maior	C.67
Attractilis	C.54	Calx	C.49
Attrahentia	C.5	Cancris pudendorum	C.50
Attrahentibus quæ miscenda	C.5	Canina appetentia	83
Attrahentium materia	C.5	Caninum cerebrum	C.65
Auditus grauis	F.67	Cantharides	C.97
Corpuscula in aures cadentia	F.67	Contra cantharidas & uene- na	C.85
Aureum Mesue	C.43	Capillorum profluuium	F.56
Aurium dolor	F.65	Capillorum tinctura	F.57
Aurium dolor a calore	F.66	Capitellum	C.103
Ad aurium dolores	C.88	Capitis dolor diuturnus	6
Aurium uermes	F.67	Capitis dolor ab ebrietate	7
Aurium ulcera	F.66	Capitis dolor a perfrictione	8
Axungia rotarum	C.38	Caprillum stercus	C.12
Azigos uena	63.68	Caricæ, ficus & inde cataplas- ma	C.21
B		Caricarum decoctum	C.21
BAlnea, fatus, infusiones	C.81	Caros	14.16
Balsaminum	C.82	Castoreum	15
Barbarum	C.56.93	Catalepsis	16.17
Bdellium	C.14	Cataphora	14
Bedegar	C.57	Cataplasmata	C.4
Borrax	C.41	Catarrhacta 44.& deinceps	35.36
		Catarrhus	3
		Cathæ	



# I N D E X.

Cathartica	C. 97	Collyrium album	C. 87
Catoche	14	Collyrium Alexandri	C. 88
Cauteria	C. 94	Coma	18
Cauteriorum materia	C. 27	Compositio Aniceti	C. 75
Cauterium	C. 91	Ad consilium quæ adhiben-	
Centaurii succus	C. 57	da	C. 3
Centaurium minus	C. 54	Conuulsio	22. 23
Cephalica	C. 38	Conuulsio canina	20. 21. 22
Cora	C. 4	Conuulsionum remedia	C. 61.
Cerata magis adstringentia.		Corallus	C. 40
C. 4		Cordis tremor	68. & dein-
Cerata resoluentia	C. 11	ceps	69
Cerati resinati uix in luxatio		Cornua ceruorum	C. 84
nibus	C. 63	Cortex radice mandragoræ.	
Ceratum album	C. 63	C. 87	
Ceratorum ratio	C. 73	Cristallus	C. 40
Ceratum diaeuphorbion	8	Critonis	C. 55
Ceratum è psilio	C. 4	Crocus	C. 21
Ceratum rosaceum	C. 4	Crustas detrahentia	C. 102
Cerealia	C. 72	cupha	7
Cerota	C. 4	Cutis excoariatio	172
Ceratorum materia	C. 38	Cyperus	C. 45
Cerusa è dracontio	C. 32		
Chalasticis quando utendum		D	
C. 13		Defensua	C. 5
Chamæpitis	C. 53	Deiectionum differen-	
Cholera 74. & deinceps.	77	tia	127
Cuneolus	C. 90	Deligatio	C. 91
Cineres diaphoretici	C. 12	Deligatio in uaris	C. 62
Cirsocele	166	Deligationis materia	C. 59
Cizicenæ & quæ glutinēt ner		Diabete	144
uos	68	Diaireos	C. 43
Coagulum	C. 6	Diarrhæa	16
Cœliaca affectio	116	Diarrhodon Nili	C. 87
Cochlex	C. 2. 56	Diarthrosis	170
Colicus dolor 110. & dein-		Dini	57
ceps.		Dolor	80
Collyria	44	Dolor capitis	F. 60
		Dolor capitis	1. causæ, si-
			gna,



# I N D E X.

igna, curatio, ibidem, & 2.	Escarotica	C.91.94.98
3.4.5.	Euphorbium	C.6.82
Dolor capitis in febribus F.41	Exanthemata, papulæ, uario-	
Dolor capitis diuturnus F.62	læ & morbilli	F.33
Dolor capitis ab æstu F.60	Extenuati membri deligatio.	
Dolor capitis ab ebrietate F.	c.67	F
61	Arinæ resoluentes	C.12
Dolor capitis ex ictu uulnere	Febris quid	F.1
aut contusione F.62	Febris anafodes	F.20
Ad dolores coli, uteri, uen-	Febris ardens	F.14
tris C.82	Febris cardiaca	F.20
Ad dolores dentium C.88	Febris ex cruditate	F.24
In doloribus uentris quid spe	Febris Epiala	F.10
ctandum 114	Febris Hæctica	F.21
Dolorum differentia 174	Febres horrificæ	F.7
Dropax C.95	Febris lipiria	F.21
Duplex ratio curandi C.70	Febres colliquantes	F.20
Dysenteria 116.118	Febres pituitosæ	F.8
Dysuria 130.131	Febris putrida continua	F.17
E	Febris quartana	F.10
Ætiloticon Asclepiadis. C.	Febris quotidiana	F.8
100	Febris Semitertiana	F.6
Efflatio læsa C.77	Febris tertiana quid & eius cu	
Elephantiasis uera 170. diffe-	ratio	F.2
rentia 71	Febris tertiana notha	F.4
Elephantiorum explorando	Februm accidentia	F.36
rum ratio Arelatæ 171	Fermentum	C.6
Elleborus 35.C.99	Ferrum cui parti infigatur C.	
Emplastrum Democratis C.18	27	
Enterocoele 166	Fluxus pestilentialis 128 129	
Epilepsia 27.28.29	Fœnugræcum	C.9
Epilepsia per consensum. 33.	Fœtus	C.81
34.35	Fomenta resoluentia	C.11
Epiplocele 166	Fotus in compuncto neruo	
Epithema Asclepiadis ad po	C.70	
dagram C.86	Francisci Valleriolæ laus 161	
Epilotica C.44	Fraxinus	C.40
Errhyna 7	Fuligo	C.40
		Fura



# I N D E X.

Furfures	F.57	Incubus	26
Fusum	C.43	contra inflammationes	c.64
		Infumatio ex pyrite & aceto	
	G		
<b>G</b> Aiacum	C.84	C.16	
Galbanum	C.15	Isidori ad nomas, gangrenas	
Galla	C.90	C.34	
Ganglia	C.79	Interpretes materię chirurgo	
Glutinantia	C.51	rum	C.1
Glutinandi ratio	C.52	Intestinum rectum	153
	H	Isatis	C.54
<b>H</b> Arpax	C.99	Isis	C.74
Hæmorrhagia 48	C.90	Iudei	C.43
Hæmorrhagia e naribus	6	Iuncatum lignum	C.85
Hæmorrhoidum differentia,			
& curatio	150.152	<b>L</b> Abroſũ ulceris ratio	C.52
Hedera	C.54	Lac	C.81
Hepaticus fluxus	125.126	Lac ficulneum	C.96
Hepatici	86.88	Ladanum	C.15.40.48
Hepatis debilitas	88	Lamponis ad polypos	C.98
Hepatis oppillatio	92	Lana ſordida adſtringēs	C.92
Herniarum differentię	166.	Lanę ſordidę	C.98
167		Lana ſuccida pro faſciis quan	
Hieroglyphica	C.74	de utendum	C.63
Hordeum	C.45	Lanarum uſus	C.70
Hybiſci radix	C.66	Languidiuſ & efficaciuſ ſarco	
Hydrargiron	C.89	ticum	C.39
Hydrocele	166	Lanugo lintei	C.44
Hydrops 94. & deinceps	96	Lapidum generatio in corpo-	
Hyppochondriaca melanco		re humano	134
lia	33	Larigna duplex	C.40
	I	Lauanda cera, reſina & metal	
<b>I</b> cterus	92	lica quando	C.71
Iccoris inflammatio	86. &	Lenientium noxa	C.81
deinceps		Letharguſ	13.14.15
Ignis	C.101	Leuce	170
Ignis duplex uſus	C.95	Lienis curatio	96
Ignis & cauteria	C.91	Lienofi	109
Impetigo	171	Lienteria	112.113.114
		Li-	



# I N D E X.

Ligamenta	c.80	tus	c.6
Linguae scabrities & nigredo.		Menses sistendi	153
F.39		Menses in grauidis & uirginibus quomodo fluant	158
Liquabilia	c.74	Mensium muliebrium causae & differentiae	158.159
Lithæ	c.36	Menstruorum prouocatio	156
Lithargyrus	c.41.45.58	Metallica	c.35.41
Lixiuum	c.30.72	Metallorum præparatio	c.44
Lixiua saponaria	c.103	Minium	c.35.103
Lixiuorum materia	c.31	Miracopa	c.83
Lumbrici terræ	c.58	Mola	160.161
M		Mollientium usus	c.13
Macedonicum	c.22	Vnde mors amputatis membris	c.60
Macheronis	c.55	Moschionis	c.65
Malactica quæ	c.13	Mucagines	c.81
Malactica leuia	c.16	Mucosus humor	c.68
Malagma scribonii ad multa		Mumia	c.93
c.79		Muscus	c.65
Malagmata	c.18	N	
Malagmatu consistencia	c.14	Narium affectus	F.69
Mania	11	Nasus fractus	c.64
Manna	c.40	Nerui crurum	c.78
Margaritæ	c.40	Nerui è spina foras & intro	c.79
Mastiche	c.9	Neruorum remedia	c.69
Masticatoria	7	Nomæ	c.30
Matricis exitus	153	Nutritum	c.50.55
Meconium	c.87	Nux rancida	c.8
Tria genera medicamentoru		O	
contra putredinem	c.33	Contra oedemata	c.64
Medulla	c.6.15	Oenostagma	c.31
Meindi difficultas	127	Oesopus	c.21
Mel	c.9.31	Olea	c.71
Mel anacardinum	c.97	Olea anodina	c.80
Melancholia	11.33.34.35	Olea arthritica	c.11
Melicratum	c.31	Olea calidissima	c.98
Meliloto decoctum oculare		Olea	
c.88			
Melligo unæ passæ	c.21		
Mendicus lue uenerea cura-			



# I N D E X.

Olea quæ callis conueniant	Paralytica remedia	16
c.99	Paregoricū Asclepiadis	c.85
Olea malactica	c.14 Parotides	c.74
Oleum	c.6 Parotidum suppuratio	c.21
Oleum è floribus rorismarini	Ad facilem partum	c.87
c.82	Passionis	c.94
Ol.è ligno sancto	c.11 Pastilli	c.21
Ol.è lini semine	c.11 Pastillus niger andromachi	
Ol.de mandragora	11 c.102	
Ol.ex ouis	c.9.83 Pedicularis morbus	F.56
Oleum de papauere	11 Pellis ouilla	c.65
Olei è rebus pinguibus eliciè	Penicilli	c.90
diars	9 Penis morbi	136.137
Ol.terebinthinum	7.13 Peramputatio ossis	c.60
Ol.è torpedine	c.87 Perfusiones	c.64
Ol.è tritico	c.9 Peritoneum	c.24
Omphacium	c.4 Perniones iuuans medicamē	
Oppilantia	c.3 tum	c.17
Oppilatio hepatis	97 Pestis essentia	26.46
Opio utendi modus	c.86 Phænigmus	c.96
Ab opio noxa	c.86 Phrenitis	9.11
Opium	11 Phthisis 56	& deinceps
Ophthalmia	37.38.39.40 Picatum	c.73
Opopanax	c.15 Picatum ceratum	c.21.63
Optimum docēdi genus	c.70 Pillulæ quæ sanguinem clau-	
Os corruptum	173 dant	c.93
Ossis abscessus	c.59.62 Pinguia	c.81
Ossis corruptela	c.59 Pituita puri similis	c.24
Ossis rasura	c.59 Pix	c.15.21.40
Ossium connexio triplex	168 Plantago	c.50
Ossium labores	c.58 Plantæ	c.72
Ossium uitia neglecta	c.58 Pleuritis 56	& deinceps
Ostrea uiua	c.6 Plumbum	c.41.48
Oxyroceum	c.67 Pneumatocèle	163
P	Polydæ pastilli	c.94
Panalithes	c.66 Pompholix	c.32.50
Paracentesis	103 Pompholix uerus	c.44
Paralysis	18.19 Præseruatio a peste	F.27.47
		Præ-



# INDEX.

Præcisio	c.91	Repellentium materia	c.3
Præhensio	c.91	Repellentium utilitas	c.2
<u>Propolis</u>	c.5.15	Resina	c.21.40
Prurigo	170	Resoluentia	c.7
contra pruriginem a deliga- tione	60	Resoluentium particularis ma- teria	8
Psoricum	c.7	Rhabarbarum	6
Psoricon Mesue	c.33	Rhagades	160
Psydracia	F.59	Ricotia	c.33
Psyllium	c.86	Rigor & contortio	c.78
Pulvis acris Galeni	c.98	Rubus	c.4
Pulvis Octavi	c.37	S	
Pulvis Rasis	c.43	Sabina	c.33
Puerorum Epilepsia	30.31	Sacculi resoluentes	c.11
Purgandi ulcera ratio	c.29	Sal alchali	c.102
Puris generatio	c.20	Salix	c.58
contra putredines articulorū neruorum, &c.	c.33	Salugo piscium	c.30
Putrida quæ curent	c.33	Sandaraca	c.35
Pyrotica	c.95	Sandix	c.35
Pyrotica quibus temperanda	c.103	Sanguis draconis	c.56
		Sanguinis mictus	140.141
		Saniem exugunt	c.29
Pytho	26	Sanies insidens perioftio	c.89
R		Saxo	c.130.131
Radiculæ malactice	c.16	Sarcocoele	164
Ranarum adeps	c.102	Sarcocolla nutrita	c.88
Ratio splenicorum	c.62	Sarcotica	c.37
Refrigerantia uehemēter	c.4	Satyrium	c.42
Regeneratio carnis in osium	c.60	Scabiem & maligna ulcera cu- rantia	c.35
Regius morbus 89. & dein- ceps	F.44	Scamma	c.45
Remedia unde petenda	c.22	Scammæ	c.61
Remediorum ratio ex ratione partium	c.92	Scammæ & ossa corrupta de- trahit cathegete	38
Renum inflammatio	138	Scirrhi differentię	c.14
Repellentia	c.2	Scirrhus desperatus	c.13
Vbi non repellendum	c.3	Scoria ferri	c.38
		Scorpio	c.6
		Sebum	



# I N D E X.

Sebum.	c. 14	Sympithi.	26
Semen rosarum.	c. 57	Syncope 70. & deinceps.	
Septa composita.	c. 99	Syrion.	c. 21
Septica.	c. 98	Syrup. de papauere.	11
Sideratæ partes nimia astringione.	c. 60	T	
Siefrosatum.	c. 87	T Apfia.	c. 6
Sinapismus.	c. 96	T Tenesmus. 124. 125. 131.	
Sinarthrosis.	173	132.	
Singultus 80. & deinceps. 80		Testiculus tertius.	167
81. 82		Tetrpharmacum.	c. 22
Sireon.	c. 14	Theriaca.	42
Sitis.	F. 38	Theriaca uetus.	13
Solutio continui.	c. 80	Thus.	c. 11. 38
Sparadrapum.	c. 67	Thus, manna.	c. 92
Spongia.	54. 90	Tophi generatio.	c. 89
Sputum sanguinis 61. & deinceps.	63	Tophi à lue uenerea.	c. 90
Stercus caprillum.	c. 35	Torpedo.	c. 87
Stomachi imbecillitas. 74 & deinceps.		Torpor.	c. 76
Stercus columbinum.	c. 73	Triapharmacum.	c. 55
Stomachi.	78	Tringener.	c. 43
Styrax.	c. 15	Triticea farina.	c. 64
Subeth.	15	Triticum & inde farina & panis.	c. 20
Succubi.	26	Trocisci de arsenic.	c. 102
Succorum usus.	c. 4	Trocisci è calce	c. 102
Sudor in febribus.	F. 42	Tussis. 53. & deinceps.	
Sulphur.	c. 6. 12	V	
Suppressa & sine uoluntate mi- sta urina.	c. 78	V Arices.	F. 45
Suppurantia.	c. 19	V Ventriculi affectus.	88
Suppuratio nõ necessariò aper- rienda ferro.	c. 24	contra uenena frigida.	c. 84
Suppuratio quomodo foras euocanda.	c. 24	Vermiculi.	c. 90
Sutura.	c. 76	Vermium genera, causse, cu- ratio.	146. 147
Symphysis.	168	Vertigo.	8
		Vini ratio.	c. 62
		Vinum.	c. 4
		Viride Andromachi.	c. 22
		Viride Bonantini.	c. 57
		Viri-	




# INDEX

Viride ex herbis.	c.37.57	Vrinæ suppressio & difficul-	
Vitus debilitas.	40.41.42	tas.	129
Vitellus oui	c.93	Vitio Arabica.	c.101
Vitiligo	170	Vitolex.	c.42
Vitreolum	c.34	Vteri affectus.	153
Vlcera quomodo abluenda		Vteri prefocatio.	160.161
c.32		Vulnera neruorum.	c.69
Vlcera uermiculantia	c.32	vulnus simplex an multiplex.	
Vlmi decoctum	c.64	c.27	
Vlmus	c.54	X	
Vomica desperata	c.29	Xysmata.	c.128
Vomicæ aperiendæ ratio C.		Y	
23		ὁ πόπυον.	46
Vomicæ quando aperiendæ.		υποσφαγμα.	46
c.28		υποχυμα.	46
- Vrina.	30	υτερικη, πριξ.	160
- Vrinæ contra naturam exeun-		Z	
tis uariæ differentiæ	143	Zambana.	c.54

FINIS.
















IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI,  
MEDICI PARISIENSIS  
Celeberrimi

DE MATERIA CHIRURGICA.  
LIBER I.

P R A E F A T I O .



DE materia remediorum, quæ ad Chirurgum pertinent, plurima quidem Hippocrates, Galenus, & ante hunc Anazarbæus Dioscorides memoriæ tradiderunt. Quædam posteritas addidit non fraudanda laude: sua enim veterum, sua posterorum gloria est. Atq; iniquum decreti genus est, quod omnem fructum laudis & gloriæ huius disciplinæ vni Græciæ detulit, vt Arabum ac posteritatis studia perpetuis tenebris opprimantur. Illaudato solo laudatæ fruges sæpenu- merò proueniunt: Vixerunt Græci in media luce literarum. Extiterunt Arabes, & inde ductæ familiæ, iam defertis ac sepultis melioribus disciplinis, digna tamen luce æternaq; memoria nobis reliquerunt. E viuis fontibus Græcorum remedia primum petenda sunt: sed ita, vt nec Arabum riuos, nec posteritatis ingenia contemnamus. In his hauriendum quod saluum & incolume: repudiandum, quicquid fecerit cænum, & disciplinæ veterum malè conuenerit. Atq; omnino hac parte perlufranda nobis naturæ fertilitas, à qua omnis vbertas, & quasi sylua remediorum ducta primū est. Nusquā nātura

*Interpretes  
materie chi-  
rurgorum.*

*Laus aliqua  
Arabum et  
posterorū.*

*Vnde peten-  
da materia.*

*Naturæ fer-  
tilitas i ma-  
teria chirur-  
gorum.*

a

tura



*Pronæa chi-  
rurgos po-  
tius quàm  
epicurea.*

*Taxantur  
nostri homi-  
nes.*

tura magis luxuriat, nulla in re pariter atque his chirur-  
giæ opibus ambitiosa est. In quibus tam prolixè numen  
suum explicat, ut Pronæa illa non tam Epicurea, quod  
quidam ait, quàm chirurgos fuisse videatur. Plurima  
quidem ad voluptatem & delicias hominis: omnia verò  
ad salutem eius & conseruationem chirurgus comparauit.  
Nam quæcunq; tota rerum facie exposita, quæcunq;  
cauernis terræ ac visceribus latent, quicquid est aqua-  
rum, stirpium, animalium, terra, ignis, maria, chirurgus  
inseruiunt. In fece rerum & excrementis, in carie, in re-  
bus minimis, obsoleti, ac propè nullis, remedia condita  
sunt. In re vna multiplex natura vario genere remedio-  
rum fœta est. In apicula quàm variè luit, quàm multas  
diuitias chirurgus condidit, mella, ceram, metyn, sandara-  
cham, fauos, propolim, quicquid denique locuples illa  
alueorum respublica continet. Quin & apes ipsas ad au-  
xilia transtulit. Et in homine multa sunt, quæ pro sunt  
homini, ut quocunq; animum aduertat, quocunq; ocu-  
los coniciat, remediorum turba sese offerat. In quo  
summopere probanda est maiorum diligentia, multoq;  
magis imitanda stodia, qui in ea vastitate rerum nihil in-  
tentatum, nihil in expertum reliquerunt: omnia elabo-  
rata & summo iure exstima, literis consignarunt, qui-  
bus iam perfrui datum est, alienis scilicet bonis. Primum  
ergo consuetudine, natura, & maiorum historia, infinita  
nobis materia comparata est, quæ iam deserta ac suppressa  
iacet, quia neglecta. Satis est capsula pauculis alueis di-  
stineta: satis pyxidicula: hic vno atque altero remedio  
contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec ulli reue-  
landa putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia,  
quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri ele-  
menta sordent, & quicquid elementare est. Hinc noua  
elementorum soboles, hinc æther & cælum ipsum ad re-  
media exprimenda sunt. Vernaculæ sunt nobis atq; do-  
mesticæ, naturæ opes, quibus vulnera coniungas, repur-  
ges sordida, sinus impleas & cicatrice tegas, cæteraq;  
præstes omnia, quæ chirurgi opere continentur. Verum  
suis



# LIBER I.

2

suis cuique studiis frui liceat. Nos ex immensa, omnibusq; exposita naturæ sylua & maiorum historia, quæ iam publica vel multorum fide constant, remedia transferemus. Exhibebimusq; rudimentum operis, suis quidem lineis descriptum, quod alius impleat, informet, suis denique numeris absoluat. Nos speciem aliquam & formam argumenti adumbrabimus, secuti Cosmographos, qui totius orbis ambitum angusta tabula contrahunt. Idem enim condonandum nobis, cum non alios fines imperij, alios materiæ, de qua præsens instituta oratio, natura posuerit. Genera quædam rerum & præcepta artis primû explicabimus, utendi methodum, & leges aliquas instituemus, ex quo censëbitur particularis materia, & formulæ describentur, quas partim ars ipsa reperit, partim optimorum medicorum usus atque experientia comprobavit. Antidotarium inscribunt hoc genus argumenti, nulla ratione aut usu veterum, sed, ut fuit annorum licentia, è Græca voce Latina analogia nomen detorsērūt. Multa nobis, plurima aliis reliquimus, ne volumen, quod quinque libris Ioannis Tagaultij, & hoc de materia chirurgica commentario cogendum erat, in maiorem molem accresceret: deinde non plus operæ hac in re licuit collocare nobis, quàm à quotidianis studiis, staturq; interpretandi cura relictum fuit, idque breviori tempore, quàm hoc institutum nostrum breue, quidem, sed uarium, expostulet. Ideoque dignum uenia, si contracto ambitu uerborum, pressaq; periodo, quædam describentur. Et in tam numerosa medelarum turba potior est uerborum moderatio, breuibsq; sententiis res premeunda est. Adhæc ponimus idoneos esse huic doctrinæ, qui iam intincti fuerint præceptis artis, quàm Ioannes Tagaultius singulari ingenio atq; incredibili studio informauit. In qua genera morborum diuisa sint, circumscriptæ formæ, designata indicia, notata præsagia, institutæ leges, scriptæ medelæ plurimæ: in qua quæcunque collabebantur in disciplina vetere, constituta, quæ uitium fecerant, reformatæ: tota deniq; ars, quasi rediuiso

*Argumentum libri explicatur.*

*Antidotarium.*

*Laus operis Ioannis Tagaultij.*

a 2 lapide



lapide instaurata est. Vnicam hanc partem operis inter-  
ceptus negociis in nos transtulit, quam ideo recepimus,  
ne & publica ratio deferri à nobis, & officium neces-  
situdinis repudiari uideretur. Multa igitur e Græcis, quæ-  
dam ex aliis transtulimus. Quæ à Guidone, eiusq; no-  
tæ scriptoribus rudius tradita sunt, paulo purius redde-  
re contendimus, etiam si intelligamus uitia corporum  
non curari eloquentia. Sed nec barbarismo depelli pos-  
sunt. Probamus quidem omnem orationem, modo sen-  
tentiis rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit.  
Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa,  
sed mediocriter culta est. Adde quòd barbarismus ille  
multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque  
sordescunt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris uocibus  
describuntur. In damnandis quibusdam rebus, autho-  
res Græcos adhibui: in remediis ea selegi, quæ præce-  
ptis artis congruerent magis, quæque ut res præsto sunt  
facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum  
opus ueniamus.

De repellentibus.

Cap. I.

Utilitas re-  
pell.

Vacuatio.

Modus.

**A** ΠΟΡΡΗΤΙΜΑ Græci uocant, quibus & initiis fluxio-  
num, & post initia utendum est, quandiu uidelicet  
humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atque in-  
crementa, hinc uomica, maligna ulcera, febrium dolo-  
rumq; causas, alia denique permulta uitia corporum  
declinamus. Ideoq; principiis obsta. Sed uacuandum  
prius corpus est, si quidem postulat casus, ac ferè po-  
stulat: quia in plethora & cacochymia, rheumatismi plu-  
rimum commouentur, quanquam etiam in mediocri ui-  
tio humorum & copia, ubi phlebotomo uel pharmaco  
natura leuanda est. Idem remedium sæpius innouan-  
dum, si quidem metus est, ne cum incaluerit mota, affe-  
cta inde pars nimium recalescat. Vis quoque remedii  
uitio conferenda: Leuius enim pharmacum ut lactuca,  
in graui ardore frustra est: fortius, qualis est succus e  
pomo Mandragoræ, liuore inficit, indurat scirrhum, &  
aliquando ita reprimat, ut in uiscera fluxionis impe-  
tus



tus rapiatur. Ad consilium adhibenda hæc omnia, natura, situs, figura, sensus, robur partium, humoris copia, qualitas, corpus, uia præterea per quas is illabitur. Neque perpetuo satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi: aliquando enim superius collocandum: ut ueluti præmissa manus uias intercipiat, nequid transfluat, ubi uenarum ductus atque coniugia animaduertenda. Cæterum reprimentium natura admodum controuersa est. Arabibus repellunt quæ influxum prohibent, refrenant, crassant, illinunt, opilant, quæ denique robur partium confirmant. In Græcorum libris astringentium materia cum repellentibus ferè commiscetur. Apud Latinos Cor. Cels. scripta reliquit, quæ simul repellant atque refrigerent, & rursus quæ sine frigore repellant. Aurelianus in chronicis alia scribit una astringere atque reprimere, alia astringere quæ non reprimant. Sed utriusque, ut aliquot locis Arabum, in censenda materia non sine uitio est oratio. Iustissima Græcorum sententia, eaq; nobis explicanda est. Repellit perpetuò quod frigidum est: frigidum aliud aqueum natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia, quod quia astringit & magis contrahit partes, efficacius reprimat: aut certe solum id efficit, si quidem ab actionis vehementia repellentibus nomen inditum est. Ac certe in rheumatibus præstantissima medicamenta sunt, quæ cum quadam astringitione uehementer siccant ut non mordeant: qualia terrena sunt. Quanquam & alterum genus, quod aqueum est, utcunque reprimat, & ex æquo frigidum uel terreno frigidius est, ac refrigerio magis conuenit. Verum præterquam quod humor frigore repercutitur, si quidem accessit constringendi uis, quod iam coit, loco exstringitur, magis etiam si tenue est: & si quid reliquum sit, sæpenumero resiccatur: confirmatur pars, ut sine pharmacorum ope quod postea influat, possit retundere. Verum hac parte prouidendum, ne quid nimis, ne cutis grauius contrahatur, crassescat humor,

*Quæ ad consilium adhibenda.*

*Conuersa repellentium natura.*

*Græcorum sententia.*

*Cautio in astringentibus.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

dolor exasperetur, fluxio increfcat: grauius deniq; incendium irriteretur. Atq; ut initio quidem te iuuiffe putes, reliquum tamen & scirrholes & contumax perfistit, quod impofterum ægerrimè difcutias. Ac grauior metus, fi quid uifcerum infirmius eft. Excipit enim celeriter quicquid retunditur: ubi omnia firma funt, in magnas uenas & uifcera circa periculū aliquid refluet. Videndū quoq; ne ultra modum contrahas in materiæ copia, craffitie, uittio, molli uigetoq; fenfu corpore, dolore graui pariter & calore. Vbi laxanda potius uia eft, ut diffluat calor, ac dolor temperetur: qui ubi cruciat uehementius, ad laxantia & anodyna omninò confugiendum eft. Adstringenti fimulatq; repellenti auxilio uis efficacior eft, fi quid tenuium partium uel natura infitum, uel arte commixtum eft: modo non mordeat. Iufto enim calore temperari poteft, multo magis, fi (quod ferè fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitas orta eft. Peltiferæ materiæ non occurrimus, ubi in superficiem diuertit: fed potius illicimus, atque rapimus ui maiore, fi tardius mota refiftit. Neque diffimilis ratio eft in criticis apoftematibus, coxarũ, lue ueneræ: ubi non repellenda in corpus, fed foras potius materia trahenda eft. Iam uerò quæ illinunt, oppilant, offarciunt, alias quidem dolorem leniunt, alias acrimoniam hebetant, uiaſq; intercipiunt. Ex quibus fi uis, reprimant: ac reuera nonnunquã reprimunt, oleum rofaceum, omphacinum, myrtinum, oui candidum, aliaq; id genus. At gummi genera, refina, gluten, farina piftrinalis, gyris tritici, hydræ leo, oxelæo, Rhodino, repellente fucco, auctero uino diffoluto, non tam fponde fua, quàm aduentitia ui reprimunt. Adstringunt calida, folium, caſia, cinnamomum, ſpica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myrrha, abſynthium, marrubium, polium, ſaluia, centaurium, uina quidem auctera, & aromata plurima. Reliqua uerò tum auctera, tum acerba in proximū ordinem referemus. Leniter repellunt aqua, uinum, lactuca, intyba, polygonum, trifolium, auricula muris, lentacula paluſtris, pſyllium, liquor oui, umbilicus ueneris, ſemper-

*Vbi non repellendum.*

*Oppilantia.*

*Quæ calida adstringunt.*

*Materia repellentium. Aquea.*



semperuium, portulaca. In summa, quæcunq; frigida  
 aqueo elemento soluta sunt. Omphacium adstringendo *Omphacin.*  
 efficax: Solanum ambigit. Hoc potentior rubus est im- *Rubus.*  
 maturo fructu & floribus: mollioribus autem foliis &  
 asparagus plurimum aquæ continet, ideoq; leuius con-  
 trahit. Adstringunt uitium folia, & capreoli, plantago,  
 sorborum, cornorum, mespilorum, pirastorum, cydonio-  
 rum, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, ro-  
 sarum capita, obelisci: deinde, sed minus, semina, flores,  
 & folia: oxyacantha mediocriter, malicorum magis, cy-  
 tinus, balauſtia, ihus, acacia, bolus Armenus, terra sigil-  
 lata, quercus, cupressi folia, germina, & nuces. Vehemen- *Quæ vehe-*  
 ter refrigerant pomi mandragoræ, hyoscyami & papaue- *mèter refri-*  
 ris succus: quæ reliquis interdum temperari possunt, *gerant.*  
 ubi acrior inflammatio est, sed prius auferenda, quàm  
 inde partes liuorem ducant. Spongia è frigida expressa  
 partim contrahit, fluxum inhibet, dissipatq; in uiciniam,  
 quod iam coit. Eodem modo lana succida & splenia au-  
 ſtero uino insuccata. Magis etiam, si aqua prius, galla & *Aqua.*  
 similia incoxerint. Vinum aquæ præferendum, & maxi- *Vinum.*  
 mè austerum, ubi reprimendum est. In deligationibus fa-  
 sciæ uino insuccantur. Acetum repellit, adstringitq; ue- *Acetum.*  
 hementer. Caphura repellit, & tenuitate partium facile  
 permeat. Oculi populi ueteribus Græcis calfacit. Re-  
 pellit gypsum oxycrato maceratum Olei rosacei fre- *Rosaceum.*  
 quens usus est, sed sit ex oleo omphacino, in quo rosæ sæ-  
 pius mutata maduerint. Quod annum superat, exoletum  
 est. Oleum omphacinum si defit, recenti oleo & uuxæ acer *Rō in oleis.*  
 bæ succo unà coctis, dum succus omninò exhalauerit, fin-  
 gito, & ad ignem saligno ramo, uel simili assidue commo-  
 ueto. Oleum uerò nec sit conditum sale, nec ætate ranci-  
 dum: in myrtino, melino, lentiscino, & similibus eadem  
 uitia fugienda sunt, uetustas, rancor, salugo. Mastichinū,  
 nardinum, costinum, adstringendo roborant, & calfaciūt.  
 Vitiosum oleum, cum integrum defit, tandiu eluatur,  
 dum uirus exuat. Eluatur aqua uel simplici, uel rosacca. *Olea facti-*  
 Descriptæ materiæ oleum uim combibet, si uel materia titia.



INSTIT. CHIRURGIC.

*Cautio.* ipsa, uel succus eius oleo incoquatur. Plantaginem gratia exempli, oleo recenti & pari aqua aut uino coquendum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculosus olei usus est, quia calore incenditur & frigit. Expressis succis melius utimur in lana succida, panniculis, ac spleniis. Portulaca, semperuiuum, umbilicus ueneris, agrè succum reddunt: nisi in mortario tritis aliquid omphacii, uel liquoris similis affundatur.

*Succorum usus.* Cataplasma. Cataplasmata fiunt farina in succo pista. Ex oleis cerota coeunt, & succis imbuuntur. Remedia neque dura sint, neque graui, ne pressio loco dolores augeant.

*Cautio.* Cerusa cichorii succo & aceto leniter diluitur. Ceratum est tum à psyllio, Psyllii vnc. quatuor in aquæ lib. quatuor psyllio. macerentur percoquanturq; , expresso succo, adde rosacei libram vnam: ceræ vnc. sex, contra articulorum rheumata. Non absimile ceratum rosaceum. Duplice vase ceratum cum oleo liquefit: ubi refrixerint, conspersa aqua commouentur, aqua reicitur, succus plantaginis affunditur, ut quantum fieri potest, absorbeant. Inflammationes, sinus, vlcera genitalium quæ serpunt, adiuuat. In teneris corporibus idem ceratum coriandri succum imbibat. Coriandrum leniter adstringit, aliis refrigerat, Galeno calfacit: utere incrementis. Ceratum myrtinum & melinum magis adstringunt. Herpatibus, & nimio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini lib. vna: ceræ vnc. duæ: pollinis myrtorum vnc. vna. In ceratis utendum cera, quam adolescentior apum populus confecerit: ceram virgineam apiarii nominant, eaq; è nouis fauis separanda. Alioqui cera alba utendum erit, non sponte quidem nata, sed factitia, qualis olim Tyrhenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus remediorum carere debet: ideoq; præferenda cera è dulci ac diluto melle. In coagulato lacte & inde nascente inflammatione farina fabacea hydræleo vel rhodino pista, mammis imponitur. Idem opitulatur testibus inflammatis. *ἡ δὲ χαλκίτης* contra rheumata hoc modo temperari debet: Adipis suilli recentis, exemptis fibris vnc.



# LIBER I.

unc. duæ: olei recentis, lithargyri, ana unc. tres: chalcitidis unc. dimid. Conficiendum arte medicamentum: vsus tempore, unc. duas medicamenti, olei rosacei unc. tres colliquabis: ubi refrixerint, aqua frigida succo portulacæ psyllii, lactucæ, uino austero, ut res postulat, subiges, animaduertens quantum repellendum, adstringendum, refrigerandum, siccandum, leniendum, ut modo rhodini loco myrteum aut melinum misceas: oxycratum hunc uel illum succum aliis præferas. Quod *De lithar.* sequitur, exprimit ulceribus quod influxit: & quod *hydræ* influat, repellit. Lithargyri unc. quatuor olei dulcis uel rhodini unc. quatuor: aquæ unc. tres: lithargyrum die uno hydræleo coquitur: difficilius enim illiquefcit: teneris corporibus & paruis ulceribus conuenit. *Defensiuæ.* Defensiuæ uocant è boli Armeni parte una, terræ sigillatæ dimidio, rosacei triplo, aceti uel succi repellentis dimid. Liquidis reliqua infriata commiscantur: uel *Deligatio.* è bolo Armeno liquore oui conleuato: deinde affuso succo è capreolis uitium, aut omphacii. Fasciæ ritè conuolutæ in repellentibus censerî possunt: quales in fracturis, & qui ab ulcere sursum adducuntur: ut adstricta parte, & ita ductis orbibus paulatim laxes. Similiter cum altero membro atrophia intabescente, alterum deligamus. Vincula quoque superioribus partibus iniecta, qua uidelicet materiæ cursus est. Aliquando etiam inferiores illaqueamus, ut cum è cruce exhalat uirus quod uiscera appetat, ex quo & epilepsiæ & syncopæ causa præciditur. Sed in ulceribus plurimum & fracturis, uias laqueo comprehendere oportet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmonæ, putredo, syderatio, aliâq; id genus concitentur.

*De attrahentibus. Cap. 2.*

**E**ΛΤΙΝΑ & ΕΠΙΟΠΑΣΙΝΑ Græcis appellata, usu quidem repellentibus conferri possunt, sed natura plurimum dissident calida, tenui substantia, quæq; ui quadam rapiant, quæ in alto corpore posita sunt. Ideoq; *Attrahentiū materia.* Multiplex uiscera, internumq; corpus exonerant, foras translata *us.* materia:



materia: uenena in cutim euocant. Criticos abscessus accelerant, desperatos pleuriticos & fortasse attonitos releuant: inguinum tumores amplificant: quodq; uel pestiferum, uel nimis uitiosum medio corpore conceptum est, alio pertrahunt. Tabidas ac uelut syderatas partes uitæ restituant: perfrigeratas spiritu resouent: uitiosam saniem exhauriunt, quæ nervis & cuniculosis ulceribus lateat: squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant: hydropicos exugunt: paxillos, clauos, spinas, sagittas reuocant: multò magis, si locus ulceris periculo inciditur, nec patitur æger angustiore plagam ferro ampliari. Quod in uenicis, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus, reliquisq; partibus altius desedit, eliciunt. Multiplex ergo attrahentium usus, sed nihilominus uaria materia est. Aliis ea uis à natura insita est: atq; in his modò manifesta qualitas elementaris: modò occulta quædam proprietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduētitiæ qualitatum ex putredine contracta acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidum est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisugæ, pyuleus, suetus, dolor, uincula, frictio, cauteria. In attrahentium usu aliquando quod fuerit attractum, corpore excludimus: sed hic modus est, ne cum uitio par-

Differentia  
attrahentiũ.

Quæ miscen-  
da attrahen-  
tibus.

Particula-  
ris materia.  
Propolis.

tem frugi materiæ eripias. Nonnunquam tantum attrahimus, nò etiam discutimus: ut quum in partem emortuam calor & spiritus attrahitur. Argenti spumam, ceram, resinam picem, oleum, epispasticis ueteres miscuerunt, ut & temperarent, & magis emplasticum pharmacum efficeret. Quidam etiam adstringente materia obtundi uoluerunt. In primò genere sunt dictamnus, propolis, ceram uirginæam uertit Scribonius. Rudis est & crassa materia in apu officinis, nondum cera: odore graui, ut qua pro galbano ueteres uterentur. Ea mellatione uerna, separari potest fauorum pars quæ cellas obstipat. Sed iam exemptis fauis, posteaquam mella diffluxerunt, quicquid est in fauis, unà confundunt, ut nihil syncerum haberi possit. Magna nerò sincera propoleos uirtus est: spiritus crassos & ui-

tio



tiosam materiam ex alto elicit. Recens per se satis est mol-  
lis & pinguis. Sic in puncto nervo agricolæ Galenus usus  
est: quæ ætate induruit, oleo veteri molliiri debet. In mol-  
lioribus corporibus oleo illiquatur. In duris lacte mul-  
to tithymalli: cum terebinthina satis attrahit.

Thapsia recens utilis: bimula & vetustior exolefcit. *Thapsia &*  
Cerato misceri solet: quæ quia ut uiscum plurimum aque *viscam.*  
continet, quatuor & quinque horas insistere oportet. Ra-  
dix arundinis cum melle. Sagapenum, galbanum, ammo- *Loco nitri*  
niacum, opopanax, calx uiua, cinis e fece uini uel aceti, *fex crema-*  
quæ loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ & *ta vini vel*  
spicula, & squammas extrahit, lepidum, sinapi, nasturtiū, *aceti.*  
tithymallus, dracontium, pyrethrum, ramunculus, sales,  
tum qui edi possunt, tum ammoniaci. Quædam infriata  
affricantur, aut gummi & resinis concorporantur. Lixi-  
uium in subtili calidaq; materia extillatum: ex eadem  
cinis Anemonæ, calamintha, narcissi radix, cyclaminus.  
Sparthi quo uites alligant fructus, & e foliis succus. Ace- *Acetum.*  
tum, sed hoc suspectum, ubi siccitas, dolor, inflammatio,  
ulcus, adstrictio, & a neruis dolor est. Cantharides ex po-  
lenta & melle pistæ. Medullæ & adipēs ætate acrimoniam *Medulla &*  
contrahunt: ursinus adeps, hyeminus, pardalinus, leoni- *adeps.*  
nus, & alii, sed hi maxime. In alopeciis & profluiis ca-  
pillorum uitium discutiunt, attrahuntq; quod ad capilli-  
tium utile sit. Oleo & oleæ flore, tela sibi refrigerare ele- *Oleum.*  
phantos, testis est Aelianus. uetus sit oleum tenue & ca- *Sulphur.*  
lidum. Sulphur infriatum melle, oleo, terebinthina, sali-  
ua hominis, axungia. Idem in œnostagmate feruefit dum  
enatet lentor quidam (oleum appellant) quem cōcha ex-  
cipere oportet aliquoties commutanda aqua, dum satis  
olei collectum sit, quo demersum corpore hydrargyron  
foras elici uoluerunt statim illito à balneis. Euphorbiū *Euphorbiū.*  
recens acrius est: bimum trimumq; paulatim remittitur:  
quinto & sexto anno exolefcit. Cerato temperatur, quod  
uel decuplum uel duodecuplum oleum habeat, & triplā *Modus eu-*  
ceram. Modus est ut tantum erubescat locus, & pruriat, *phorbij &*  
non uratur, nec ulcus contrahat, nisi & hoc etiā necesse sit. *similium.*  
Cerato



Cerato largiore dilui potest quod est acrius: quod uerò languidius pharmacum, aucto euphorbio, cerato immixto augeri debet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est. Ardor affusa aqua, aceto (quod uim thapsiæ efficacissimè diluit) cerusa è rhodostigmata lota extinguitur. Succus cyrenaicus medicus, opobalsamum & alia, quæ partim exoleta sunt, partim usui esse possunt, ex 3. de comp. pharmacorum κατὰ γέν, & aliis Grecorum libris repetenda. Aduentitio calore trahunt, fermentum, sterces asinerum, gallinaceum, columbinum, arietinum, humanum, & quæcunq; talia sunt. Scatebat quidam è grege mendicabulorum lue uenerea: aliquot diebus uniuersum corpus equino fimo obruit, ut tantum esset qua respiraret. Erat sterces stabularium, equino lotio sæpius perfusum, quoddam iam computruerat. Effecit ille hac arte, ut totum uirus exprimeret: addidit aliquoties enchrison ex axungia, larynga, & hydrargyro. Nec alia uitæ lex seruata est, quam mantica offerebat: atq; his remediis curatus est. Fermentum oleo incoquitur: fundit, liquat, surculos trahit, pedes contusos sanat, mollit, discutit. Axungia ueteri, larynga, terebinthina & resinis liquidis pistum efficacissimum est. Aliàs cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulum quo uetustius, eo efficacius. Ex echino animalium (quæ πάλκοιλα) lepore & uirulo marino colligitur. Lac est in lactentium animalium uentriculo uel omaso ita concoctum. Aristoteles ad alui profluvia utile facit magis leporinum: equinum Diosc. Arabes & quidam è Græcis astringens frigidum, ac reprimens auxiliū faciunt. Alii acrimoniam elementis, reliqua occultæ qualitati attribuant. Hoc certo habet, quod dissipata cogit, & coacta dissoluit. Magnes ferrum attrahit: repellit Theamenes. Succinum illicit festucas ignorata ui. Cácer fluuiatilis tritus tela extrahit. Lacertæ caput: rana summis partibus resectis. Cochlearum & limachum carnes, aliàs per se, aliàs cum suis uolutis tritæ, ac mixto interdum coagulo, tela rapiunt, atq; hydropicis aquam exugunt: non prius solvere oportet, quam totus humor exudauerit.

Ostrea

*Quæ trahunt  
aduentitio  
calore.  
Mendicus  
lue uenerea  
curatus.*

*Fermentum.*

*Coagulum.*

*Quæ quali-  
tate occul-  
ta.*

*Cochlea.*



Ostrea uiua pestiferos bubones loco transferunt, & ad se trahunt. Scorpiotritus & impositus, quod infixit uir, retrahit. Oleum quid ex eo fit, idem efficit, & calculos educit illitum glandi, si in cole restiterint: uel pubi, ac perinaeo, si superius inhæserint. Cucurbitula summa ui rapit. Hirudines superficiem sugunt. Pus, urinas, calculos, suctus elicit ore mundo ac prius loto fit, qui exugit. Pyulcus, catheter iisdem utilia sunt: uincula, frictio, phoenygmus, dropax, sinapisimus, ferrum candens, uel admotum, uel impressum, calore trahunt. Sed hoc uiolentum remedium est. Verum quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis: quod Hippocratem in Aphorismis scripsisse uolunt. Mixta remedia sunt theriaca. Psoricum dupla chalcite & lithargyro, aut æquis partibus cadmiæ & chalciteos: uel duabus chalciteos, & tribus cadmiæ: fortius est quod cadmiam, quàm quod lithargyrum recipit; minus acre locis metallicis. Ex acerrimo aceto trita & fictili clausa sepeliuntur fimo. Hac arte macerata, triplo, duplone cerato excipiuntur. Ceratum sesquialtera ratione dupla, tripla olei, ad ceram conficitur. Ea metallicorum cura pharmaca tenuiora sunt, facilius penetrant, & inde trahunt. Oleum sit uetus, ricinum, sinapinum, sicyonium. Raphaninum, è terebinthina, larigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica si uis distillatum; quæ resinæ etiam è profundo trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina; in quibus non modo calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt. Cerati unc. quatuor, terebinthinæ unc. dimid. liquatis immisce puluisculi, euphorbii drach. tres. Interioris fermenti unc. una; terebinthinæ liquidæ, unc. una; concorporata plurimum ualent in punctis neruis. Propoleos acris & pinguis (nam cera uirginea abutendum non est) unc. duæ; olei ueteris unc. quatuor; galbani unc. dimid. coeant ad ignem. Picis liquidæ, picis aridæ, propoleos, partes æquales lithargyri, cerussæ, salis, ana drach. decem, seorsum tusa, & cum olei unc. tribus in mortario pista, ad ignem diu uersentur, paulatimq;

*Ostrea uiua  
Scorpio.*

*Aph. Hipp.*

*Psoricum.*

*Quomodote  
nuiora me-  
tallica.*

*Olea cōmo-  
da.*

*Resinæ ex  
inde olea.*

*Formula ex  
Gal. Orib.  
Aet.*



INSTIT. CHIRURGIC.

paulatimq; decoquantur. Lithargyri, cerusæ, nitri, ceræ Colophonix, ammoniaci, ana vnc. una: olei ueteris unc. sex: reliqua unciis sex lixiuii ficulnei dum non inquinant, concoquuntur. Deinde cera Colophonia, ammoniacum, deinceps quidem ac paulatim adiiiciantur.

*Relatum ad  
Andromae-  
chum.*

Nucleorum è dactylis crematorum, nitri rubri, salis ammoniaci, uel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinæ ana drach. uiginti: piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylobalsami, myrrhæ, resinæ siccæ, capitum lacertæ, lactei succi mori, ceræ, ana drach. decem: adipis caprini drach. quindecim: olei irini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest, nisi

*Necepsionis  
à cupresso.*

ad uocata *αντιβαλλόμενα* cōfugas. Quod sequitur admirandum ad strumas, ramicem gutturis, parotidas, omnem duritiem, & œdemata. Cupressi folia neq; teneriora, neq; duriora in puluerem cōminues: tortiuo uino consperges, atq; ita uoluta bis, dum in fecis corpus coeant. Inde struma uel ramex inducitur, tertio primū die soluitur medicamentum: contractum locum inuenies, qui digitis exprimi debet. Rursus ad tres dies idem pharmacum applicabis, eodemq; modo solves & exprimes: septimo die, uel ad summum nono, strumæ uelut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem per poros affectę partis. Olei antiqui unc. uiginti dux: ceræ albæ unc. quindecim: nitri uel salis torrefacti, aut fecis crematæ uini unc. tres: terebinth. unc. duodecim: lixiuii querni, uel ficulnei unc. octodecim: cera cum oleo liquatur: terebinthina adiicitur, refrigeratis nitrum cōspergitur, lixiuium paulatim affunditur: omnia pistillo conuoluuntur. Plurima ex tertio & sexto de cōpositione pharmacorum *κατα γινη* & 13. Aet. repetēda. De sinapismo, dropace, phœnygmo, & aliis alio loco. Addunt Apostolicon Nicolai, Oxycroceum, & alia.

*De resoluētibus. Cap. 3.*

**I**ncrementis rheumatismum discutiens materia cum repel lente misceri debet. Inclinate uitio diaphoretica pura sint, & horum unicum fortasse genus est: sed clarior doctrina fuerit, si duplici differentia separemus, ut alia quidem



quidē leuiora, ἢ ἀραιωτικὰ: alia fortiora, quæ διαφορητικὰ  
 si uis, appelles. Aræotica mediæ naturæ uicina sunt eo  
 calore, quē humiditas temperet: ex quo minimē siccant,  
 dolorem leniunt, relaxant cutem, spiramenta corporis  
 rarefaciunt, tenuitate partium intrò penetrant, quodq;  
 inhæsit parti, liquefaciunt: hinc ex humore uapor fit, qui  
 subinde expirat, dum omnino locus detumeat. Et adhuc  
 quidem satisfaciūt, ubi tumor in superficiem exponitur.  
 Locusq; mollis est ac rarus, materia uerò calida, humi-  
 da, & tenuis est. Quòd si in alto corpore humor deponi- *Consilia in*  
 tur: si idem frigidus, crassus, glutinosus: si dura densaq; *usu resoluē-*  
 cutis: si uerò longitudo quædam est flexus & an fractus, *sum.*  
 iam ui maiore opus est, uidendumq; non quale in præsen-  
 tia, sed quale futurum sit medicamentū, quum eo perue-  
 nerit. Ex quo nec acribus quidē parcendum erit. Etenim  
 pars exterior perferet, quæ ægra dolensq; tolerare non  
 potest. Maiora uerò remedia in diaphoreticis numeren-  
 tur, iam uicina epispalticis: quamquàm utraq; uirtus euo-  
 candi atq; digerendi plurimis rebus insita est: sed ut in  
 unoquoq; uis altera superat, ita genera distincta sunt.  
 In hepate, liene, uentriculo, atq; id genus partibus, à re-  
 laxantibus metus est ne dissoluant uires: ideoq; adstrin-  
 gens materia, qualis est aromatū, misceri debet. Frigida  
 crassaq; materia, incidente auxilio prius comparanda.  
 Mollienda quoq; ubi durior concreuit, ex quo à leuiori- *Cautio.*  
 bus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, ut sine peri-  
 culo discutias. Alioqui diffabit tenue, lapidescet quod *Ab acriori-*  
 crassius est. Cum parte stupida, durius: cum ea quæ uege *bus quū coa-*  
 tius sentit, clementius agendum est: quanquàm stupore *tingas.*  
 partis abutendū non est, ut ea imperies, quæ exulcerent.  
 Sic enim sensile corpus intabescet: contrahetur, nō rare-  
 scet: cogetur materia, non liquefcet: horror, dolor fluxio  
 irritabitur: dehiscunt uenæ, omnia in deterius cōmuta-  
 buntur: multo magis si pharmaca crassiore consent ma-  
 teria, & siccant. In phlegmone quæ uetus est, uidendum  
 nunquid affluat: id ferè accidit tumoribus qui inuete-  
 rascunt, ubi medela quæ reprimat, commiscenda est.

Posteaquàm



# INSTIT. CHIRURGIC.

Posteaquam uerò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquum est, cōfirmanda pars, quæ longo uitio elanguit, multò magis si statis periodis, rheumatismo uexari solet.

*Particula-  
ris materia.*

Aræotica sunt, chamæmelum, lini semen: in maluis efficacissima, althæa: sequitur agrestis, domesticæ uis nimio humore elanguit. Aqua calida utitur Hippocrates in fracturarum exolutione, quam uocat ἐπιλυσιν: uinum exiccat, reprimat, & digerit: lana sordida bene carminata inebriata uino, & inde pressa: ceratum similiter. Butyrum digerit, mollium corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliaq; innumera, ut per se satis esse possit. Oleum dulce, calens, & in quo illa efferbuerint. Sicyonium è fo-

*Olea.*

*Oleum lilio-  
rum cū cro-  
co.*

*Nux ranci-  
da.*

liis, fructu & radice cucumeris agrestis. Crinelaon intinctum croco, omnes inflammationes discutit. Oleum carynon efficacius è rancidis. Nux rancida per se, uel cum melle trita efficacissimè suggillata rapit, inuritur, aut candente ferro premitur, ut reddat oleum, quod optimè discutiat. Omne oleum concalsfactum igne, quale est lucernarum, uel ignito ferro extortum, efficacius est. Oleum uetus, ricininum, canabinum, anethinum, quod è rosinarino, maiorana, zambace, leucoio, hyssopo, aliisq; eiusmodi œnelæo coctis, dum omnino expiret uinum. Rhaphaninum, sinapinum, melanthinon, terebinthinum, hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ, & uocati sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydropicis & œdematis olea comparantur. E galbano, hammoniaca, & similibus quæ molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, ut flatus excutias, cui galbanarinum utile est. Si quid incidendum, detergendumue, aliquid aceti uel oxymelitis affundi potest, quo tempore absynthium, polium, centaureum, iris, aristolochia, gentiana, urtica, hyssopus, & similia œnelæo incoquantur. Hic uinum melius non adstringens, giluum, tenue & odorum. In phymatibus & parotidibus duriorum corporum talia ex usu sunt. Brassica per se, uel cum axungia trita, induratas phlegmonas & uetera erysipelata discutit. Adipe & medullis recentibus laxando, ueteribus discutiendo utendum est. Mastiche, furunculis:



LIBER I.

furunculis: Ammoniacum & similia chœradibus & articu-  
lorum tophis conueniunt. Fermentum oleo pistum, & cū  
cocta capā mixtum, potenter coquit, mollit, ac digerit.  
Pellibus animalium recens detractis, in contusis uerbe-  
rumq; plagis uti conuenit. Fœnum græcum duris phleg-  
monis adhibendum. Acetum achoribus & œdematis utile  
est. Agrippa concalfacto aceto pedes immerfit, unde into-  
lerabili pedū cruciatu liberatus est. Oxycrato quoq; te-  
pido & oxymeliti uis inest discutiendi. Mel in diaphore-  
ticis censetur, magis etiam quod roremarino & similibus  
conditum est. Butyrum mollit ac digerit, tenellorum cor-  
porum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliaq; innu-  
mera, in quibus per se satis esse possit. Melius est initio in  
aqua rosacea lotum, & modico intinctum croco. cōditum  
melle coquet, detergebit & digeret. Oleum dulce, calēs,  
& in quo diaphoretica cōxerunt spondylium, serpillum,  
pastinaca, pulegium, calamyntha, menta, & similia, quo  
genere olei, utendum erit in crassiore materia, & ubi ro-  
bur partium firmandum est. Sicyonium ē foliis, fructu &  
radice cucumeris agrestis multum digerit, ac ferē loco ue-  
teris usurpatur. Vix enim reperias uetus, quale olim trice-  
narium, quadragenarium & eo antiquius seruabatur. Liri-  
um intinctum croco omnes inflammationes discutit.  
Caryinon efficacius ē nucibus rancidis, & in hoc genere  
efficacissimum, quod in lucernarum ellychniis cōcaluit,  
quo gangrenas, egilopas, carbunculos quidam persanant.  
Nux rancida per se efficacissimē sugillata delet, leuiter  
exurit flamma, aut candenti ferro exprimitur, ut reddat  
oleum, quod efficacissimē discutiāt. Omne oleum concal-  
factum igne, quale est in ampullis lucernarum, uel ignito  
ferro extortū, efficacius est. Ex quo seruefacto nouo olei  
dulci pro ueteri uti licebit. E tritico & nuce quam nusca-  
ram uocant, contra lichenas candentibus laminis extrin-  
gitur. Ex assis ouis premente cochleario, in figulari sarta-  
gine concalfacta igne, quæ plumbo uel uitro incrustata  
sit, contra impetigines, lentigines, & sœdas maculas oris.  
Alia quoque propē infinita, quorum conficiendi ratio à

Acetum.

Agrippa a-  
cto libera-  
tus.

Mel.

Butyrum.

Olea.

Sicyonium.

Oleum ē li-  
lis.

Caryinon.

Nux ranci-  
da.

Oleū lucer-  
narium ex  
extortū can-  
denti ferro.

Oleum ē tri-  
tico.

Ex ouis.

b

Mesue



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Olea alia* Mesue & aliis descripta est. Oleum uetus, ricinum, canabinum, anethinum quodque è roremarino, maiorana, zābucō, leucoio, hyssopo aliisque eiusmodi conficitur.

*magis digerentia.*

*Efficaciora prioribus.* Aquā & oleo, uel hoc & uino materia incoquitur, dum omnino expiret humor, & oleum reliquum sit. Rhabdanthinum, melanthinum, sinapinum, terebinthinum è resinis pressum potenter digerunt. Hypericinum mollius est.

*Efficacissima.* radice bryoniæ & uocato sigillo mariæ, cnico, grano gnidio, hermodactylis, anacardiis, arida uini fece, calce, hydropicis & œdematis. E galbano, ammoniaco & similibus quæ molliant simul ac digerant, è dauco, caro, ruta, cumino, lauro, ut flatus discutias, cui rei & iuniperinum & galbanarium utile est. E sambuco & ebulo iuuat hydropicos, œdemata, podagricos. Si quid incidendum atque detergendum, aliquid aceti uel oxymelitis affundi potest, qua in re absynthium polium, centauriū, iris, enula, gentiana, aristolochia, urtica, hyssopus & similia cœleō incoquantur. hic uinum melius, non astringens, ætate uetus, colore giluum, tenue & odorum. In phymatibus, buboribus, parotidibus duriorum corporum talia ex usu sunt. Ac bubonibus peculiariter è maiorana factum. Chamæpytis in oleo cocta mammarum duritias discutit, & articulorum uitia adiuuat. Cypero utendum, ubi resolendum & leniter astringendum, cui rei olea croco intingantur: idque curandum magis in uiscerum causis, & quum iam propè nullę reliquię sunt tumoris, & hic totus ferè euauit. Brasica per se uel cum axungia trita induratis phlegmonis & erysipilatibus idonea est. Affectas partes oleo fouebis: materiam tussam, in cataplasmate foto prius loco fasciis alligabis. Adipe & medullis recentibus quidē laxando, ueteribus discutiendo utendum erit. Sed de his alio loco. Mastiche, furūculus ammoniacū & similia chœradibus & articulorum tophis cōueniunt. Mulsā prodest, in qua hyssopus, thymus oryganū & similia coxerint. Fermentum oleo pistum & cum cæpa cocta tussam potenter coquit, mollit ac digerit. Pellibus animalium recens detractis in contusis, præcipitatis, uerberumq; plagis uti cōuenit.



uenit. Fœnū grēcū oleo coctū duris flāmationibus adhibē *Pelles ani-*  
dū. Caricæ acres, incoctæ mulsæ idē præstare possunt. Pin *malum re-*  
guibus aut ut coquas, lenias, & leniter digeres, utendum *cens detra-*  
est. Mirum est qđ affirmāt, Coluber fluminalis funiculo *etæ.*  
à cauda præligatus suspendit, subiecto uase aqua pleno, in *Caricæ.*  
qđ dehiscat, ore aliquot post horis uel diebus lapidē eru *Mirum de-*  
ctat, qui exceptus uasē qđ subiacer, totā aquā ebibat. Alli *lapide colu-*  
gat lapis hydropicorum uentri, atq; in totū exausta aqua *br.*  
liberat. Fomēta fiunt è mulsā, aqua calida, uino, hydreleo, *Fomenta.*  
exymelite, in quib. si uis, digerēs pharmacum præcoxerit.  
Sacculi similiter è florib. anethi, meliloti, chamæmeli, ro *Sacculi.*  
risinarini, calēdulæ, maluæ, althææ, seminibus lini, fœnu-  
græci, fursure, aliamq; id genus materia infarciuntur. In  
fomentis ex eodem genere remediorum incalescunt, atq;  
inde succum rapiunt, exprimuntur, & calidi adhibentur,  
ut leniant, coquant, laxent, discutiant. E materia sedulò  
contusa, laxior sacculus & leuior esse debet, ne quid gra-  
uitate lædāt, & exasperent, idq; multò maximè in molli  
parte, & ubi dolor est. Modus est quum inde quiescit do-  
lor & minuitur moles. Nimiū est si quod resoluas in pus  
uertitur, quod discutias in scirrhū cogitur, si deniq; ro-  
bur partis immoderato usu dissoluitur. Cerata simplicia *Cerata.*  
oleo minus digerunt, sed firmitus hærent. E cera fulua, tri-  
plo, uel quadruplo oleo digerente: decima uel duodeci-  
ma resinæ parte, & reliqua materia quæ digerat infinita  
cerata cōficiēs. In superficiali uitio & materia tenui focus  
ex oleo satis esse potest: ubi contumacior humor est, & al-  
tius latet, non modò ceratis crassioribus, sed malagmatis  
& emplastris uti oportebit. Idq; plurimum fit in querelis  
articulorū, ubi i ceratis, acopis, malagmatibus, emplastris  
eligenda olea quæ conueniant, qualia & antè multa no-  
tata sunt, & nunc dicentur. E resinosis seminibus & assu-  
lis abietis, pini, picæ, tenax & unguinosum oleum elici-  
tur. Conueniente oleo & uino erinaccus coquitur dū pu-  
trescat, putrilago capta rariore linteo in ollam, quæ reli-  
quum oleum habet, magno conatu extinguatur, & oleo mi-  
sta articulis uitis seruetur. Idem è vulpe, lutra, meli,  
b 2 cygno-

*Olea arthri-*  
*tica.*

*Oleum ex*  
*erinaceis.*



cygnorum pullis, testudine, ranis, caro ueteri & emascu-  
to fieri potest. Quæ animalia digerentia materia si uis, in-  
farcias, & ita coquas. Possunt etiam eo modo facta & in  
ueru fixa exassari. Excipitur pingue quod diffuset. Lignū  
sanctum pingue ac succosum, non obductum situ, aut ca-  
riosum in fragmenta diuides, ut inde hac arte exprimatur  
oleum, qua & ex aliorum lignorum assulis ac rametis om-  
niq; materia, in qua sit pingue aliquid & unguinosum  
olea deducas. Duas singulares ollas satis amplas, quæ in-  
teriore uentre plumbo uel uitro inductæ sint, ita compa-  
rabis, ut utræq; ore respondeant, & planis labris nō pro-  
minentibus, neq; rotundis exactè cōmitti possint. Atq;  
conueniet alterius uasis margines intro proici, easq; re-  
ctas, non decliues, non elatas: his ergo marginibus crati-  
cula ænea uel reticulū incumbat. Erit hoc ad escariæ lan-  
cis imaginem conformatum, & conuexo gibbo deorsum  
spectabit, caua parte uertetur sursum, extremo ambitu, ro-  
tundo, rectis labris uasis quæ intro prominent, insidebit.  
Assulæ lignorū ita struentur, ut craticulæ marginibus ex-  
trema parte nixæ quasi parallelos fingant: ac rursus aliæ  
transuerso, aliæ in decussē superdabuntur, & ita attolle-  
tur materiæ moles. Alterum uas quod est reliquum, ore  
& labris, subiecti uasis marginibus aptabitur: utrunq; ar-  
gilla uel chymicorum luto compingetur. Ita cōpositis fi-  
ctilibus reticulo & assulis, totum uas inferius terra defo-  
di debet, ut extrema facie solo adæquetur. Alioqui ædifi-  
cium aliquod luto, calce, gypso & tegulis extruendum in  
ambitui iusto pede latum area æquabili, in cuius meditul-  
lio quasi labellum sit, quod deorsum hiet, in quod uas in-  
ferius deponi possit. Atq; tam cauum sit, quantum uideli-  
cet altitudo uasis est. In area ædificii, mollis ignis è puro  
carbone paulatim succenditur, unde superior olla quæ to-  
ta extra fornacem eminet, concalescat, & ex eo materia  
quæ intus latet, exudabit liquor pinguis, qui per craticu-  
læ meatus in uas subiectum diffuset, isq; sedulo colligen-  
dus & usui seruandus est. At ignem paulatim augeri ne-  
cesse est, qui ubi senescere uideatur, noua iniecta pruna  
foceri

*Oleum è li-  
gno sancto.*  
  
*Ars dedu-  
cendi olei è  
rebus pin-  
guibus.*



foueri debet. Qua ratione ueteres capniston suū exprime-  
 bant. Et lini semine oleum trusatili mola exprimitur, cū *E lini oleo*  
 sarmentitio lixiuio subigitur, modicum terebinthinæ ad *lixiuio.*  
 lentorem additur: mollet, lenit, digerit. Panis cibarius cō-  
 ditus sale è ricinino pinsitur, sugillata delet. Cataplasma *Cataplas-*  
 ta è farina fabacea, hordeacea, e panico, milio, lupino, *mata.*  
 orobo, cicere, solio, scœnugræco, lini semine: in putrescen-  
 tibus & contusis ex oxymelite & lixiuio, in aliis ex oleo  
 farinæ subiguntur. In putrescenti articulo contusoq; ner-  
 uo circa initia fabacea & hordeacea ex lixiuio: postea  
 eruina ex eodem Galenus usus est. Aliquando etiam con-  
 tusis simul & uulneratis neruis fabaceam oxymelite iun-  
 ctam usurpauit. In cataplasmatibus quæ discutiant aliquid  
 misceri conuenit, ut ne lentore offarciant, multo magis si  
 quid pestilens ac malignum, ut in bubonibus & carbuncu-  
 lis pestilentibus, ex quo Gal. puriores panes in carbuncu-  
 lis reiecit. Orobi farina diluto oxycrato cocta, & in cali *Farina.*  
 do cataplasmate adhibita crassa uiscidaq; fecat & discu-  
 tit. Eodē modo usurpatur è lupinis, ciceribus & lolio: mi-  
 tior est scœnugræco & linospermate. Miliū agrè infriatur,  
 & cataplasma fingit, atq; hoc ut panico siccando magis  
 quàm digerēdo utēdum est: utrumq; refrigerat, & in oleo  
 coctum discutiēdo leniter facit. Cataplasmatibus miscen-  
 tur puluisculi è spica, uocata lauandula, chamæmelo, me-  
 liloto & aliis. Modus ferè est, ut farina ad puluisculos du-  
 pla sit, quanquàm & tripla & quadrupla, æqualis etiā, ut  
 corpus & uitium exigit: Fauos mellis: è uino friget cum  
 farina loliacea uel simili, butyro & terebinthina uel lari-  
 gna subiges. Bdellium cum melle teritur. Calx cum uete *Sales.*  
 ri axungia: Laserpitium cum sulphure, molliunt, tergēt,  
 discutiunt. In durioribus phlegmonis sales cōmiscuntur.  
 Astringunt marini & digerunt, sed ustura tenuiora sunt,  
 & uim astringendi deponunt. Cineribus ostreorum, bucci *Cineres dia-*  
 norum, crematis cochlearum cauis & testulis pectunculo *phoretica.*  
 rum utimur inueteratis in scirrhum uergentibus inflam-  
 mationibus & parotidibus, triplo butyro, cœsypo, adipe  
 concorporantur, cera interdum addita, aut in ceratis ad-  
 hibentur,



# INSTIT. CHIRURGIC.

hibentur, quale fuerit butyri, æsypi, ceræ, cinerum ostreo-  
rum ana semuncia. Eodem modo salibus, sulphure, pyre-  
thro, cardamomo & aliis id genus uti oportebit: uel cari-  
cis in marina coctis rufisque ea commiscenda. Caprillum  
*stercus.* stercus ex aceto rufum inueteratas parotidas discutit. Sed  
his omnibus utendum iam sedatis doloribus & quieto  
fluxu, satis deniq; purgatis corporibus. Sulphur cū oleo  
*Sulphur.* ueteri, axungia, molli terebinthina, salina mistum, uel in  
vrina & lixiuo maceratum uenenatis moribus conuenit  
terget, attrahit, discutit, nonnunquam aceto prius cōsper-  
gitur. Calx lota in recenti axungia tenellis corporibus  
adhibetur. Lapis calaminaris & quęcunq; metallica acia  
sunt, vsta discutiunt, cruda mordicant. Sinapismus vulga-  
ris discutit. Sapo soluitur oleo. Sed acibus nō utendum,  
si quid doloris & caloris reliquum est. Actumoribus qui  
in scirrhum abeant adhibentur. Mane & vespere commu-  
tātur, videndumq; vt ne nimium calfaciāt, diachalciteos  
neq; uino, neq; astringente succo pistum subduplo oleo  
ueteri, ricinino, raphanino diluitur, ut sit liquidi cerati  
corpus. Atque aliquando modum olei superare oportet,  
vt sint pharmaci drach. 10. olei duodecim. In teneris cor-  
poribus & lacunis ulcerum oleum paulo uincere melius  
est. In uigore & ante declinationem oleo dulci ætate me-  
dio dissoluitur: in declinatione uetus oleum idoneum est.  
*In contumaci uitio.* In cōtumaci uitio & minus calente olei chamęmeli vnc.  
*Aliud.* 3. cerę drach. 3. adipis anatis & gallinę ana unc. 1. chamę-  
meli & anethi ana drach. 2. omnia lento igne cocta perco-  
lentur, ut fiat unguentum. *Al.* Olei sicyonii unc. 3. cerę  
drach. 2. In frigidiorē materia seminis fęniculi, anisi, ane-  
thi ana drach. 2. farinę lupinorum, farinarum fęnugręci  
& seminis lini ana unc. 1. coquuntur uino, contunduntur  
assuso oxaleo, & ita applicantur. Papaueris cornuti folia,  
propoli pingui, uel pice molli strumas, bubonas, & simi-  
lia emolliunt atque discutiunt. Loco propoleos pice li-  
quida uel arida sed soluta oleo discutiat, uti licebit.  
*Loco propo-  
les.* Aliud. Colophonię lib. 1. cerę sesquilibram, olei lib. 3.  
*Pus exugēs.* simul liquatis addito salis torrefacti subtilissimę triti nn.  
6. ubi



6. ubi refrixerint manibus cōpoluito, cylindros quas Græci uocāt magdalias, nostri magdaleone, singito: in usu alutæ intendito, & adhibitum dolenti loco finito: pus exigit emulgetq; quasi miraculo: quod cum emplastro hærens deraferis, de integro pharmacum induces, idq; aliquoties repetendum. Medicamētum hoc durius dolor nō sustinet. Idem prællat picis aridæ, ceræ nouæ ana lib. 1. olei lib. 2. blando igne fusa coniungantur. Al. Picis, ceræ nouæ, axungie, suille, saponis nigri ana unc. 2. liquata trāscolato, hydropismos uacuat, & dothienibus medetur. Al. quod uehementer discutit, galbani, castorei ana unc. 1. liquefiant in olei ricinini sesquilibra, expresso & colato pharmaco adde picis terebin. ana unc. 4. ceræ quod sufficit, ut fiat solidum pharmacum. Hæc autem pertinacibus uitiis & induratis phlegmonis imperanda sunt, in quibus est quod molliat, coquat, trahat, discutiat. Inflammationum reliquiis siquidem nihil durum habeant, satis sunt chalastica. Rhodiaceum Asclepiadis curans & discutiens mammas induratas. Lithargyri, ceræ amaræ ana se. librā, axungie bene purgatæ, cerusæ ana uncias tres, myrrhæ uncias duas olei uncias septem. Lythargirus oleo coquitur, axungia colliquatur, & cera, ex quo cerusæ immittitur, sublatis igne myrrha inspergitur: translatis omnibus in mortarium uitellus oui assatus commiscetur, usus tempore conueniente oleo diluitur. In sedis uitiis rhodino uel myrtino dissoluendum est. Plura. 6. & 7. de compositione medicamētorum cata geni, & 15. Act. Et quæ uehementer trahunt diaphoretica redduntur cerato, dulci oleo, uel adipe, ac breuiter paregoricis temperata & mediæ naturæ medicamentis. Partem chalasticis fouebis, quæ relaxent, & spiracula rarefaciant, fundantq; materiā ex quo diaphoreticon induces, liquidum quidem & molle initiis ubi dolor aliquis est: lenius etiam si silenti pharmaco mistum, atque hinc ad paulo fortiora, nec tam liquida transeat. Postremò ut mitefcit dolor, & fluxio minor est, ita ad efficacissima, si fuerit opus, & emplastri forma compacta paulatim ueniat.

Id præstās.

Ad hydro-

pismos &amp;

dothienas.

Vehemēter

discutiens.

Chalasticis

quādo uten-

dum solis.

Asclepiadis

mammas &amp;

sedi conue-

niens.

Ratio utēdō



INSTIT. CHIRURGIC.

De mollientibus. Cap. 4.

*Malactica  
qua.*

**M**alactica sunt quæ modicè calida nulla uì siccandi uel humectandi manifesta indurata corpora emol-  
lunt, quanquã ut omnia ferè multiplici natura coierunt,  
in malacticis censentur plurima, quæ primo ordine calfa  
ciãt, secundo siccant ac tertio. Sed qua malactica sunt, hu-  
mido calidoq; elemento temperari necesse est. Plurimus  
usus est in tumoribus quos scirrodos medici appellant.

*Usus.*

*Scirrhi ge-  
nera.*

Hi in musculorum finibus ferè concrescunt: aliquando in  
mediis masculis, glandibus, uisceribus, ulcerum labris: ex  
materia crassa, lenta & frigida, qualis est pituita, & melan-  
cholicus succus. Sed è melancholico succo omnino can-  
crofi sunt, & malagmatis exasperantur. Inflammationes

*Vnde infla-  
matio i scir-  
rhu trãsit.*

in schyrrum cogi contingit, si materia crassa & lenta est, si  
adhibita pharmaca quæ nimium siccet & calfaciant, qua-  
lia sunt epispastica & exiphotica. Hinc enim tenue expri-  
mitur, reliquum occalescit. Sic enim topi in articulis,  
& calculi in renibus lapidescunt. In tenui serosaq; mate-  
ria non ita metuitur scirrhus, tota enim facile exhalat: in  
crassa & uiscida omnino declinãda, quæ siccãt, discutunt,  
astringunt, siquidem sola molliendi cura est. Atq; omni-  
no tum phlegmonæ, tum erysipelata quæ cum duritie de-  
clinant, malacticis curanda sunt, quæ citra hanc laxanti-  
bus remediis & diaphoreticis uacuentur, Malacticis quod  
clementer digerat interim cõmiscemus, sed quo iam tem-  
pore tumor durior caperit edomari: phlegmone & erysi-  
pelata in schyrrum degenerãt refrigerante nimisq; astrin-  
gente materia, sed à phlegmone scirrhus amplior est.

*Alia gene-  
ra scirrhi.*

*Leges i usu  
malagma-  
tum.*

In usu malagmatum certæ sunt leges. Primum enim co-  
gnosendum, quantum pars ægra à sua symmetria recesserit,  
quanto seipsa siccior atq; humidior euaserit, quãtum  
deniq; uitium increuerit: ex quo æstimãdæ remedium  
uires. Tum naturas partium distinguere oportet: postre-  
mo artificiosè colligendum qua ratione emollias, nun-  
quid admisceas quod detergeat, incidat, discutiat. In quo-

*Desperatus  
scirrhus.*

rum omnium usu modum & occasionem animaduertas.  
Desperatur scirrhus qui sic occalluit, ut iam non sentiat,  
& inde



& inde glabrescat locus: desperari dico, quia nullo malagmate domari possit. Etenim rescindi ferro, & septis exedi potest, nisi à subiectis nervis, venis arteriis metus est. Scirrhus cui sensus aliquis vel obscurus, vt magis minusq; induruit, ita lenius aut efficacius auxiliū requirit. Mulieribus, pueris, eunuchis, virbanis hominibus, ociosam atq; vniuersalem vitā degentibus lenior medela: nauis, messoribus, fossoribus, duris omnino & laboriosis corporibus fortiora malagmata conueniunt. In lenta & contumaci materia miscēdum aliquid, quod incidat atq; detergeat: id in chordis & tendonibus fieri consuevit. Tale est acetum mulsum, aut si ab aceto metus est, melicratum, in quo hyssopum, thymum, pulegium aut calamintha precoxerint. Est & hoc animaduertendū. Scirrhus quidā simplex, alius flegmonodis vt quædā inflammatio scirrodus est. Scirrhum malacticus & diaphoreticis excuties: phlegmonem lenies, concoques & in halitum vacuabis. Vbi verunq; coit, ut hoc vel illud superat, ita remedia temperabis. Malagmata in cerati crassioris formam & corpus cōpinguantur, quæ inde ciratomalagmata appellāt, quāquā aliquādo cerelæi aut cerati liquidi, nonnunquam emplastri compage permiscuntur, vt videlicet molle ac tenerū: squalēs durumq; corpus est & vitium habet. Cataplasmata fiunt è farinis hydrelæo coctis. Quod si hydrelæo lini semen, althææ radices & liliorum, ficus pingues aliq; id genus prius incoxeris, deinde in expressa muccagine farinas subegeris, magis emollies. Cataplasmata ita cōsistere oportet, vt mollia quidem sint, sed non diffuant. Adduntur cataplasmatibus, oleum, resina, quæ quasi vinculo pharmacū retineant: adduntur pistæ herbæ & semina quæ vim malagmatis inaugeant, sed modus sit ne inde durius euadat, aut contra soluatur corpus cataplasmatibus. Integrum enim permanere & compage iusta necesse est. In calore, phlegmone, parua duritie & natura molli paulo liquidius confingi potest, & rursus crassius vbi omnia cōtraria sese offerunt. Ac diutius insistere pharmaca vtile est, neq; vno die sæpius absolueret, nisi exaruisse videretur.

*In lenta & teria.*

*Differen-  
scirrh.*

*Consistēt  
malagma  
tum.*

*Cataplas-  
mata.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Particula-  
rium mate-  
ria.  
Olea mala-  
stica.*

*Utendi mo-  
dus.*

*Frigida ui-  
tenda.*

*In scirrhis  
hepatis &  
lienis.*

*Siraon.  
Adeps &  
sebum.*

tur ac ne exarescant celerius, oleo, adipe, mucagine ferè  
coniunguntur. Leniter emolliunt butyrum, œsopus & la-  
na succida: hæc oleo inculcanda, amygdalino, lirino, cha-  
mæmelino, oleo i quo semè lini, althææ, scænugræci, i quo  
maluæ, althææ, cucumeris agrestis, & liliorum radix, te-  
nella maluæ agrestis, & liliorum folia, vel viridis anethi  
cacumina præcoxerint: in quo aliquid illiquatum fuerit  
galbani, ammoniaci, bdellij. Molliunt & hæc, lentisci-  
num, terebinthinum, mastichinum: quæ tum peculiari-  
ter vsurpantur, quum præterea digerendum ac leni-  
ter repellendum. Hyosciamino, violaceo, nenuphari-  
no locus est in ea inflammatione, quæ iam uideatur indu-  
rescere, hæc ergo olea in lana sordida molliter apprimū-  
tur, ex quo malasticum impingitur. Omnia uerò prius in-  
tepescant. Etenim frigida omnino vitanda sunt. Expressa  
oleorum materia & cum adipe pista aut cataplasmatibus  
cōcorporata, malagma finges, ut liliorum radice cum adi-  
pe anserino mista. Olea quæ tenuitate partium celerius  
permeant, ex emplastris mollientibus chymicorum arte  
educuntur. In malagmatis censenda sunt uitelus oui, cro-  
cus, cera unguinosa, caricæ pingues circelæo è duplo oleo  
ut sit liquidissimum: æquali, ut sit medium. Iam crassum  
est, quod ceræ partes quatuor & olei tres continet: magis  
emolliet quod è cera pingui dulci oleo, lirino uel simili  
temperatum sit. Cera alba recens, molis, cum æquali pō-  
dere butyri, resinæ liquidæ uel colophonæ pulchrè  
emollit. Caricæ pingues cum irino lirino, capparino, tri-  
tæ scirrhis hepatis & lienis opitulantur. Id habet peculia-  
riter scirrhus hepatis, quod leniter mollientia deside-  
rat mistis aromatibus, quæ calefaciant & tenuent. Sed  
hæc uincere oportet. Siraon è pinguibus caricis ad mel-  
liginem coctis, molli, terget, digerit. Adeps & sebum  
utrunque coquit laxat, & molli quæ quia materia unde  
generantur, genere animalium & loco ubi concresecunt,  
natura denique (adeps enim mollior est) differunt:  
cum Aristotele distinguas licet, ut in natura molli, adi-  
pe: in dura, sebo potius utendum putes. Rursus quia  
minimum



minimum est quod dissident, misceri possunt. Vtrunque genus natura & specie animalium, ratione uitæ & pabulatione, sexu & ætate, deinde quia hæc recentia, illa uerusta: alia syncera, alia cõdita sale & aromate uel externa imbuta qualitate, distinguendum est. Lenissimus suillus adeps (axungiam uocant) in qua mirum est, & experimẽto constare ueteres scripserunt, q̃ eà genibus alligata reddi in os sapor, ut etiam expui uideatur. Ex quo fortasse non unius hydrargyri qualitate, sed totius misuræ ex eo & axungia illitis in lue uenerèa os grauius exhalat, & salina madet. A suillo sunt uitulinus, hædinus, caprinus, bubulus, quibus si lubet, uulpinum & leporinum adiicies: atque hi leniunt magis & concoquunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sed inusitati, hyæninus, pardalinus, deinde ursinus: & hi duriora corpora molliunt. In medio sunt taurinus, hircinus, ceruinus, quibus ascribi possunt arietinus, equinus, asininus: caninus admodum efficax est. Taurinum sebum omnium domesticorum aialiu pinguia, siccando superat: tenuitate partiũ a leonino, pardalino, & hyænino superatur. In uolatilium genere, efficac anserinus adeps, anatinus, olorinus, sicciore gruibus & prædatoriis auibus suauis gallinacens, calidior columbinus. Ex anguillis & fluuiatibus piscibus, languet: è marinis fere sicciore & calidior est. Humanus mediocriter habet ad omnia. Domesticorum animalium pinguia humidiora sunt, ut suum quam aprorum: e maribus sicciore & calidiora. Castrati mares fœminis respondent: ideoque ueruecinus adeps arietino languidior est. E iuuenibus animalibus humidior est unguedo, e senioribus sicciore. Adipes oleo magis emolliunt: ætate calefaciunt magis, tenuiora fiunt, acrimoniam contrahunt. Purgatur adeps exemptis uenis (quas fibras uocant.) Salsus uel conditus aromate sicciore est. At constat pepticis & malacticis aduersari, quæ nimium siccant, quamquam Plinius conuenire scribit salsam axungiam molliore magis. Id in suillo adipe fortasse concedi potest, qui alioqui parũ emolliat.

Reccens

Ex quibus  
adipes & se  
bi genera di  
stinguas.

Tres ordi  
nes adipum  
Pus.

Efficacissi  
mi adipes.

Medis.

Taurinum  
sebum.

Volatilium  
adipes.

E piscibus.

Salus de  
eps & que  
siccant.



INSTIT. CHIRURGIC.

*E uetere a-* Recens adeps si defit, & uetus ad curam reuocandus est,  
*dipe quomo* liquefieri prius oportet & purgari fibris, mox frigida sæ-  
*do recens pa* pius lauari, postremo etiam uino quam odorantissimo.  
*ratur.* Eo modo sæpius liquatur, cogitur, lauatur aqua & uino,  
 dum omne uirus exuat. Quod grauius olet ferè odio-  
 sum est: ex quo odoratis aquis arte chymica illectis (sta-  
 lagmata uocant) sæpius lauatur, aut ex odore uino subigi-  
 tur. Infumatur etiam iisdem aquis, quæ momentum mo-  
*Medulla.* schi, uel ambaris conceperint. Medulla in sebalibus, in  
 adiopifis animalibus adipi respondet: uiscera, chordas,  
 tendines, musculos emollit: ex ossibus humidior, è spina  
 ficcior est. Prima laus ceruinæ quæ nullis malacticis infe-  
 rior est. Vitulina sequitur, tum ouilla & caprina. Acrior  
*Quæ magis* taurina est, qui ut emolliat. Atque hæc leniora sunt. Iam  
*emolliunt.* uerò durioribus corporibus conueniunt, ammoniacum,  
*Ammonia-* quod aceto liquari potest: leniter decoquendum, ne effe-  
*cum.* uescat, id si metuitur, ex aceto leuigatur in mortario: &  
*Bdellium.* reliquis in cacabo coctis permiscetur. Bdellium molle &  
*Syrax.* pingue salina hominis subigitur, molliet, coquit, modicè  
 digerit. Syrax idem efficit, uerum liquido, aut melligi-  
 noso utendum est. Nam neque syrax aridus, qualis est,  
 quam calamiten uocant, neque ammoniacum, neque de-  
 nique quicquam generis eiusdem malacticon est, ubi iam  
*Galban.* exuccum inaruit, & discutiendo usurpandum est. Galba-  
 num præterquam quod molliet, coquit, discutit, etiam se-  
 pticon est, & dolorem lenit: purgatur sordibus hoc mo-  
 do. Mundo linteo ratoque conuoluitur, & ita feruidæ im-  
 mergitur, ut pendeat quidem, ne fundum attingat. Nam  
 per raritatem lintei colatur galbanum: sordes in linteo  
 retinentur. Liquefit uino uel aceto, aliisque modis, &  
 coctionem non sustinet. Efficacior opopanax. Ladanum  
 molliet ac repellit. Propolis ammoniaco uicina est, & qua  
*Opopanax.* (ut antè dictum est) pro galbano ueteres utebantur.  
*Ladanum.* Sint hæc omnia mollia & pingua pro sua quæque natu-  
*Propolis.* ra: quæ si ætate inaruerint, nec ad manum fuerint mollio-  
 ra, pingui oleo instaurare oportet. Malacticis quæ em-  
 plastica esse conuenit, resinæ coniunguntur. Resinæ sint  
 quæ



# LIBER I.

quæ acrimonia careant, chia mastichæ, larigna picea, *Malagma-*  
 abietina, terebinthina. Pineæ nimium siccant, strobilina *ta emplasti*  
 acrior est, bitumen & pix aridiora sunt. In summa, quæ *ca sunt.*  
 nimium siccant, quæque acria sunt, reicere oportet. *Resina.*  
 Neque enim iuuare possunt, nisi aliis temperentur.  
 Pix mollis & bene pinguis, qualis olim brutia, utilis *Pix.*  
 est. In summa neque pix, neque resina molliendo ido-  
 nea est, nisi uel liquida, uel ita mollis, ut tracta facile  
 sequatur uisco similis uel ceræ, quæ ut paulo firmior  
 sit, quam ut sequatur, pressa tamen digito concedit.  
 Acrior & siccior repudianda est, quæ liquidior uideatur  
 cera, ceratis & magis corpulentis malacticis colligatur.  
 Durior pingui & oleo macerari debet. Butyrum, pin-  
 guia, atque omnino liquabilia, uesica suis includuntur,  
 demergitur hæc aqua calida uase concepta, in quo coxe-  
 rint quæ emolliant. Sic illa paulatim eliquantur, & a-  
 scititiam uim transpirante halitu per uesicam combi-  
 bunt. Succedit his miraculosum ex aceto remedium, *Aceti usus.*  
 quod non temerè, sed summa ratione adhibendum est.  
 Scirrhus malactico oleo fouetur, ex quo inducitur ma-  
 lagmate: hoc diebus aliquot permittendum loco, neque  
 prius reuellendum, quam exuccum solutumque uidea-  
 tur: hic ergo detrahi potest. Quod cum feceris partim  
 oleo, ut prius, fouebis, malagma nouum & benè succo-  
 sum impinges, quod priore paulò sit efficacius. Mora  
 igitur dierum aliquot interposita pharmachum reuelles  
 animaduertens, quantum emollierit, ut si lenius uidea-  
 tur, uim eius inaugeas, ex quo gradatim ad ea quæ ace-  
 tum combiberint, peruenias. Quæ omnia posteaquam  
 profecisse animaduueris, & mollior tumor extiterit,  
 pyritem lapidem molarem, aut filicem, unde scintilla  
 decutitur, candentem igne, acerrimo aceto merges. Ex-  
 halabit plurimus uapor, quo scirrhus aptè infumandus  
 est circumseptæ parte, ne dissipetur fumus, sed totus in  
 scirrhum coeat. Locum iam satis infumatum oleo tepi-  
 do fouebis, & reuocata prima illa curandi uia malagma  
 applicabis, atque ita bidui, uel etiam tridui interiecta  
 mora

*Infumatio  
ex pyrite et  
aceto.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

mora aceti usum & igniarium lapidem reuocabis, ut sit aceti uicissitudo & remediorum quæ molliunt. Verum, neque diutius, neque sæpius halitu aceti, pars uexanda est, ne in lapidem concreascit, & neruosum genus grauius laceffatur. Sed ut molliendo profeceris, ita acetum & effumantem lapidem repetes. In malacticis quoque usus aliquis interpellari debet: primum enim (gratia exempli) è pinguibus caricis, medullis, adipibus, cera & oleo exigua resina mista, malagma conficies, aut parygron usurpabis. Tum ut res succedet, ad ammoniacum & similia ueniendum, ac primum quidem hæc citra acetum, deinde cum aceto lenioribus commiscebis, quibus quum uno uel altero die fueris usus, ad ea quæ leniora, quæque sine aceto sunt, curam reuocabis: ut ueluti circulo quodam & e re nata auxilia transmutentur. In musculis & liene tutior aceti consuetudo est: in chordinis & tendonibus, neque diutius, neque frequentius utendum erit, ubi scirrhi magna ex parte coalescunt. Atque hæc de aceti usu breuiter dicta sint. Ammoniacum aceto fustum manibus diducitur, ut sit luti crassitudo: tum ex irino, lirino, capparino pinsitur, terebinthinæ sextula coniungitur, puluerantur ora cumino trito, aniso, sale torrefacto: & in alutam explicata splenicis affiguntur. fermentum coquitur aceto, hepatis duro & lieni: potest oleo uel butyro conditi, & terebinthina colligari. Fortius acetum est in quo thymum, hyssopum, pulegium, & similia tusa maduerint. Lene malacticum est butyrum, cera, resina æqualiter mista. Eodem modo adeps cum cerato iunctus & resina. Caricæ pingues in sapa coctæ, & uino dulci cum lirino, tuxæ. Lini semen hydrelæo coquitur, & cum adipe infringitur. Altheæ radix arida in pollinem resoluta, malagmatis inspergitur. Eadem radix qua parte pinguis & quasi medullacea est, eraditur, & resina colligatur. In conficiendis malagmatis rudicula utendum est è resinosis arboribus, nec altringentibus è caule maluaceo, ex assulis tedæ. Alioqui malug folia extremæ spathe alliganda, ut inde

*Remedia  
composita.*

*Ex ammoniaco  
splenicis.*

*Ex fermento  
hepaticis.*

*Aceti uis  
quomodo in  
endatur.  
enia mala  
ctica.*

*Rudicule  
malactica.*



de uerses, uolutes, ac denique conficias malagmata. Licet etiam more nostro & exemplo ueterum rarum lin-  
teum insarcire lini semine, foliis altheæ aliisque id ge-  
nus, & extremo ueruculo uelut caput alligare, inde phar-  
macum circumagere: nodum, caput hoc nostri: uete-  
res crociphātion appellarunt. Quod si fuso butyro,  
adipe, oleo intingas, idque sæpius repetas, dum medica-  
mentum in cacabo, uel mortario conuoluitur, malaëtico-  
teron hoc est magis emolliens pharmacum relinques.  
Atque hoc semel quasi exemplum positum sit, ut in a-  
liis pharmacis spatha ueruculo, capite, asserculo, aliis-  
que id genus instrumentis conuenienter uti possis. Pa-  
rygron Heræ & ueteribus laudatum recens dolorem le-  
nit, phlegmonas mitigat, paruis inflammationibus me-  
detur, id quod lenioribus malagmatis omnibus commu-  
ne est. Parua ulcera cicatrice claudit, si coctis prius me-  
tallicis comparetur: recens liquidum est unde nomen ha-  
bet, ætate uerò concrevit: recentis usus in paruis inflam-  
mationibus quæ doleant: concreti & uetusti in phlegmo-  
ne declinante non dolente quidem, sed iam durescente,  
quæ ut magis minusve induruit, ita uel uetustius, uel mi-  
nus uetustum parygron requirit, quanquam eo usque oc-  
caluisse contingit, ut ne uetustissimo quidem parygro  
iuuari possit, tumque maioribus auxiliis certandum erit.  
Itaque ut mollias, parygro utendum non ita liquido, ni-  
si fortasse in mollioribus naturis, neque concreto, nisi  
in callosis corporibus: omnino uerò modice durum sit  
quod emolliat. Uetustius oleo, butyro, adipe dissolui po-  
test. Est autem mistura hæc. Adipis suilli recentis & be-  
ne purgati unc. 44. ceræ pinguis unc. 24. cerusæ litharg.  
ana unc. 6. liquabilibus confusis metallica trita colli-  
guntur. Al. mediocriter emolliens callosas rimas calca-  
neorum & perniones adiuuans, litharg. cerusæ ana unc. 3. succi seminis lini, olei ana unc. 20. ceræ unc. 8. adi-  
pis suilli unc. 14. colophonis unc. 18. Similiter priori  
comparetur. dialthæon clauis, carbunculis, furunculis,  
litharg. ol. ana lib. 1. galbani lib. semiss. ceræ terebinth.  
ana

*Perniones  
adiuans.*



INSTIT. CHIRURGIC.

ana li. i. radicum althex fasciculos 4. lithargyrus ex oleo  
 diu teritur in mortario : cera & terebinthina fusa com-  
 miscentur, galbanum purgatum & ut antè, fufum cola-  
 tumque adiungitur, postremo radices tuse ligneo pistillo  
 concorporantur. Aliud dialthæon. radices althex & li-  
 liorum ana unc. 2. coquantur in hydrelæo ad aque con-  
 sumptionem, ex quo in olei expressi lib. 1. lithargyri lib.  
 1. coques, dum non inquinet, & adipis suilli lib. 1. com-  
 miscebis. In his omnibus uis efficacior est oleo & adipe  
 ueteribus: aucta & magis cocta lithargyro: utriusq; pin-  
 gui & oleo recentibus mitior est. Media uerò altero recē-  
 ti, altero ueteri. Mediocriter mollit, colophonix purissi-  
 me unc. 2. cere albæ unc. 4. mastic. unc. 1. olei quod suffi-  
 cit. Al. terebinth. cere ana unc. 9. galbani nitri ana unc. 1.  
 thuris pinguis sesquuncia, medullæ cerui unc. 2. propo-  
 lis pinguis sesquuncia, ol. laurini, sepi uitulini ana drac.  
 2. uel eo plus uehementer mollit & discutit. Violentum  
 quod sequitur rusticis corporibus accommodatum, inue-  
 teratis nec iam dolentibus scirrhis, tantisque prius lenio-  
 ribus remediis adhibetur, desperatis splenicis & paroti-  
 dibus (diacoprægiar uocant) Caprillum sterco aceto sol-  
 ues, uel ut ne tam acre sit, oxycrato: mitius èt si dilutum  
 pharmacum polentæ iunges, & affuso oleo cataplasma fin-  
 ges. Aliud stercois caprilli unc. 2. radices cucumeris  
 agrestis, ficum immaturatum ana unc. 1. herbæ pedicula-  
 ris, bdellij, farinæ fabarum, amygdalarum amararū ana  
 semuncia, fecis olei antiqui quod sit satis ad emplastrū,  
 tuis omnibus medicamentum in mortario conficies. Eff-  
 & hoc potentissimum: Subigitur caseus putris & uermi-  
 culotus e iure in quo suilla perna diutius coxerit. Ar-  
 thriticis tophorum particulas sine ferro detrahit & sa-  
 nat. Eadem præstat quasi miraculo coccum cnidum com-  
 myrrha & aceto tritum. Sed horum multa non tam mol-  
 lire quam secare & ui discutere uideri possint. Celebre  
 iam olim ac ueluti per manus traditum Menecratis em-  
 plastrum, quod Democrates metro reddidit, & diachylon  
 ex authoris instituto appellauit, quod nomen leuiter mu-  
 tata

Escaso ph-  
 179.



rata uoce ætas nostra retinet. Recentia vulnera inflammatione uindicat, uel (ut alii) neurotrota nervorum vulnera: sæpe enim neurotrota & neurotrota alterum pro altero in Galeni libris, ubi medicamentum hoc describitur, supponi solet. Diuisa glutinat, & quæ inflammantur curat: optime pessis adhibetur, diuturnis & recētibus vteri inflammationibus: implet cauernas vlcera pistrum rosaceo uel bono myrteo, & cicatrice tegit. Olet æstate lib. 7. aliàs lib. 7. & semiss. hyeme lib. 9. axungia recentis lib. 7. lithar. subtilissimè triti lib. 6. fœnugræci heminam vnam, aliàs uncias 9. seminis lini vsti tantundem, radicis agrestis maluæ recentis & succosæ uel altheæ lib. 3. Habeatur olla amplo orificio, in quam fundatur aquæ sextarii octo. Sic enim notatur Græcè per literam  $\nu$  quanquam fortasse substituendum  $\alpha$  quæ uiginti, significat. Ac uiginti sextarii mensura Parisiensi, 15. pintas implent, sextarii octo sex pintas. In aqua purgata radix & concisa coquitur, semina immittuntur, exprimatur succus in linteo, eius succi libræ quatuor cum oleo coquuntur. Maiores primum bullæ existent, deinde minores & crebriores: hic lithargyrum insperge, coque omnia molli carbone, dum succus omnino confectus uideatur, ac melinum & bene coloratum fuerit emplastrum, non inquinans, neq; nimis durū. Sic enim apud Gal. 7. de compo. pharm. cata geni. Orib. habet aquæ sextarios 12. id est nouem pintas, & radicum lib. 4. & seminis utriusque sextarium vnum vel vnc. 18. & litharg. lib. 2. Radices alii purgant, tundunt, & prius quàm coquant, diem integrum macerant in aqua postridie fœnugræcum lotum fideliter & purgatum adiiciunt, tertio die lini semen similiter lotum eadem aqua, ubi reliqua etiā dum madet, immergunt, quarto die coquuntur omnia ad crassitiem. expressus & colo trajectus succus vsui seruatur, ut uidelicet cum oleo ut prius, coquatur, & addita lithargyro pharmacum conficiatur: quod deinde conuoluitur rude, subigatur manu & in pastillos conformetur. In usu capiunt pastilli vnc. 2. ceræ, olei ana vnc. 1. & omnia colliquant. Ex eadem materia magdalix officinarum em-

c      plastrum



INSTIT. CHIRURGIC.

*Emplastrū.  
Democratis*

plastri diachylon sinut, sed nō eadem ratione, iam remol-  
lita parte ubi discutiendum, ireos trita pars duodecima  
plus minusve adiicitur: si sedandus dolor est, mucago ē  
meliloto, si etiam calor adest, ē psyllio: potest etiam in-  
tingi croco. Potest diachylon aliis malacticis commisce-  
ri tam efficax, ut unum sine aliis chirurgo satis esse possit.  
Superficialia ulcera glutinat solutum rosaceo uel myr-  
teo. liquatum chamæmelino uulnura neruorum inflam-  
matione prohibet. Podacraeis quouis tempore opitula-  
tur: ueteres uteri phlegmonas persanat inditum pessario.  
potest alia, quæ ut intelligas, describendum pharmacum,  
quod antè diachylon Democrates memorauit, ut obces-  
sa inflammatione liberes musculos, neruos, perioestion  
membranam punctam (unde dolor, inflammatio, febris,  
sitis, uigilia, atque id genus accidentia) uindices: ut po-  
dagricos quouis tempore adiuues, & prohibeas callos.  
Accipe lithar. auri in pollinem triti lib. 2. axungia uetu-  
stissimæ lib. 4. libram uero & uncia quaternas olei uete-  
ris & crassissimi, non fœtidi, non nigri, non asperi. Axun-  
gia liquefit igni, purgatur fibris, in uas aliud satis am-  
plum transfunditur, adduntur olei unc. 10. ut simul fer-  
ueant, relinquuntur olei unc. 6. quas si fuerit opus & me-  
dicamentum crassius appareat, postea affundes. Crasso  
iam pharmaco litharg. inspergitur, coquuntur omnia blan-  
do igne, & assiduè uersantur spatha ē picea: atque ubi em-  
plastri forma fuerit, auferatur igne, paulò durius æstate:  
hyeme mollius, sed ut non inquinet. Sublatum igne mo-  
uetur, dum refrigescat, atque hic rursus duriter uersa-  
tur manu, iungitur atque reponitur. usus tempore mol-  
liri debet, & aluta intenditur, permagnaque splenia su-  
per accomodantur. In neruis crassis & masculis, durio-  
ribus mammis, & tumentibus articulis radicis altheæ  
purgatæ sordibus, & in taleolas cæcæ lib. 1. medicamen-  
to indes, quo tempore reliqua iam ad focum feruent  
priusquam lithargyrus inspergitur. Vtriusque uires tum  
illius quod sine altheæ radice, tum huius quod cum ea  
radice sit, emplastrum illud diachylon continere scripsit  
iuuen-



iuuentor Menecrates, quod & alii aliter conficiunt.  
 Aliud diacylon, ut Orib. è semine lini, fœnigræci, hor-  
 dei, radice althææ, ut prius, maceratis coctisque succus ex-  
 primitur: tum lib. duabus succi adduntur lithargyri olei  
 an. lib. 2. ceræ unc. 8. Lithargyrus cum oleo diu teritur,  
 & cum cera leniter incoquitur affuso oleo, postremo suc-  
 cus adiicitur: uersantur omnia, & sedulo permiscuntur.  
 Sunt & alia diachylon malagmata, ut Alexandri è psyllo  
 quod Aetius describit, & magnum Mesuræ sine gummi, &  
 cum gummi factum, quodque album, paruum & magnum  
 conficitur. Paruo utendum in duris inflammationibus:  
 album mediocres scirrhus adiuuat: magnum reliquis effi-  
 caciùs est. Giluum haliei cruentis uulneribus, præcisis  
 nervis & nudis remedio est, inueterata ulcera cicatrice te-  
 git, digerit, uenenatis hominum & animalium morsibus  
 medetur: duritias maximè mammarum mollit ac discu-  
 tit, atque omnino eo ueteres usi sunt, ut optimo & admi-  
 rabili medicamento. Descriptum est tertio & 5. lib. Ga-  
 len. de compositione pharmac. cata geni, ceræ, argenti spu-  
 mæ ana drach. 100. terebinth. mænç, galbani, rubricæ sino-  
 pidis, terebinthinæ ana unc. 1. ol. sextarium 1. uel lib. 2.  
 Oleum & litharg. dum non inquinent, coquito, hic ce-  
 ram, resinamque iniicito: sublatis igne rubricam, galba-  
 num, mannam deinceps adiungito: quidam myrrhæ unc.  
 1. miscuerunt & ceræ non centum, sed tantum octo dena-  
 rios scripserunt. In præcordiis tensis difficili motu arti-  
 culorum uetus ac nobile, Amythaonis emplastrum quod  
 omnem duritiam soluit. Ammoniaci unc. 36. ceræ unc. 36.  
 terebint. uncias octo bdelli galbani an. unc. 8. thuris, myr-  
 rhæ ana unc. 4. cyprini uel olei terebinthinini alioqui ma-  
 stichini heminas quatuor: myrrha, thus, bdellium uino  
 madefiunt, ammoniacum aceto diluitur, omnia contun-  
 duntur pistillo, quod oleo inungendum quousque per-  
 festè dissoluantur. Et hoc etiam fortius est Cathegetæ  
 malacticon ad contractos articulos & ita occupatos ut  
 non moueant: internos abscessus, opisthotonicos, ner-  
 uos dolentes, inueteratas & contumaces duritias. Bdel-

*Giluum ad  
mirabile.  
Halici.*

*Amythao-  
nis.*



lii, seui vitulini, ammoniaci, iridis illyricæ ana vnc. 2.  
 opopanax, galbani, canchryos, vel baccarum lauri, flyra  
 cis thuris ana vnc. i. piperis gra. 160 ceræ terebinth. ana  
 selibra vini & feculæ, irini vnguenti quod sufficit. loco  
 huius, vel oleo irino condita aromatibus utendum erit,  
 vel aliquod ex iis quæ apud Mesuem composita sunt, ac  
 condita aromatibus, vsurpandum Conficitur ut prius co  
 pta hæc quasi tusilia ex conficiendi ratione ueteres appel  
 labant. Plura septimo de compositione pharm. cata geni,  
 & 15. Aetii describuntur. Sed & octauo cata topus malag  
 mata sunt quæ siccant, contrahunt, indurant, atque emol  
 liunt, quanquam Asclepiadi & Andromaco malagmata  
 appellata, quia videlicet non solæ vires, sed & compages  
 ac corpora medicamentum in ratione nominum spectata  
 sunt. Ac ferè malactica corpulenta sunt & emplastica, si  
 neque dolor, neque phlegmone, neque mollities corpo  
 ris prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo subiiciatur ma  
 lagma remollitum pingui uel oleo, ne celerius exarescat.  
 tunc enim reuellendum est & aliud imponendum, alio  
 quin pluribus diebus hæere conueniet. Iam uero in ma  
 lacticis quæ nostra hac memoria in vsu sunt, emplastrum  
 de meliloto, aliud ab eo quod ueteres diameliloton de  
 scripserunt. eo vtendum est, in crassa ac frigida materia: in  
 cidit, mollit, attenuat, calefacit. Quod de muscillagini  
 bus appellant, moliendo magis idoneum est, & dolorem  
 lenit. Dialthæas mollit, lenit, coquit, incidit, digerit: Ce  
 roneum repellit, coquit, mollit, incarnat, & multiplicis  
 usus est. Resumptiuum mollibus corporibus conuenit, op  
 timè mollit ex solis muccaginibus siue gummosis. Empla  
 strum filii Zachariæ parabile est, & mediocriter mollit.  
 Arthanite strumis & lieni duro conuenit: unguentum de  
 bdellio mollit, incidit, discutit. diachalciteos tollitur liri  
 no. Oleo è maiorana aliisque id genus molliri possint, &  
 adiecto galbano, bdellio, ammoniaco & similibus fortio  
 ra reddi. Priuatim conueniunt duris inflammationibus  
 mammæ. Violarie & althææ folia hydrelæ o cocta adi  
 pe uituli conteruntur, ouorum uitelli duo infecti croco  
 com.

*Malagma -  
ta.*

*Censura re-  
mollientium  
quæ nūc usi  
tata sunt.*

*Ad mamas.*



commiscentur. Al. hædina capita, veruecini pedes cum althea & uiolaria percoquantur, in expresse succo oryza bene munda & asperiore lintheo attrita decoquantur, butyrum recēs iniicitur, postremo cum iam corpulenta pulicula, est ouorum uitelli croco intincti commiscentur. Al. In Caricarum decocto fabacea farina subigitur, adiecto oleo violaceo & aceti momento cataplasma fingitur. Multa ad mammarum duritias & abscessus. 7. de compo. pharma. cata geni. Ceterum grauer peccatur cum emplastra malactica è galbano, ammoniaco, opopanace, resina & aliis squalidis comparantur, & aceto multo diluuntur. Sic enim tenuent, incidant, discutiant, non molliant.

## De suppurantibus.

## Cap. 5.

**I**Am hoc genere vtendum nobis, quum ab aliis remediis desperatio est. Verum in fracturis capitis contuso pericranio relictæ alia medendi cura ad suppurationem statim conuertimur, specillo vulneratio periorationem diducimus, labra vlcis in decussem ducta nouacula ampliamus, conscalpimus cranium, & abradimus: medicamenta quæ quam celerrimè suppurent, adhibemus, suppurata diligenter repurgamus, siccamusque, ut iusta nascatur caro, neque mollior quàm oportet, neque durior, & quæ non excresecat: ut denique conquassati ossis testula à viuo osse maturè deducatur. Venereos bubonas quique abscessus in articulis & ad articulos confederunt, celerius maturamus, ne inclusum virus aut latens sanies periculum aliquot amolliatur. Alioquin tumor omnis, phibeatur, aut discutitur potius quàm suppuret, nisi iam eò conuerti natura videatur, excessitque tempus in quo conuenienter discutias. Ac ferè maiores phlegmonæ suppurant, pulsant, dolent: Dum pus conficitur (inquit Hippocrates) dolores fiunt ac febres. Suppuratis omnia ferè conquiescunt. In suggillatis hæc eadem remedia sæpe conueniunt. Imbecillæ parti, putri vlceri & tumori, cancroso, rheumatico, Telephio, Chironio atque omnino maligno frustra maturantia

*In fracturis  
capitis.*

*In ueneris  
bubonibus  
et articulis.*



INSTIT. CHIRURGIC.

*natura sup* acria decurrendum, uel quæ plurimum siccant. Sint autē  
*purantia.* quæ suppurent, natura modicè calida & humida, iisdem  
 limitibus circumscripta, quibus temperiem hominis defini-  
*Empiastica* elementari familiaritate cōsentiat: Emplastica sunt dia-  
*sunt quæ* pyitica, (sic enim appellant ecpyitica & peptica) ut præ-  
*suppurent.* clusis inde spiraculis natium calorem inhibeas, in quo  
 concoquentis nature robur est. Ita substantia quidem ca-  
*Pus qñ* lor augebitur, neque qualitate crescet: solidæ partes con-  
*generetur.* coquetur, & consuetudine partium similiarum exalbe-  
 scet, fietque tandem pus album, leue & uniforme, quod  
 quia alimento esse non potest, exesa cute uias sibi faciet,  
 atque ita effluet. Non ab simili ratione chalaistica uocata  
 ecpyitica fient, si accesserit crassities partium. Eodem mō  
 quæ leniunt, calefaciunt & adstringunt. Emplastica mo-  
 dicè calida omnia concoquunt. Præit in his quod est te-  
 nue: reliquum uerò uel contracta, uel illita cute uias in-  
 tercipit, ne quid spiritus exhalet. Conrra uerò si ex-  
 pirat calor, nec emplastica materia est, nihil suppurat,  
 & aliquando alienus calor succenditur, unde putredo.  
 Echecolla, quæque tenaci & uiscida materia temperata  
 sunt, per se inhaerent: reliqua uerò uel gummi, uel resi-  
 nis mollibus implicanda, alioqui commodè alliganda  
*Malactica* sunt. Malactica calidiora sunt, & leniter siccant, insi-  
*quid diffe-* tumque humorem paulò minuunt, quo nomine à pe-  
*rant à pe-* pticis distinguenda, ne similitudine fallant. In pepti-  
*pticis.* cis uitanda quæ detergent & quæ uehementer calefa-  
*Utanda.* ciunt. Nihil enim quod ualidè discutiat, pepticon est:  
 & quod deterget, poros expurgat, quos illinere oportet.  
 A siccantibus metuitur, ne frugi materiam exorbeant,  
 multò magis si præterea excalfaciant. In summa mo-  
 dicè calfaciant, atque adeo emolliant potius quàm sic-  
 cent. Neq; uerò contra nos faciet, quòd in historiis medi-  
 corum



corum permulta peptica sunt, quæ mistis diaphoreticis deterforiis atque desiccantibus temperentur, quin & simplex pharvacum est quod concoquat & discutiat ut galbanum: maturet, digerat, detergeat ut terebinthina: qualitas enim rerum, mistura retundi potest, & multa vitia eodem tempore interdum coeunt, unde varia misceri necesse est, & iis semel uti quæ polychrasta ueteres appellant. Ac sæpe facit abscessus natura, ut etiam acria miscamus. Qualis est qui lenta & contumaci materia con- *Materia.* creuit, & eo nomine tardius suppurat. Peptica sunt, aqua temperatè calida affusa parti: modus est ut inde *Aqua.* erubescat locus, ac leniter extumeat. Nimium fit si inde subsideat, aut expalleat. Hydræleo, oleo pingui ac dulci modicè calido: similiter & butyro utendum est. *Butyrum.* Butyrum phlegmonas concoquit ac digerit, in iis quæ molli aut certè nō ita dura carne præditi sunt. Et ad parotidas, bubones & oris phlegmonas, aliaq; innumera omnino satis est: dentientibus pueris, & inde calentibus gingiuis atq; tumentibus medetur. Lingitur per se incoquendis expuitionibus peripneumonicorū, pleuritico- rum, & iis omnino quæ in thoracem defluerunt. Vfus est quo iam tēpore fluxio restitit. infectū croco nihilo- minus coquit, & inde pharvacum leniter repellit, & tempestiuum est incrementis. In more fuit ueterum tubercula foris enata & contumacia calido pane fouere, uel cera subinde calefacta, sic ut ne sit nimius is calor, sed faciliè ea parte sustineatur: cera sit natura pinguis, panis recens & ex optimo tritico cōparatus: hac enim ra- tione tuberculum sæpe discutitur, interdū concoquitur. Tussilago sub cineribus cocta celeriter maturat: idē oxa- lidis foliis uulgu doctū experientia tribuit. Triticum *Triticum et* ore præmansum, saliuāq; hominis commolitum, rusticis *inde farina* corporibus conuenit. Leniora sunt farina tritici per- *& panis.* purgata furfure, & inde panis dissoluitur aqua: olenū uel butyrum additur: coquuntur omnia ut sit cataplasma quod lenit inflammationes uulnerum, & celeriter matu- rat. Eadem farina hydrelæo coquitur, coloratur croco.



# INSTIT. CHIRURG.

*Farina hor-  
dacea.*

*Ad paroti-  
das Archig.*

*Adipes.*

*Pix.*

*Picatum ce-  
ratum.*

*Resina.*

*Osypos.*

vbi calor aliquis superest, parum cocto pane ac recenti, quem uel hydrelæo, uel pauciore oleo insperferis, utendum erit. In contumaci uitio, nec ita calente, panis sic-  
cior, uberiore oleo molliori debet. Panis conditus sale, ef-  
ficacior est. Farina hordacea per se inutilis est: verū quæ  
bene purgato grano extunditur, & castratur sulfure eodē  
modo quo triticea, comparari potest hydrelæo cocta, con-  
spersa oleo mista butyro, infecta croco: sic enim pus fa-  
ciet, & calidioribus phlegmonis conferet, præsertim co-  
cta hydrelæo. Tale fuit cataplasma ueterum omilulæ  
uel omilulæ ex farina hordei, quod prius tostum non  
fuerit, quanquam etiam licentia quadam ad alia farina-  
rum genera nomen transtulerunt. Archigenes hoc modo  
parotidas celeriter suppurabat, assiduè calida consperge-  
bat, & omilulæ imponebat. Est & alia omilulæ antiquis  
usurpata ex farina hordei, scænuæ, seminis lini in sapa  
coctis ad glutinis corpus, adiectis interim duobus uel tri-  
bus uitelis. Adeps suillus, phlegmonæ familiarissimus,  
deinde uulvinus: taurino & caprino in duris, frigidisq̃ue  
tumoribus utendum est. Leoninus & reliqui eiusmodi inu-  
tiles, gallinæus & hoc paulò acrior anserinus usurpari  
pōt. Pix & resina in feruenti phlegmone rosaceo: in frigi-  
diore, ueteri oleo sicyonio uel simili colliquanda sunt.  
Pix arida qualis coracina & colophonia, uberiore oleo  
dissoluitur: pauciore quæ liquida est: mediocri quæ natu-  
ra & ætate mollis, digitis cedit, lentoris est participes,  
qualis olim brytia & lycia. Picatum ceratum dolorem le-  
nit, & pus generat: ideoque inflammatis ulceribus con-  
uenit. Resina utendum, terebinthina & lentiscina: cera læ-  
uidior, resina acrior, confusæ ad suppurandum ualent.  
Eluantur prius si quid acrimoniæ conceperint: mollian-  
tur oleo uel butyro cum exaruerint. Oelypon ueteres in  
pepticiis censuerunt: similem uim habet atque butyrum,  
digeritq̃ue leniter. Lana sordida modica atque macera-  
tur, tertia pars uini dulcia funditur, coquantur omnia,  
quod superfluit pingue, maturandis carnibus contusis,  
colligit Hippocrates. E flore lilii succus, exprimitur, sup-  
purationes



purationes concoquit; & uulvas mollit, quod mel & sy-  
 rion ueteres appellarunt. Siræon uerò malligo è coctis *Syrion.*  
 caricis, detergendo emolliendoque idoneum est. Deco- *Syræon.*  
 ctum caricarum lenissimum est, quod maximè coquit ac *Decoctū ca-*  
 digerit. In aquæ sextariis sex, pinguium caricarum libræ *ricarum.*  
 quinque decoquendæ, dum sextarii duo reliqui sint: ma-  
 gis maturabis si inde pista farina triticea, adiecto oleo uel  
 butyro cataplasma finges: ubi uerò digerendum magis ac  
 refrigerandum, hordeacea melior est. Atque omnino cari-  
 cæ pinguiore coquendo, acriores detergendo atque di- *Carica, ficus*  
 gerendo magis conueniunt. ficus recens digerit & lenit, *& inde ca-*  
 sed nō coquit. Cataplasma è ficu recenti & hordeacea fari- *aplasm.*  
 na in dulci uino coctis lenit & discutit: è carica pingui &  
 triticea oleo iunctis, lenit, coquit, discutit. Ex acri carica  
 & pane deterget, incidit, digerit & contumacia maturat. *Ex althea*  
 Eodem modo althææ decocto & uuæ passæ partes foue- *& uua pas-*  
 bis, farinas aut panem incoques, cataplasmata compinges *sa.*  
 & si uis, intinges croco. Crocus maturat, leni astrictione *Crocus.*  
 confirmat partes, & poros contrahit. Pinguissimas passas  
 exemptis nucleis per noctem aqua macerabis, postridie  
 coques ad melliginem. Id in sapa dulci factum magis con- *melligo uue*  
 coquet & leniet, sed aqua potius utendum si quid caloris *passæ.*  
 reliquum est. Inueteratis & callosis tumoribus conue- *Efficaciora*  
 niunt, colla librariorum quæ sit è farina purissima, uis- *remedia.*  
 cum aucupatorium, styrax pinguis, ladanum, galbanum. *Thus.*  
 Thus in corporibus temperatis molle, album, pingue,  
 dumque manditur, minimè friabile. Rhodinum, & myr-  
 teum in calidiori & dolenti phlegmone misceri possunt,  
 ut pix, resina, uiscum, colla, & similia, ubi pernicax ma-  
 lum, & platysma diutius hære necesse est. Miscetur quo-  
 que sterus suillum, columbinum, caprilum, uitrum. Et  
 iam notum mulierculis remedium, pueri sterus calidum  
 duris & inflammatis mammis aliisque partibus imposi-  
 tum sed quum aliis remediis uti possit, iis sordibus absti-  
 nendum, quanquam certum experimèto est breui tempo-  
 re concoquere, & in scæditate excrementorum certa auxi-  
 lia inuenta sunt. Furunculos & parotidas mollit ac sup-  
 purat



# INSTIT. CHIRV R G I.

purat cataplasma è ficubus, calce, iridis radice uel nitro, atq; omnino si nitrum desit, quod iã antè dictũ est, sale torrefacto in mollioribus: fæce uini, uel aceti in duriori bus utendũ erit. Fex sit recens, nã celeriter exolefcit uul gò etiã nota est medela, è cæpis cineribus coctis. In pe pticis ponenda est confectio è cera & resina, quod riti nociron appellant. Ex cerę semuncia, resinæ frictæ ses quiuncia, in olei modico liquatis. Aliàs ex æquis oïum partibus, aut una ceræ, resinæ duabus. Aliquando etiã ce ræ ratio & resinæ cõuertitur, ut minor sit resinæ quã ce ræ modus, hoc pepticis miscetur, ut Aniceto celebri m : dicamento ueterũ. Tetrpharmaco primas tribuit moué do puri non aspernabilis author Cornelius Celsus. Idẽ remediũ à Græcis suppurando usurpatũ. Constat pice, re sina, cera, & adipe: usus tempore, oleo uel butyro subiga tur. Pix sit mollior, resina fricta, uel colophonía, quæ in teneris corporibus oleo molliiri põt: cera pinguis, adeps in mollioribus naturis, uel suillus, uel uitulinus: in durio ribus, taurinus uel hircinus. E ficciorq; materia cõparatũ mollioribus corporibus sarcoticũ est. hoc tetrpharma con Paulus basilicõ, quo nomine à Græcis ferè oïbus in scriptũ est. Scribonius emplastrũ Aristi nigrũ appellauit, & aliud basilicon descripsit. Tetrpharmaco thus additũ facit Macedonicum, quod & pepticon est. Basilicon mi nus recentiorũ hoc imbecillius, commutato adipe in oleum, quantò adeps oluo efficacior est: sic oleum quo que uarie commutare licet. Oleo rhodino, myrtino, uel simili tetrpharmacum durius molliatur, ut corpus & affectus natura exigit. Mirabile hoc ad molliendum ac suppurandũ. Ceræ, terebinthinæ, medullæ cerui, adipis uituli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosarum, myrrh. ana unc. i. Myrrha cum melle subigitur, & prunis leniter incoquitur, ex quo re liqua adiecta sedulo miscentur. Al. picis unc. i. ceræ, unc. iij. axnngiæ ueteris purgatæ, unc. vj. adipis taurini, unc. iij. oesypi ana unc. iij. resinæ pinæ uel magis piceæ unc. v. liquatis omnibus utitor. Al. Resinæ unc. xii. ceræ, æru ginis

*Tetrphar macum.*

*Macedoni cum.*

*Mirabile ad suppurã dis & mol liendum.*

*Viride An dromachi.*



ginis rasæ vnc. 8. sepi uitulini vnc. 2. aceti, manæ ana  
 unc. 1. Manna & ærugo cum aceto liquantur, & conterū  
 tur: reliqua dissoluta commiscentur: molliat, coquit, pur  
 gat, digerit, dia gyreos parotidas emolliens, & in pus eli  
 quant. Farinæ piltrinalis, quæ è mollis & piltrino circum  
 uolitans parietibus & tabulatis hæret: guttæ ammoniaci  
 ana libr. 1. resinæ, ceræ, adipis porcini ana libras duas,  
 succi seminis lini quantū sufficit: liquatur adeps, cera ad  
 ditur & resina, farina coniungitur, ammoniacum solutum  
 uino uel aceto, & lini succus, translatis aliis in mortariū  
 concorporantur. Fermēto & eo quod dia zymis inde me  
 dici appellant, in cōtumacibus uitiiis ueteres usi sunt, de  
 quo multa ex Democrito, Mesuæ, Paulus septimo, &  
 Galenus tertio de compositione medicamentorum cata  
 topus. Cēparnm, & aillorum coctorum in cinere ana lib.  
 1. uitellorum numerum quinarium, radicis lapathi coctæ  
 libr. dimidiū, farinæ scēnugræci uncias 3. fermēti unc. 2.  
 axungie lib. 1. fiat corpus: in frigidis & crassis humori  
 bus conuenit. Utuntur quoque diachylon paruo & aliis *Malagma*  
 quæ molliūt. Atque omnino malactica refrigerāte oleo, *Damocra-*  
 astringente pharmaco, uiscida & offarciente materia le  
 niter temperata, suppurare possunt. Tale est malagma  
 Damocratis, quod eadem potest quæ diachylon, capite  
 de malacticis descriptum, ac præterea cruda quæque co  
 qui, mutarique nequeunt, edomat: musculorum, & mem  
 branarum uulnera persanat, punctis medetur, arthriticis  
 dolorem attemperat, & omnino anodynū est. Picis  
 quā siccissimæ, ceræ puræ, terebinthinæ, manæ ana  
 lib. 2. thuris probi libram unā, butyri pinguis ac recentis  
 selibrā uel unc. 5. Liquabilia funduntur largo igne & as  
 siduo, dum non inquinent: uersantur rude: hic cacabus  
 prunis subducitur, manna trita inspergitur, circum  
 aguntur omnia asserculo, postremo uoluntur manibus,  
 & reponuntur. In uso, copioso & recenti rosaceo phar  
 macum diluitur, ut caua carne impleat, inflammatio  
 nes tendonum abigat, & in pus album cruda & rebellia  
 tubercula conuertat. In ulceribus dissimilis quæ pus  
 non



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Vtendi for  
mula.*

non reddunt, mirum quàm efficaciter concoquat, coloris ambigui quot sequitur: Lithargyri vncie tres, olei ricinini uncie quatuor coquuntur unà dum non inquinent, deinde misce squammæ æris nigri, æruginis, chalcitidis, ana scrupulos quatuor, sed hæc metallica diutius fuisse trita conuenit, ex aceti acerrimi uncis duabus. Vfus tempore diluitur ricinino, & in concepto lintheo inseritur cauo. Atque hæc in præsentia sufficiant, locus oleo dulci, peptico succo, aqua moderatè calida, hydrelæo, & aliis foueatur: sympepticon medicamentum inducatur, mollis stappa uel lana succida superponatur. omnia decussata fascia colligetur, ut qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affectum locum opprimas, semel in die, uel rarius, cõmutari debet, nisi uel dolor urgeat, uel pharmacum exarescat. Ita uerò formari sympeptica oportet, ut neque liquidiora diffuant, neque corpulenta, nimis locum opprimant. Iustum corpus est cerato malagmaton & mollium emplastrorum, ac quod antè dictum est echicolla & glutinosa esse melius est, ut p se, sine uinculis hæreant, quanquam & emplasticeis lanam succidam, aut mollia colligari nihil prohibet, idque hyeme magis & frigore.

FINIS PRIMI LIBRI.



IACOBI  
23  
HOLLERII  
STEMPANI,

MEDICI PARISIENSIS  
Celeberrimi

DE MATERIA CHIRURGICA.

LIBER II.

*De Aperienda vomica. Cap. I.*



VO & quali genere remediorum humor repellatur, quæ medicamenta trahant, & discutiant, molliant, maturēt, & pus efficiant, superiore libro, quantum arbitror, satis explicatum est. Ac iam subiiciendum nobis, qua ratione vomica exugi pharmacis, aperiri ferro, igne etiam rescindi possit. Tum exponenda materia quæ sordida repurget, pura impleat, plena denique cicatrice claudat. Et quia ad hoc institutum nostrum pertinet, de glutinantibus auxilium eodem nobis compendio differendum erit. Atque ut hinc initium capiat oratio quæ suppuratio sponte sua non rumpitur, ferro, igne, uel medicamentis aperienda est. Alioqui serpit sanies, & cuniculos agit, uenas, arterias, neruos, & uicina corpora depascitur: hinc etiam atteruntur ossa, & cariem ducunt, liuescit cutis, & in rugas quasi senio marescens contrahitur: id quod metuendum magis in digitis, articulis, partibus corporis quæ in decliue patent. Sic enim parotides, femorum abscessus in fistulas cauantur, & quæ faciliè putrescunt qua-

*Argumentū  
1. e. 2. libri.*

*Noxa non  
aperta sup-  
puratione.*



*Foras euo-* iis auus est, extremæ partes, & loci genitales. Cumq; am  
*canda sup-* bigat materiæ cursus, quæ uidelicet foras introq; cōuertī  
*puratio.* possit, puidendum medico ut in superficiē deriuēt multò  
magis si uiscerū aliqd in propinquo est: si intus disperso  
puri nulla uia sit qua excernatur. Alioqui uitā celeriter  
*In vomiciis* eripit, aut cōpressum intus putrefaciet partes quibus infi  
*ventris.* debet. Quo fit ut in uomiciis quas ilia collegerunt, ea curā  
di rō quæ tentat ferro, ueteri medicinæ probata sit. Atq;  
*Peritonæū.* declinē partē qua ile est, iuxta inguina secari iussit: neq;  
à peritonæo mēbrana metuit, ut quæ nullo ferē periculo  
incidatur, & facilè coalescat. Nec aliter in uulneribus ca  
pitis, ubi contusum aliqd, fissum, fractum, modo serra, mo  
*In caluaria* do terebra caluariæ partes ad diploen vocatam & menyn  
gē excindimus. Quare et si tumor nōdum satis maturuit,  
ea pericula ferro anteuertenda sunt, multò magis si uiru  
lenta materia, vomica includitur, vt pestilēte carbunculo  
& bubone, lue venerea, & aliis generis eiusdem. Cruda  
ani tubercula metu fistulæ secat Hippocrates. Quāquā  
animaduertendum, vt ne nimis citò: nunquam enim vis  
naturæ gratis inferenda est, sed semper aliquid beneficii,  
*Vbi ossa in* nihil maleficii proponi debet. In uomica quæ tardius erū  
*propinquo* pit, à subiecto osse metus est: atque ideo in cōtusionibus  
*sunt vom-* capitis & angullis uulneribus, pericranium in crucem in  
*carum.* tersecamus, aut ampliori plaga diuidimus. Sed iam aper  
ta vomica, membranæ, neruacea corpora, & alia semipu  
*Cautio i mē* tria occurrunt, quæ nec intempeliuē rescindenda sunt,  
branis ex- tria occurrunt, quæ nec intempeliuē rescindenda sunt,  
*cindendis et* molliter prius vellicare oportet: at si nec sequuntur, ce  
neruaceis lerius illiquare conuenit, vt vel sponte sua excidant, uel  
corporibus nulla vi & leni tractu reuellantur. Atque omnino sua est  
*vomicarū.* putredini maturitas, eaque expectanda est. Alioqui no  
ua inflammationis & cōuulsionis pericula creari solent.  
Itaque semiputria illa molliter commouenda sunt: ma  
tura enim facilè concedunt, cruda resistant, dolentque si  
*Suppuratio* vi maiore pertrahantur. Iam verò perpetuum nō est ape  
*non necessa* rere ferro, quod suppuratum est, sed si nullum in mora  
*riò aperien* periculum apparet, diaphoreticon remedium imponen  
*da ferro.* dum, quo loco mollior abscessus est, & digito cedit. Sic  
enim



enim sanies exugī potest, idque faciendum magis, quam  
alta parte uomicæ non declui, suppuratio se colligit. At  
que antea pharmaca non notata sunt, quæ pus exhauriāt,  
& postea describentur. Neque ignorandum est locis ali- *Pituita pu-*  
quot interdum materiā subesse, quæ sit puri similis, qualis i *ri similis.*  
atheromate, steomate, meliceride, aliena quædam pituitæ  
genera: nonnunquam quoque ad ossa colligitur, eaque di-  
scutienda, aut facto uulnere expurganda est. Est cum spi-  
ritus flatuosus speciem puris referat, atque aperientem  
fero medicum eludat, nullo pure, sed solo spiritu excun-  
te. Quod si ferro uel igne semel utendum est, prius animad- *Animaduer-*  
uertere oportet, ne quod uas insigne, neruus, tendo, uin- *tenda in usu*  
culum: ne quid neruosum (quales membranæ quædā sunt, *ferri & i-*  
aut potius lati tendines) conuulnerentur. In musculis fibra *gnis.*  
rum interstitia cultello ligneo uel digito diducenda, ne  
cum fibris nerui, aut uasa præcidantur: idque magis, quam  
in profundo sanies resedit. Parcendum quibusdam par-  
tibus, quæ uegetius sentiunt, & à quibus uis ignis ad  
principia celerius transilit. Cauteria & ferramenta pericu-  
losa occipitio, temporibus, & ubicunque caluaria mol-  
lior est, ubicunque uel exitus neruorum, uel aditus ua-  
forum est: nec ea ipsa citra periculum oculus sustinet. Ac  
in palpebra quidē transversum ferrum ducitur. In oculo *In oculis.*  
qua uulneretur uena prouidendum, ne pupilla contin-  
gatur, ut inde humor profluat, & cicatrix relinquatur  
quæ uisum intercipiat. Ex quo in eam partem qua exti-  
ma membrana albicat, scalpellum, acus, & alia id genus  
ducere solēne est. A uulneratis temporibus & eo loco qui *In tempori-*  
paulò superior est, quaque perreptant uenæ, nerui ar- *bus.*  
teriæ hæmorrhaggia commouetur, & aduersæ partes fe-  
rè conuelluntur. In capitis uulneribus animaduertendum,  
quā altè uitium descenderit. Pericranium contusum di- *In capite.*  
scinditur, ut fiat exitus puri: in eodem plaga angustior in-  
ciditur, dum satis pateat. Quod si cranij fractura accesserit, *In caluaria*  
curandum sedulò, ut celeriter suppuret, quod ante *fracta.*  
uulnus est, ut purum sit & aridum: ex quo agnoscenda  
fracturæ magnitudo: quæ superficialis est, rasorio scal-  
pro



# INSTIT. CHIRURGIC.

pro atteri & cephalicis curari debet. Si ad diploen procedit, modò terebra, modò ferra superior pars ossis eximenda est: sed ita, ut ne ultrà quàm oportet ferramentũ prodeat. Cranio uerò usq; ad membranam fracto, omnino excindendum os est. uerũ sæpius reuocato ferro, & frigida merſo. Et enim iugiter attritum, incalescit motu, & os elimatum ferra unã conferueſcit. Ac uideo placuisse multis aliquid ossis relinqui, nec totum semel excindi, quodque reliquum sit, pharmaco siccare. Sic enim alimenti inopia exareſcit, ut uel sponte sua excidat, uel leniter motum statim sequatur. Deinde ea ratione periculum declinatur, quod accidat, si altius permeante ferro membrana uulneretur. Atque omnino in cranii fracturis, ubi ferra, modiolis, cycliscis, terebellis uia puri sit, crassiori parte ossis ferramenti acies cõfigi debet, & à futuris, fissuris, neruorum radicibus & uasorum cuniculis, postremò quoque molliore osse duriore fracto, & temporibus declinanda uis est. In strumis & colli abscessibus à carotide arteria, uena sphagitide, uocali neruo abstinendum, illinc hæmorrhagia, quam egrè supprimas, hinc uel omnino mutus, uel certè semimutus homo relinquitur. Ex quo (opinor) ceruici omnino parcere quidam è ueteribus maluerunt. Adde quod in totum collum neruorum propagines à spina disperguntur, quas non nisi periculose uulneres.

*In humero.* Extérieure parte humeri tendo est, qui ignem ferrumque non sustinet. In empyicis & deploratis pleuriticis scalprum & cauterium inferiore parte mesopleurii collocamus, quia uidelicet superiore, uena, arteria, neruus est.

*In thorace.* Hippocrates qua parte exauditur materię strepitus: Alii scabriorem cutem & peius coloratam ad sectionem annotant. Nonnulli ubi minus carnis est: Paulus inter quartã & tertiam costam, inter quintam & sextam Leonides, multi inter quartam & quintam aperiunt metu diaphragmatis. Sed aliis thorax breuior, aliis lâguior est. Sunt qui internam membranam commouerent, ut pus effluat. Alii ne attingendum putant, quia sic effluxione, spiritus egri intereant, aut insanabiles fistulas trahant, utrique se confirmant



firmant authore Hippocrate. Per sterna nerui uasaque decurrunt: ideoque in uomicis quæ illic coeant, ad latera chirurgia nertenda est. In collectionibus uentris, *In uentre.* quæ inter peritonæum & intestina latent, siue ex iecore, siue ex alia parte diffuse sint, Erasistrato primū, deinde aliis medicis placuit detrahi pus sectis inguinum locis, ubi uidelicet ilia terminantur: incisa etiam peritonæi membrana, ut quæ sine periculo diuidatur, & facile cicatricem claudat. Idque cōfirmāt, quod in hydropum paracentesi & chirurgia ramicis intestinalis nullo ægri periculo ea sanescat. Sed hoc tentandum magis ubi desperamus, ut ne naturæ possit intrò pus effusum, uel per urinas, uel per intestina transmittere, id quod integris uiribus naturæ aliquando quasi miraculo contingere certum est. Hydropicos temere incidi corrupto hepate rectè scripsit Erasistratus. Et in colo suppurantia tubercula, eodem modo supra inguina aperta uia perpurgantur. In extremis ilibus qua in sumen uertunt & aqualicu *In ilibus.* lum, multi sunt tendines, multa uasa coeunt, ex quo hac parte manus sedulò temperanda est. Videndumque ne, uel laxetur uel disrumpatur is meatus qui à peritonæo ad testiculos procedit, unde hernia moueatur. Inuritur carnosus podex, & ferrum sustinet: non ita quod illic neruaceum est. Eadem ratio in genitalibus seruari debet: ubi ab arteriis cauendum, quæ illic plurimæ coeunt, *Genitalia.* hiantque maioribus clausulis: nam inde hæmorrhagiæ non ita facilè supprimuntur. Sub natibus neruus est, qui *Sub natibus* si iuxta suppurationem præciditur, aut nudatus uiolatur *Cautone nudi nerui re-* frigore, subiectum crus stupidū relinquit. Idem animaduertendum in uomicis reliquarum partium, ne nudi maneant nerui, & frigore contrahantur. Hinc enim stupor *frigeretur.* & conuulsio fieri consuevit. In perinæi tumoribus qui *In perinæo.* inciduntur & calculis summopere cauendum, nequid intus uulneres, quod postea ægerrimè glutinetur, quaque summo pudore & molestia excrementa diffuant. Itaque ubi fistula medium cunicum agit inter intestinum & ceruicem uesicæ, fistulam medicamentis quidem exedit: ferro attingi uetat Hippocrates. Sed fit aliquando non modo



# DE MORBIS INTERNIS

modo hac parte, sed aliis, ut neque medicamēta iniicias, quia profundior & obliquior fistula est: neque ferro diuidas, quia altius descendit, quia obiter incurrunt uasa magna, & nerui, qui certē casus desperationis etiā putandus est. At breuiter ubi maior pars est, quæ auferri postulat, & ad partes ueniendum, quæ non nisi certo periculo uiolentur, abstinendum ferro est. In quibus autē aperire licet, magna sectio uitari debet: quia inde cicatrix turpior, pars imbecillior & ad motum ineptior relinquitur. In bubonibus uenæ sunt & nerui, quæ glandibus innituntur, ideoque si quando inurendi loci consilium est, apprehendenda cutis, & à glandibus superanda prius est. Sectio uerò oblonga angusta transuersim ducenda est. In uulneribus quæ ferro sunt, quacunque parte eiusdem generis glandulæ sunt, eadem ratio seruari debet. In articulis perpetuo suspectus ferri & cauteriorū usus est, quibus si necessārio utendum sit, ea parte quidem imprimeretur uis, quæ magis carnosā est, quæque neruos articuli, & tendines longius relinquit. Ex quo ischiadicis inferiori parte quā malum est, ignem adhibemus. In genu, lato illi tendini parcendū est. Is ex duobus maximis musculis femoris abneruatus, patellam capit, alligatq; uicinis ossibus, qui si uel ferro, uel igne uiolentur, efficit ut neque sursum trahatur membrum, neque extendatur, & grauiā conuulsionis pericula creare solet. In carpis multiplices tendines, quasi annulo colligantur: atque hinc tota ferē extrema manus neruacea est: eaque interiore parte lato tendine contegitur: extremis digitis, quæque radices unguium posite sunt, acriter sentit ideoque hac tota parte admodum suspecta, tū feramenta, tum cauteria sunt: in toto extremo pede eadē ratio seruari debet. Quo fit ut in clauis, hoc est, tuberculis duris, clauorum capiti similibus, qui ferē summis digitis manuum, calcaneis pedum & plantis enascuntur, aliis potius utendum auxiliis, quā ferro uel igni ueteres existimarint. In his omnibus anatomica disciplina opus est, in qua quicunque fuerit exercitatus, ea omnia pericula facile declinet. Contra uerò sæpenumero aberrat,

*In bubonibus.*

*In glandulis.*

*In articulis.*

*In ischio.*

*In genu.*

*Latus tendo genu.*

*In carpis.*

*In extremis membris.*

*Clauis.*



ret, necesse est. Rursus aliud è situ cõsilium capere oportet. quædam enim uomicæ in superficiem eminent, quæ fere sine periculo inciduntur, uitatis scilicet neruis, maioribus uenis & arteriis. Quædam in alto latent, ut pulmone, renibus, cauis hepatis, œsophago, interiore diaphragmate, uentre intestino, nisi qua parte in anum desinit posterioribus partibus uesicæ, & uteri, altiore cerebro. In his itaque suppurationibus nullus ferro locus est, neque tractantur cauterio, nisi hoc aduersæ parti quæ foris est quæque familiaritate aliqua consentit, imprimatur. Tantum hoc unum reliquum est, ut modicè acris modo in potu datis, modo linctis alias infusis disrumpantur. Quale hoc est, tussilago mediocriter acris est, quæ citra molestiam thoracis collectiones rumpere credita est. At uerò in internis suppurationibus quædam foras se proferunt, quales sunt in gibbis iecolis, lienibus, uentris, uesicæ collo, & parte sub pubem eminente, peritonæo, colo, utero. Sed quæ in utero & uesica suppurationes coierunt, sanescunt ægrius: aliæ facilius percurantur. Sunt præter hæc genera tum abscessus, tum tubercula quæ non ita latent, sed ad quas uia angustior periculum aliquod denunciet, ne quum ad partem ægrâ cauterium derigitur, uiolet obiter quod sanum est: quæ lia sunt in ore, profundis naribus, intestino recto, & eo sinu qui pudoris est. Qua in re uel sutillis fistula more ueterum, uel calamus scriptorius habendus est, aut inanis canaliculus, per quem cauterium ad uomicam & partem egram transtuehatur. At si quid in profundo rescindendum ferro, lente quidem & perpetuo oculo ducenti culter dirigendus est. Id quod in strumis, cancerorum radicibus, uaricibus, & ubi pus altius desedit, facere oportet. Primum ergo cutis in crucem secanda est, nudanda caro: si quid uasorum aut nerui cultro occurrat, id ipsum digito, ligneo uel osseo ueruculo separandum, distinctis fibris, nec ita momētaneis membranis, quibus illa inter se coniugantur. Idque sedulo faciendum, donec secando ad eum locum perueneris, in quo uel colluies latet, uel conditum est, quod eximi debet. Atque

*E sita.**In profundis uomicis.**Tussilago.**In ijs quæ ex alto se proferunt.**In quibus à uicinis meritis est.**Vbi in profundo rescindendum aliud quid.**Cautio.*

d 2 dum



# INSTIT. CHIRURGIC.

dum hæc sunt, præsto adesse oportet medicamenta, li-  
 niamenta, fascias, reliquaque omnia, quæcunque ad hæ  
 morrhagias facere uideantur, ut si nec opinanti sanguis  
 è uena uel arteria profluxerit, habeas ad manum quod  
 in præsentia opituletur. Itaque quo iam tempore om-  
 nia tuta sunt, & locus æger nudatus est, opportunæ parti  
 gladiolum infiges & uomicam repurgabis, aut peram-  
 putabis quod eximi oportet. Videndum quoque in con-  
 figendis uomicis, ut quantum oporteat culter descēdat:  
 profundius uulnus hæmorrhagias commouet: superfi-  
 ciale sæpenumero frustra est. Eodem modo cauteria in  
 superficiem transcurreunt, leniter insident, aut altius im-  
 primuntur. Et hæc quidem in molliori corpore, mol-  
 liora, qualia è subere, spongia & quibusdam radicibus  
 confingi possunt. In metallicis, aureum æneo & ferreo  
 clementius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum  
 uerò an transversum, uel obliquum uulnus esse debeat,  
 figura partium, flexus, rugæ, fibræ primum quidem in-  
 dicant, deinde consilium iuuant subiecta uasa & corpo-  
 ra. In collo qua parte eunt uena, arteria & neruus, re-  
 ctum quàm transversum præferunt. In fronte, palpebris  
 & ubicunque transverso ducuntur rugæ, transuerso  
 quoque ferramentum duci maluerunt, ne contractis ru-  
 gis uulnera replicentur. Quibusdam tamen in fronte  
 recta uulnera placuerunt magis, ubi nec ita profunda,  
 nec punctim infligenda sunt, ne quæ à periosteo mem-  
 brana subest, conuulneretur. In inguinibus è flexu, trans-  
 uerso ducitur duplex, interim angustum & oblongum  
 in myrti folium. In uentre nisi prohibeat flexus & ru-  
 gæ, ut sunt fibræ musculorum: eodem modo in reliquis:  
 eaque parte infligenda plaga est, cui in motu & corporis  
 flexu, externa corpora minus occurrant, interiore bra-  
 chio & crure potius quàm exteriori, & longius ab arti-  
 culis. Simplex uulnus aliquando sufficit, declinæ parte,  
 duplici aliquando & trigono opus est, cuius uertex al-  
 tior, basis inferior describatur. Eadem ratione in luna-  
 tis uulneribus, sursum cornua existant, deorsum alueus  
 abducatur. Atque omnino scalpellus ea parte configura-  
 tur,

*Profundi-  
tas vulneris*

*Cauteriorū  
materia.*

*Figura vul-  
neris.*

*In collo.  
In fronte et  
rugosis par-  
tibus.*

*In buboni-  
bus.  
Cui parti in-  
fligitur fer-  
rum.*

*Simplex an  
multiplex  
vulnus.*



tur, quæ mollior est, quæ digitis succumbit, ubi fastigiū erigit, qua deniq; sanies commodius expurgetur. ὁ πόρ-  
 ρυσιν appellant ἀπόρρυσιν & exanitionem, uel (ut alii)  
 exanitionem: in qua ἐπιδιαρρυσίς est, & ἔκτριψις, ἀντιδια-  
 ρρυσίς & καταρτία. Nam ubi proclinata parte foramen  
 est, faciliè purgatur sordes: ubi uero in sublimi, ea resti-  
 tare solet, deorsum subfidet, tādēque sinuat, siquidem  
 uomicosa pars nequeat pro arbitrio commutari. Quale  
 est in trunco corporis, ac fore capite & parotidibus: In  
 manu & crure etiam si os ulceris altius positum est, po-  
 terit tamen ita inclinari, ut sanies liberè excurrat: tum  
 quæ manus quidem è mitilla suspendi debet, ut carpus  
 gibbero sit altior. Crus autem puluino innitatur, subla-  
 to genu, & decliui in coxam femore: in brachio & tibia  
 non ita libera est conuersio: utrumque membrum ea ra-  
 tione collocandū, ī qua diutius sine dolore permaneat.  
 At si cui parti id denegatum est, nec ea potest pro libidi-  
 ne conuerti, aduersæ parti & decliui uulnus inferen-  
 dum, quod καταρτίαν uel ἀντιδιαρρυσιν appellant. In aliis  
 quoque manu & crure quæ commodè inuerti possunt,  
 quum sinus longior, cuniculosū ulcus, sordes uberior,  
 etiam aduersæ parti lanceola immittitur, ut duplici exi-  
 tu dato, uitium celerius expurgetur. Adde quòd ea ratio *Duplex exi-*  
 ne liquida medicamenta, quibus in id genus ulceribus *tus pueri.*  
 ferè opus est facilius infunduntur. Est quum ab ore ulce-  
 ris ad fundū, ducto gladiolo, tota cavitās detegitur, ut in  
 fistulis & ubi suppressis arteriis gangræna metuitur, ubi  
 denique nulla alia uia sanies satis expurgatur. Nonnun-  
 quam angustius orificium ferro ampliatur, aut quod am-  
 plum quidem, sed rotundum aucto uulnere in longum,  
 aut aliter deformatur. Sed hoc non tam purgando, quā  
 glutinando fit. Quibusdam locis plurimæ concurrunt ar-  
 teriæ: plurima uitalis spiritus materia est: hic paruo  
 uulnere contentus eris: ne confertim semelque erumpē-  
 te sanie, simul magna uis spiritus diffluat, unde animi de-  
 liquia, & nec opinatæ mortes consequantur. Est cum ad  
 pressa manu fundo ulceris, & ita ad orificium adducta,  
 interior sordes excluditur. Fasciis quoq; alligatis, astri-



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Quo tempo-  
re aperi-  
enda uomica.*
 Etis alligatis, id efficitur. Aliquādo ī latera materiæ cur-  
sus deflectitur nouo facto ulcere, ut inde pars nobilior ī  
quā uitiū decurrat, liberetur. Quibusdā ē uomica supe-  
riore per angustias quasdā sanies deorsum illabatur, &  
nouā uomicam gignit, qua aperta superior facilius pecu-  
ratur. Vitioso dente & inde gingiua puru lēta, tumor sub  
mento colligitur: cōtusa atque inde saniosa maxilla su-  
periore, labrū superius interiore parte purulentum eua-  
dit. Hæc atq; alia id genus medico obseruanda sunt, ne  
prius inferiorē sinū claudat, quā superior fuerit pecu-  
ratus. Ac temporis ratio quædam est, in quo uomicæ re-  
cludantur. In quibus morbis nullus dies urget, tutius est  
uere, deinde autumno, & æstate, aut certè calore fracto  
nondum ortis frigoribus. Atque hæc temporis ratio  
multo magis seruari debet, quo magis necessaria pars  
est quæ tractatur, & maiori periculo subiecta est, ma-  
iorque plaga facienda est. Eodem modo matutino ma-  
gis & proclinato sole, quā meridie, quā feruente cæ-  
lo, quā denique nimium progressa nocte. Et hæc qui-  
dem ferro & cauteriis in aperiendis uomicis breuiter  
dicta sint. Reliquum est ut eodem compendio de me-  
dicamentis quæ aperiunt dicamus, postremo addamus  
quæ sine ferro & uulnere, pus exhauriant. Atque utro-  
que genere, hoc etiam magis utendum est, quia mollior  
æger est, quā qui uel ferrum, uel cauterium sustineat:  
quia eo loco sanies confedit, è quo etiam si aperiās, non  
facile effluat. Et medicamenta quæ aperiunt, cauteria  
quædam sunt, natura certè caustica: ideoque à quibusdā  
ueterum cauteria frigida uocata, à recentioribus poten-  
tialia. Cauteria quidem, quòd tenera urant: frigida ut  
ad ferrum, & similia, quæ rutilent igne, comparata. Ne-  
que tamen sic urunt, ut quæ caustica & septica postea  
describentur, nisi quædā fortasse, quæ diutius insistant.  
Theriaca igitur domitas aperit: urticæ semen ē uino  
tritum, frangit, purgat, incarnat, cicatrice tegit. Cauliū  
radices ustæ, tritæ & ueteri axungia captæ: Eodem mo-  
do radices cannæ, ostreorum testæ crematæ, adeps rana-  
rum uiridiū quæ uersantur in arboribus, lac ficulneum,  
tithy-

*Medicamē-  
ta quæ aperi-  
unt.*

*Frigida cau-  
teria.*

*Quæ aperi-  
unt.*



tithymalorum succus, puluis è capitibus muscarum & lacertarum, puluis cantharidum, erinaceorum corium cum pinnis ustum, batrachium, caninum sterus album muscerda, arida uini fæx & aceti, magis etiam quæ cremata fuerit, calx uiua in sapone, uocatum sublimatum in axungia: trita illa uisco quercino, terebinthina, laringna, abietina, sapone, butyro, æsipo, melligine anacardi na, hermodactylorum succo, excipi debent. Ac plura capite de pyroticis. Sed hæc ita insistere oportet, ut aperiant, nec crustam ducant: aut si sic, ea molliter detrahen da est. Mistum remedium est, fecis crematæ uini uel acet i unc. 2. fimi columbini, propoleos, salis torrefacti, æru ginis ana drac. 3. aquæ marinæ, uel in qua subduplum sal illiquauerit, unc. 1. ol. antiqui, uel feruefacti unc. 2. æru go cum sale & fæce trita, aquæ & oleo commiscetur: co quuntur ea fictili clausa, puro carbone, dum tota exha let aqua: ex quo propolis mollita prius imponitur: aufe runtur igne: ubi paululum refrixerint, colubi fimus in spargitur: pusilla plagula & oblonga efformatur, eaque medicamento inducitur, & conueniēter adaptatur: tum amplius spleniū sudatur, quod leniente simul & coquen te pharmaco illitum esse oporteat. Al. fimi columbini, nitri ana dra. 4. caricæ 7. quibus arida trita cōmisceto, ac bene pista inducito, ut prius. Quod si durius uidebitur, purgata axungia & melle temperato. Arsenico, sanda raca, puluere angelico uel mercurio uocato & sublima to prudenter utendum est, ut habeatur ratio corporū & uomicarum: nec enim placuit ueteribus Medicis (quod iam consuetudine inualuit) grauius cruciari ægros. Nec in his solum, sed iis etiam, quæ tantum pus exorbeant, non aperiant, ita cauisse ægris certum est: ueriti ergo illi ne quæ discuterent acrius, dolorem una commouerent, bis in die detrahi medicamēta uoluerunt, bis fomentis uti quæ dolorem remitterent. Ac iam discussa saniei par te, semel tollere remedium, seniel fouere tantum per miserunt. Postremo non reuelli, sed contineri, dum tota materia exhausta esset, utile iudicarunt. Neque prius hoc utendum genere remediorum, quàm

*Quibus ex-  
cipiēda quæ  
aperiant.*

*Mistum re-  
medium.*

*Non cruciā  
di ægri.*

*Clementior  
curatio ne-  
terum.*



*Desperata  
vomica.*

*Quæ sanie  
exugunt.*

estus uomice & phlegmone quieuerint. In usu, superpo-  
nitur solium uel malagma, quod leniat, aut splenium  
delibutum pharmaco, quod dolorem prohibeat. Quan-  
tum uulnus esse uelis, tantum splenium aut plagulam  
constituas, quod pharmacum uulnerarium excipiat. A  
maiore uena, arteria, neruo abstinendum, neque diutius  
relinquendum loco medicamentum. Laxanda prius cu-  
tis est, & tenuitas partium comparanda pharmaco. Sic  
enim cruciabit minus, & celerius efficiet. Ac rursus fa-  
cto uulnere solatium parti afferendum, fouendumque  
remediis quæ temperent. Quod si adhibito pharmaco  
uulnus fit, neque doloris sensus commouetur, iam syde-  
ratæ & emortuæ partis indicium est. neque iam aliud re-  
liquum est, quàm ut uel depaschas igne, uel excisorio  
scalpro peramputes. In aliis austerior nostrorum homi-  
num quàm ueterum medicorum cura est, dum alligatis  
causticis crudelius excruciant ægros: sed fortasse dicant  
quod olim Epicurus, doloris grauis solatium esse, quum  
is breuis est. In alio genere remediorum quæ sanie  
exugunt, sapo est illitus, tum per se, tum in discutiente  
oleo solutus. Quod sequitur, peculiariter conuenit ab-  
scessibus genuum & articularum, exprimit enim pus,  
nec incidit. Idem etiam glutinat: Recrementi plumbi  
lib. i. teritur, & in sesquilibra olei ueteris coquitur ad  
crassitudinem mellis: subductis igne, terebinthinae lib. i.  
commiscetur: coquuntur omnia placido igne, atque uniu-  
tur. Al. litharg. cerusæ, salis ana vnc. 5. ol. ueteris vnc.  
10. trita illa ex oleo coquuntur olla, & assidue commo-  
uentur: quum non inquinant, in mortarium traducta cō-  
tunduntur, & usui sunt. Et lithargyro, sale, terebinthi-  
na & oleo uetere, multa comparata reperias, quibus  
acria trita resperguntur, ærugo, fex, calx, uitreoli gene-  
ra, squamma, lapis calaminatis & similia. Facit hoc ad  
strumas, parotidas, ganglia, mammarum abscessus, eli-  
citque laxata cute, quicquid putis intus conditum est.  
Ceræ, nitri, terebinth. olei ueteris ana lib. i. quæ uel (ut  
Andromachus) lixiuij ficulnei uncia 10. liquatis aliis ni-  
trum, uel aliquid tale inspergitur solutum aqua uel li-  
xiuij:



uitio: miscentur omnia, circumaguntur assidue, ne quid efferuescat. Plura iam ante, ut capite de resoluentibus, & 6. de compositione pharm. κατὰ γένη.

## De purgantibus medicamentis.

## Cap. II.

**S**equitur ut purges. Etenim omne ulcus sordidum sedulo purgandum est. Quod si dehiscit foras, neque fistulosum est, molli tomento uel lintheo tum si-  
*Ratio purgandi.*  
*In expositis ulceribus.*  
 num ipsum, tum labra ulceris perpurgabis: deinde medicamentis cauum implebis, dum rubens ac nimium neque  
*Cōsistentia medicamētorum ratio- ne ulcerum.*  
 ficcum, neque humidum ulcus exriterit. Medicamenta in concepto linamento ferè imponuntur, quāquam ali-  
*In profun- dis vulneribus.*  
 quando puluisculis cauum inspergitur, hocque præcipue quum humidius est. Contra uerò arefcenti uitio, dolenti & inflammato liquidiora conueniunt. In me-  
*In capite.*  
 dia conditione satis corpulenta pharmaca inseruntur. Quòd si non ita expositum uitium est: sed intus latet,  
*In naribus.*  
 difficilis omnino cura est. Et si quidem capite includitur, neque per aures, nares aut aliter sordes effluit, mo-  
*In ore.*  
 diolo, cyclisco, uel terebella patefacere uiam oportet. In extremis naribus qua meatus in os pertinet, specilli  
*In thorace.*  
 nucleo uel fistulis medicamentum induci debet. Alio-  
 qui aperto ore per palatum uia ad ulcus quærenda est. Nec alia seruetur ratio in oris ulceribus, quæ non ita pa-  
 rent. Ad thoracem unica ferè uia est ab ore per asperam  
*In uentre gula et primis intestinis.*  
 arteriam, nisi uulneris orificium in superficiem ueniat. hic pyulcis, collyriis, suctu, suppuratio exorberi potest: iisdemque machinis uel melicratum, uel aliquid generis eiusdem inferri debet. Insufflantur pulueres per corniculum, & arundinem, qui præsentí uitio conueniant.  
*Crasius in- test-*  
 Ad uentriculum & intestina prima per gulā aditus est: at quæ gulam purgent, lenta, tanaci que materia illigari conuenit, ut obiter inhæreant. Intestinum crassius de tergente materia in clysteribus expurgabis. In uesicam fistula argentea, qua calculi tentantur, primum immit- titur, quæ ut locus patitur amplius cauo pateat: in cauum clyster uesicarius introducitur, exprimiturque ut liquor



INSTIT. CHIRURGIC.

*catbarchicō  
facultas*

*Rhiptica.  
Vitanda.*

*Sale & si-  
milib. qua-  
re abstinen-  
dum.*

liquor per canalem fistulæ ad uescicam usque perfluat: Rectis enim fistulis injectis, ferè refluit atque disperditur. Iam uerò medicamenta purgantia, (quæ *καλαπτικά* appellant) modicè tergeant & siccent: detergenda sordes, quæ corruptela corporis conctescit, & reliquiis alimenti colligitur. Exiccanda sanies humidumque recrementum, quod statâ naturæ lege ab alimento partis reliquum fit, & aliunde illabitur *ρυστική* peculiariter appellant *αφαιστική* τῶν πυλῶν, quibus uis detergendæ sordis data est. Hac parte uitanda sunt quæ adstringant, unde sordes pertinacius inhærent: quæ laxent, unde robur partium elanguescat: acria quæ colluuiæ sordium cauum impleant. Sale & eadem materia ideo obstinendum, quia ut detergeat, adstringit tamen, sordes impingit & uelligat. Hæc autem audire necesse est, ut ad purgandi rationum omnia referantur: nam si serpit ut ulcus, si putredo est quæ uicina depascitur, si quid occalluit, si quid influit & phlegmone est, medicamentum ita comparandum, ut ex iis quæ laxent, reprimant, mordeant, quæq; detergeant, tam multis semel casibus medeatur. Sed omnino in purgando ulcere, prima quidem ratio totius corporis haberi debet, quia uel in colume, uel pletoricon, uel cacochymon est: deinde peculiaris natura partis requirèda est: quia humida ea aut sicca, acri uel stupido sensu prædicta est. Postremo animaduertendum, num quid alieni uitij ut calli, rheumatis, phlegmones, doloris, uitiosi succi, putredinis, aut aliquid generis eiusdem ulceratæ parti aduenerit. Itaque ut ea sunt omnia & sordes ulcerum, ita qualitas remediorum distinguui debet. Adde quòd uel recens, uel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque sordido neque humido, parti præterea sensus acrioris, leniora remedia conueniunt: multo magis si in uitiosis succis æger est. In contraria conditione, contrariis auxiliis locus est. Quòd si pars aliqua tumoris maturuit, & pus reddit: alia uerò etiam dum cruda est: huic quæ concoquant. purulentæ quæ repurgent, imperabis. Eadem ratione si quid durius, malactica: si quid inflammatum,



matum, lenientia suis quæque locis accommodabis : alioqui pharmacum è multis temperabis quod iis omnibus querelis satis esse possit, qualia sunt Græcorum πολυχρηστα. In purgando plurimum ualet recta ablundi ratio, de qua breuiter nobis dicendum est. Vbi ergo molliore flocco tum sinum ipsum, tum labra exterius, si præterea conuenienter abluas, magnopere curatio nem adiuuabis : ut ad reliqua per se natura interdum sufficiat. Itaq; si sanies acris est, sero si copiosa sordes, melicrato: si multa simul & acris est, sero in quo sacchari octuplum, uel tantundem mellis diffusum sit. Quumque cæperit cauum esse purius, ænomelite: post etiam uino è dulci austeriusculo utendum erit. In foetido sinu, putri & cruento oxycratum conuenit. Acetum, oxymeli, ænomeli, dilutum marrubij, absinthij, aloes, myrrhæ pauculo conditum melle, putredines efficaciter iuuant, & nomas cohibent. Nomæ sunt ulcera quæ in ambitum partes arrodunt, depascuntur, ac præterea putrilagiosa sunt. Eidem medetur malo marina aqua, uel in qua subduplum salem illiquaueris. Vrina quoque uetere exemplo, & quotidiano usu ad eam rem laudata est. Rustico è neglecto ulcere digitus in pede computuerat : is Galeni consilio, concepto linamento ulcus impleuit, conuenienter alligauit, & quoties incessit mendi cupiditas, propria urina perluit, atque ita per sanatus est. Quod exemplum retineri potest in pudendis & aliis partibus corporis, quas sine pudore permixturis. Vrina sit non quæuis, sed cuique propria : nec hæc quidem cruda & aquosa, sed suo diluta sero & iusta bile colorata. Salsugo piscium eodem authore commendatur. Sed hæc leniter adstringit : at putridum ulcus faeculenta sorde plerunque impingitur, uidendumque ne astrictione sordes illa crassior magis inhæreat. Ex quo putridis adhibenda præcipiunt, quæ tergeant, discutiant, tenuent aliquando etiam quæ repellant, quæque adstringendo siccent, ubi tenuis est sanies & fluxio infestat. Fraxini folia molliuscula coquuntur aqua, unde cancerosa eluantur. Sic enim lenies, siccabis, absterges, & discu.

*De ratione  
abluendi ul  
ceris.*

*Contra pu  
tredines.*

*Noma.*

*Vrina.*

*Historia.*

*Salsugo pi  
scium.*

*Ad putrida*

*Fraxinus.*



*Lixiuum* . & discuties . Lixiuū deterget, siccatur, tenuatur, digerit. Ita que in crassa sorde & putredine, magnus lixiuii usus. Paretur è materia quæ detergeat, siccetur, incidatur, discutiat, & si efferatur malum, ea etiam quæ acrimonia mordeat,

*Sapo*. quale saponarium. Saponem ueteres confecerunt ex seuo caprillo, hircino, ueruecino, bubulo & lixiuo cum calce: qui acriter relaxet, sordes expurget, detergeat, siccet similiter nitro. E cinere fagino, caprinino & seuo alii conficiunt. Quidā è calce, sale, oleo & seuo interim permixtis aromatibus. Isque modo liquidior, modo solidior, comparari potest. Atque omnino inde lixiuū ex

*Materia lixiuorum* . purgandis sordibus putridorum ulcerum idoneum est, Eodem modo è tithymalis, dracontio, fico, bryonia, batrachio, ostreorum & metallorum acriū cineribus. Vultur etiam capitello, quod capite de pyroticis describitur. Vrina ergo & iis lixiuii generibus utendum erit in putridis, fluxis, humentibus, & malignis ulceribus tum etiam ænomelite in quod cinerem chalcanti, uel cremati uitreoli resperferis. In eundem usum cinere caricarum liquida puluerantur: nec improbandum ligni sancti remedium. Alii ænostagma probant, quia siccatur & putredinem prohibet, magis etiā si tantillum cremati mellis accesserit. Nam ubi in multo humore ulcus est, crematum mel, aut è meliteis uasis detersum & aridum magis conuenit. Ac dum crematur, aloë, myrrha, centaurii puluis, inspergi potest, quo iam tempore summonetur igne. Idē succo marrubii, plantaginis, absinthii, apii & si milium aptè perfunditur: sic enim cancrios, gangrænas, putredines, facile prohibet. Vulgus senicula, bugla, centaurio & plantagine, plurimum utitur in melle, ut cum

*Ænostagma*.

*Mel*.

*Utendū vulgi remedijs adhibita ratione.*

*In nomis malignis ulceribus.*

hoc succus ex herbis pressus percoquatur. Neque turpe est per vulgus & aniculas profecisse. Non enim puduit maiores nostros in multis remedijs brutorum discipulos sese profiteri: sed acceptis è vulgo remedijs adhibenda ratio & rectus usus in quo summa artis posita est. In nomis, phagedænis, chironiis & omnino malignis ulceribus, ueteres usi sunt iis, quæ & detergeant & adstringant, sed hæc rectè diluas, ut liquida infundantur. Aqua aluminosa



## LIBER II.

31  
 aluminosa, uel in qua malicorium, myrtha, balauftia, cæ-  
 teraque eiusmodi coxerint, id genus ulceribus accom-  
 modanda sunt. Aegyptiaca in liquidis dissoluuntur, alia  
 quæ id genus. Verum matutino melius adhibentur, tum  
 quæ constringant, tum quæ mordeant, quo iam tempo-  
 re diffluit corpus, ne adstrictione excrementa cohi-  
 beantur, & acrimonia pertrahantur in ulcus. Præstabit  
 quoque detergente materia prius expurgare, quã astrin-  
 gentia instituas. Lixiuum è calce sæpius elota terget &  
 siccatur, nec sine re laudatum est. In callosis, ægrè cohæren-  
 tibus, cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithy-  
 mali, aliisq; id genus lixiuum fit, quo sinus quotidie  
 perfundantur. Aqua è larigna, terebinthina, resinis ferè  
 omnibus extillata, tergendo idonea est: lixiuum ex oli-  
 uæ nucleo, cancerosa tollit. Succo absynthii siccabis, ex  
 terges, astringes, & roborabis. Melicrati & eorum quæ  
 mel, uel saccharum recipiunt, modus est, ut sit decupla,  
 octupla, sexcupla, aqua. Eo dilutiore utendum erit, quo  
 sinus purior: acriore, quo sordidior. In ulcere satis expo-  
 sito, lintheolum prius pharmaco insuccandum, leuiter  
 exprimendum, insinuandum cauo. In humidiori exactis  
 sine triti puluisculi resperguntur. In sicciore & quod  
 sorde offarctum est, diuulsa linamenta, uel sine his phar-  
 maca mollia imponuntur: ex quo bene carminato uelle  
 re os ulceris obstopandum est: deinde superdanda mollis  
 spongia, uel complicata lintheola, uel denique quod  
 patria lingua, & iam uulgari Cotton appellatur, ut inde  
 tota ulceris regio comprehendatur. Atque hæc omnia  
 uino inculcabis, & expressa superpones. Postremò arti-  
 ficiose colligabis. Omnino tamen cauendū erit, ne quid  
 durius, grauius, asperius, ulceri incumbat. In fistulis &  
 altioribus lacunis, quod superdatur spleniū, in decussem  
 uel crucem discinditur, ut sit quā sanies effluat, atq; ea  
 parte diuidi melius est, quā os ulceris in decliui tangit.  
 Poterit etiam linoxylon molle obdaci splenio, quā par-  
 te diuisum est, ne sanies molestè diffuat & subiecta cor-  
 pora inquinet, sed combibatur. Omnia commodè obli-  
 ganda sunt, uel ut contineas, uel etiam ut reprimas. Ac-  
 cidit

*In callosis.*

*Ad cancro-  
sa.*

*Absynthij*

*succus.*

*Melicrati*

*& similia.*

*Quomodo*

*utendum ca-*

*tharticis.*



cidit aliquando ut longior turunda extrema parte ner-  
uum aut dolentē particulam attingat, atque exasperet.  
Quare ea decurtāda est, & ima parte intingēda remedio,  
quod & lētū sit & leniat, reliqua uerò detergēte auxilio  
illini debet, quæ si parū etiā uideatur, quia non pene-  
trat in alueū qua ulcus definit, iniectis liquidis medica-  
mentis sufficiendum erit, quod deesse uideatur. Postea ue-  
rò quā tempus redierit, in quo uincula soluātur, atque  
reuellantur indita medicamenta, recognoscendum fide-  
liter, quanta qualisq. sordes prius fuerit quanta, qualis-  
que in præsentia sit. Nā si iam minor & cocta appareat,  
bene est. Optime uerò si purum vlcus est, & iam aliquid  
laudandæ carnis succreuit. At si solito magis sordescit,  
& nihilominus crudum est, distinguendum hoc modo:  
Nam si cavitās maior, nouus calor, rubor & dolor, ad-  
fuerint, id acriori medicamento attribues. Temperabis  
ergo cerato rosaceo, si maior calor: si uerò flaccidum vl-  
cus & humidum, myrtino. Quod si nihil horum extite-  
rit, non calor, rubor, dolor, sed tantum sordes uberior  
prouenerint, imbecillius est pharmacum, quod adiecto  
melle exacues. Sed aliunde humor interdum affluit, ut  
in Rheumaricis ulceribus appellatis: nonnunquam in  
largiore cibo & potu peccatū est, quibus mederi prius  
necesse est, quā ulcus purgari possit. In humore nimio  
siccantem pollinem consperges, & mollibus pharmacis  
abstinebis. Aliquādo uerò nimium siccando, & contra-  
ctum, & exuccum ulcus reperiēs: qua in re siccantia hu-  
mido diluuntur. Inflammato ulcere sæpe initio re-  
currit materia, ut tenuis quædam sanies, lachrymæ  
similis, tantum effluat: unde *δαρπυαδης* ulcus appella-  
tum ab Hippocrate. Vbi non medicamento sed uitio ul-  
ceris ea res attribuenda est. Oculis, naribus, & palato  
aliisq. partibus ulceratis, quas humor subinde alluit  
uis medicamentorum aut acrior sit quā ulcus postu-  
let, aut sæpius commutetur. In contumacibus, solidio-  
ra pharmaca inseri possunt (si non prohibet dolor) &  
platismata suprā adhibentur. In summa iustam qua-  
litatem pharmaci æstimabis, si purius ulcus inde red-  
ditum



## LIBER II.

32

ditum est: si naturaliter sentit locus ulceris qui sensu  
 præditus est: si modicè rubet: si nimium neque siccus, ne  
 que humidus est. At quicumque sensu caret, aut non na-  
 turaliter sentit, quicumque nimium aut aridus aut flac-  
 cidus est, quicumque albidus, pallidus, liuidus, aut ni-  
 ger est, is nondum purus est. Omnino uerò siccandum  
 ulcus est, quantum adelicet & ratio sordium, & na-  
 tura partis ostendit. Alioqui infra modum siccato ul-  
 cere, fungus è membranis nascitur, aliunde excrescit ca-  
 ro, aut putredo contrahitur, in qua ad acria, mordentia,  
 ignem quoque & ferramenta confugere sepe necesse est.  
 Accedit aliquando ad sordes ut etià uermiculentur, quo  
 tempore aloe cremata conspergatur: ueratrū albū in to-  
 sto melle: puluis pollij & absynthij in pice imponatur:  
 nuclei mali perfici è persicariæ succo tusi: plátago arefa-  
 cta, marrubiū, centauriū minus, calamyntha, porrū uesi-  
 ca suo felle plena, igne resiccatur, teritur, & inspergitur.  
 In summa quæ amarore uermes enecāt, & purgāt sordi-  
 da. Arida teruntur, & ita resparguntur cauo. Ex aliis suc-  
 cus exprimitur, melli uel aloe concorporatur, & aliquan-  
 do simul omnia coeunt. Eidem rei lixiuium cōuenit, uri-  
 na linamēta ieiuni hominis salina tincta, cicer, orobus,  
 lupinus, hordecum: uista, trita & melli mista, uermes extin-  
 guūtur, maligna sanant & chironia. In cancrofis cancri  
 flauiatilis cinis cum cadmia. Si cadmia desit, tutia uul-  
 gari crustacea, gleba æraria uista tritaque, aut fuligine  
 ex ærariis fornacibus uti licebit. Meliora hæc omnia ex  
 uino giluo, tenui, pellucido, leniter alstringenti, & odo-  
 ro: diutius uersata loco subdiali & obiecto soli, alioqui  
 luculento foco. Irionis semen cōlæuigatum melli: lens  
 cocta cū melle. Mel in tegula torrefit, & solani succo im-  
 bibitur. Ex uirētis oleæ furculis succus exprimitur: mali  
 coriū uritur. Semperuiuū, umbilicus ueneris, solanū, in-  
 tybum, lactuca, psyllium, omphax, atriplex exuccātur,  
 quod inde expressum fuerit, pistillo & mortario plum-  
 beis diutius circumagitur, dum sit luti crassitudo. Pom-  
 pholyx in pila plumbea diu uersatur, atque paulatim  
 affuso succo qui conueniat, uolutatur. Colocynthis uri-  
 tur,

*Vermiculā  
tia ulcera.*

*Ad cance-  
rosa.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Πόπνο.  
Cerusa è dra  
contio.*

tur, pulvis pompholygi permiscetur contra maligna & vermiculantia. Cerusæ e dracontio (gersam serpentariam vocant) vnc. i. calcis uiuæ, drac. tres cum aceto pista iuncta quæ fistili cremantur: pulvis expurgat caneros & curat. Fit autem ea cerusa hoc modo, quæ per se clementer purgat. Radicem Vere colligunt, Galenus sub canicula: Dioscorides lauat, siccatur umbra, aliquot post diebus secta in taleolas, traicitur acu quæ filum ducat ex quo depêdens umbrosa domo asseruatur. Vsus tempore, trita inspergitur, & maligna curat: melli aliquando, aut (ne acrior sit) cerato commiscetur. Sed ut inde cerusa fiat, vbi iam siccata, & in farinam trita est, vitreo vase includitur, in quo tantum sit aquæ rosacæ (quod *ροδοσταγμα* vocant) ut enatet aqua: vas ergo viginti dies percolatur, & ut expirat aqua atque combibitur, ita noua refunditur: postremo farina illa exiccatur umbra: vbi liquorem multum combibit, usui reponitur. Eodem modo umbilici marini, sales ostreorum cinis, puluisculus iridis, os sæpiæ aliaque generis eiusdem cõparantur, & addita cerusa lota, gummi, mucagine, crino stagmate: bene mundato lotoque adipe, anchusa denique ad fucos mulierum permiscetur. Ad canerosâ, litharg. vnc. 2. uino giluo, tenui, odoro, leniter altringente uel aceto, si quid est calli, immerguntur, ex eoque quotidie in sole uel igne conteruntur pistillo plumbeo & mortario. Idque diebus octo uel pluribus. At quoties tritura repetitur, uinum & acetum mutari debet: tantò efficacius pharmacum est, quantò plus liquoris rapuerit. hic rursus oxelæon ad selibram iniicitur, ex quo diu trita lithargyrus excoquitur puro carbone. Iam non inquinanti, cerusæ semuncia inspergitur, mouetur omnia, & sedulò cõmiscetur. Sunt qui cineris ostreorum drac. 2. adiiciant. Ex eadem materia, Ricotia barbarorum, conficitur. Lithar. triti & cerusæ ana vnc. 2. ol. myrt. uel rosæ solani imbuuntur. Psaricon Mesuæ medetur câcris fistulis, lebræ, scabiei siccæ, putrida depascitur: superiori- bus pharmacis acrius est. Litharg. argenti, chalcanti, uel

*E litharg.  
& cerusa.*

*Ricotia.*

*Psaricon  
Mes.*



uel uitreoli ana unc. i. ærug. unc. i. teruntur uno die in  
sole æstiuo ex aceto acerrimo, quod paulatim respergi  
debet, deinde conduntur omnia uase uitreo, & ad qua-  
draginta dies sub fimo obruuntur. diapampholigos me-  
dicamentum est ueterum & recentiorum, quod contra  
cancros usurpari potest. Vrticæ semine & foliis utrisq. *Facultas*  
tritris, aridis, infriatis. Galenus usus est ad gangrænas & *quorundā*  
cancros, quia modicè calfaciunt, siccant, digerunt, tenu- *medicamētō*  
ium sunt partium, nec mordent, qualia gangrænis & can- *rum ad gan*  
cris conueniunt. Sed ubi calor est, refrigerante succo *granas, &*  
qui per se conueniat, temperari debent. Gangrænx cō- *cancros.*  
punguntur, scarificaturque, ut oppressis spiritibus liber *Putrida*  
anhelitus reddatur: iisdemque iuuantur remediis qui *quæ curent,*  
bus & cancri, & putredines. Putrida curantur melle scil *Aristolo-*  
lite, cui intritus sit puluisculus ellebori. Aristolochia *chia.*  
rotunda extenuat, putredines sanat, repurgat sordida,  
ad quæ efficacior est quam longa. Hyperici semen ari-  
dum, commistum melli: putridis & iis quæ in multo  
humore sunt, medetur. Erysimi semine ad cancrōsa,  
putrida, gangrænas similiter utendum est. Sabina iisdē *Sabina.*  
remedio est, & atra iuuat: uerum tum hæc, tum quæ  
acria sunt, rebelli ac nimium contumaci uitio accommo-  
dare melius est. Quod genus ulcerum uim acrium me-  
dicamentorum sine noxa perferre potest. Nam cum re-  
centi malo, dolente atque inflammato clementius agen-  
dum est. Computrescebat & humore soluebatur medii  
digiti manus articulus: cui Galenus initio cataplasma *Historia.*  
induxit è farina hordei in lixiuio pista: uicina uerò  
sursum uersus tensa dolentia & inflammato oleo calen-  
te fouit. Postea uerò quàm dolor acquieuit, calorq. ex-  
tinctus est, ex orobi farina eodem lixiuio iuncta cata-  
plasma compegit, atque is tandem sanatus est. Ita in ar-  
ticulis & neruosis partibus, tum etiam aliis quæ putre- *Contra pu*  
scant, farina (ut dolor est & calor) commutanda, quæ si *tredines ar*  
non prohibent, è lupinis & ciceribus extundi potest. *ticularum,*  
Subiguntur autem cataplasmata, modò lixiuio, modò *neruorum,*  
oxycrato, & in dolore œnomelite aliquando etiam ace- *etc.*  
to mulso uel aceto. Marrubio, scordio, centaurii mino-



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Usitata ue-  
teribus con-  
tra putredi-  
nes.  
Tria gene-  
ra medica-  
mentorum  
contra pu-  
trida.*

ris cauliculis uti solitos ueteres contra putredines Ga-  
lenus auctor est. Aloe, myrrha, absynthio, apio amaro,  
melle tosto ferè usa est posteritas. Plantago rebellia,  
rheumatica & putrilaginosa sanat. Ac ferè inuenias uete-  
rem medicinam triplici genere remediorum pugnasse  
contra putrida. Frigidis enim & astringentibus aliquan-  
do usa est, ut plantagine: admodum calidis, sed quæ non  
mordeât, ut urtica: acris ac iâ mordētibus, ut Sabina:  
ac singula genera, singulis ulcerum differentiis accômo-  
danda sunt. Initiis enim putredinum ubi calor & dolor  
est, frigida illa conuenient. Vbi inualuit putredo & con-  
tumacior est, ad acria decurrendum. In media condi-  
tione, medium genus utile est: in quo anethi semen est  
ustum, tritum & inspersum. Ex officinis ærarii, ea scoria  
colligitur, quæ fuso ære relinquitur: è uino tenui quod  
ex aultero dulcescat, diu conteritur: quadruplo melli  
torrefacto permiscetur, singulari remedio in ani, oris &  
genitalium uitiis, magis etiam quum potredo depasci-  
tur: colligi potest ea scoria, non solum in primariis illis  
fufuris glebæ ærariæ, sed ubicunque æs collectaneum in  
iecto lapide quem calaminarem uocant, refunditur.  
Melle myrtino, gingiuarum putredines cohibentur.  
Cōtra putredines & nomas, Aluminis uehemēter triti,  
drach. 2. salis drach. 1. mell. unc. 3. omnia coniuncta, cre-  
mantur olla: ustis, tritisque, drach. 3. tritæ ireos immi-  
scentur. Alumen per se ustum, tritumque contra eadem  
mala inspergitur. Aliud. Aloes, myrrh. ana unc. 1. trita  
iunguntur succo plantag. & absynth. dum fit luti crassi-  
tudo. Vitreolum uritur, diuque est aceto tritum circum-  
agitur: hic siccatur: siccum è uino subigitur, rursus sicca-  
tur: puluis citra morsum siccatur, & putredines adiunat.  
Eodem modo macerari possunt acria metallica ut sic-  
cent, nec ita mordeât. Chamæpytis cupressi nuces & fo-  
lia, putrida, flaccida, & atra iuuant. Ostreorum, buccino-  
rum, testularum, ossium, sapiæ cinis ex oxycrato, & aliis  
contra eadem ualent. sunt qui dum ea cremantur, quar-  
tam partem salis immisceant. In calore & phlegmone,  
alterci semen album cum dupla farina tosti hordei uel  
aue-næ



auenæ, usurpandum. Atque hinc poterit ex ænomelite,  
 uel oxycrato cataplasma fingi. Arida radix cucumeris  
 agrestis, fici folia, ellebori fibræ, unumquodque tritū, &  
 melli mistū, iisdē uitriis auxilio est. E radice gentianæ &  
 enulæ, cerusa factitia qualis è dracōtio descripra est, mi-  
 rificè prodesse potest. Scilla similiter cū melle cocta. Ci-  
 nis è lana succida molibus, flaccidis, malignis ulceribus  
 utilissimè inspergitur, atq; efficaciter siccatur: eodē modo  
 è pilis animalium utilis siccado cinis cōparatur. Ad putri-  
 da uitreoli usti, & ut prius, confecti 3. i. elaterii & semi-  
 nis lini torrefacti ana drac. i. terantur omnia. *Isidori An-  
 nomas, gan-  
 grenas, etc.*  
 tiochei ad gangrænas, nomas ueteres, & malignas putre-  
 dines. Litharg. semuncia, æruginis 3. i. olei ueteris uel  
 ricinini 3. 9. uel (ut alii) sesquilibra, metallica trita cum  
 3. quatuor, & semisse olei clementi foco coquito: uersa  
 to spatha, uel manubriolo ex enulæ radice, cucumeris  
 agrestis & gentianæ, idq; donec uiride fiat: hic in morta-  
 rium data omnia uolutato: ex quo in cacabum repetita,  
 cum pari modo olei recoquito, dum sit melinum phar-  
 macum: tum in pilam reuocato & circumagito: deinde  
 redditum foco tertio excoquito, ut rufum appareat, &  
 in mortarium reducta subigito. Postremò iam quarto  
 coquito cum pari oleo, omniaq; ut prius, facito. *Andromachi ad eadē*  
 dronachi ad eadem. Litharg. unc. 9. calcis uiuæ, æris cre-  
 mati, thuris, terebinth. aristolochiæ rotundæ, ana unc. 3.  
 picis, ceræ, ammoniaci ana 3. 6. liquabilia seorsum fun-  
 dito: deinde metallica uino tenui & odora tincta, trita-  
 que immittito: omnia in mortario contūdito, & fide-  
 liter commiscero. In putridis, depascentibus, & graui-  
 ter olentibus, uocato puluere angelico, arsenico, crucis *In nomis et  
 fæcentibus.*  
 uitreolis, aliisque id genus utendum erit. Ea in tenuissi-  
 mum pollinem trita, & extremo specillo capta resper-  
 guntur, ex quo linamentum simplex uel liquore qui cō-  
 ueniant, madidum superponendum. Atque hic ubi aliis  
 remediis nihil profeceris, ferro & igne purgandum est.  
 Efficax medicamentum Lncij Cathægetæ ad malignas  
 putredines & nomas. Sulphuris uiui, auripigm. squamæ  
 aris ana drach. 2, æris combusti, drach. dimidium:  
 trita



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Materia  
purgans.*

*Metallica.*

*Caprinum  
stercus.*

trita omnia insperguntur: mollius est si in melle rosaceo adhibetur. Arido utendum magis in humore multo: in siccis temperatur rosaceo. Aegyptiacis quoque uti licebit. Atque hæc quidem obiter, neque tamen præter institutum, contra canctros, gangrænas, putredines, nomas, vermes, nigredines, quæ ad purgandi, siccandique rationem, atque omnino perturbanda vlcera pertinent. Nunc autem ad peculiare materiam veniamus. Repurgant molle tincta linamenta: aridum mel quod melitæis vasis inhæsit: mel rosaceum, quod etiam repprimat & calorem attemperat. Sacchari eadem fere vis est: terebinth. cum melle & rosaceo pari mensura. Eadem cum butyro, neruis utilis est: Iris serpentibus & forde plenis, gentianæ radix & enulæ. Marrubii succus & fœniculi conditus melle, mucago fœnugræci tincta rhodomelite, oculorum ulceribus idonea sunt. Melissa phyllon, marrubio imbecillius est. Aerugo tostata, lotaq. æris squamma, ac ferè reliqua metallica, similiter comparata citra morsum siccant, quædam etiam detergent, æs, stibia, ad hæc, chalcitis, misy, sori, quæ ad uitreoli, & cuprosæ genera referunt. Caprillum stercus exustum, & è uino pitum desperata sanat. Trochisci è calce, maligna iuuant: calx uiua trita quadruplo melli commiscetur: ex quo finguntur orbiculi, qui in figlino, ordiat collocati, & in fornacem dati concremantur. Inde puluisculus inspergitur, qui longè clementior fuerit si uiuo uel aceto eluatur, ut citra morsum tergeat, & siccet. Eadem arte multos pastillos conficias, e calce, melle & metallicis. Chironiis, hoc est, ualde malignis aliquando satisfaciunt cicer, orobus, faba, hordeum, auena, fresa omnia & melli infriata, uel per se respersa cauis. Eadem lupinorum uis est, qui in cinerem, molli igne usti, maligna ulcera tibiarum purgant, implent, cicatrice claudunt. Ad eadem ualent radix asphodeli, ari, & asari, ostreorum testæ & uolumina cochlearum. Vruntur omnia figulari clausa, deinde etiam lauantur uino, si quidem acrimonia deterenda est. Polium aridum rebellia sanat. At hoc scabiem expurgat, & maligna curat. Ellebori



bori albi unc. i. litharg sesquuncia, litharg. in olei, unc. *Contra sca*  
 iiij. & aceti, unc. ij. coquitur, dum non inquinet, subdu *biem & ma*  
 ctis igni, elleborus paulatim inspergitur, commouen *ligna.*  
 tur spatha, & sedulo permiscetur. Ligulstri nostri & mi  
 noris plantaginis folia affuso omphacio teruntur, asper  
 guntur sale, succus exprimitur ad maligna colis ulcera.  
 Sed ubi quæ mordeant partibus adhibentur, quæ inflam  
 mata celeriter putrescant, purgato corpore & ieiuno ui  
 cinia repellentibus obstinanda est. Erinacii cinis, amyg  
 dala, stæchas, anagallis, aristolochiæ radix, gentianæ,  
 enulæ, cyperi, urticæ semen, & irionis, humidioribus  
 ulceribus, cancris, putrilaginosi gangrænæ & liuore  
 tinctis, mirifice prosunt. Radix diplaci, in cinerem cre  
 matur, aut in uino ad melliginem coquitur. Solani ra  
 dix excorticatur, siccat, cortex, cancris, & nomis auxi  
 lio est: contra eadem, succo & trita herba utimur, mul  
 to magis ubi calor est. Minium quod est sulphure & hy  
 drargyro nostro fit, depascendo purgare potest, nisi ulsu *Minium.*  
 ra & lotura maceretur: sic enim clementius futurum  
 est, ut quod est sola cerusa ulsa comparatur, uel plumbi  
 gleba sterili, quodque ueluti arena in uenis argentariis  
 colligitur, aut paratur est syrico. Cerusa trita cribro tra  
 ducitur, & in fictili patella coquitur sincero igne, do  
 nec rubea, & sandicis colorem trahat, idque alii sanda  
 racam, alii sandicem uocant. Quidam etiam syricon.  
 Et qui sandaracam, ex hac & rubrica sandicem fingunt.  
 Ex sandice & synopide syricon, omniaque siccando con  
 ueniunt. Ad diuturna & malefica ulcera tibiæ, ubi  
 siccandum, atque digerendum. Sandicis lib. i. ol. dulcis  
 lib. 2. coquantur lento igne, dum non inquinent. At si  
 qua sordes, ea detergenda prius est. Ad cancris & ma  
 lefica, cerusæ est dracontio, uel radice dracontii, ut prius  
 comparatæ unc. iii. calcis uiuæ unc. i. cum aceto fingan  
 tur magdaliæ, quæ in olla concrementur, ut inde puluis  
 inspergi possit. E silicis radicibus quæ tergeant, & leui  
 ter astringant, cum melle medicamentum fit conueniēs  
 iisdem ulceribus. Quæ ex ærugine parantur cruda, ulsa,  
 lota, usu frequentissima sunt, qualia Aegyptiaca, ac in *Aegyptiaca*  
 e 3 purgando



*Aerugo.*

*Nota de metallicis.*

*Litas.*

purgando cruda ferè æruginè utendum erit, multo magis si ualde sordida, si putrilaginosa, si maligna ulcera curanda sunt. Quòd si nò adeo graue uitium est, uita quidem licebit uti, aut tantù lota, uita uerò & elota implendo cauo atque glutinâdo magis idonea est. Temperatur cerato, octuplo, decuplo, duodecuplo, & aliquando terebinthina permiscetur, quæ ut ad æruginem, similiter cerato habet octupla, decupla, duodecupla. Quanquam earatio uario commutari potest, ut sunt ulcera & corpora. Cere terebinth. ana  $\frac{3}{4}$ . i. ol. unc. 4. liquefactis adde æruginis drach. 1. 2. 3. Quanto plus receperit æruginis, tanto acius pharmacum futurum est. Aliud. terebinth. lib. 2. cere lib. 1. rosacei unc. 3. aut. 4. fufis permiscetur æruginis unc. 2. uel tres, ut magis siccet atque detergeat. Ac iam deterfa sorde, quum iam regeneranda caro, uel glutinandum ulcus est, minuetur ærugo, uel cerati & terebinthinæ modus inaugebitur. Atque omnino medicamenti quæ ex æruginè & acribus metallicis conficias, uis obtundi potest, si cerato aliisq; id genus temperentur: si crementur, lauentur: si denique diutius excoquantur: uisturæ ratio ex Dioscoride, & aliis petenda est. Ab eodem loturæ formula explicatur. Lauantur uino, ut impleas & glutines: aceto, ut tenues, penetres, repellas. Cruda melius expurgant: uita tenuiora sunt, magisq; discutunt: lota omnino clementiora: uita, lota q; præstantissima sunt, ut sicces quidem, nec mordeas. Si lauitur aqua, ea sit pluuia, uel æstiuâ, uel quæ tonante cælo defluat. Aerugo sublati igne aliis inspergitur, ut uiride & acius pharmacum relinquatur. Circa initia indurata, gilua facit, & dichroma colore ambigua. Diutius cocta æruginè etiam redduntur rusta, minusq; acia medicamenta: mitiora quoque si diutius lotura repetatur, & multum uini ærugo combibat. Litas Græci ferè appellant medicamèta, ex cere & terebinthinæ æquis partibus, æruginis octaua parte, decima, duodecima, subduplo thure, ad modum æruginis, & aliquando oleo addito sesquialtera ratione ad æruginem. Cere terebinthinæ ana unc. 1. æruginis drach. 2. thuris, drach. dimidium, olei



olei sesquidrach. sed ferè oleum adiicitur, cum sine thure & aceto cōficitur pharmacum. Aceti uerò usus est, ut ex eo ærugo diutius uersetur. Maleficis conuenit, æruginis unc. 1. squammæ æris unc. 2. aceti unc. 8. mell. unc. 2. metallica in sole tandiu teruntur ex aceto, dum hoc consumptum sit: mel adiicitur, coquuntur omnia dum ruffescat pharmacū. Clementer purgat ex mellis & terebint. pari pondere: paulo efficacius, addita ærugine priore ratione. Maligna iuuat litharg. lib. 1. coquitur in aceti libr. 1. ol. ueteris lib. 2. iam inspissatis, adde ærug. nnc. 1. coquantur omnia dum ruffum colorem trahant. In rheumaticis & humidioribus mel. lib. 1. aceti scilicet libra, æruginis unc. 1. aluminis semuncia, coquuntur reliqua: postremum alumen immittitur, tandiu permittuntur dum ruffescant. Atq; oīno in his modus sit æruginis, ut ne mordeant. Multa alia uiridia & gilua ex ærugine 2. lib. de composit. medic. *Ægyptiaca recētiorum.* *Ægyptiaca* *recētiorum.* Aegyptiaca recētiorū multis emplastris ueterū ex ærugine respōdent. Vnguentū de melle, aut Aegyptiacū magnū Mesuæ, ulceribus malignis, putrilaginosi, cuniculosis cōuenit. Sed hæc præscriptis modis macerata ærugine, moderari licet. Cera uiridis, arida & infriata, aut (si res postulat) soluta roseo deterget. Aegyptiaca, aloë, myrrha, uisio alumine, radicibus Aristolochiæ, gētianæ, enulæ, & aliis id genus aridis tritis consperguntur: siccātur in regula, puluis inde mucosas carnes putridas, præhumidas corrigit, & testulas ossium elicit. Papaueris cornuti folia, & flores ad modum sordida ulcera & rebellia iuuāt: sed his ut aliis omnibus quæ ualde tergeant, abstinendum in molli corpore, nec ita sordido ulcere: siccantur illa & insperguntur. Archigenes inspersis puluisculis, floccum è diuulso filo, imbutum frigido uel subaustero uino superponobat. Squammæ, æruginis ana unc. 1. ceræ unc. 6. larignæ aut terebinth. liquidæ sesquincia: in minus malignis, dimidio minuenda metallica. In tumētibus ulcerum labris resine loco, œsypus, medulla cerui uel uituli permiscenda: medicamentum in platysmate totum ulcus comprehendat: uicinæ partes parygro recenti, uel alio me-



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Ratio conficiendicamento, quod phlegmonem arceat, muniantur: tercio quoque die resoluitur platysma. Ex ærugine & cretica ex æruginem, & metallicis.* tato ære medicamenta conficiuntur ad maligna, cōcorporantur illa modò cera pingui, modò cerato myrteo, uel rosaceo, atque par metallorum modus est. Ceratum paulò uincat metallica, quod aliquando quoque laryngnam, uel terebinthinam habeat subdupla ratione ad ceram, & alumen sub quadruplum ad metallica. Aerug. æris cremati ana unc. i. aluminis semuncia, ceræ sequūcia, terebinth. drac. 6. olei myrtei semuncia. Plura generis eiusdem quarto de compositione pharm. catà geni.

*E farinis.* E farinis hordei, fabarum, cicerum, orobi, lupinorum, melle & terebinth. concorporatis, sordes ex tergebis. Farinæ unc. iij. succi apii, absynthii, marrubii, & similium, unius lib. i. mell. unc. ix. ad iustum corpus decoquatur. Al. hordeacea in duabus partibus aquæ, una mellis rosacei percoquitur, purgat, lenit, calorem temperat. Farinæ in memoratis succis coctæ, contra canculos & fistulas ualent, in laboribus neruorum terebinthina commodè permiscetur, myrrha & aloë in putredine, quæque contra putria descripta sunt. In calore, hordeacea, & fabacea præferri debet. In aliis è scœnogræco, ciceribus, orobis & lupinis melior est. Amicissimum neruis quod sequitur. Resinæ, mel. terebinth. ana selibra, myrrhæ, sarcocollæ, farinæ scœnigr. & seminis lini ana unc. i. ireos semuncia. Aliud quod in pure crassiori usurpandū est, galbani, ammoniaci, resinæ, terebinth. sepi taurini, ceræ, olei ueteris ana, in aceto imersa, paulatim fundantur igne. Aliud quod purgat, siccatur, fistulas curat & glutinat. Iris florentinæ unc. 5. farinæ orobi uel cicerum unc. iij. manne, thuris, calcis uiuæ ana unc. iij. aristol. unc. iij. & semiss. fiat puluis, in fistulas uentulo facto immitti potest, alioqui in liquida medicamenta quæ fistulis conueniant, respergitur. Viride ex herbis uetera ulcera repurgat, excrecentem carnem reprimat & cicatricem ducit. Chelidoniæ, plantaginis, scabiosæ, lybistici, urticæ, ormini syluestris, ana M. i. conuassata septem diebus in oleo macerentur, in eodem cocta exprimantur, expresso succo,

*Amiciss. neruis.*

*In pure crasso.*

*Puluis. Octauj.*

*Viridis ex herbis.*



so succo, adde ceræ unc. iiii. terebinthinæ unc. vi. resinæ  
 unc. i. simul bulliant dum fiat corpus. Subductis igne  
 adde sarcocollæ, aloes ana unc. i. aristolochiæ longæ,  
 æruginis ana semunc. aluminis unc. 6. sed iniquius pon-  
 dus est: fiat unguentum. Unguentum apostolorum ferè  
 respondet ueteri antiquorum: qui hoc usi sunt attrahen-  
 do, molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus,  
 quod quia uariè describunt, & Aetio uertimus thuræ  
 addito, & myrrha, unde clementius futurū est. Litharg.  
 unc. 25. ammoniaci unc. 9. colopho. unc. 16. æruginis,  
 galbani ana unc. 2. bdellij, opopanacis ana unc. tres. Ari-  
 stoloch. thuris mascul. ana. unc. 6. myrrh. unc. quatuor,  
 ceræ, ol. ana. lib. 2. Lithargyrus oleo coquitur, media  
 ebullitione inditur ærugo (recentiores decoctionis sine  
 ut melius purget) ubi non inquinant, colophonia insper-  
 gitur: summotis igne, reliqua ex aceto trita immittun-  
 tur: postremo uersantur in mortario, & permiscetur. No-  
 stri terebinthinam addunt, & maiorem modum ærugi-  
 nis: idèoque purgando efficacius est. Al. mellis cocti  
 lib. i. thuris semuncia, myrrh. drach. duas efficacius è cru-  
 do melle, additisque æruginis & resinæ ana drach. i. Pla-  
 ra primo, secundo, quarto, & quinto de compositione  
 phar. *κατα γιν* decimo quarto & decimoquinto Aetiis.

Prouidendum autem ut ne malè purgatum ulcus  
 coeat. Hippocrates cunolos è spongia aut plumbo ori  
 fistulæ inducebat: nostri & spongiam & gentianam &  
 Syphones, uel tubulos quas cannulas appellant. Ac li-  
 quabilia quæ *κατα γιν* uocant cuniculos ulceribus & fistu-  
 lis iniiciuntur, penna uesticæ alligata, ut Hip. uel cornea  
 fistula uesticæ iuncta, ut Gal. Nostri melius fistulis quas  
 syringas uocant: ueteres oriculariis clysteriis, aut uesticæ  
 loco sacculis coriaceis usi sunt. Arida uerò *ἐν πια* dicta  
 corniculis inspirabant, aut illitis penicilis lentore ali-  
 quo inspergebant: penicillos autem è filo contexebant,  
 fingeant è scirpo. Nostri è plūbo fistulas constant, illi-  
 nunt unguinosi auxiliis, candelas cereas immittunt, aut  
 has mistis Aegyptiacis, cera uiridi & aliis conficiunt.



**Q**uod iam purum, quodq; aperistaton ulcus est, carne impleri debet. Ac tale quidem est, quod sordibus purgatum, modicè siccātū, sine rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie constitutum est.

In summa cui nihil accidit, quominus impleri possit.

Hic ergo carnem regenerabis. Sed hoc naturæ opus est, quæ carnem è sanguine conficit. Oportet ergo tantū talemque sanguinē naturæ suffici, ut inde carnem procreet: instituēda uitæ lex, cibi boni succi, uitatis acribus: auis, uenatio, suilla elixa dari potest. Vinū in dolore & phlegmone, alienum est, datū alioqui modicè, nec ita uetus ut iam acre sit, aliquando prodest. Reliquū uero sarcoticis medicamentis perfici debet. Quæ reuera sarcotica sunt,

*Sarcoticum  
natura.*

*Cephalica.*

*Modus cera  
ti ad rhypti  
ca & cepha  
lica.*

*Materia ce  
ratorum.*

*Axungia  
sarium.*

iustā materiā naturæ cōparant, modicè detergēt, siccāt primo gradu: uel ita ut ne nimis calefaciāt. Nā quæ uehementius extergeāt, & siccant, primū quidē ac per se, rhyptica & cathartica appellētur: deinde uerò ac secūdario sarcotica: & colletica dici possint. Quin & cephalica, sarcotica quædā sunt, sed paulò acriora, quàm ut reuera in sarcoticis statuātur, nisi uim siccādi emollias, & acrimoniā hebetes: ut eorū quæ purgāt, asperitatē lenias. Sic enim carnē regenerent. Itaque ceratis, oleo, & similibus tēperentur. Ac cerata dupla, tripla uel quadrupla sunt, ut molle, durumque corpus, & medicamentum lene, uel asperum, acre uel moderatum est. Quale fuerit si ægyptiacorum unciam, duabus, tribus, aut quatuor uncis cerati permisceas. Cerata fiant è myrteo, si adstringendum: omphacino, si etiam refrigerandum: rosaceo, si præter hæc concoquendum & repellendum: quanquam his omnibus communis quædam uirtus est. Mastichino, leuitiscino, terebinthino, ubi leniter calefcendum, molliendum, & cōtrahendum. Quod si parte aliqua durum, crudū, nec ita clemēs ulcus est, loco cerati simplicis, uteris eo, quod quia resinā capit, *πρωτόκρηρον* appellant. Derasa quoque rotis axungia, temperandis eiusmodi catharticis idonea est. Mollit, siccāt, digerit, & leuiter astringit. Licentia est uocare sarcotica, quæcunque repellunt, tēperant,



perant, molliunt, intemperiem corrigunt, ac breuiter  
 summovent omnia, quæ agneranda carne naturam in-  
 tercludant. Qua in re uitanda sunt quæ plurimū astringunt,  
 & acrimonia mordicant: illa frugi humiditatem  
 partium, & materiam carnis ebibunt acris corro-  
 dunt, & aucta sorde ulcera amplificant: utraque uerò exaspe-  
 rant. Seligēda materia quæ naturæ corporū, & partiū cō-  
 ueniat. Nā si quid Dionis ulcus impleat, nō statim & So-  
 crates iuuare potest: nec quod in glande carnē instaurat,  
 & præputiū protinus incarnabit. Finge Socratem cui fe-  
 mur ulceratū sit: thure aliqui sarcotico putredinem gi-  
 gnes: aristolochiæ puluere, carnem restitues. Aristolo-  
 chia enim carnem regenerat, ubi thus sordes cōmouet.  
 Ac rursus Dion sit paulo humidior tēperatis: huic thus  
 cōmodum, aristolochia inutilis est, Thus quod in Dione  
 carnē gignit, i humidioribus uel siccioribus nihil tale efficiat.  
 Atq; omnino in siccioribus corporibus & partibus, ma-  
 gis siccantia: in humidioribus quæ siccet quidē, sed minus  
 utilia sunt: ideoq; & præputio, & toti pelli quæ colē in-  
 duit, sicciora: peni carneo & glandi minus siccantia con-  
 uenient. Ad hæc carni quæ minus siccet: oculo minus  
 quàm nari, huic quàm auri. Oculos incarnant, sarcocol-  
 la quæ maceratur aliquando in aqua rosacea, lacte, rubi-  
 succo, & alijs: thus, manna, cortex thuris, aloë, myrrha,  
 gammæ arabicum, tragacātha, mistis interim metallicis  
 quæ citra morsum siccant ( siquidem copiosior humor  
 affluit) pompholyge, cerusa, terra sigillata, plumbo ul-  
 spodio, antispodiis: acrium etiam momento, ubi in mul-  
 ta sorde ulcus est. Sed hæc elota prius, meliora sunt. Au-  
 ribus metallica magis siccantia, nec alijs temperata car-  
 nem regenerant. Ad hæc passi illi qui plurimum siccet,  
 Andronis, Polyidæ, Pasionis. Scoria ferri plurimis die-  
 bus in sole teritur, ac subinde intingitur aceto, quod a-  
 cerrimum esse oportet: aut certè uino. Alii ita compa-  
 ratam, & in latere torrefactam, sæpius terunt, lauant, a-  
 ceto imbuunt, siccant, & in pollinem tenuissimum com-  
 minuunt. Atque hoc medicamento utendum erit in ue-  
 teratis ulceribus, in duris corporibus, ubi lenioribus ni-

*Selectus ma-  
teriae.*

*Thus ex ari-  
stolochia.*

*Consiliū a  
natura par-  
tium.*

*Oculis incar-  
nandis.*

*Auribus.*

*Scoria ferri*



*In naribus.* nil profeceris. Quæ ocularia efficaciora sunt, incarnan-  
dis auribus quasi leniora usurpètur. In nariū ulceribus,  
non tã ferri quã plūbi recremēto uti conueniet. Ad hæc  
litargyro, cerusa, uino austero, oleo myrteo, rosas, pini  
corū succo misto interim malicorio & alumine. Qualia  
sunt recremēti plūbi, uini ueteris, olei myrtei, ana ʒ. 2.  
recrementum in pollinē terito, & affuso uino diu uersa  
to: tū myrteo adiecto omnia cōquassato, circūagito, figli  
no icludito, coquito, dū sit luti crassitudo: i uase plūbeo  
ad usum reponito: hoc etiā aurium ulceribus accommo  
datur. Eadē ratione metallica trita, liquidis pmiscebis:  
& si siccadum magis, rosas, melicorium, alumen ex uino  
tritum adicies. Cæterum ulcera narium, pastillis illis,  
Andronio aliisq̃ue generis eiusdem semper curari  
Gal. auctor est. Verū a lenioribus auxiliis ad hæc tran  
seundum erit. Soluuntur uino modo dulci (si quidem do  
lor est, aut aliquid crudi reliquū sit) modo austero quod  
reprimit: aliquando ueteri, ut siccet magis: nonnunquã  
aliis: aceto etiam modo uinoso, modo acri & uetusto.  
Atque hi pastilli capite de hæmorrhagia describentur.  
Rosæ detractis unguibus omphacino triplo infundun  
tur, quadraginta diebus insolantur, oleum cauis ulceri  
bus accōmodatissimum est. Vlcerebus pudendi quæ hu  
midiora sunt, anethum ustum inspergitur cucurbita sic  
ca, lota pompholyx eiusq̃; cinis, lapis hæmatites, pini  
cortex, plumbum ustum lotum, cadmia similiter compa  
rata, spodium, antispodia: quæ conficias ex oleastri flo  
ribus & follis, ebore, cornu cerui, dactylorum nucleis,  
moris immaturis, buccinorum cauis, testudinū & ostreo  
rum domiciliis, taurino glutino, aliisq̃ue plurimis: quo  
rum quæ solidiora sunt, noua cremantur olla, molli  
carbone, dum figlinum percoctum sit: quæ uerò mollio  
ra, exarescunt in sole: teruntur omnia, & si quid acrimo  
niæ retinent, lauantur uino & rosacea aqua, ut citra mor  
sum siccent, impleantq̃ue: hæc autem ocularibus sarco  
ticis commodè ascribentur. Præter hæc tum pudendis,  
*In pudendis  
& partibus  
quæ facile  
sentiant.* tum partibus omnibus quæ uegetius sentiant, idonea  
sunt amy lon, cerusa sæpius elota. His autem conuenien  
ter



ter miscebitur aliquid thuris, mannæ, corticis thuris, aloes, sarcocollæ, myrrhæ, cerusæ factitiæ: aloe sicca, & mannæ portiuncula, nō ita madida ulcera genitaliū incar nātur. Quod si cancer in metu est, solani succū, semperui ui, plātaginis & similium, pistillo plumbeo & mortario diu uersabis, in eoq; medicamentum accōmodatum con corporabis: aut in oleo quod ni ignis exprimunt è plum bō. Eadem quoque remediorum ratio in ano & parti bus quæ faciliè putrescant, seruari debet.

Putrescunt faciliè & nomis occupātur extremæ corporis partes, quibus infirmus calor est, quiq; celeriter extin guitur: caux, ut quæ recremētis facile impleātur, atque omnino calidæ & humidæ, & ita posite, ut parū cōmodè perflectur. Atq; omnino naturæ partiū coniungere oportet, q̄ sinus uel humidior & sordidior: uel purior & sic cior est: ut si cōsentiāt, quia & pars humida & humidum ulcus est, ad utrunq; remedia accōmodes. Quæ si contra ria indicāt, pars natura sicca, & cauū quod supra modū humectū est, ita tēperanda ratio ut quū alterū iuues, al teri nō noceas. Natura partis similia: ulcus ferè cōtraria desiderat. In diuturnis, rehumaticis, quæq; egerrimè car nem recipiant, sarcoticis aridis opus est, quæ citra mor sum siccant, qualia proximè descripta sunt, quibus ca nitas confertim implenda est. Eadem fistulis inspiran tur, ex quo in uetere axungia, aut erasa rotis. Oltreorū cinis labris ulceris, & aqua parte callus, est imponitur. Omnia ergo remedia suis finibus distinguenda, & na turæ partium ulcerumq; accommodanda sunt. Lan guidius sarcoticon uel saniem aceruat, uel mollem car nem, flaccidamq; gignit. Efficaciore cauum exarescit, uel callosum germen enascitur, sæpe etiā excitatur do lor, ulcusq; grauius arroditur. Quæ induntur ulcerib. leuia sūt, & contractu suauiā (ὀρεφιστῆρα Græci uocant) ne asperitate dolorem creent. Ex quo terebinthina ce ræ, & hæc terebinthinæ sæpe commiscetur. Friabilis ma teria in tenuissimum pollinem resoluitur: & cum aliis lenta & emplastica temperātur, ut aliorum aspredinem delineant. Coquantur multa ut liquecant, & uiscidam naturam

*In diuturnis & rheumatis.*

*In fistulis.*

*Languidius et efficacius sarcoticon.*



naturā trahant:uersantur sedulo ne in grumos coeant. Cæterum aliud genus uarium, quod multa simul perficit, & ad multas corporum naturas deformari potest, sæpe usui est: quia uidelicet eo celerius malum percutetur, & unum pluribus mederi possit. Ac certè perferri debet, quum multiplex ulceris querela est, quia rheumaticon, dolēs, callosum. Quodque uolumus, subiecto exemplo intelliges, idque in usu reliquorum medicamentorum semel expositum sit. Glutinat, siccatur, deterget & carne implet. Strobillinæ unc. 3. ceræ unc. 1. æruginis rasæ semunc. thuris drach. 2. aceti quod sufficit. æruginem pluribus diebus aceto cōteres, thus uno die

*Exercitatio  
in aciendo  
uel hebetan  
do pharma  
co.*

*Duplex la-  
rina.*

atque ita liquatis aliis permiscebis. Gangranis, nomis, putrilagini conuenit. Fiet clementius strobilina prius molliore facta è rosaceo, uel terebinthina strobilinæ loco mista. Quòd si terebinthina careas (quòd ferè fit) larigna, quæ pro terebinthina supponitur, & omnino ei similis est, utendū erit, quam ad omnia ualere, ad quæ terebinthina scripsit Aetius. Alia larignæ differentia, cætera quidem terebinthinæ similis, sed gustu mordacior, sensu acrior, & odore grauior est. Mitius quoque fuerit cerato addito, cera lota, diutius trita ærugine, aceto non ita forti, sed uinoso: postremò si æruginem minuas, hac arte clementius factum glutinat. Mediocre fit, minimum neque acre, neque lāgudum, nō ita diu trita ærugine, & medio modo indita, ut didrachmi uel drachmarum triū pondere: picea iniecta aut abietina, qualis est uulgaris terebinthina, iam crassior, natura lenta, colore ruffo: tenatius simul & minus acre ad modum æruginis immisto thure. Vbi siccandum magis, drachmas duas lithargyri, aut squammæ (siquidem contumax uitium est) adicies. Squamma uratur prius, & cinerem trita, uino uel aceto eluantur. Atque hæc metallica tum maximè usui sunt, quum flaccet carnes, & humidius ulcus est. Oleum uerò adhibeatur (siquidè fuerit opus) mellinum, aut myrteum: in calore, rosaceum præstātius est. Quòd si parum procedit caro, aristolochiam, aut aliquid è sarcoticis iniicies: in duritie, medulla cerui & uiuli,



coli, adeps uituli, gallinæ, anseris, colliquāda sunt. Quæ  
 si leuius efficiūt, ad resinam liquidā, nō acré: postea etiā  
 ad galbanū & ammoniacum decurrendū erit. Partē quo  
 que aluminis, infriabis in rheumaticis, uel ladanū quod  
 mollit, lenit, repercutit: Mastichen, sarcocolā, aloen. At  
 que hæc repellit, terget, digerit, & carnē gignit. Sic ergo  
 polychriston tēperabis, quod ad multa uitia semel trās  
 formes. Variis corporibus adhibeas, eoq; semper carnē  
 regeneres. Lā uerō cōstare puro in simplici ulcere quod  
 aperistaton dicebamus, utendū esse eo genere sarcotico  
 rū, quæ suauiter implēt, nihilq; mordēt. In malignis, de  
 pascētibus, putrilaginosi, ad acria decurritur. Sed ita, ut  
 ratio aliqua partiū habeatur, iustoq; modo creatis, rosa  
 eco & aliis tēperentur. Quod inter utrunq; uitium ambi  
 git, mediis auxiliis curari debet. Atque omnino proui  
 dendum, ne moueatur dolor, atque inde inflammatio:  
 tum ne qua sit intēperies ulceris, aut partium, quæ hoc  
 ambiunt. Etenim natura partis instauranda prius est  
 quam renutrias. Quæ metallica adhibentur, cruda mes  
 soribus, nautis, fossoribus, atq; omnino callosis corpo  
 ribus: eadem uisita & è uino lota pueris mulieribus, eunu  
 chis comparentur. Quæ tantum uisita femori inferun  
 tur, ea uisita sæpiusq; lota inspergātur coli. In pudendi  
 ulceribus præstantissimus est margaritarum cinis. Co  
 rallo similiter uti licebit: crysallum laudāt in oris ul  
 ceribus & cācris. In clemētibus auxiliis aloë est. Amy  
 lon per se tritum & respersum genitalia implet, & cica  
 trice tegit. In tenera natura lauatur aqua polygonii, so  
 lani, plātaginis: nec absimilis habetur cura ulcerata se  
 de, ore, partibus extremis. Fuligo tharis, terebinthinæ,  
 myrrhæ, admodum siccare potest: è styrace & pice li  
 quida efficacior est. Suauior quæ ex butyro & æsipo  
 effumat. Lauari debet quæ sit acrior. Manna repellit &  
 ad multa utilior thure est. Colophonia, pix, resina præ  
 fertim sicca, humidioribus corporibus conueniunt. Co  
 lophonia modo per se, modo cum thuris polline uel  
 māna, ulcera genitalium persanat. Caries lignorum ex  
 purgat, impletq; humida. In ulmo præcipue, quercu  
 & ad-

Ladanum  
 Ex natura  
 ulcerum.

Particula  
 ris materia  
 Margarita.  
 Corallus.  
 Crysallus.  
 Aloe.  
 Amylon.  
 Fuligo.

Manna.  
 Pix est resi  
 na.

Colophonia  
 Caries ligno  
 rum.



*Aristolochia.*

*Plumbum.*

*Metallica.*

& adstringente ligno colligenda est. Per se inspergitur, & aliquando adhibetur in cerato. Cortex radice caparis eadem potest: & cum carie contra chironia & maligna permiscetur. Farina tostii hordei & fœnugræci humecta iuuat: torretur in tegula. Aristolochia, gentiana, enula, & similia detergent, digerunt, attrahunt, & carnem replēt: sed hæc paulo acriora sunt, quæque duriori corpori & humidiori vlceri conueniant. Aqua rosacea vel vino macerata aliquantulum mitescunt, cerato quoque retundi possunt. Pumex crematur carbone puro, vino immergitur, siccatur umbra: per se & cū sexta sulphuris parte Chironia iuuat. Chironijs longè optimum medicamentū est plumbum vsum & elotum. Plumbi scoria similiter comparata, vtraque caneros & putrilagines mirabiliter adiuuant. Extillant oleum e plumbo chymicorum arte, quod ad eadem vtiliter adhibetur. In acrisanie acria suspecta sunt. sed hæc partim vstura, partim lotura obtundi, & cerato capta, vel rosaceo leniri possunt. Ac cerato quidem, si expositum, nec ita cauum vlcus est: in cuniculoso diluuntur rosaceo. Liquidiora pharmaca in superficiem data diffluunt, & inde linamenta arida reliquuntur. Crassa verò atque corpulenta altiore sinum non subeunt, nisi diluantur, & in pyulcis, collyrijs, corniculis oris amplioris infundantur. Metallica acria sunt, squamma æris, & stomomatidis (chalibem vocant) chalcitis, chalcantum, quibus non nisi parcè utendum est, & quod antè dictum est, vstis ferè, lotis, & leuiori genere pharmacorum temperatis. Lauantur pluuia, si quæritur astrictio, alioqui puteali, fluuiali vel fontana. In fistulis & callosis vlceribus, aceto, vrina, lixiuio, vino alioqui giluo & subaustero: multo magis si vel caro, vel cicatrix creanda est. Sed acribus paulatim assuefacere oportet. Consuetudo enim efficit vt ferat parsea quibus initio grauiter irritabatur. Cremantur metallica: vbi acrimonia metuitur, olla cruda tecta operculo quod vel corniculo vel multis foraminibus pateat, quæque acrior vapor exhalet. Vsta verò extinguere oportet lacte, butyro, melle, vino, herbarum succis,



succis, unde uim conuenientem imbibāt. Ex quo lotura  
 quicquid acrimonię reliquū ex exteri debet. *Lithargy-*  
*rus.* cocta sarcoticis imbecillior est, quia non ita siccatur, *Lithargy-*  
 terget, adstringit: acrioribus mista iuuare potest. *Aerugo.* *Aerugo.*  
 go acrior est, quā ut carnē gignat: oleum sordes colli-  
 git: cera idem efficit: tria hæc mista carnē regenerant, ce-  
 lerius etiam si quid sarcotici ammisceas. Quale est, cera  
 ti rosacei lib. i. gruginis unc. i. Ac de medicamentis ex  
 æruginē superiori capite satis dictum arbitror, explica-  
 tumque, qua arte cathartica deformes, ut fiant sarcotica  
 retundenda acrimonia, leniendā eorum quæ tergant  
 asperitas, lenis adiungenda adstrictio, ut carnē regene-  
 res: de quibus abundē eo capite dictū est. Quod si in hi-  
 storiis ueterum medicamenta reperiās, quæ carnē rege-  
 nerent, capiant tamē acria & aspera, qualia quæ ualde  
 tergēt, quæq; uel austera sunt, uel acerba: recognoscere  
 oportet ea ipsa non omni ulceri descripta, sed ei quod  
 sordida sit & contumax, atq; humore diffluat. In quo a-  
 crimoniā retundi & asperitatē sorde multa & sanie de-  
 liniri contingit nō aliter quā illa ceratis & oleis mol-  
 liri solent. Atq; omnino separandū genus hoc pharma-  
 corū ab altero quod pura impleat. Eadē ratione in ulce-  
 ratis oculis, multum lachrymātibus & sordidis paulo a-  
 criora sarcotica imperamus: quia intelligamus sorde &  
 lachrymis uim pharmacorum dilui. In genere æruginis  
 factitia est chrysocolle ex urina pueri impubis. Versa-  
 tur hæc in mortario, pistilloque æneo, quæ ē molli ære  
 & cupro conflata sint sal purissimus uehementer tritus,  
 aut nitrum coniungitur urinæ. Similiter ex grugine cy-  
 pria uel quā ē cupro deraferis, diutissimē trita, circum-  
 acta iisdem mortario, pistillo & urina. Borax aurificū ni-  
 ueo candore, quodque capistrum uocant, eodem modo  
 teritur & in mortario cum urina circumagitur: deinde  
 omnia tinguntur glasto, aut eo puluere glasti qui iam ē  
 Narbonensi Gallia marsupiiis importatur. Is emitur ma-  
 gno: communi nomine cum cocco baphico pastellum  
 uocant: inficitque, colore purpureo ad uiolā inclināte:  
 Sic intinctus Borax ceruleo splendet, aut si plus glasti  
 f combibit,

*Animadaer-  
te.*

*Borax.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Ustolex.*

combibit, purpureo. Est & ustolex barbaro nomine, ex alumine, sale ana parte una, aceti acerrimi partibus duabus tritis ut prius, dum ceruleum, colorem trahant. Alii aceti loco, urina illa uti malunt, à qua non longè abest Scolœcia ærugo ueterum, maximè Diosc. hæc omnia acri sunt natura, eodem modo usurpanda quo ærugo & acria metallica: cremantur, eluuntur, temperantur aliis. Quod sequitur, anodyn non est, sistit, incarnat, phagedænicis, rodentibus, cancerosis, tibiæ ulcerib. medetur: Litharg. unc. 6. olei myrtei, & succi hyoscyami ana lib. i. coquantur omnia expirante succo, dum sit mel lis crassitudo. Seorsum autè coquito, cerusæ lib. semiss. in olei rosacei & succi plantag. ana lib. semiss. ita cocta metallica misceantur, leniter coquantur, uersentur spatula: postremo summotis igne, insperge mastich. lib. semiss. uniantur probè, & plumbea pixide reponant. Ad eadem ulcera tibiæ, litharg. lib. semiss. subtilissimè teratur, uersetur affuso uino, succo plantaginis, uel alio liquore qui per se conueniat: ex quo coquito cum ol. rosacei, adipis caprilli ana lib. semiss. coctis ad iustum corpus addes mastiches lib. semiss. subductis igne, & leniter refrigeratis, uitellos quinq; ouorum immiscebis Theriaca. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. In sarcoticis censentur, cephalica, quæ primum quidem caluariæ medentur, deinde reliqua ossa carne contegunt, postremò duras carnes restituunt. Duorum ferè generum. Alia enim cephalica, quæ peculiariter caluariam incarnant: quædam catagmatica, quæ reliquis ossibus fractis adhibentur: uerum utriusque nomen & ratio interim permiscetur. Cephalica catagmaticis acriora sunt, squammas ossium detrahunt, foras euocant quæ in alto latent: utraque tergent, digerunt & siccant. Multis catagmaticis, & cephalicis acria metalla commiscetur, sed præcipuè ubi ramentum ossis reuellendum, & humor uiscidus longius trahendus. Ac nudatis ossibus incarnandis, arida inspergantur. Pingua enim & quæ emmota uocant, quia inuncta linamentis adhibetur nudatis ossibus nocent. Miscetur ferè cephalicis, quod leniter

*Ærugo scolœcia.*

*Ad phagedænas tibiæ.*

*Theriaca.*

*Virtus cephalicorum. De compositione cephalicorum.*

sunt, squammas ossium detrahunt, foras euocant quæ in alto latent: utraque tergent, digerunt & siccant. Multis catagmaticis, & cephalicis acria metalla commiscetur, sed præcipuè ubi ramentum ossis reuellendum, & humor uiscidus longius trahendus. Ac nudatis ossibus incarnandis, arida inspergantur. Pingua enim & quæ emmota uocant, quia inuncta linamentis adhibetur nudatis ossibus nocent. Miscetur ferè cephalicis, quod leniter



niter adstringat. Ad hoc nisi eo usque ulceris tritura, ut tenuissimum pollinem abeat, tardabit potius reliqua, quam incitet. Contra tenuissimè laeuigatum reprimet quod influat, efficietque ut uis tergentium altius penetret. In uulneribus ossium, sed præcipuè capitis, non statim ad incarnationem (syfarcasin appellant) ueniendū sed explorandum prius, an omnia ruta sint, numquid contusum, quod suppurare prius, ac deinde purgare & siccare oporteat. Videndum quoque prius est, ne quæ parte syderatum aut corruptum os liueat, uel cariem trahat: elimandum enim, inurendum, excidendū, ac omnino repurgandum est. Hæc autem cura multo maxime suscipi debet in caluariæ fracturis, quæ altius procedunt. Itaque tum demum cephalicis utendum, quum pura omnia carere periculo uidebuntur. Atque ubi succrescit caro (succrescit autem facillimè) & os suo corpore leuiter integetur, cephalica temperabis oleo, cerato, alijsque generis eiusdem. Cerati modum definiunt, natura partis, qualitas uitij & medicamenti. In calloso ulcere, par medicamentum pari cerato misceri potest. In alijs ceratum duplum, tripulum & quadruplū esse consuevit. Parantur cephalica ex iride illyrica, uel florentina, alioqui pumila, densa, quæque sit frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquâ syncero. Parantur quoque ex orobi, cicerum & lupi norum farina, manna, aristolochia, gentiana, bryoniæ & panacis heraclii radice, magis etiam eius cortice. Opopanax autem calidior est. In summa cephalicorum materia deterget, siccatur, & non rodit. Nam acra miscentur, non quia sarcotica, sed ut testulas ossium è profundo trahant. Cephalicum Cathægetæ, quod tollit squamas, ossa corrupta detrahit, & caua implet. Iridis radice panacis uel capparis ana unc. i. aristolochiæ rotundæ, mannæ ana semuncia: trita & traiecta cribro resperguntur, uel mista melle inseruntur cauo. Aliud acrius Xenocratis: faring orobi unc. i. iridis sesquunc. mannæ, aristoloch. rotundæ, squammæ ana drac. 5. triticis utitor, & cum melle. Sunt qui addant radicē bryoniæ, & aliter

*Cautio.**Cerati modus ad cephalica.**Materia cephalicorum.**Cathægeta.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

*E silphio.*

parent. Aliud ē Silphio, quod si defit, utere benguino : rescindit callos, purgat tabefacit membranas, ut sponte sua decidant: & caua implet. Resinæ pini sicce sesquunc. punicis torrefacti extincti uino, iridis, aristoloch. silphij ana unc. 1. thuris semunc. squammæ æris drach. 2.

*E serapiade*

alias quatuor: arida & in melle usui sunt. E Serapiade. Satyrij tritesticularis, iridis, marrubii ana unc. 1. farinæ orobi uel lupinorum drach. 10. aristoloch. drach. 15. sicco & ex melle utitor: squammas elicit, ualde siccatur, incarnat.

*Satyrium.*

Huic generi Satyrii quod serapias & triorchis uocatur, hæc insunt, quod in pollinem radice trita, contumacia & putrilaginosa siccatur & repurgatur, herpes fanat, discutit oedemata. Triphonis quod aufert squammas. Corticis pini, squammæ, punicis usti sesquunc. manna, thuris, aristoloch. iridis resinæ pini ana unc. 1. myrrh. aloes ana semunc. utere ut prius. Athenæus, pro cortice pini habet gallæ unc. 1. Quod sequitur, Delcontis est: diuturno, ægre curabili, & calloso ulcere medetur, ossa corrupta rapit. Squammæ, manna, thuris, resinæ sicce ana unc. 2. aceti quantum sufficit. Squamma ex aceto leuigatur, thus & manna tenuissime trita immiscetur, si militer & resina: pastilli fiunt qui in umbra resiccantur. In callosis, pari cerato rosaceo: in aliis triplo uel quadruplo temperantur. Melanchloron Triphonis ad eadem. Squammæ sesquunc. manna, thuris, ammoniaci, resinæ pini sicce, seui uitulini bene curati, terebinthinæ ana unc. 10. confice ut prius. Plura capite de uitiis ossium: secundo, quarto & quinto de compositione pharmacorum catâ geni.

*Trigener.*

Trigener. Cera, colophonia, terebinthina pari pondere colliquantur, refrigerata immerguntur frigida, diuque manibus uoluantur: nuda ossa capitis incarnat, squammas deducit & cicatricem facit. Sed hic aliquid epulotici commiscebis. Admittendum est mastiche pariter mista in ossium fracturis. Iudæi.

*Iudæi.*

Colophonix lib. 1. mastich. unc. 1. olei sesquicia: liquata & in frigida pilla sine linamento ulceri interponuntur: purgat hoc pharmacum, & carne implet, sed non claudic



## LIBER II.

43

dit cicatrice, nisi quid ex epuloticis immisceas. Optime incarnat, farinæ pistrinalis unc. 2. colophonix ualde tritæ unc. 1. arido cauum impletur. Galeni, ceræ sesquunc. ol. lib. dimid. liquefactis adde thuris, iridis. aristolochiæ ana drach. 2. æruginis drach. 1. Aliud radicis anchusæ unc. 2. aloes unc. 4. utere arido. Hactenus experimenta ueterum, nunc ad recentiorum sarcotica transeamus. Aureum Mesuæ ita describunt. Ceræ unc. 5. resinæ unc. 3. terebinth. lib. 1. mell. sequunciam, mastichis, thuris, sarcocollæ, myrrh. aloes, croci ana drach. fiat unguentum. Aliter Mesue & alii, ceræ citrinæ unc. 6. ol. boni lib. 2. & s. terebinthinæ unc. 2. resinæ, colophonix ana sesquunciam, olibani, mastichis, ana unc. 1. croci drach. 1. utrumque sarcoticon est, & molliora corpora conglutinat: cera in eo liquanda est: liquata resina, colophonia, & terebinthina cōfundenda: depositis ab igne olibanum & mastiche insperguntur: postremo crocus in puluerem citius immiscetur. Fuscum Nicolai & croceum multa habent unde emolliant & concoquant. Unguentum paruum Ceraeos, Cratia dei, emplastrum de Ianua multa habent unde purgent & carnem gignant. Tetrapharmacū dolorem lenit, maturat phlegmonem, putredinem augere potest, siccare uerò & expurgare nō potest. Galenus locis aliquot Thessalum & Thessalios reprehendit, qui tetrapharmaco ut siccante, purgante, & incarnante uterentur. Quod si iure reprehensum fuit, in eandem causam incidunt, non modo recentiores medici, sed inter Græcos Actuarius, qui iam à uetere illa Græcia degenerasse, & Arabum familiis consensisse uisus est: inter Latinos Scribonius. Vterque enim uim incarnandi tetrapharmaco tribuit. Sed non ita absurdum uidetur nobis tetrapharmaco uim generandæ carnis eos assignasse, parte non admodum sicca, si modo è sicca pice, colophonia arida, adipe taurino, & cera non ita pingui confecerint: & in usu, rosaceo, myrteo, mastichino dissoluerint. Omnia ulcera perlsanat, artemisiæ, scabiosæ, absinthii, ormini, senecionis, tamarisci, apii, uerberenæ, pilosellæ, lanceolæ, pimpinellæ, linguæ canis,

Galeni.

Aureum  
Mes.Fuscum  
croceum.

Actuarius.

Scribonius.



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Diaireos.*

*Pulvis Rasis.*

*Lanugo linthei.*

*In fistulis.*

millefolii, chelidonix ana M. 1. ex omnibus, reiectis radicibus, exprimatur succus, cui adde ueteris axung. lib. 2. sepi hircini lib. 1. ol. lib. 2. mellis unc. 3. mediocriter bulliant, deinde in mortario pista uniantur. Diaireos. Sepi uaccini lib. s. ol. ros. unc. tres, cerę unc. 2. radices ireos unciā, unam, thuris, sarcocollę, mastiches, aloes, aristolochiæ ana drachmas duas, cum terebinth. unc. 3. fiat unguentum. Pulvis Rasis, olibani, aloes, sarcocollę, sanguinis draconis, radices ireos ana. Eodem modo cum mastiche, farina orobi, scenigræci, cicerum, lupinorum, thure & aliis sarcoticos pulveres confinges, quos subtilissimè teterere oportet, ne asperitate lædant. Itaque materia tunditur in pila, tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius cribratur: quicquid non transeat, repetitur in pilam, ac tandiu conteritur, dum ad extremum pollinem deueniat. Alia sarcotica per se induntur cauo uel penicillo uulnerario capta imponentur: in fistulas immittuntur clysterio, sed diluta: ab his thorulus mollis uino madens superdatur. Vinum sit è dulci austeriusculum: postremò omnia commode alligantur. Aestate bis, Hyeme semel in die commutantur sæpius etiam si quid phlegmones, doloris, aut casus generis eiusdem intercesserit. Linthei lanugo bene munda, impacta ulceri sæpe sufficit. Liquida uerò quę in fistulas danda sunt, ex incidentibus, molliētibus, & incarnantibus ferè comparantur, quale est in decocto centaurei, marrubii, apii, absinthii, ligni sancti, aristolochiæ ireos, althææ, maluæ, ficuum, passerum, tragacanthæ, in lixiuio, lotura calcis & acris metallici, aqua uitæ, sarcotici pulveres respurguntur: qualia sunt, radices althæę, exempto neruo unc. 1. ficus duę, centaurei, marrubii, absinthii, ana pug. 1. fiat decoctio: in decoctionis unc. 4. disperge pulueris ireos, mastiches, aloes, sarcocollę ana drach. 1. Sunt qui aliquid mellis rosacei, uel myrthei cōmiscant. Aliud uini albi odoriferi unc. 7. aquę uitæ optimę unc. 3. myrrh. aloes, sarcocollę ana drach. 2. thuris. drach. 3. seminis hyperici centaurei, millefolii, uerbanę, linguę canis, utriusque consolidę ana pug. 1. leniter



leniter bulliāt in uino herbe & semina: deinde exprimātur, affundatur aqua uitæ, reliqua trita misceātur. Fistulosos obstripet medicamēto ex acriuscula materia, ut ostreorū cinere, & axūgia uetere, ut incidat, molliat, discutiat.

*De Epuloticis.*

*Cap. II II.*

**P**Lenum ulcus clauditur cicatrice. Epuloticon siccatur, (sed citra morsum) atque hinc reprimat, carnem reficit cogit & cute operit: aut certe callo tenui qui cuti similis est. Ex quo siccare magis necesse est, quam quod uel carnem gignit, uel glutinat. At cicatrix nō aliter quam caro, naturæ opus est. Aliud uerò genus quod licentia epuloticon appellant, quia excrecentem carnem reprimat, acri natura & iam mordaci. Addunt & tertium genus, quod siccatur quidem, sed non adstringit. Cicatricem ducunt, Pompholyx, cadmia, cerusa, plumbum, ostrea usta & elota: ac pompholyx quidem lotus & cinis eius in iis quæ citra morsum siccant, præstantissima sunt. *Natura epulotici.* *Improprie dicitur epuloticon.* *Verus pompholyx.* Verus pompholyx efflari potest, colore parum candido atque liuescente, iniectus carbonibus auream flammam edidit: is iam olim Aetii memoria parum frequens erat, ac sæpius adulterabatur. E fornacibus ærariis facile parari potest, ubi tum flamma, tum uapor æris, testudinem elambit. Pinguis enim, candicans & tenuis fauilla inde extersa pompholyx est. Qui uerò pompholyx crustaceus conuexo quasi dorso asperior, & parte caua lenis est, colore modò nigro, modò cineritio, ad cadmiæ genus potius referri debet. *Cadmia.* Spodios quam uertunt cinerulam, è solo atque pauimentis fornacum æris euertitur. *Cerusa.* Cerusa plurimis locis Galliæ conficitur. Venetiis importatur quæ ferè candore uincit: ad cicatricem nihil fortasse melior est. Recrementum plumbi ustum, ac sæpius elotum, terra sigillata, bolus armenius, lapis hæmatites, antispodia bene lota, acribus fluxionibus & teneris corporibus omnia instituenda sunt. Asperiora sunt, galla, myrta, malicorium, alumen, æris squamma, chalcitis, misy, ærugo, uitreoli genera usta & elota. Et (quod *Fortiora epulotica.* in his præstantissimum est) crematum æs & elotum. Me

f 4 tallis



*Prepara-  
tio metallo-  
rum.*

*In quibus  
extinguitur la-  
uarique con-  
ueniat.*

*Squamma.*

*Aesustum.*

tallis acris excrefcens caro confumitur : uftis tan-  
tum uel elotis, aut utroque modo maceratis trahitur ci-  
catrrix. Sed folum ufta, lotis etiam acriora funt. Vrun-  
tur ea fictilibus crudis, dum percocta uafa funt : extin-  
guuntur uino : tunduntur in mortario affufa pluuia,  
mox ficcantur, cribrantur rariore feta, in mortarium  
aliquoties repetuntur, ne quid uel arenofum, uel fca-  
brum reliquum fiat. Abluuntur fæpius & torrentur, ea  
ratione quæ partim ex Diofcoride, partim ex Arabum  
commentariis petenda fit. Tertiò aliquando & quartò  
retorrentur, lauantur, in pilam reuocantur, ut ea cura  
melius mitefcant. In ulceribus quæ ægrè uix quæ cicatri-  
cem ducunt, tandiu elaborare metallica non oportet.  
In his enim femel cremata, femel uino, uel pluuia ex-  
tincta, ufurpanda funt. In callofis aqua maris uel ace-  
to extinguere melius eft. Si fanies acris eft immergatur,  
lacte, tenuiffimo liquore oui, rhodoftagmate : uinum  
fubaufterum conuenit, fi quidem copiofus humor allabi-  
tur. Atque hoc lauandis metallicis præferri debet, quod  
annis & qualitate medium eft: inutile recens, quòdque  
ærate, uel mordax, uel fugax & languidum eft. Aqua æt  
in calore ntilis eft. Nec alia ratio in lotura feruari dèt.  
Atq; ea arte tum ufturæ tum loturæ eodem medicamē-  
to excrefcentem carnem adimes : cicatricem mollibus,  
durifq; corporib. informabis. Malignis idonea funt far-  
cocolla, ichthyocolla, chryfocolla, quæ cruda, admodū  
acris eft, nifi fanie ulceris & forde diluatur : plumbum  
uftum cremata ftibia, plumbi recrementum, squamma  
ferri & ftomomatis. Aeris squamma præterquam quòd  
ficcat, etiam deterget, & pura ulcera efficit, quod reli-  
qua squammarum genera non præftant. Aes uftum car-  
nem exedit : uftum & leniter clotum duris corporibus  
epuloticon eft. Poterit autem urendo fæpius & lauando  
ita macerari ut etiam molli naturæ conueniat. Lenio-  
ra metallica, Pompholyx, fpodium, plumbum, atq; inde  
purgamentum, minns obtundi debent. Cerufa non eger  
uftura, & lotura fatis téperatur. Extergent, æs, eris (quā  
ma, ftibium, cadmia, uitrioli genera: ufta lotaq; acrimo-  
niam



niam deponunt: astringendi vim ad cicatricem retinēt. Eodem modo calce, ostreis, buccinorum cauis, & purpurarum, limacum testis atque testudinum, crinacei spiculis, calculis marinis & silicibus, vitis oibus & elotis utendū est. Ac breuiter quæ in sarcoticis efficacius siccāt, ad creandā cicatricem trāsferrī possunt. Omnia in cinerem trita specilli nucleo capiantur, & ita inspergantur plano. Quæ in cerato myrteo adhibentur leniora sunt. Acrīa verò excepta cera impingi possunt. Cera sequaci uti conueniet, alioquin ad ignem ē myrteo pista, molliēda est: quale hoc est: Cerae vnc. quatuor, manibus myrteo tinctis ignem molliantur, & cum æris usti, squamæ æris: & eruginis ana drach. 3. fiat platysma. Sed hoc & alia id genus malignis & contumacibus imperanda sunt. Ac ferē duplici ratione epulotica vsurpantur, quia alia in farinam trita inspergantur, catappalmata & epipasmata Græci vocant, alii xira & xiria & eppasta. Alia vero emplastro di firmo corpore ac tenacius hærente. Addunt alij & emmota mollioribus naturis, loci dolentibus aut inflammatis: quæ liquatis emplasticis confinguntur. Itaque ubi ægrius trahitur cicatrix, emplastica meliora sunt, quia diutius inhaerent, quod vim & celeritatem cicatricis adiuuat. Vlcus humidius aridis iuuatur: Molliora corpora linamento gaudent. Suauiora ferē, nec tam aspera, quæ vel emplastri forma, vel in linamentis adhibentur. Recens enata caro, neq; acrimonia rodi, neq; attritione irritari debet. Corpus ferē accipiūt a cera quæ pinguis sit, uel natura sua, uel quæ remollita oleo. Olea cōueniunt cōtrahente natura, myrtinū, fraxininū, melinum, terebinthinū, lētiscinū, mastichinū, rosaceum, omphacinum, uel in quo olea germina, cimæ rubi, cauliculi ulmi, salicis, & similū præcoxerint. Quale si desit, ad ea quæ siccant, decurrendum erit. Tale uetus est, & recens quidem, sed quod diu efferbuerit. Siccāt & alia, Raphaninum, Syerionum, Ricininum, quæque uehementer discutiunt. Iisdem generibus olei, crassiora pharmaca ad linamentum diluuntur. Quanquam in malignis non oleo, non aqua utendum erit, neque per se,

Vnde corpus epulotico.

neque



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Modus olei  
in molliēda  
cera.*

*In callosis  
labri.*

*Modus eo-  
rum quæ e-  
pulatoricon  
componūt.*

*In flaccidis  
carnibus.*

neque cum alijs: sed larigna uel terebinthina mollietur  
cera in qua epulotica concipias. Olei modus ad cerā, ut  
si decuplum, uel duodecuplum: copiosius tamē esse po-  
test, & parcius, ut cera mollis est & dura: ut sunt cor-  
pora dura & mollia: ut denique ulcera, uel facile uel  
ægre cicatricem trahunt. Labris tumentibus & callosis  
hæc adduntur ceræ, larigna, terebinthina, lanarum sor-  
des, medulla cerui & uituli. Quæ connexa nō solū emol-  
liunt, sed præterea efficiunt ut diutius hæreat pharma-  
cū, & tardius exarescat. Prouidendum autē, ne quod te-  
nelle carni pharmacū incumbit, ariditate scabrescat: ex  
quo irriter locum, & ante tēpus decidat. At diutius hære-  
re bonū est: ex quo tertio primum die, uel eo tardius ab-  
solui debet. E larigna & dupla cera ceratū cōfici potest.  
Minor sit medullæ modus & œsypi, quā resinæ. Metalli-  
ca quadruplo & sextuplo cerato capiuntur. In epuloti-  
co Zenonis quod à Galeno descriptū est, uicesima pars  
Galbani molliēdo scilicet, metallicis permista est. Verū  
præstabit callosa labra circulari malagmate circūscribi:  
mediam uerò carnem, cui cicatrix creanda est, epuloti-  
co induci. Alioqui platysma fingatur, quod malacticon  
sit, qua parte labra contingit: reliqua uerò epulotico  
pharmaco illinatur. Sed in callosis labris, si nihil mala-  
cticis efficies, ad ea quæ eczilotica inde appellant, ue-  
niendum. Extrema auxilia sunt ferramenta quæ exci-  
dant, & linum usurpatum Hippocrati. Flaccidis carni-  
bus balauftia, alumen ustum, quæque similiter contra-  
hunt, affatim insperguntur. Verū liberalius iniici opor-  
tet, ubi caro detrahenda est: parcius & in subtilissimum  
puluerem conleuata, atque acie cultelli capta, ubi cica-  
trice caro tegenda est. In calloso stupidiq; sensus corpo-  
re, si neque plethora est, neque cacochymia, acrioribus  
(idq; matutino magis) ad cicatricem uti licet. In alijs  
ulceribus, quæ leniant ideo miscentur, ut acrimoniam  
retundant. Ac iam progressā carne cicatricem trahente,  
oleum, adipem, resinam, ceram aliaq; id genus coniun-  
git Hippocrates, ut decora, lenis, non scabra duraq; cica-  
trix inducatur, idq; hyeme magis quam Aestate. Quæ  
molliora



molliora corpora colliquāt, durioribus cicatricem trahunt. Rursus quæ his carnem regenerant, mollioribus ferè epulotica sunt: & acria rosaceo cerato facta, cicatricem claudunt. Quodq; ante dictum est, tam possunt mā suescere lotura, quam suavis est cerusa. E sarcoticis scordio, carie lignorum, cortice radice capparis, irionis semine, iri, acoro, artemisia, dracūculi radice, aristolochia cypero, gentiana, & aliis epulotica fingūtur, multa astringenti materia: sed & ea myrteo cerato capta, epulotica sunt. Acriora quoque, ut calx uiua, arsenicon, ærugo, mollioribus sarcoticis ad cicatricem temperantur. Eodem modo alumen quod nimium astringit: sed hæc omnia propositis exemplis declarantur. Manna, thus, leuia sarcotica sunt: calx acrior: nec sine acrimonia squamma est. Ex his fit aridum Spodorides Asclepiadis, quod conuenit ulceribus quæ uix cicatricem trahunt. Calcis uiuæ drach. 6. mannæ, thuris, squammæ ana drach. 4. uel (ut Heliodorus) Calcis uiuæ, mannæ, thuris, ana 3. i. squammæ semunc. Al. Ireos, mannæ ana drach. 2. recrementi æris, squammæ ana drach. 4. Nomæ & putredines nisi uehementissimis, acribusq; pharmacis ægrè curantur. Qualia sunt, Sulphuris uiui, auripigm. squammæ ana drach. 2. æris usti drach. 1. Al. Sandaracæ semuncia, aluminis, myrrh. crocomagmatis, ireos ana semuncia, cyperi unc. 4. tritis utere. Fit autem crocomagma è croci drach. centum, myrrhæ, amyli, rosarum, gummi ana drach. 50. Siccant, nec ita stringunt, myrrha, sarcocola, argenti, spuma, ostrea, diphryges, ærugo, & alia quædam metallica. Spodios factitia (quod antispodion uocant) in epuloticis censetur. Cyperi radix in nimio humore cicatricem trahit. Cucurbita sicca, usta, humidis præputi ulceribus, nec adeò malignis utilis est. Ad eadem inueterata, anethi radix usta inspergitur. Abrotani radix eadem maligna iuuat. Amylum per se tritum, & cum tantillo aluminis, eisdem ulceribus prodest. Litargyrus duplo rosaceo uel myrteo coquitur, ac ne efferuescat, paulatim affusa rosaceo refringitur: ubi non inquinat, in eadem aqua subigitur, omnia uersantur mortario:

Quomodo  
è sarcoticis  
sunt epu-  
lotica.

Heliodori.  
Magni.

Cyperus.  
Anethi ra-  
dix & abro-  
tani.  
Amylon.  
Litargy-  
rus.



rio : rebellia curat & humida : loco rosaceæ licebit uti  
 aqua rhois (sumachum appellant) cornorum, spinorum  
 (quæ prunella uocant:) quanto coquetur diutius, tanto  
 siccabit magis. Hordeū combustum Chironiis inspergi-  
 tur, & quod inde cōficitur, *ἡ δὲ χρὴ*. Serpentina Chiro-  
 niæ, & quęcunque tardius cicatricē ducunt, persanat: hor-  
 dei cremati drach. 10. ærug. drach. 50. ceræ unc. 10. olei  
 mastichini unc. 9. ærugo ex oleo teritur, cera seorsum li-  
 quata cōiungitur: leniter coquuntur: refrigeratis hordeū  
 in mortario permiscetur. In summa quæ leniter siccant  
 & altringunt, mollibus torporibus & benignis ulceribus  
 conueniunt: durioribus naturis, nec ita mansuetis uitiis,  
 paulo ualidiora auxilio sunt. In ulceribus quæ pertina-  
 cius repugnent, ad metallica acria uita ueniendū. In ma-  
 lignis, chironiis & alioqui desperatis, crudis metallicis  
 & acris utendū erit ubi si nec his quicquā efficitur, fer-  
 ro & igne opus est. In dysepulosis fugienda malthacodi  
 mollia medicamenta: deinde malactica, adeps suillus,  
 oleū, cera, resina, ammoniacū, & similia: fugienda acria,  
 piper, sinapi, sed precipue ubi plethorauel cacochymia.  
 Ad hæc quę humectāt, ut aqua: quanquā nō ignorandū  
 ea omnia interim cōmisceri, uerū alia ratione quā ut ci-  
 catrice claudant. In Pamphilo Asclepiadis, metallica co-  
 quuntur hydrelæo, ex aqua interuntur, si sanies acrior,  
 si quid phlegmonis, si molle corpus est. In albis epulo-  
 ticis miscetur aqua, ut lithargyrus celerius eliquescat.  
 Verū eo usque coquuntur pharmaca, dum tota aqua  
 exhalauerit, atque ita nihilo ferē humidius medicamen-  
 tum est. Acria discutiunt, & contumacius uitium magis  
 edomant: malactica acrimoniam temperant & mollunt  
 callos. Quod si omnibus ritē institutis quę ad topica  
 remedia pertinent, nihilo magis cicatris inducitur: aut  
 si iam opertum, clausumque ulcus reseinditur, longius  
 requirenda causa est. Ac fere cicatricem tardant pletho-  
 ra & cacochymia. Copia phlebotomo deplenda est: ui-  
 tiosus succus pharmaco purgari debet. Quod si utrun-  
 que coit, neque in sola copia humorum, sed & in quali-  
 tate uitium est, primū quidem phlebotomo, deinde  
 purgante

*Hordeum  
 & inde ἡ δὲ  
 χρὴ.*

*Vitanda in  
 dysepulosis*

*Anaquare  
 cipiatur in  
 epuloticis.*

*Vnde diffi-  
 cilis ca-  
 rix.*



purgante pharmaco leuare corpus necesse est. Sed e varice uitiosa materia ulceri illabi potest. Vbi nō modo difficilis, sed etiam plena periculi cura est. Secatur uena, purgatur corpus eo pharmaco quod melācholicū succū una, & pituitam ducat: iusta uitæ ratio decernitur. Quibus si parum efficitur, emulgetur uarix, ac medius præciditur. Designāda prius uena est: atramento notatur, aut rubrica: sed ea parte præcipue, qua proxime radicē spectat. Hic cultello nudatur cutis, caro inciditur, molliter distinguuntur fibræ, atq; his omnino uulnerata caro explicatur: ubi specillo buxæo, uel eburno uti cōuenit. Ac iam nudo uasi culter lenis summittendus est, ut ab inferiore carne diuulsis fibris, uarix absoluator: hic uolsella religatur, quem acus cōuehat: supra funiculum phlebotomo pertunditur, ut reddat sanguinem quantum sit opus. Ex quo supra uulnus immissa acu ut prius, quæ filum ducat, præstringitur: hic iam uinculum inferius distringendū, attollendū mēbrum est, & sursum adducta manu qua uenę mēbri decurrūt, & per factū uulnus sanguis exprimitur, ita paulatim emulgetur uarix. Laxatū filum rursus obligatur, & media uena præciditur, qua parte utrinque funiculo illaqueata est. Postremo iusta ratione suoque tempore noua plaga sananda est. Quamquam aliquando contingit, ut iam rurato ueteri ulcere, maneat incurabile, quod ad uaricē est, nouo uitio subinde affluente. Aliis utroque ulcere persanato melancholia commota est. Atque uterque casus reuocato subinde phlebotomo, sæpius purgato corpore, iusta uitæ lege declinari potest. Hippocrates rudius, sed melius fortasse. Varicem, siue is sit euident, siue in carne teneatur, multis locis compungit, ubi opportunum uideatur, ac sanguinem nigrum exhaurit. Prohibet autem ut ne uicina loca quæ eodem uitio nigricant scalpro exasperentur uulnere illato, quod ægerrimē postea percuretur. Quod si ab hepate, liene, aut alia parte corporis ducta colluue in perpetua sorde ulcus est, necessariū parti remedium adhibebis. Ac uomica interior nonnunquam

*A partibus  
corporis tar  
dior circa  
trix.*

agit



# INSTIT. CHIRURGIC.

agit cuniculos qui in exterius corpus desinant, ubi ferè  
 sed multò magis prouectis annis desperatio est. Et ab ul-  
 ceribus externis in latera initio ducuntur sinus, qui etià si  
 lateant, produntur tamen, cum multo plus sordium col-  
 ligitur quàm ferat ratio & magnitudo ulceris, & pus a-  
 liud est, quàm natura partis gignere consuevit, serosius  
 scilicet aut crassius: quum denique qua parte subest cu-  
 nculus, aut scabrior, aut pallidior, durior aut mollior  
 cutis est. At specillo argento, vel cereo res tentari pòt,  
 ubi vel cauterio uel ferramèto cavitates detegenda est, nisi  
 uel profundior descèdat, vel grauior casus à ferro & cau-  
 teris metuat. Sæpe èt in uetusto ulcere, quodq; fracturæ  
 coniunctum fuit, os subiectum parte aliqua syderatum, lury-  
 dum, cariosum coalescit. Itaq; qua parte vitiosum os est, ab  
 radi scalpro, & cauterio inuri debet: malè compactum rescis-  
 so callo ad curam deintegrò reuocandum est. Reliquæ fissuræ  
 sedulo compingendæ, & ramenta maturè detrahenda,  
 si qua restiterint. Instauranda quoque ulcerum natura  
 & uicinæ carnis, quæ nonnunquam eò usque corrupta  
 est, ut uel frugi materiam alimenti possit corrumpere:  
 ut iam uicina liueant: nigra sint ulcera: modò uieta: mo-  
 dò callosa, cancrosa, putrida, uermiculantia. Quædam  
 igitur contrariis remediis deppelluntur: alia ferro per-  
 amputanda, alia igne affligenda sunt, sanguisugis affi-  
 xis scarificatu & corniculis exhauriendum uitium est.  
 Ac breuiter summouenda omnia, tum quæ cicatricem  
 prohibent, tum quæ eadem factam refricant. Legitima  
 uitæ instituta præscribi debent, uidendumque medico,  
 ne quid peccetur ignorantia, uel negligentia omittatur.  
 Lithargyrus per se inspersa, attrita operit. E uino uel  
 aceto teritur, siccaturque ad cicatricem ulcerum quæ  
 multo humore madent: elota mitissima est. Lithargyri  
 usus est in paruis ulceribus, in desquamata cute, &  
 prurigine. In his enim leniora remedia usui sunt: sæpe  
 etiam in subliquidis ceratis, quæ è myrteo, rosaceo, &  
 aliis id genus confingas. Tenuis plumbi lamina, plum-  
 bum ustum lotum, summo opere medetur cancri. Recre-  
 mentum plumbi, in æquali uino exactissimè læuigatur,  
 affusoque

Lithargy-  
 rur.

Plumbum



affusoque pari myrteo decoquitur, dum sit luti crassitudo, & aurium nariumque ulceribus accommodatur. *In ulcerib. sedis & narium canali cuius.*

Ulceribus sedis & narium, canaliculus è plumbo fingendus est, qui dehiscat foras: altera parte qua subit corpus in læuem ac rotundum quasi umbilicum desinat, atque hic centro suo angusto foramine pateat, qua uidelicet liberum iter aeris teneatur. Vtero similiter & aliis locis corporis quæ caua sint, conformari potest è figura partitis. *Cadmia.*

Cadmia cremata pluribus diebus læuigatur, ex aceto quidem in malignis: in aliis uino, modo giluo, modo è dulci austeriusculo. Atque sic elaborata incarnat, & cicatrice claudit. Lapis (quem calaminarem uocant) impetigines, herpetas, scabras pruriges persanat: fictili cremat, uino extinguit, & cadmiæ similiter elaborat. *Ladanum.*

Ladanum molle è uino uel salua pistum eleganter claudit, ea etiam quæ uix cicatricem ducant: Mirteo cerato duplo triploque iunctum, lene epuloticum est. Recens unguinosum est, & per se liquefit, myrteo exiguo interdum mistum. Aridum ætate, infriari potest. Ex scoria & squama æris fictili crematis, extinctis uino, ex eoque diutissime læuigatis, epulotica fiunt, quæ maligna iunent. *Ad maligna.*

Medium quoddam genus efficies mista lithargyro. In compositis auxiliis Galenus prætulit quæ è cadmia & ladanum conficiuntur: quæ cum multa sint, & uarie concinentur, pauca eaque paratu facilia describemus. *Ad media.*

Ceruse, cadmiæ ana unc. 4. ceræ, myrtini ana unc. 6. Al. Plumbi usti unc. 3. cadmiæ, æris usti ana unc. 2. colophonix, olei myrtini ana lib. 2. uini antiqui odorari, quantum sufficit. Cadmia, ut prius, elaboratur: usta, lota, diuque trita: præstabit quoque pharmacum, si reliqua duo metallica similiter comparentur: deinde colophonia & oleo una liquatis, sedulo misceantur. E ladano, quod prætumida ulcerum labra imminuit, callosa mollit, implet caua & cicatrice claudit. *E Ladano.*

Picis aridæ lib. 1. & semunc. æruginis unc. 3. æris usti unc. 2. squamæ rubræ unc. 2. & semiss. ladani unc. 9. litharg. lib. 3. olei. uini optimi ana lib. 2. & semiss. hoc est unc. 30. Lithargyrus oleo coquitur: coctione media reliqua metallica immittuntur, uoluntantur rude, dum

non



INSTIT. CHIRURG.

non inquinent: hic pix iniicitur: sublatis ac refrigerantibus, ladanum è vino tritum coniungitur: omnia conficiuntur in mortario: hoc & reliqua medicamenta quæ ficientur & non mordeant diutius coqui melius est. Adhibitur in platysmate, maligna iuuat, nec ante quartum diem exolui debet. Alia generis eiusdem secundo & quarto de compositione medic. κατὰ γένος. Sunt & hæc epulotica & maligna curant. Aeruginis, æris cremati ana unc. dimidium, aluminis drach. 2. ceræ drach. 10. mite scit ulla ærugine: trita omnia capiuntur cera præmolita igne vel cerato ex larignæ semuncia, & ceræ unc. 1. alioqui cerato myrteo vel rosaceo. Hoc ut optimo in malignis Gal. usus est, quod habet gris combusti, squamæ, æruginis ana drach. 3. trita omnia, ceræ pinguis 3. quatuor excipienda sunt. Alioqui mollior cera è myrteo modo in sole, modo igne. Ac ferè tripla cera est metallicis, aut quadrupla: nonnunquam æqualis est: constatque tantò forè acriora, quanto plus metalli, ceræ minus acceperint. Al. Squammæ, æruginis ana unc. 1. ceræ pinguis unc. 6. larignæ semuncia: iuncta omnia in platysmate adhibentur, quod vlcis locum, nec eo amplius circumscribat. Munienda uicinia iis quæ phlegmonem arceant: tertio quoque vel quarto die platysma reuellendum: hic autero vino fouenda pars est, & platysma, ut prius, apponendum. Reperuntur hæc dum cicatrix duci incipiat. In callis, resinæ loco, vel œsypo, vel medulla cerui præstabit. uti. Et hæc quidem è metallicis, duris corporibus & malignis vlcibus imperanda sunt. Plura quarto de compositione pharm. cata geni. Vapor è pastillis acris Andronis, Pasionis, è cinabrio vulgari aliisque id genus maligna iuuat, prius autè hæc suis sordibus expurganda sunt. Leue est, cerusæ, lithargyri ana lib. 1. olei myrtini lib. 2. ceræ lib. semil. terebinth. unc. 3. aluminis unc. 1. piperis semuncia vel paulò minus: leuius erit, si sesquunciam thuris addideris. κατὰ γένος clementius quàm quod paulo ante descriptum est. Singulariter facit ad ambusta: Cerusæ unc. 5. al. unc. 6. & drac. 2. Litharg. unc. 5. hordei tosti. unc. 15. al. unc. 5. id.

*E metallicis*

*Galenus ad  
maligna.*



(idq; melius) cere un. 5. alii un. 15. (sed maior hic modus est) ol. rosacei, uel myrtini un. 15. alii un. 18. metallica è uino terito: cerâ cū oleo liquefactio: hordeū cribratū in spergito: omnia coquito, excolato, in mortario cōficio. In ambustis, alba meliora sunt, quę thus, neq; resinā accipiunt, in iis præcipue quę aceto cōstant: piper additum cicatricē accelerat. Paratur facilè, & mirabiliter iuuat. Ambusta. Aluminis 3. dimid. in uini, aquæ pluuię unc. 9. diluitur. Lintheolum uetus, sed bene mundum aqua inculcatur: hocq; arefactum sole depestitur, & concerptum imponitur. In sedis, oris & genitalium inueteratis uitiis, uino uti melius est: aqua uero pluuia præferenda, quæ in cauis ulmi uel quercus resederit. Al. Alumen nucis magnitudine teritur, & cum 3. 3 mellis myrtei uel rosacei coquitur, aut fictili crematur, ad eadem uitia. Aliud, in quo ueterum & posterorum consensus est: Lintheolum aqua illa uel uino madens, & expressum, molliter apprimendum plano, cui deinde pertenuem plumbi laminam induces & alligabis. Al. sine morsu siccatur, & ægrè trahentibus cicatricem conuenit. Cerusæ drach. 2. gallæ, myrti, recrementi plumbi ana drach. 1. fiat puluis. Aliud. Litharg. cerusæ ana lib. 1. coquatur in ol. albi lib. 2. aquę purissimæ se libra, dum exhalauerit aqua, & purum phar macum constiterit: purus sit ignis, & serenus aer, ubi medicamentum incoquitur: liquatis & ita coctis, adde terebint. uel (si rebelles ulcus est) lartignę unc. 2. uel unc. 3. ceræ albæ unc. quatuor, uel unc. 6. Nam ut augetur resinæ modus, ita cera augenda est. Postea uerò quā omnia coierint, adde thuris semunciam, pompholygis, ostreorum, cadmię ana 3. 1. hæc in cinerē usta lauatur aqua, si sanies acris est: marina uerò uel aceto, si labra ulceris in callum extuberant. Inopia marinæ, subduplum salem aqua diffundes. Quod si multus humor affluit, uino albo pel lucido leuiter astringente, metallica lauabis. Miscen tur autem his, cadmia, pompholyx, cerusa, lithargyrus, ostrea, buccinorum inuolucra, os sepiæ, calx & similia, quia præterquam quod epilotica sint, album colorem iuuant, qualia fingi uoluit antiquitas. Calx septies Calx  
g lota,

*Cerusæ.  
Albugal.*



lota, è rosaceo vel aqua diluitur, exponitur soli æstu me-  
dio, subinde reuoluitur, teritur, abluitor: quū iam satis  
lota tritaque exaurit, è rosaceo pinfitur, imponit, cicatri-  
cem ducit: vlcera neruorum maligna iuuat, & ambustis  
auxilio est. Sordes quę in ampullis lucernariis subsidet,  
vlcera quę mediis digitis excitantur, alopecias quoque  
adiuuat, dia chalciteos ex austero, rubroque vino subigi-  
tur: deinde emollitur oleo melino vel myrteo: rosaceo  
etiā, si quis rubor calorq; in oris vlceris existit: alioqui  
crassius in platysmate inducitur, vt vicina cōprehendat,  
qua videlicet metns est, ne quid humoris affluat. Albū  
Actuarij capite de repellentibus descriptū, epuloticon  
est vt quę emplastra alba è cerusa fingunt, quale hoc est  
nō ab simile albo Galeni. Cere 3. 4. rosacei libr. semiss.  
terebinth. unc. 3. cerusę unc. 2. litharg. vnc. 1. thuris, cine-  
ris ex cochleis crematis ana semunc. cera, oleum tere-  
binth. simul funduntur: reliqua miscentur, uersantur o-  
mnia, & in mortario vniuntur: Aliud leuius, Cerusę  
vnc. 1. litharg. semuncia, aquę rosarum sesquunc. rosa-  
cei lib. 1. metallica trita in mortario fortiter perfrican-  
tur pistillo duro: quod quum fit, deinceps ac paulatim  
liquida affundunt. Albū Rafis: Olei rosacei lib. 1. ceru-  
sę vnc. 1. cerę unc. 2. caphurę drach. 1. albumina ouorū  
tria: melius fiet cū semunc. vel drac. 6. litharg. leue est &  
magis conuenit vbi calor, vltio, excoariatio est. Cerusa p-  
se in pari rosaceo cocta ambusta iuuat, & atrita. Ad eadē  
facit vnguentum de cerusa. Alij ex rhodostamate ceru-  
sam terunt, vt sit liquidū mellis crassitudo, quod in calo-  
re, in paruis inflammationibus quales ad nasi pinnas eue-  
niunt, vtile est. Trita è uino humidioribus vlceribus cō-  
uenit, per se ambusta curat: permista butyro, mollit, co-  
quit, cicatricem claudit. Epulotica, sunt, vnguentum  
desiccans rubrum, unguentum de plumbo, & alia. Pul-  
uis epuloticus balaustrorum, sāguinis draconis, cadmię,  
argēti erisvsti loti ana fiat puluis: duris corporibus cōtu-  
macib. vitiis & nimis humidis, vtilis est, utraq; plātago  
cum radice siccat umbra, trita ad cicatricē inspergit. Tri-  
pharmacū, quodq; huic simile ex litharg. & oxelao, in  
glutin

Album  
Actuarij.

Albū Rafis

Cerusa.

Vnguenta  
epulotica.

Plantago.



glutinantibus describetur, epulotica sunt. Nutritum quoque quod à Rasi & Auic. hoc modo fit. Lithargyrus in pollinē trita, & aceto & rosaceo diu uersatur in mortario (ut quidam uolunt) plumbeo, pistillo plumbeo: modus est ut inde crassior fermentetur, & exurgat. Sunt qui addant sextulā æris usti, uel cremati plumbi, aut tādē aluminis, balaustrorum, rubig, sanguinis draconis, cadmiæ argētī, caphuræ: idque singulari ope in malignis & ptinacibus uitis. In cancrofis cerusā permiscet pistillo & mortatio plumbeo. Alij hoc modo, Litharg. cerusā ana. unc. 2. terunt in mortario, uniunturque ex olei myrtini uel ros. sesquunc. Sunt qui olei prius circumgant in pila plumbea, & radio plumbeo concutiāt dum crassescat, & nigrius euadat, ut olim Apollonius. Alij sic unita, omnia, olla noua urunt, puluerem reponunt: mirabili remedio ad cancrofa, malignaque sedit & genitalium ulcera. Alii loco olei succum acetosæ, solani, polygoni, plantag. omphacis & similium, eo modo exercent plumbo, & metallis ad uisurā iungunt. Quidam etiā theriacam addunt, & una cum aliis cōcremāt. Frequentissimus etiam usus est pompholygos: siue uetustas, siue posteritas utraque salubriter usā est. uritur pompholyx & in cinerem resoluitur: in solani succo, rhodostagmate, & aliis generis eiusdē diē integrum macerāt: tum pistillo plumbeo in plumbeo mortario die exercetur: bis ī die inseritur cancrofis ulceribus & malignis: Qd̄ at pharmacū diapōpholygos īde cōficiūt, variē describunt. Aliter n. Oribas. Paulus, Aetius, aliter quoq; Arabes. Sed hoc maximē epuloticon est. Pompholygis, cerusæ, litharg. ana unc. 1. Ladani unc. 2. acaciæ unc. 4. ceræ unc. 3. myrt. unc. 8. ouorū affatorū uitellos 9. metallica ē uinoterito: cerā cū oleo liquefacito, ex qua ladanum & acaciā cōmisceto: deinde uitellos & metallica in mortario reliquis cōiungito. Simile ferē qd̄ sequitur, cerusæ, litharg. pōpholyg. an. 3. 2. cadmiæ 3. 4. medullæ cerui unc. 3. ceræ, ol. rosacei ana lib. 1. myrtini selibra. Liquefactis aliis metallica ē uino trita pmiscēt. Hoc cācerosis conuenit, pueris, eunuchis, mulieribus, atque omnino

Ad caneros  
pudendorū.

Pōpholyx.



mollibus corporibus, ubi cicatrix citra dolorē ducenda est. Nicolai. Olei rosarum 3. 10. ceræ albæ unc. 5. succi expressi è granis solani unc. 8. cerusæ lotæ unc. 4. plumbi usti, tutiæ ana unc. 2. thuris unc. 1. oleū cū succo decoquito, donec expirauerit succus: deinde cerā oleo confundito, reliqua in farinā trita, in mortario p̄misceto, omniaque diu circumuoluito. In putridis & cācerosis, ubi feruor, aliquis est, summa fiducia usurpandum est, q̄ nulli ceterū cōpositionū cedit. In corrodētibus & inflammatis ulceribus, succo seridis subigunt. Liquido cerato rosaceo emolliunt, immittunt tubulo, ad rhagadas & alia id genus: in callosis, lini succus & adipēs misceri possunt: ac inflammata, croco & uitellis oui intingit. Atq; hæc sufficiant. Reliquum uerò genus est eorum quæ excrescentem carnem detrahant, de quibus capite de Picroticis abundè differetur. In cicatrice uitia sunt quia excrescit, q̄a caua est, quia deformis, durior, scabrior, mollior, & maior est. Excrescit parum siccato purgatoque ulcere. Caua est nimium siccato, & ante tempus indutis epuloticis, uel quia pars subiecti ossis igne absumpta, sublata ferro, aut abscessu excidit. Deformem facit futura frequentior & inepta, maior incisio & alia quæ uel cauā, uel eminentem efficiunt. Durior est, nimium siccātibus medicamentis, nec lenientibus tempore immistis, q̄, ut ante scriptum, præcepit Hippocrates. Mollior infra modum siccato ulcere. Excrescens cathartecis reformatur, scarificatur, absumit. Caua refricāda & exsterenda, ut q̄ desit aggnat. Mollior siccāda, est. Deformitas molliētibus, leniētibus, discutiētibus, exedētibus, quoq; & cathartecis, aliquādo ēt astrictione medicamentorum corrigit. Ad hæc omnia materia suis locis descripta est. Epuloticis utimur iam pp̄e pleno nondum tamen adæquato ulcere. Celsus linamento è frigida presso, primum integit: deinde ubi iam æquata cuti caro est, sicco utitur. Ac bene fiet, si in frigida illa alumen maduerit: & q̄ inseritur siccum in eadem mersum, exaruerit. Et hæc quidem in leui ulcere faciunt satis. In maligno, bene puro lintheolo sinum molliter extergebis.

uitia cicatricis

futura frequenter et inepta facit cicatricem deformem:

cicatrix exulcerata quod reformat

Quando epulotici resus, et ratio uendi.



## LIBER II.

bis: epuloticō induces q̄ plurimū siccet. Et q̄ ferē aliqd  
 à calli labris cōcreuit, oras ulceris pharmaco circūscri-  
 bes q̄ attenuet. In dolore, rubore, phlegmone, & rheu-  
 mate, parygro recēti utēdum erit uel diā chalciteos liq-  
 do in platylmate. Attenuans platysma æquali lintheo  
 cōtegitur, ex quo splenium superdatur, expressum fri-  
 gida, aliquādo vino. Ac frigiditas splenij, subinde refuso  
 frigido liquore cōtineri debet: postremò fasciæ cōmo-  
 dē alligādē, quas tertio primum die absolues. Hic molli  
 flocco saniē detergebis, & priorē curā oīno reuocabis, ē  
 renata uel retento, uel mutato cōsilio. Recētiore vino  
 calido, cui balauſtia cōcoxerint, aut similia, vlcus fouēt: *modus uic-  
trix adinectio*  
 alioquin aqua, si quid caloris est, quæ uim aluminis cō-  
 ceperit, Ac sit octupla aqua allumini. Sed in calore aſtri-  
 ctio suspecta est: molli vellere humorem sorbent, phar-  
 macum imponunt, superdant stuppas vino madidas, uel  
 aqua: omnia glutinātibus fasciis constringunt, non iis  
 quidem quæ ita contrahant, ut ē rotundo oblōgum fiat:  
 nisi cauitas super sit, & vnā cures, ut & glutines & cica-  
 trice claudas. Galenus interdixit aqua, ut ne nudum ul-  
 cus contingeret. At in calore & iam pcedente cicatrice,  
 non adeo nocere potest. Cicatrix (si quidem naturaliter  
 ducitur) in ambitum ulceris sanis partibus primum cō-  
 crescit, deinde paulatim ad cētrū progreditur, postremò  
 in ipso centro coalescit atque perficitur.

### De glutinantibus. cap. V.

**L**ongius fortasse quā res postulabat, de glutinanti-  
 bus sermo dilatus est. Verū ita nos coegit, traxit-  
 que consequens medelarum ratio: nec alius obtigit lo-  
 cus, in quo de illis orationē commodius institueremus.  
 collotica Græci uocāt, symphyatica & traumatica. Qui-  
 dam etiam enemās & peculiariter quæ cruentis uulneri-  
 bus adhibentur. Siccant hæc omnia ad secundum ferē  
 gradum, media natura inter ea quæ ad cicatricē ducunt,  
 & quæ carnem regenerant: non detergent, sed astringūt  
 prohibentque ne quid humoris ulcerū labris obuēniat.  
 Nec in cruentis solum usurpari solent, sed ad sinus, fistu-  
 las, maligna uetustaq; Vlcera transferunt. Opitulant̃  
 celerius,

*Facultas  
glutinatiu.*



INSTIT. H CIRURGIC.

celerius, si integra partium natura est: si paucus sanguis idemq; purus affluit: si non abrasa, non præcisa, sed uel salua, uel parte aliqua etiamdum hærens cutis est. Et enim cum subiecta carne naturalis quædã amicitia conit ut ægerrimè sanescât quibus omnino illa excidit: facillimè ubi incolumis seruata est. Mirum qđ præcisa, sed loco suo reddita, coalescit, recipit spiritum, & quasi mortua reuiuiscit: quodq; e plaga liuore ducto, nō in iuuenesolo, sed etiam sene uiuendum colorē recuperat. Magna igitur cutis habēda ratio, neque ob id solum, quòd inde celerius glutinatur uulnus, sed quia interiecta cute plurimis iuuatur, quæ nuda caro nō perferat. Nudum ulcus lintheo, lana, spongia irritatur: medicamētis paregoricis sordes colligit, uellicatur catharticis, iuuatur oībus, si familiari cute quasi propugnaculo obtectum est. Ideoque & abrasa cutis & pendula, suo loco inducatur, & reducta molliter apprimat: sic enim ulceri celerius conuescet. Neque desperatur quæ suspensa, iam liuida aut nigra est, etiam si eo abscessit loco, ubi os sine carne uel cartilago subiecta est. Ea enim uel in hoc acerbo casu suo corpori reconciliat, & uitalē spiritum recipit: quod in genu & nuda carne tibia, in gibbero ubi tātum subiecta cuti mēbrana est, experiri licet. Idque fieri tū aliorū pharmacorum ope, p̄didit Galenus, tum celebri illo qđ Heræ & Attalo attributum est. Describit hoc libro primo de cōpositione pharmacorum cata geni titulo dia pī pereos Attalo & Hera authoribus, & paulò post in Albis Asclepiadis. Asclepiades Pamphilium uocauit: lam vero & labra ulceris animaduertēda sūt: quia uidelicet alia contracta, alia euersa, plurima dehiscunt. Quas formas ulcerum in uario labiorū motu percipias. Os enim commissis labris interdū clauditur: nōnūquam illa diducunt, ut sit hiatus. Aliquando quoq; aliter deformatur, quia alterū retortum labrum & euersum: alterum in os reductū uel utraq; mō intrò modò foras replicata sunt. Ad contra- Contracta labra ulcerum specillo uulnerario molliter Et labra. disiungenda, & utrinq; abductis fasciis ut extra ulnus magis cōstringantur, separanda sunt. Colligenda uerò quæ

Labrorum  
ulceris ra-  
tio.

Ad contra-  
Et labra.



LIBER II.

52

que plurimū hiant, à sanis partibus ineunte fascia, que  
 vt ad oras vulneris, ppius accedit, ita firmitus astringat,  
 ea scilicet rationes vt ne nimīū cogendo, nimīū compri-  
 mas, & dolorē gignas. Everso tantum altero vlceris la-  
 bro hin linthea abduces, & in alteram partem quasi tra-  
 hēdo volutabis. Si vtrunq; evertit, ea q̄ ἐκδοῖται ἀρχῶν  
 ἐπιδείκνυται vocāt necessaria est. Atque hæc labra flaccidis,  
 callosis, muccosis & cācerosis vlceribus magnis eueniūt.  
 lā verò glutinatio fit, vel innata carne (sy sarcosin Græ  
 ἀ vocāt) vel eo que illi ἀ γρηΐσμον, nostri infibulatio-  
 nē appellāt: deinde ēt catā raphin futura. postremò κατ'  
 ἐπίδεικνυται fasciis obligatis, quam deligationē vertunt. Sed  
 omnino vt vulnus glutinetur, enato corpore, religatis,  
 vt prius, & inter seplexis carnum fibris coire necesse  
 est. Id quod fibulis, acu & fasciis sæpenumero admatu-  
 ratur. Ac ferē ut sunt ulcera & partes, ita remedia di-  
 stinguuntur. In paruo ac recenti ulcere fasciola in or-  
 bē nexa satis esse potest: & quæ cultellis cibariis fiunt,  
 solo suctu q̄ partes colligat, sæpius coalescunt. alia uul-  
 gaci terebinthina illita (que abietina potius uocāda est)  
 & iniecta fasciola celerrime cōmittuntur. Verū nullū  
 omnino vulnus uel minimum, etiā si acus minima pupu-  
 gerit, cōtemni debet, multo minus, si uel plethora, uel  
 cacochymia, uel deniq; sensus acrior in metu est: alioq;  
 dolor, phlegmone cōuulsio ad exitium sequi consuevit.  
 Itaq; statim initio relicta glutinādi uia, paragoricis utē-  
 dum erit: quæ dolorē leniāt, & à phlegmone uindicient  
 partē, donec omnia pericula abiisse uideantur. Ac ferē  
 quinto & septimo die grauiores casus sese proferunt,  
 quos quum æger saluus euasit, & omnia tuta sunt, deter-  
 sum siccaturūq; ulcus glutinabis. In maiore uulnere ma-  
 iora remedia quærenda sunt, deligato, futura, fibula, me-  
 dicatio: ubi medicamentum quoq; siccare magis necesse  
 est, hicq; audiēda sunt magnum & paruum in sectione,  
 non quorundā ueterum opinione, qui ἐπικαιρον, in signe  
 uulnus ē natura loci: μέγα, magnum ē periculo definiūt.  
 In glutinando distinguī debet natura corporum: quia  
 uidelicet (ut loquuntur illi) aliud δυσελκίς, quodque

Quatuor ra-  
 tiones gluti-  
 nandi.

Nullū uul-  
 nus uel mi-  
 nimum con-  
 temnendum.

medic. parago-  
 rica que!

In maiore  
 uulnere.



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Ratio glutinandi.*

*Aqua et acetis usus.*

*In transverso.*

ægrè coalescit: aliud *vulnus*, in quo vulnere celeriter coniunguntur. Vulnere rotunda non facile glutinari, nisi in longitudine diffecetur, testes sunt, Hippocrates, Aristoteles, Gal. Cassius & alii medici veteres. Mentigino sa corpora, ruffa, cacochema tardius sanescunt. Ac breviter difficultas nascitur ex iis, quæ in rebelli ulcere proximo capite tradita sunt. Ad hæc externis casibus, culpa medicorum, ægri & eorum qui ægro inseruiunt. Primum igitur in cruento vulnere (si quidem neque profundum est neque hæmorrhagia exitit) molli tomento, spongia, paniculo detergendus cruor est: atque illa prius inculantur frigida, & expressa adhibentur. Patroclus apud Homerum Eryphili vulnus tepida extergit, rudius quidem, quod postea ab Hippocrate interdictum fuit. Quod si altius descendit vulnus, erupitque sanguis, aceto magis utendum erit. Sic enim grumos incides, & sanguinem cohibebis. In nervis ab aceto metus est, nisi servata tenuitate, frigiditatem eius exolvas. Ideoque specilli extremo lintheolum alligabis, quod vel sapa, vel melicrato madefacies. In lacunis & ulcere veteri ubi glutinandi tempus accesserit, vinum & ænomeli idonea sunt. In mulieribus, pueris, eunuchis atque id genus corporibus, tum alias, tum maxime vulnere capite, aceto abstinemus. Idem aperto perioestio relinquendum est. Aceti loco, vino & ænomelite floccum intingimus, exprimimus, & cruorem inde extergemus. Atque ubi is rite deterfus est, nihilque labris ulceris intercedit, qualia sunt grumus, pilus, oleum, pluma & similia, sequitur ut latera lateribus, oræ oris, rite coeant. Ponimus autem neque dolore, neque phlegmone, neque ullo alio vitio ulcus laborare: ac iustam carnem lateribus vulnere interesse. In rectis vulnere labra facile adducuntur, multo magis si molle corpus est: & adducta fasciis continenda sunt, ex duplici initio, alioqui simplicibus: sed sutura interdum addita, & fibulis. In transverso vulnere oræ dissident magis: quare suturis & fibulis opus est. Atque has figuras vulnere ex fibrarum cursu quæ musculos intexunt, distinguere oportet. In magnis & profundis vulne-



uulneribus uincula ex duobus initiis necessaria: eadem quoque in latis & profundis: sed hæc præterea altis futuris cogenda sunt, neutra uerò præpropere glutinanda, ne quid reliquum fiat, unde postea recrudescant. Fascias autem austero uino & nigro maduisse iuuat, quod in cæteris uulneribus præferendum est: quia repellit, phlegmonem prohibet & cogit. Quin & aliquod eorum quæ cōtrahunt, licebit incoquere: sed modus sit ut ne nimis adstringendo, moueatur dolor. In molli parte, extrema auricula, imo naso, fronte, bucca, palpebris, cute gutturis, uentre, membranis quæ non sunt tendines, sutura cōuenit. Præputium assuitur & infibulatur ut carnosum genus, ubi nimium dehiscit, nec oræ faciliè coniunguntur. In capitis uulneribus extrema cutis, tum suturis, tum fibulis committi potest. Cartilagine auris effractas Archigenes fibulis continebat, & argilla cauum auriculæ implebat ne cōcideret. Alii diuisas partes eiusmodi, primum quidem digitis committunt: deinde guttine, uisco aliisq; generis eiusdē in breui platysmate quasi ferunt ruminant. Sed quæ uiscida impingas, glutinare præstat, ut non solum contineant, sed diuisas inter se partes concilient, atque conglutinent. In particulari materia eadē seruatur ratio quæ iam sæpius in aliis generibus pharmacorum præscripta est. Eaque seligenda, ut sunt partes, ut molle durumue corpus: ut recens, uetustum, paruum, magnumque uulnus est: quod in fasciis, fibulis, suturis similiter distingui debet. Ac præcipua ratio haberi debet in uulneribus, quæ in uentres corporis penetrant, aut alioqui multum profunda sunt, ut ne commissæ parte quæ exterior est, interior distincta inglutinataque maneat: ut si hæc quidem glutinatur, infirmior tamen sit cicatrix atque unitio, unde & suppuratio intus colligatur, soluta cicatrice, & exteriores oræ resoluantur, quod monuit Hippocrates, Glutinandi uim habent ebulus, sambucus, syderitis, palma, pini, tædæ cortices: dracontii folia recentia, herba quæ fraga gignit, anagallis, salix, androsæmum, allragalus, phlomisculus, telephium, symphytum petraeum, aranea tela, sed ea præ-

Particula-  
ris materia  
quæ seligen-  
da.

tela aranea



INSTIT. CHIRURGIC.

*Equisetū.*

*Chamepy-  
tis.*

*arnoglossae  
uirtus:*

*Spongia, etc.*

*Isatis  
Centaurii  
minus.*

ea præcipuè cui è pistrino farina infederit. Equisetum maxima vulnèra, præfectos etiam nervos conglutinat. Coccus baphicus ex aceto pistus ingentia vulnèra coniungit: cum oxymelite diuisos nervos cõciliat. Magnis quoque vulneribus Chamepytis idonea est. Arnoglossum quadam temperaturæ symmetria iungendis veteribus lacunis, atque recetibus vulneribus, nulli remedio rum cedit, Rebellia, rheumatica, putrilaginosà vlcerà, & in dysenteriis facta percurat. Eaq; omnia, quia cõuenienter refrigerat, siccatur, adstringit, nec mordet: leniter digerit & exterget. In humidis vlceribus, & partibus quæ natura sicciorè præditæ sint, tota herba cum radicibus siccatur, tritaq; inspergitur: eidem rei per se com modum semen est. Spongia, lana succida, lintheolum, immerguntur aqua, aut vino potius: vel si profluxit san guis, oxycrato: ad hæc liquoribus aliis quæ contrahant: deinde expressa vulnèri colligantur. Querna folia tri- ta in læui petra, uulnèri securi facto, Galenus apposuit, ut etiam uicina comprehenderent, eoq; remedio glu- tinauit: ea ipsa uino conspergi possunt. Caseus recens & oxygalactinus, Isatis satiuà, nervos præcisos & tendines in fine musculorum iungunt, & duriora corpora conglu- tinant. Centaurium minus, foliis & floribus ulcera ma- gna coniungit: arefactum collicicis miscetur, multò ma- gis si rheumaticum ulcus est. In quo genere præstantissi- ma medicamenta sunt, quæ ualde siccant, leniter adstrin- gunt, ut non mordeant. Pentaphylli folium nervos ad- iuuat, cum melle tritū. Ad ulcera capitis, myrrha, aloë, terebinthina, asis alliis tritisq; farina tostī hordei & milii. Mummià utendum est. Calamynthæ succus mem- branis uulneratis infusus, egregiè glutinat. Sed hoc & si milia, acriora scilicet, quæq; uehementer siccant, Me- getis sunt Sydonii & Eudemi, qui in membranis cere- bri, acribus, mordentibus, oxymelite, aliisque generis eiusdem usi sunt. Milii farina iisdem uulneribus insper- gitur. Resina, pix sicca, amurca cocta, duris corporibus adhibenda sunt. Pix humida, minus quàm sicca mordax: hordeum ustum, aloë ex aqua trita: herbæ folia & suc-  
cus,

*Isatis est herba quæ quando appellatur*



cus, quam ex India comportant, & patrio nomine *Zambana*. *Zambana*.  
 banam appellant. Aloe vulgaris est quæ tenaci uita in  
 multos menses uiget: è laquearibus ædium & tabulatis  
 magna uiroris cōmendatione suspenditur. Constat hoc  
 remedium certo experimēto nautarū. In colleticis quæ  
 ad manum sunt, præcipua laus attractylidi. Eius cacumi *Attractylis*.  
 na austero uino uel oxycrato incoquantur: excipitur  
 concha, quod enatat oleosum. Eadem quoq; in reticulū  
 data, quod duabus ollis argilla iunctis, eliciendo oleo  
 intercedit, oleagineum liquorem reddit. Atque ollam  
 superiorē igne cingi, inferiorem terra defodi, reliquaq;  
 omnia ea ratione comparari oportet, quæ superiore li-  
 bro præscripta est. Cuidam decifus nasus, quæ os in car-  
 tilaginem definit, Rusticus propendentem partem alte-  
 ri digitis coniunxit, herbam tusam, & è uino nigro tri-  
 tam, quod millesfolium appellant, impegit, rudius om-  
 nia colligauit, unde celeriter restitit profluens sanguis,  
 & uulnus pulchra cicatrice breui coit. Folia hederæ *Hedera*.  
 recentia in uino cocta, grandia uulnera coniungunt,  
 & maligna sanant: atque inde succus, tum per se, tum  
 rosaceo temperatus (si quidem acrior uideatur) narium  
 ulcera & aurium percurat. In ulmo multa sunt quæ lau-  
 des. Decocto ulmi compingendis fractis ossibus, uete- *Ulmus*.  
 res usi sunt: eiusdem cortex & folia adalligata, glutināt,  
 & ambusta iuuant, ut sine manifesta cicatrice coisse ui-  
 deantur. Teruntur folia: cortex ueluti fascia obligatur.  
 Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, exterit, delet  
 papularum uestigia, & artificialibus balsamis commi-  
 scetur aqua, quæ ulmi folliculis includitur, bene purga- *Aqua in folliculis ulmi*.  
 ta uermiculis. Ea Crito usus est ad Lichenas. Balsamo  
 quodam raro & pretioso principes utuntur glutinan-  
 do. Sunt qui eam aquā quæ castratis uitibus exudat ue- *Aqua uitis*.  
 re, lenticula uitrea excipiant: uas operculatum sedulo  
 clausumq; annum integrū exponunt soli, loco subdia-  
 li, sed qui ab iniuriis cœli tutus esse possit: ac lenticulā  
 ad solem subinde uertunt, ut undequeque radii euerbe-  
 rent, & aquam coquāt. Melligo tandem cōcrescit, quæ *Ampelostagma*.  
 sit balsamo uiribus æqualis, empelostalagma ex analo-  
 gia



Galen  
pharmaca.

Tripharma  
cum.

Nutritum.

gia (si uis) appelles. Duriorum sunt corporum, sorbus, me-  
spilus, piraster, quercus, & quaecunque acerba sunt. Si-  
militer quernis foliis comparanda sunt. Addunt bolum  
armenum, terram sigillatam, & similia. Composita sunt,  
cerati myrtini unc. 3. cerusæ un. j. uetustaglutinat. Aloe  
arida ænomelite coquitur, linamentum inde tinctum  
uulneribus capitis inferitur: phlegmonem prohibet &  
iungit. Galenus mollioribus naturis pharmaca tempera-  
uit ex lithargyro, oxelco & ænelæo: durioribus ex æ-  
ruginè, bitumine, squamma, aloe & myrrha. In quibus  
quia bitumen præcipitum uim habet, uerum friabilius,  
est, quam ut solutum oleo emplastrum reddat, cera quo-  
que ad corpus una temperatur. Sed oleum & cera uim  
bituminis exoluunt: ideoque squamma additur, ærugo,  
& alia: atque hinc uocata barbara comparantur. Fistulas  
expurgat, glutinat, priusquam occalescant, & cicatrice  
tegit: induratis musculis utile est. Litharg. unc. 4. olei  
& aceti ana lib. i. uel paulò minus: coquantur omnia  
dum omnino combibitum oleum, acetum uerò expiras-  
se uideatur, nec iam inquinet, & nigro splendeat. Ace-  
tum sit acerrimum, pellucidum, ex uino factum non  
aquofo: oleum uero antiquis simum. Hoc parabili auxi-  
lio Galenus parotidas criticas, quæ iam fistulas trahe-  
rent, in pueris, adolescentibus, mulieribus, sæpius cura-  
uit. Siccat sine morfu, ulcera difficilia persanat, cruenta  
glutina, omninoque ulcera magna paruaque, iuuat, dum  
ad cicatricem perueniant. hoc emplastrum alii nigrum,  
alii unguentum de lithargyro coctum appellant, nec à  
Tripharmaco Mesuæ alia re differt, quam quòd plus  
habet aceti & olei. Recentiores enim parem aceti mo-  
dum & Lithargyri: duplum oleum commune uel rosa-  
ceum commiscunt. Differt autem à Nutrito, quòd aliud  
est, ex quo non ita siccat, & uim aliquam concipit è plū-  
beo mortario in quo conficitur. Quod ex lithargyro &  
ænelæo fit, contra rheumata ualet, induratos musculos  
adiuuat, & cruenta iungit. Litharg. lib. i. octo dies, uel  
10 plures in sole teritur affusio uino giluo, tenui, pellu-  
cido,



cido, odoro, subadstringente. Ac quanto plus uini com-  
biber, tanto efficacius futurum est: postea cum sesquili-  
bra, libris duabus olei plus minusve excoquitur, dum  
non inquinet. At hæc assidue uersare spatha necesse est.  
Melina sunt multa. 2. de compositione pharmac cata ge-  
ni, quæ glutinent. Quod sequitur ex uino, Hære, luxa-  
ta firmat, recentes puerorum strumas discutit, inuetera-  
tos sinus, quique in uacua penetrent, percurat. Recentia  
uulnera etiam magna conglutinat. Litharg. auri lib. 1.  
hoc est unc. 12. sic enim perpetuo libram Græcorum usur-  
pamus: diu teritur in sole affuso uino giluo, tenui pellu-  
cido, ut prius. Quo teretur diutius, & plus liquoris ra-  
piet, eò præstantius euadet. Ex quo iterum lænigatur in  
mortario, instillato deinceps atque alternatim modo  
oleo concalfacto, modo uino illo: atque utroque quan-  
tum fieri potest, saturari debet.

Hic in cacabum transmittitur, & cum olei & uini gilui  
ana unc. 9. uel eo pluribus excoquitur: bene coctæ li-  
thargyro, immiscentur resinæ pini lænigatissimæ lib. 1.  
ceræ albæ drac. 10. opopanacis sesquunc. coquuntur oia  
molli igne, dum nō inquinent. In usu, sanguine agrestis  
columbæ cōspergitur. Al. Critonis quod iungit recētia,  
cicatricem ducit & extrahit. Litharg. lib. 1. ceræ lib. 1. te *Critonis.*  
rebin. unc. 2. æruginis unc. 2. ol. ueteris unc. 9. aceti unc.  
2. & semiss. Litharg. oleum, acetum, ærugo blando igne  
coquenda sunt: iam propriè coeuntibus resina ceraque  
coniungitur, coquuntur dū sint corpus, & nō inquinēt.  
Magis glutinabit pharmacū, si myrrhæ, aloes, sarcocol-  
læ ana drac. 1. misceas, aut ea quæ per se glutinent. In mali-  
gnis, squāmæ & uitreoli genera cōspergi possunt. Cele-  
bre & polycreslon Macherionis pharmacū ad ulcera ma *Macherio-*  
ligna: recentia glutinat, phlegmonē prohibet, præcipuē *nis.*  
ubi aliquid cōtusum fuerit: rabiosi canis moribus me-  
detur impositū, ac subinde cōmutatum: phagædenis cō-  
uenit, aurium nariumque; ulceribus carnem generat. In  
genitalibus & nudatis ossibus idē efficit. Aristol. rotun-  
dæ, galbani, opopanacis, æruginis, iridis, ammoniaci,  
myrrh. ana unc. 1. terebint. ceræ, ol. omphacini an. unc.  
7. &



# INSTIT. CHIRURGIC.

7. & semiss. Aerugo ex dimidio olei seorsum terit, cum reliquo oleo, cera & terebinthina molliter coquuntur: ærugo additur: postea uerò ammoniacum ex aceto, fusum, galbanum purgatum, & opopanax permiscuntur, postremo refrigeratis reliqua insperguntur. Aegyptia

*Aegyptia  
Andruma-  
chi.*

Andromachi uulnera ense facta, uel profundissima, tri-  
duo glutinat, quod capite de ossium uitiis describetur. Axun-  
dia chalciteos fistulas & magna ulcera coniungit. Axun-  
giæ ueteris bene purgatæ fibris & sine sale lib. 2. ol. ue-  
teris, lithar. ana lib. 3. chalciteos unc. 6. conficiatur ex ar-  
te. quòd si palmaria spatha defuerit, saligna rudicula cõ-  
mouebis: aut ex ea materia quæ glutinando conueniat,  
non radice cannæ, cui magna uis inest detergendi. Salix  
uerò siccatur & astringit, id quæ sine morfu, quæ omnia  
glutinando idonea sunt. Quod è succo liliorum cõfici-  
tur, diuturna maligna quæ ulcera conglutinat: nimio hu-  
more languidis malè coalescentibus, cicatricem ægrè  
trahentibus utilissimum est: uehementer siccatur, id quæ ci-  
tra morsum, ut incisa capita musculorum possit coniun-  
gere. Succo foliorum lilii unc. 5. mellis & aceti ana unc.

*Salix.  
E succo li-  
liorum.*

1. coque lento igne, dum crassescat. Alii è symphyti sue-  
co & aliis quæ per se glutinent, melle rosato & aceto  
sambucino eadem pharmaca componunt, quæ efficacis-  
simè glutinent. Ad neruorum uulnera cochlearum car-  
nes concisæ tritæ quæ adiecta myrrha & thure conferunt.

*Ad neruos*

Eisdem neruos uniunt lumbrici terræ triti & impositi.  
Iam uerò cruentis, suggillatis, excisis quacunq; parte cor-  
poris, uiriligni, lepræ, maculis, crustis efficacissimè opi-  
tatur quod paratur ex Atractylide. Atractylidis effos-

*Ex attra-  
ctylide.*

se cum radice, deinde siccatur umbra, postremo tritæ unc.  
quatuor, ol. dulcis unc. quatuor, colophonix sesquili-  
bra, ærug. unc. 2. ceræ unc. 8. Oleum, cerâ, colophoniam  
liquefacta excolato: deinde æruginem, postea herbam  
commisceto: iuncta omnia frigida immergito, manibus  
uersato pinfito quæ: pista in aqua noctem finito, atque  
ita usui reponito: uerum colophonia nostra siccior est.  
Liquida quoque ueteres utebantur, quæ si defit, sicca  
partim oleo, partim terebinthina mollienda erit. Hoc  
autem



autem glutinat recentia: Rhodini uel myrtini unc. 1. te-  
 rebinth. unc. 1. æruginis drach. 2. si quidem lota est, &  
 molliora sunt corpora, alioqui sesquidrachma. Barba-  
 rum Galeni: Picis lib. 1. bituminis ceræ ana selib. ammo *Barbarum.*  
 niaci, mannæ ana unc. 3. cerusæ sesquun. ol. unc. 20. nam  
 sic melius quàm drach. 18. Al. Est & aliud insigne barba-  
 rum emplastrum nigrum, quod capite de hæmorrhagia  
 describetur. Plura quoque primo & secundo de compo-  
 sitione pharm. κατὰ γέν. Atq; hinc ad recentiorum me *Qua ratio*  
 dicamenta transeundum, si prius monuerimus digeren- *ne in uaria*  
 tia & attrahentia cerato temperata fieri sarcotica: è sar- *genera re-*  
 coticis fieri glutinantia, si quid astringentiũ permisceas *media com-*  
 aut si iunxeris quæ siccant magis, & astringeant, reddi: *mutes.*  
 epulotica. Basilicum magnum Mesuæ glutinat nervos.  
 Celebris est puluis (quem rubrum uocant) ex sanguine  
 draconis, & sesquialtera ratione uel dupla thuris. Alii *Pulus rub.*  
 calcem, bolum armenum, santalos cõmiscent. Sunt qui  
 hoc modo cõficiant: Symphyti maioris, boli armeni ana  
 unc. 1. picis Græcæ unc. 3. mastich. olibani ana semun-  
 ciam, sanguinis draconis, mummiæ ana drach. 2. Pulue- *Sanguis dra-*  
 res futuris insperguntur, uel in cerato imponuntur. San- *conis.*  
 guinem draconis collecticon uariè conficiunt. Thus, ma-  
 stichen, bolum armenũ æqualiter mista, hirci sanguine  
 mactati Augusto mense concorporant. Alii aliter ex ea  
 dem materia. Quidam bolum armenum terunt, faciunt-  
 quæ ut plurimum sorbeat sanguinis hircini & sorborum  
 succi. Plinius sorborum succo & caprillo sanguine com-  
 pingit Eidem Plinio & Solino sanguis est draconis, qui  
 dum uulneratus elephas concidit, colliso casu dracone  
 colligitur. Aetius è succo herbæ Indicæ (quem dracuncu-  
 lum uocant) fingi credidit. Dracontio nostro uis. inest  
 glutinandi. Cartilagine mediam naturam habent ossa  
 & carnem. Itaq; glutinantur non tam siccantibus, quàm  
 quæ catagmatica, aut quæ porotica è gignendo callo ap-  
 pellant, nec tam mollibus, quàm quæ *κατὰ γέν.* carnẽ uniunt.  
 Eaq; natura constant tenaci & uiscida, pix, manna, caro  
 & saluia cochlearum uiscum, glutinum fabrilẽ, polen  
 uisco illigatus, tragacantha in aceto fusa. gummi ara-  
 bicum,



bicum, aloë pinguis, terebinthina è uino lota, muccagi-  
nes, aliaque id genus: quibus sanguis draconis, puluis  
ruber & alia quę per se glutinandi uim habeant, coniu-  
guntur. Ita concorporata pharmaca illinuntur, compin-  
guntur, adhibetur in splenis, & ueluti incerata tela quę  
arctius consuatur, ut pharmacum firmitus inhærescat.  
Sed si magna uulnera sunt, fibula uel acu prius conduce-  
re oportet: deinde medicamento impingere. id in carti-  
laginibus aurium & narium fieri debet. Cochleæ cum

*Cochleæ.*

suis uolutis diu teruntur in mortario, ut nihil asperi re-  
liquum sit. Sanguis draconis sub quadrupla, manna sub  
octupla ratione adiungitur, permiscuntur in mortario,  
& affiguntur. In naribus (quod ante dictum) ne uulnus  
concidat, atque ita cartilago diffideat, fistula concaua  
paranda est, quę introducatur, & qua parte uulnus con-  
tingat, illinatur pharmaco: altera uerò nasi pars quę fo-  
ras uertitur, quaq; pinnę eminent, emplastico medica-  
mento cōpingatur. Aurium caua, argilla impleri debet.  
Argilla prius cochleæ salina, & acidi punici loquore su-  
bigatur. Alioqui drach. i. aloes excipiuntur fabrilis glu-  
tine soluto ex aceto. Aliud Tragacanthę drach. i. in aqua  
Rhois maceratur, muccago elicatur, in qua excipiantur  
myrrh. aloes, sanguinis draconis ana drach. i. omnia pau-  
ca terebinthina, colligantur adhibentur in pellicula, uel  
lintheolo. Atq; hæc tandiu inhærere oportet dum coa-  
lescat cartilago, nisi prius excidant. Quę sequuntur, iu-  
sta ratione probata sunt posterioribus chirurgis. Planta  
ginis, utriusque cōsolide, betonicę, uerbenę, pimpinel-  
lę, pilosellę, millefolij, lingule canis, caudę equinę ana

*Viride Bo-  
nantini.*

M. i. concastata coque cum lib. 3. sepi arietini: colatis ad  
de resinę, cerę, galbani ana quartaria 3. sarcocollę quar-  
tarium unum, terebinthinę quartarium i. & semiss. li-  
quata omnia & ad ignem circumducta, ex arte miscean-  
tur. Aliud, è Centaurii minoris manip. 6. macerentur no-  
ctem integram in uino albo, postmodum in eodem uino ad  
dimidias coquito, colatum succum recoquito, dum sit  
mellis crassitudo: postremo reponito. In usu, accipe suc-  
cine 3. terebinth. libr. i. cerę nouę quartarium i. re-  
sinę,

*Ecentorio.*



sinæ, thuris, gūmi arabici, mastiches ana ʒ. i. lactis mu-  
 liebris unc. 2. Optimū hoc medicamentum & amicū ner-  
 uis: cruenta glutinat, dura emollit, fluxiones inhibet, ar-  
 cet putredines, detergit sordes, à fera morsis auxiliatur  
 atq; omnino dignum laude est. Cētanrij succus leniter  
 astringit, siccatur, tergit citra morsum: ex quo miscetur me-  
 dicamētis, quæ fistulas, sinus, rheumatica ulcera coniu-  
 gāt, & cicatrice claudant, quæq; ueteres duritias emol-  
 liant. Plāta admodū parabilis est, maximè laudata uete-  
 ribus, de qua libellus etiā Galenus attributus est. Eius  
 radix inutilis est. Herba cum floribus postremo Vere col-  
 ligenda, & ut prius, exuccāda, reponēdus in multos usus  
 succus est. Eadem siccatur umbra, ut in tempore trita in  
 puluerem, putridis, sordidis, cancrofis, & aliis uitiis in-  
 spargatur. Eodem modo Marrubium, Scordium, Apiū,  
 & aliæ plantæ plurimæ chirurgus ueluti opes quædam,  
 suo tempore comparandæ sunt. In medicamēto de quo  
 agitur, glutinandi uis aucta est adiecto uino. Similiter &  
 aliis emplasticis, mastiche, thure, gummi Arabico, quæ  
 cum leniter astringant, molliant, reprimant, in commu-  
 nem usum medicamenti conspirant. Aliud Dini: Betoni  
 cæ, centaurii ana manip. 2. coque, & cola, ut prius: ex-  
 colato succo adde resinæ quartarium i. terebinth. lib. se-  
 miss. sarcocollę unc. 1. ceræ unc. 2. liquefiant omnia ac  
 leniter bulliant: acetum paulatim affundatur: ubi refri-  
 xerint omnia, è muliebri lacte manibus conuoluantur.  
 Pares uires habet cum priore, benignum est, ut neruis  
 possit conuenire. Centaurium, betonica, resina, neruis  
 punctis amica sunt: sarcocolla mirissimum est colleticō:  
 aceto fit, ut altius permeet, & melius attrahat, lacte mu-  
 liebri mollius pharmacum est: nec ita cohibetur eius te-  
 nuitas. Al. ceræ albæ, resinæ ana quartarium i. olei unc.  
 2. terebinthinæ unc. 1. thuris, mastiches ana unc. dimid.  
 Ad Pimpinellæ, melangianæ, aut loco eius, telephii, ma-  
 ioris semperuiui, uel attractylidis, uerbenæ uermicula-  
 ris, aut potius semperuiui minoris ana manip. 1. co-  
 quatur uino ut prius, dum duæ uini partes euauerint:  
 & hæc omnia percollentur, exprimanturque atque ite-  
 rum

*Centaurij  
succus.*

*Dini.*

*Anserini.*

h rum



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Viride ex  
herbis.*

*Bedegar.*

*Semen rosa  
rum.*

*E vermibus*

*Lumbrici  
terra.*

rū coquantur ad crassitudinē: tum adde resinę lib. i. cerę  
albę, libr. semiss. mastiches 3. 2. refrigerētur ut prius, &  
laſte muliebri subigantur: leue colleticō eſt. Viride ex  
herbis fortius eſt, & iā malignū quid prę ſe ferētibus cō  
uenit, quod ex cap. de purgātibus repetendū eſt. Vngüē  
tū glorię. Olei bedegaris lib. i. cerę quartariū i. ſeminis  
albarum roſarum ſemuncia. Oleum bedegaris nō ita pa  
rabiile, quia quid Barbarorū bedegar parū conſtat. Vte  
ris autē nel ſpongiolis illis quę in canino rubo colligū  
tur, uel cymis attractylidis. Alioqui tenerioribus cacu  
minibus aculeatę plantę, quę ab herbariis Bedegar ap  
pellatur: uel eadē e carduo ſylueſtri, (quā cardonetā uo  
cant) detruncabis. Incoques autem horum quoduis oleo  
& uino nigro: dum uinum exhalauerit, materiam uehe  
menter exprimes. Semen roſarum eſt, quod detractis fo  
liis & apicibus luteis excuſo capite decedit. E uermi  
bus, neruoſis partibus glutinandis, utriusque ſimphyti,  
cynogloſſi. pilofellę, utriusque plantaginis ana manip. i.  
uermium terrenorum libr. ſemiſſ. conquaſſata omnia ſe  
ptem dies in ol. ſeſquilibra madēt, deinde leniter cocta  
in ſuum oleum exprimuntur: expreſſo ſucco & oleo, mi  
ſce ſepi arietini purgati lib. i. picis naualis lib. ſemiſſ. pi  
cis Gręcę quartarium. i. galbani, opopanacis, terebinth.  
ana unc. i. thuris maſtiches ana ſemuncia: alia liquātur:  
galbanum, opopanax, thus, maſtiche aceto macerantur:  
ex quo ſoluta aliis permiscuntur, & ex omnibus effici  
tur corpus. Lumbric terrę triti & per ſe impoſiti, ner  
uos glutināt. Aureum, Cerę citrinę lib. ſemiſſ. olei boni  
lib. 2. & ſemiſſ. terebinth. unc. 2. resinę & colophonię  
ana ſeſquunc. olibani, maſtiches ana unc. i. croci drac. i.  
cera cum oleo liquatur, deinde refina, colophonia, te  
rebinthina confunduntur: ſublatis igne, thus, & maſti  
che inſperguntur, poſtremo reſperſo croco omnino in  
tinguntur. His ergo pharmacis utendum erit, ubi cruo  
rem & ſordes exteſeris, ubi curaueris ne quid interſit  
ulcerum labris: ubi denique neque dolor, neque phleg  
mone, neque alius caſus eſt, unde glutinatio prohibea  
tur. Digitis, acu, ſiſtulis, deligatione, diuiſa labra con  
iungenda



## LIBER II.

58

iungenda sunt: arida resperguntur, illinuntur liquida, crassa, uiscidaque: ut in magnis uulneribus neque satis coherentibus impinguntur, superdatur stuppa è uino nigro pressa, ex eodẽ splenia, fascias, subligacula madere utile est: quanquam & aceto imbui possint, colliganda omnia eo deligationis genere, quod contineat, reformet, cogat, quantum uidelicet casus expostulat. Pulvis ruber oui candido, postea quoque terebinthina excipitur, atque imponitur. Quoties commutatur medicamentum, austerio uino fouetur uulnus. Rarius autem commutari debet, quarto primùm die, deinde sexto. Linrea eodem uino inculcata super imponuntur: atque hæc donec coalescat uulnus: A quo si qua macula relinquitur, detergente materia exteri oportet.

## FINIS SECVNDI LIBRI.

h 2 IACOBI



IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI,

DE MATERIA CHIRURGICA

LIBER III.

De utili materia in vitiis ossium. Cap. I.

*Quæ negle-  
ctis ossibus  
superveniāt*



AM explicanda nobis ea pars reme-  
diorum quæ ad ossa pertinet. Vitiis  
ergo quæ ossa fecerint, eodem fere  
momento succurrere oportet. Alio-  
qui phlegmone succenditur, quæ fa-  
niam facit, agit cuniculos, vlcera di-  
spergit alta, exesa, & curanda motis,  
ἐμμότουρ inde vocat Hippocrates. Ex quo denigrantur os-  
sa, cariem inducunt, sideratione corrumpuntur. Aliis fe-  
mur claudica manca manus est, ad solitos flexus torpet ar-  
ticulus, vel is extortus est. Huic conuulsis nervis, distor-  
to corpore, crudeli morte vita extinguitur. Ille gangræna  
& putredine contabescit, extinctoque sensu paulatim con-  
ficitur. Itaque in tam lubrica medendi parte, omnem con-  
silio rationem moueamus, maturrimè occurramus, vt ni-  
hil naturæ percat, nulla cicatrix, nulla vestigia mali, aut  
honestæ certè relinquantur.

*Labores os-  
sium.*

Laborant ergo (vbi accessit iniuria) corrupta, fracta,  
collisa, fissa forata ossa & mota articulis. Ad quæ vitia alia  
quoque suboriri solent. Accessio mali est, si cum vulnere  
laxa sunt, multò magis in articulis, ubi nervi, tendines, li-  
gamèta, nuda carne & ossea loca sunt, in quæ laxa ac com-  
mota & iam nouo casu imbecilla, excrementa corporis fa-  
cilè decurrunt.

Adde



Adde quod ibi cartilago est, in qua cicatrix formari nequit. Hic ergo asperior casus est, dolor, vigilia, febres, deliria, conuulsio & mortes sæpenumero commouentur: & ut articulus maior est, ita periculum grauius creare solet. Verum non alia chirurgiæ parte ditior suppellex veteris disciplinæ, nusquam hæc curiosa magis quam in ossium medellis. Infinita propè reperit, & literis tradidit: quædam etiam autoritate principum ære publico in ciuitatibus extruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent: ferramenta uaria, excisorios cultros, scalpria rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, forcipes, meningophylacas, uolsellas, scalas, scamna, cotos repagula, uestes, glossocomia, canales, spheria, stathmia, trochiscos, pennas, incerator canaliculos, fistulas, setas, fila bysso, & auro texta, alia quoque plurima quæ ad purganda, tenenda, reformanda, tentanda, constituenda denique ossa facerent. Et in una deligandi cura quamplurima usu diuersa suis etiam nominibus ueteres distinxerunt, linteola, fascias, hypodesmides, splenia, apodesmos, regulas, ferulas, spathulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modo scroteos, modo molliusculos: nodos, acus, acias & alia sexcenta, quorum multa retenta sunt: alia antiquata, quædam deserta partim ignorantia, partim negligentia. Adde quod multis in rebus facilius, nec tam operosa curandi uia inuenta est. Atque hic quoque peculiare nomen habuit deligandi forma, & catagmatici uocata est, quanquam non in omni querela ossis ea necessaria est, sed aliquando in orbem, aliquando in asciam ducta, nonnunquam etiam sine deligationibus id genus splenia usurpantur: quorum omnium ratio ex libris primum Hippocratis κατ' ἰκτρεῖν de fracturis & articulis, deinde commentariis Galeni petenda est. Corruptum os pingue est, nigrum, molle, cariosum, quod supernatis grauibz ulceribus aut fistulis, hisque uel longa uetustate uel putredine occupatis euenit. Nudatur os cui uitium accersit, ulcere exciso, inbsecta carne, si latius sergit ossis iniuria, quæ ulcus fuit. Abscessus ossis priusquam corruptelâ trahant, partim melotide, partim e sanie cognosci possunt.

*Quæ multa  
auxilia in-  
uēta ossibus*

*Deligatio-  
nis materia*

*Deligatio.*

*Corruptella  
ossis.*

*Remedia  
corrupti os-  
sis.*

*Abscessus*

*ossis.*



*Medicamē-  
ta in sanio  
sit ossibus.*

*Corruptum  
os.*

*Rasura os-  
sis.*

possūt. Hinc enim sordes uberior, & ui maiore quā pro  
ulcere scaturit, eaq; tenuior est, nō crassa, ut à carne: nō  
glutinosa, qualis est à neruis: neq; unguinosa, ut ab adi-  
pe diffluit. Adhæc in abscessu ossis oræ ulceris dissident  
magis, ægrè coalescunt, & interiore quodā motu uitii si-  
gnificatur. Saniosis ossibus medicamēta cōueniunt quæ  
plurimū siccant, quorū materia ex capite de purgātibus  
pharmacis petenda est. Quæ in superficiem extat caries,  
ea sola radula eximi potest, sed ab igne tutius remediū  
est. Corruptū os ad uiuā scobē eliminandū, exterebrandū,  
inurendū, excidēdum, perāputandum quoq; totum est,  
ubi desperatur malum Miserum quidē, sed unicum præ-  
sidium, & instanti exitio præferendum. Vbi ergo ulcere  
conciso uel amputata carnos undique nudatum est,  
quod uideatur pingue, nigrum, aut cariosum, semel ite-  
rumve inurendum ferro, aut scalpro deradendum, do-  
nec iam aliquid cruoris ostendatur: quæ integritatis no-  
ta est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum  
debet, ut & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est,  
cum in nigritie ad os album: in carie ad solidum uen-  
tum est. Neque alia faciendā sunt, cum in summo osse  
iniuria est. Sed hæc uitia aliquando secedunt oleo fer-  
uente, aquis quas fortes uocant, & mollioribus caute-  
riis: de quibus capite de pyrotic. Nonnunquam etiam  
matura putredine, modo per se, modo leni tractu deci-  
dunt. Quod si malum altius descendit, caries quidem  
specillo tenui explorari debet, quod ut cedenti osi al-  
tius infigitur, ita longius caries procedit. Nigrities col-  
ligi potest ex dolore & febre. Quæ ubi mediocria sunt,  
illa altè descendisse non potest. Manifestior tamen ada-  
cta terebra. Nam finis uitii est, ubi scobes nigra esse de-  
siit. In maiori carie, maior asperitas & inæqualitas fer-  
ro deprehenditur, & hoc quidem minus firmiter inhæ-  
ret, & cito elabitur loco cui impressum est. Igitur caries  
tota, sæpius uersata terebra excalpenda est: ex quo can-  
dente ferro, foramina perpurganda: ut iam nullo af-  
fluente uitio, lacuna carne repleatur. At os quod uel  
nigrities totū peruasit, uel excedit caries, excidere opor-  
tet.



ret. Excidentur ossa ferè in capite, pectore, & membris. *De exciden-  
dis ossibus.*  
Idq; modo scalpris, modo terebris & modiolis quorū  
omniū ratio à Galeno, Celso & aliis tradita est. Sidera-  
tū mēbrum non tā crudeli quā miserabili auxilio semel  
perāputandum est: in quo quicquid corporis emortuū  
est, lacerandū scalpro, & nouacula excidendū est. Siquid  
autē uiuæ carnis, nerui, uenæ, arteriæ superest, nec ur-  
get casus, qua parte corruptela desinit, uincula arctissi-  
mè cōstringenda, ut ea omnia defecta alimēto celeriter  
exolescāt. Quod quū euenit, ea corpora ferro, ut prius, *Perāputa-  
tio mēbri.*  
& nouacula exsecāda sunt. Hæc aut quia nō placuit Hip-  
po. corpus etiā dū uiuens ferramētis irritari: ne inde cō-  
motus dolor, hæmorrhagia & animi deliquia (quod fe-  
rè fit) ægrum è uita tollant. Alii maiora uasa & neruos *Vnde mors  
amputatis  
membris.*  
prius designant, medias carnes interfecant, & illa ipsa  
ad sanam partem filo illiqueant, ut intabescant mora, &  
sponte sua decident. Qua etiā arte hæmorrhagias & con-  
uulsiones magis declinent. Iam uerò legitima serra sit,  
& bene comparata, quæ quam celerrimè transcurrat.  
Linteum interponi potest uino uel aceto madens, qua  
parte commota serra uiuentem carnem affricat, ne sci-  
licet exasperetur caro, & profluuium sanguinis mouea-  
tur. Præfecto osse reliquæ partes contra hæmorrhagias  
cauterio inuruntur. At si uiuente osse circumducta caro  
emortua est, priusquam malum in os transeat, excinden-  
da illa est, & injectis uinculis, omnis aditus quo sanguis  
ad os decurrat, intercipiendus est: imperanda uitæ par-  
simonia, & ea alimenta quæ faciliè diffluant, nihilque  
succī crassī lentiūque gignant, ut os ipsum cum suis uincu-  
lis paulatim emarcescat, ac tandem excidat. Ad celerita-  
tem operis ubi utrunque licet, maluit Hippocrates in  
articulis quā medio membro ossa rescindi. Reliquis *Ulcera con-  
iuncta ui-  
tiis ossium.*  
iniuriis ossium ferè accedit ulcus: idem adstrictioribus  
linteis & ferulis aliquando contrahitur. Sed hoc genus  
ulceris leniotibus pharmacis: illud autem aliorum ul-  
cerum legibus curari debet. At non antè uias claudere  
oportet, quæ per ulcus ad ossa pertinent, quā hæc se-  
dulò explorata, & omni carie, sorde, nigredine perpur-  
gata



gata sint. Quin & præclusum iter patefacere oportet, & angustias ferro ampliare: deinde spongia molli aut penicillis implendum cauum, ut ne coeat, sed dehiscat ulcus, dū uel integendū carne, uel feruminādum callo bene purū os uideatur. In altis cuniculis spōgia, linamēta penicilli summa parte religātur filo quod foras propendeat, ut in tēpore faciliè reducātur. Vt at quæ succrescit caro toti suo ossi coalescat, purum os esse & siccū necesse est, inspergendūq; medicamentis, iri, manna, aloë, myrtha, arido thuræ, aristolochia, & eo genere cephalicorū, quod capite de Sarcoticis descriptum est. Sed quæ cōtinentur ossibus caro generatur, ut paulo siccior futura est, ita magis siccātibus gaudet, quo genere etiā deterfa, rasa, exterebrata ossa cōspergi debēt. Vt uerò ducēda carne ab ossibus recedis, ita uis siccantiū tēperanda est, donec iā cicatrix trahenda sit. Ac carne replere ossa, & fissa iungere sæpenumero opus est, ubi callunt gignere nō licet, nimium dissidentibus fracturæ labris, & ubi in maiorem circulum uel os ipsum maius excisum est, uerum multo stabilius uinculum callus est. In fracturis cum ulcere, si quidem transuersum hoc est idemque malignum, ferulis abstinendū: in recto ulcere ferulæ ad latera committi possunt. In utroque maior copia fasciarum adhibenda, quia declinanda astrictio, confirmanda tamen deligatio est: quod uel astrictio uel copia linteorum efficit. Linteorum multitudo astrictioribus fasciis præferri debet, ubi molle corpus & cum fractura ulcus est. Astrictior deligatio & ui maiore cōfixæ ferulæ sæpenumero siderant partes, atque exulcerant. In tumore, ulcere inflammatione & dolore ferulis & omni astrictione interdiciendum. Ferulus Hippocrates septimo primo die sublato metu inflammationis adhibet. Noster statim initio. Albucasis in leui malo primo die, in grauiore uitio quinto uel septimo. Solutis ergo linteis & refixis ferulis, si quid cōputruit, excindendum ferro, priusquam ad implendam carnem ueniatur. Videndum quoque priusquam impleas, ut omnis diuisio ossis nuto cohæreat. At si qua squamma aut fragmentum excesserit,

*Regeneratio carnis in uitijs ossium.*

*In fracturis cum ulcere ratio ferularum & linteorum.*

*Siderate partes nimia astrictione.*



cesserit, ea suo ossi sedulo coaptanda sunt: aut si acumine  
 carnem subintrāt, molliter præcidere oportet, etiā diui  
 sa carne & excisa, si res exigit: uerū in columis fragmēti  
 radix qua ossi suo etiā dum hæret, seruanda est. Alioqui  
 scalpello ferrula leniter elimināda, aut uolsella prehen-  
 sanda est. Quod si nihil molestiæ squāmę adferūt, neq;  
 possunt suis ossibus recōciliari, uel medicamentis detra-  
 hes, uel ita fines, donec maturitate quadā p se decidāt.  
 Sic enim celeriter cogetur callus, & caro ossibus concre-  
 scet: Quæ uerō squāmę rapiuntur ferro, necdū maturæ  
 uiolētia reuelluntur, fistulas ægre sanabiles relinquūt.  
 Hic ergo declināda uis est. Squāmas detrahunt medica-  
 mēta in cephalicis descripta, capite de Sarcoticis, erucæ  
 radix, utriusq; brionię, cucumeris agrestis. Aristolochia  
 peculiariter elicit testulas caluariæ. At quæ demēda os-  
 sa sunt, medicamētis siccari conuenit, ratione uitæ simi-  
 li: cauterio, radula quoque atteri, uolsella molliter agi-  
 tari, perforari terebra, ut maturius, uel spōte sua, uel le-  
 ui cōmotione excidant. In fractis ossibus & loco motis  
 multarū rerum cura est, ac circa initia omnino prohibē-  
 da fluxio, dolor, inflammatio. Os ergo quod uel abiit  
 articulo, uel fractum dissidet, primum quidem reforma-  
 re atq; constituere oportet: deinde ita continere, ut ne  
 recidat: postremo confirmandum callo, carne, resiccatis  
 humoribus, qui colligātia uincula relaxent. Primum ta-  
 men ineunda ratio, an reponi possint: deinde an sine pe-  
 riculo reponantur: postremo qua arte conuenienter &  
 celeriter, minimo dolore ac molestia reducantur. Con-  
 cisis articulorum uinculis, dissectis cartilaginibus despe-  
 ratio est: tumq; bene agitur cum ægro, si solum clau-  
 dicat, si manco membro, si deformato & obtorto arti-  
 culo superesse datum est. Non reponendum) inquit  
 Hippocrates) tibię os qua parte suo utrinque articulo  
 copulatur, si quidem rescissa cute per uulnus prominet:  
 alioqui conuulsio, phlegmone, gangræna, sideratio com-  
 mouentur, quæ ægrum breui momento è uita tollant.  
 Quæ ut declines, quā ut os reponas, potius cogitan-  
 dum. Reformanda luxatio primo die, uel certē altero.

Nam

*Squamma.**De detrahē-  
dis squāmis**Medicamē-  
ta.**In fractis  
& luxatis  
multa cura**Desperata.**Non statim  
reponenda.*



*Quando re-  
formanda  
laxatio.  
Contra con-  
uulsiones.*

*Tasis.*

*Cautio intē  
sione.  
Cognosce-  
nda in luxa-  
tis.*

*Exemplum  
in vertebra*

Nam tertio & quarto quiescere oportet, quo ferè tem-  
pore nouæ iniuriæ sese proferunt: hinc ad decimum tu-  
rior reponendi occasio est. Quòd si restituto ossē con-  
uulsio incidet, rursus articulum excludes, calida libera-  
liter irrigabis, fovebis oleo, & molli lana conteges. In  
luxatis & fractis ossibus hæc sunt præcipuè tasis, vel si  
mauis, antitasis, diaplasis, epidesis, apothesis, uel ypo-  
thesis, Extenditur membrum manibus prehensum, uel  
iniectis laqueis, ubi ni maiore opus est, ut diductis & ad-  
ductis marginibus soluti ossis, oræ oris molliter cōsue-  
scant, nihil exasperetur, nihil diffingatur, quod in fra-  
cturis denticularis, scabris & serratis sæpè contingit. Vi-  
dendum quoq; ne in distentione, neruus, uena, arteria,  
musculus, tendo, ligamētum, atq; inde os & membrum  
contra naturā extorqueantur. Sed in luxatis, compages  
articuli & ossium copulatio prius recognoscenda est,  
quàm multis, longis, prominulis & obstitis capitibus  
cōstet: quot, qui sinus & acetabula, quàm alta hæc, quo-  
modo inflexis alueis decliuibus, lubricis, quibus scili-  
cet capita illa & exerta ossium tubercula inserantur: q̃  
superciliorum forma: qua fide ceruices ossium comple-  
ctantur, quibus uinculis iunctura articuletur: quæ carti-  
lagines intercedant, qui tendines, musculi & nerui ad  
cōstantiam articuli concurrant: in summa, qua omnino  
ratione flectant, tendant, diuertant, atq; uno uerbo, co-  
pulentur. Vertebrae duplici capite prominent, duplici  
quoque acetabulo sinuantur: altera alterius acetabulis  
sua capita inserit, eademq; paria faciens, & quasi relata  
gratia suos alueolos explicat, in quibus uicinæ uertebrae  
processus reponantur: mucosis uinculis utræque con-  
iungantur, quæ soluta, cæsa, arefacta, distracta morbo,  
uertebrae exarticulant. Quas iam cognoscas agrè refor-  
mari, quia scilicet intelligas quàm multis cardinibus,  
quaque societate coeant, quàm denique uario implexu  
conferantur. Itaque omnis articulata iunctura sæpius  
oculis ipsis usurpanda, sicq; animo & mente concipien-  
da est, ut ad uiuum pressæ articulorum formæ cum res  
exigat, oculis ipsis, ut ita dicam, obuersentur. Sic enim  
expli-



Explicatur opificium naturæ, quod in fractis & luxatis sedulo persequamur. Atque omnino qui extendit, com-  
 ponit, ligat, continet, hoc efficiat, ut iusta naturæ tenea-  
 tur carattasis. Sic enim Hippocrates, quod naturali fi-  
 gura membri & partis Galenus definit. Extensum mem-  
 brum loco redditum manibus tractari, palpari, & legiti-  
 mè conformari debet, diaplasiin appellant. Quòd si ne-  
 que sic constitutum est, ad mochlian, lorum, habenas &  
 usitatas machinas ueniédū. Quæ omnia ex libris Hipp.  
 & cōmentariis Galeni petenda sunt. Sequitur epidesis  
 quam catagmaticin appellant, in qua multorum proui-  
 dentia est. Sed maximè ut contineas, phlegmonè arceas  
 & procures callum. Ac primum an sit deligandum, sta-  
 tuere oportet, tum qua deligandi forma: ac ferè apodio  
 archæon, uaria tamen ratione. Ex quo decernendū qui-  
 bus, q̃ multis, longis, latis, q̃ deniq; firmis fasciis opus  
 sit. In spleniis eadem uersetur cura: idonea forma lin-  
 teis quærenda est. Cognoscendū præterea unde primū  
 ineas, quæ sit futura progressio, q̃ multi & quales circu-  
 li, quo modo distinguantur orbes, qui conueniant angu-  
 li, quibus interuallis, ubi & quādo laxior uel astrictior  
 deligatio, qua parte definat, quo loco & qua arte necē-  
 tur nodi, aciæ ducantur, cōplicentur habene, quando re-  
 do regulæ, ferulæ, puluinaria, mitellæ adhibenda sint,  
 quādiu continere omnia & quādo soluere oporteat. At  
 que in sano mēbro probanda prius deligatio, q̃ in ægro  
 periculum facias. Postremò in ea figura collocandum  
 membrum, in qua diutissimè cōstare possit, & minimè  
 doleat. Iustos hæc cōmentarios desiderāt, & hæc nō tā  
 docendi q̃ mouendi causa dicta fuerint. Neq; ignoran-  
 dum unum os parum extendendū esse terebra, minusq;  
 inurendum: semel enim ustum ægerrimè tum callo tum  
 carni reconciliatur. Ac nec minima cura esse debet, ut  
 ne diutius os apertum expositumq; aeri maneat. Gra-  
 uis enim ea consuetudo noua est, quia sic calor insitus  
 aerē expirat. Sinto igitur tecta & q̃ minimum licet nu-  
 data ossa. Sic enim conclusus calor & non exhalans, sa-  
 niem foras dispergit, atque ita purgata ossa celerius cō-  
 iungit.

*Diaplasia.**Epidesis.*



*In varis & valgis deligatio.*

*Abscessus ossium.*

*Ratio spleniorum.*

*In iugulo & costis.*

*Vini ratio.*

iungit. Extorta valgorum crura pertractis intro uinculis & astrictis asserculis ita cōponenda nō quasi dirigas sed nō aliter q̄ si è uaro ualgum trāsformare uelis. Inflexis uarorum cruribus aptanda omnia & colliganda sunt quasi è uaro ualgum efficias. In abscessu paruo ossium deligatio catagmatici locum habet, sed paulò laxior & sine ferulis. In magno non est deligandū catagmaticos. Satis faciunt splenia uino insuccata nigro, subaustero, q̄ deinceps atq; conueniēter hinc inde adhibēda sunt, nō ut hoc illi infideat. Longiora sunt q̄ q̄ solum ambitum membri comprehendant. Nam si quadrantalus circulus est partis, paulò longiores splenes triēta libus esse oportet. Obliquē inseruntur mēbro & aduersa parte decussant. Atq; hæc quidē spleniorum ratio alia quā os abscedit, & saniosum est: alia eorum q̄ in deligationibus fascias confirmant. Hic enim æqualiter affinguntur membri, ne alterum extremū alteri infideat, aut reduplicet, quum uidelicet longius splenium est: ne breuius atque decurtatum inane spatium, & quasi fossulam relinquat. Ab utrisque spleniis tum quæ longiora, tum quæ breuiora sunt, inæqualis, aspera, & inconcinna fit deligatio, in qua æqualitas, uel maximè quærenda est. Alia rursus illa ratio est à plagulis quæ fractio iugulo & costis adhibentur, quarum prima atq; altera in decussē collocātur & se interfecāt: tertia porrigitur in longum, obstitat fracta, & reliqua splenia confirmat. Aliter quæ ut sunt uitia & partes commutantur. Sed hæc peculiarem commentarium requirunt. In fasciis remedia adhibentur, quæ madorem linteorum contineāt. Sic enim prohibetur dolor atque inflammatio. Fasciæ initio plures & astrictiores, si neq; dolor, neque phlegmone non uulnus aut aliquid tale prohibeat. Ac ferè inebriantur uino crasso, nigro, modicè austero. Vinum hoc superficiem cogit, uim suam ad repellendum altius imprimit: ex quo præcidit inflāmationum causas. Quod nimium adstringit, dolorē facit, tenue, album, giluum, fuluum, etiam si contrahat, repudiandum tamen est ut totum reprimendum genus, quod a quo humore solutum est, papauer,



papauer, mandragora, cicuta, multò magis in articulis  
& nervosis partibus labor est: quia non sola qualitas,  
sed & horum corpus intro penetrat, & nervosa lædit.  
Hinc etiam calor qui uitam fouet, interdum extingui-  
tur. Vino igitur crasso, nigro, modicè austero, fasciæ &  
splenes saturentur. Minister adsit qui subinde affuso  
uino lintea perfundat: alioqui cum periculo resicau- *Lintea ma-*  
tur: quod ne fiat, noctu præcipuè & æstate prouidendū. *dere opus*  
Hyeme uini loco œnelæo uti satius est, quo etiam tem- *est.*  
pore prius intepuisse iuuat: & succidæ lanæ splenibus  
præferuntur. In fracturis & luxationibus ubi exertum  
os est & ulcus facit, quodque cum periculo reponatur,  
quandiu conuulsio in metu est, abstinendum fasciis, & *Quando la-*  
succida lana utendum est. Eaque ut prius imbuenda ui- *na succida*  
no, curandumque est ut assidue irrigetur, & non squal- *pro fasciis*  
scat. Astringit leniter lana hæc, & tepido calore fouet. *utendum.*  
In his fumoso uino & nimis odoro ideo abstinendum  
quòd caput feriat.

Atque hæc omnia decreta sunt ueteris disciplinæ,  
quæ Galeno probata sunt. Iustum quoque insuccandis *Alia qui-*  
linteis medicamentum ad dolores & inflammationes, *bus fasciæ*  
oui candidum è rosaceo uel myrtino fractum. Alii con- *imbuuntur.*  
tra eadem uitia aceto oxelæo fascias imbuunt, detur id *Ceratum al-*  
bene carnosâ parte & sine ulcere. Quòd si suspecta est *bum.*  
ministri cura, qui negligētius fascias respergat, & nouo  
madore compluat, unde lintea exarescant, cerato albo  
utendum erit. Adde quòd cura illa odiosa esse potest.  
Verum ceratum hoc ut repellat, & phlegmonem inhi-  
beat, uino minus est efficax, & magis usurpandum post  
initia, iam abeunte periculo inflammationis, ubi fractu-  
ra simplex, nec in fragmenta uaria contritum os est. Igi-  
tur cerato pars ægra, fasciæ & splenes illinantur, adhæc  
extremæ partes, sed manus præcipuè & pedes ne quod  
deligatione extringitur, infirmum scilicet frigidumque  
membrum concipiat, ex quo putredine tandem corrum-  
patur. Ceratū hoc catagmaticon ygron & λιγνόν, ueteres *Compositio*  
appellarunt. E cera pingui & duplo oleo conficitur. *cerati albi.*  
Oleum sit recens rhodinum uel myrteū. Quòd si cera  
uetus



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Pissociron .*  
*Picatum ce*  
*ratum.*

uetus fuerit, nec ita mollis, paulò plus olei miscendum  
 erit. Picato quoq; ueteres usi sunt, si quid contusum es-  
 set, si quid coquendum atq; mitigandum, pissiran ciro-  
 tin & pissociron appellant. Eoque magis usurpandum,  
 quia contusa oia & cruda quæ ossibus incumbant, q̃ ce-  
 lerrimè saniem fecisse iuuat, ne subiecta ossa tēpore cor-  
 rumpantur. Atq; hoc præcipuè in caluaria, deinde reli-  
 qua ossium natura, magis etiā qua parte subsunt nerua-  
 cea corpora, procurādum erit. Liquido cerato albo pix  
 addita picatum facit. Ac tantū picis misceatur, ut inde  
 color in nigrū transeat, uerum cerati corpus nō immu-  
 tetur. A pice molli utrūque præstari potest: hæc enim  
 media cōpage inter oleum & ceram ambigit. Quæ cera  
 durior, uel huic pariter dura est, mollienda manu: ma-  
 nus itaq; oleo inquinatur, atq; hinc ad ignē pix illa pin-  
 situr, uoluitur, cōtrectatur dum satis emollescat. Alio-  
 qui ceræ & pici oleum nō duplum, sed ferè triplum mi-  
 sceatur, ut picatum inde coeat, quod tam liquidum sit q̃  
 ceratum album esse opus est. Sed in contusis liquidius  
 conuenit ubi mitigādum. Ad coquendū iustiore corpo-  
 re cōpingi debet. Eædem seruandæ leges hac parte, in  
*Ritinociron* eo quod ritinociron appellāt resinā ceræ mista. Ac resi-  
 na liquida, qualis est larigna quædā & terebinthina, ce-  
 ratum nimis diluit, nisi admodum exigua misceatur. Re-  
 sina cōpage ceræ seruabit cerati corpus. Dilutum est ex  
 ceræ unc. 1. terebinthinæ liquidæ drac. 3. olei unc. 2. So-  
 lutum quidē & molle est, nō dilutum nimis, ex ceræ un-  
 2. colophonix unc. 1. olei unc. 4. Corpulentum satis ubi  
 ceræ & resinæ utriusque unc. 2. olei unc. 4. permiscetur.  
 Sed de cerato quod resinam capit, plura capite de sup-  
*Vis cerati* purantibus. Verū in luxationibus hoc cerato præci-  
*resinati in* puè utendum, quia scilicet articulata ossa magis conti-  
*luxationi-* net, & hunc lintea firmitus affiguntur, hærent diutius,  
*bus.* uincula uero humore laxa & uiete melius exiccantur.  
 Fracta denique firmitus cohærent, & callo suo fidelius  
 compinguntur. At quæ sine lentore lintheis capiuntur,  
 quale austerū uinum est, ante resiccantur quàm soluere  
 oporteat. Ac tertio primū die ferè absoluius. Sicca  
 autem



# LIBER III.

64

antem lintea duritie & asperitate lædunt, elaxataq; mi-  
nus cōtinent. Hæc ergo ratio magis ineunda, si quando  
periculum grauius metuitur, atq; ideo cura maior desi-  
deratur. In his uitiis ossium magnum diachalciteos *Diachalci-  
teos.*  
usus est. In metu inflammationis mollietur subduplo ro-  
faceo, deinde austero uino imbuitur, illinitur parti, & *Cōtra inflā  
mationes.*  
in linteis adhibetur. Ex aceto uini loco subigi potest, si *Contra œde-  
mata.*  
neque uulnus, neque neruacea natura, neq; aliud quic-  
quam prohibet. Contra œdemata & inflationes q̄ astri-  
ctione linteorum extuberant, idem medicamentū auxi-  
lio est. Omnia uerò leuia sint & mollia: Grauitas enim  
opprimit, & dolorem creat. Idem durities efficit & exa-  
sperat: utrūq; callum retardat. Perfusiones fiunt ex a-  
qua tepida, eo calore tēperata, quē manus perferat: in  
frigorebus hydrexon melius est. Perfunditur pars ter-  
tio & quinto die quoties uidelicet lintea absoluntur,  
idque liberaliter, unde prurigo acquiescat, & materia  
eius in halitum dispergatur. In articulis tepidæ usus est  
tenfare laxat, dolorē mitigat, & phlegmone aduersatur.  
Iam septimo die tardius aliquādo affunditur, non ut di-  
scutiat, sed euocet sanguinē: unde cōcreto porò ossium  
fracturæ cōserantur. Capitis fracturas neq; uino neque  
re alia nisi quā minimum madefacere iussit Hipp. Dio-  
scorides ex ueterum usu corticē ulmi aqua incoquit, de  
cocto fracturā fouet, & os perfundit quod iam egere cal-  
lo uideatur. Id de radice ulmi nō cortice Galen. prodi-  
dit. porosin Græci uocāt geniturā calli, & inde poroti-  
ca, q̄ callum gignant. Callus neq; caro est, neq; os, sed  
inter utrumq; ambigit: itaq; deposito metu inflāmatio-  
nis, purgatis uitiis q̄ curā tardent, oīno cogitandum ut  
coeat porus, & inde effractæ partes solidētur. Ea q; cura  
septimo primum die ferè suscipitur æstate, decimo quar-  
to hyeme: quo iam tempore id genus periculis perfun-  
cta ossa uideātur. Etenim intra ea spatia febres & phleg-  
monæ magna ex parte sese proferunt: quāquam aliquā-  
do latente uitio & maleficio trahēte uigesimo die &  
post uigesimum, nec opinantibus nobis eueniunt. Ne-  
minem uerò latere arbitror non antè de porò cogitan-  
dum

*Diachalci-  
teos.*

*Cōtra inflā  
mationes.*

*Contra œde-  
mata.*

*Perfusiones*

*Contra pri-  
uriginē à de-  
ligatione.*

*Decoctum  
ulmi.*

*Porosis.*

*Callus.*

*Quando gi-  
gnēdus cal-  
lus.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

dum quàm contusa, in pus uersa, deterfa ulcera & sicca-  
ta, ossa quoque bene explorata fuerint. Hic ergo gene-  
ratur callus, ubi moderàda perfusio ut inde pars niuido  
colore floreat, & leniter attollatur: nimiùm est si subsidet  
& pallorem ducit. Fistulosa ossa & spongiosa, quæque  
plus humoris in se continent, celerius coalescunt, & cal-  
lum contrahunt: quod in iugulo & id genus ossibus cõ-  
probatur. Alimenta sunt quæ probum sanguinẽ, crassum,

*Alimenta  
ad poron.*

*Medicamẽ-  
ta.*

*Triticea fa-  
rina.*

*Exemplum  
in naso fra-  
cto.*

*Specillum  
narium fra-  
cturum.*

uiscidum, multũ gignant. Panis triticeus ẽ farina prima-  
ria: triticum legatur graue, densum, unde ptisana cõpa-  
retur: cartilagineæ animalium partes, neruaceæ, cutaceæ,  
pingues, ligamenta, tendines, petioli, uentres, linguæ,  
rostra, capita hœdorũ, ueruecum, & porcellorum agni-  
na caro, & suilla, palmulæ pingues, castaneæ, uinũ ltrin-  
gens, & cætera generis eiusdẽ. Medicamenta sunt em-  
plastica, lenta, quæ modicẽ calfaciãt, & siccent ẽ gyry si-  
mila, manna, gummi, fabrilis glutine, mastiche, tragacan-  
tha, pingui cera, lachrymis & succis generis eiusdẽ. Tri-  
ticeam farinã probat Hippo. quæ subacta longius trahatur,  
digitorũ sequax: hæc ut reliqua, liquore oui, myrtino,  
aqua, uino, mucagine concorporatur, dum lentore quo-  
dã bene cohæreat. Qualis si desit, & aridior tantum ad  
manum est, thus pingue, eiusquẽ pollinem & fuliginem,  
liquidã resinã, mel quoque uiscidũ permiscebis. Sed alia  
quidem initio, resinã & mel post initia quum iam exces-  
serit periculum inflãmationis. Thus quoque in lima-  
cum mucco & salina: aloe, & myrrha, mel etiam, si qui-  
dem resiccandum magis, in eodem mucco diu uolutan-  
tur, & in aluta impinguntur. Finge igitur aduersa parte  
effractum nasum, ut intrò desideat. Eodem die aut non  
multò post reformare oportet. Itaque quicquid in carti-  
laginem incidit, excitandum leniter est subiecto crassio-  
re specillo, qua maximẽ parte delabatur quod fractum  
est, ut sublatũ molliter suo corpori decenter coalescat.  
Lene fit specillum non asperum, ad digitelli formam fa-  
bricatum ẽ buxo uel ebore: digitis quoque utitur Hip-  
pocrates, sed præfert indices, ut qui narium cauis magis  
conueniant. Ac suis quisque uti potest: alioqui magni-  
tudine



## LIBER III.

65

tudine respondeant, sintque molles quales pueri habent  
& mulieres. Atque hos diutius insistere oporteat, ut quæ  
reformata iam sunt, contineant. Alioqui in longitudi-  
nem implicata linamenta, & molli pellicula cinctæ cir-  
confutaque intus adicienda sunt. Aut eodem modo con-  
positum aliquid ex arido penicillo & fimbriis linteorum.  
Aut grandis pinna gummi uel fabrilis glutine illita, &  
molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem  
non sinat. Alioqui fistulas & tubos plumbo, argento,  
canna ad hanc rem comparare oportet. Frustrulo pulmo-  
nis ouis aliquando usus est Hippocrates, quod fortè ad-  
erat. Spongia non utendum putat, quia fortasse humo-  
re rapto exturgeat, dissoluaturque iuncta. Abstinentium  
quoque omnibus quæ uel uehementer spirent, uel gra-  
uiter oleant. Omnia uerò memoratis medicamentis illi-  
nenda sunt. Vinculis autem & habenis illis ex aluta molli  
non ita opus est, etiam si quod fractum est in latus tor-  
queatur: si modò repositum aliis artibus contineri po-  
test, ut plagulis quas uiscida illa pharma inquinant,  
& iis similiter comparatis, quæ intro naribus inserun-  
tur. Emplastra quæ pertinacius hærent, foris tepidæ re-  
uelluntur. Atque hinc ad catagmatica, de quibus antea.  
Sed horum materia impræsentia locupletanda nobis. *Caninum ce-*  
Caninum cerebrum in linteo adhibetur: superdatur lana *rebrum.*  
incolata oui candido: iam squalescens commutari debet:  
quatuordecim diebus solidat. In Sardinia fontes esse ca-  
lidos scribunt, qui fracta ossa solidant. Vinum picarium *Hybiscira-*  
in lana succida efficit, ut luxata celerius coeant. Purga- *dix.*  
tur hybisci radix, atque hinc medulla rasa in splenio ad-  
alligatur. Potest adici tritici farina, & cum liquore oui  
ita subigi, ut sit cataplasma. Radix illa aquam coagu- *Muscus.*  
lat, in qua sub dio horas aliquot maduerit. Musco uiti-  
cis utuntur ueterinarii: quernum alii, alii in ulmo lectum  
preferunt. In honore est ueteri exemplo quam confer- *Cōferuam.*  
uam vocant. Muscus est densus, herbaceus, spongiosus,  
hærens aquatilibus petris, cuius efficax natura nobili *Historia.*  
historia consignata est. Putator quidam ex alta arbore  
deciderat omnibus ferè ossibus confractis. Præsto ad-  
i rant



INSTIT. CHIRURG.

rant amici, qui corpus eius uniuersum eo musco obliga-  
runt, atq; ita relatum domum in quiete tenuerūt, subin-  
de conspersa aqua ex eo flumine, quod muscū alluebat,  
ne uidelicet muscus emarcesserit. Rarò nec nisi deficien-  
te herba remedium mutatum est. Atq; hac medela incre-  
dibili celeritate cōualuit. Aestate bene carnosio duroq;  
corpore, recenti malo exemplum uetus liceat imitari.  
Vetus est & uulgo familiare auxilium in iis qui ex alto  
*Pellis ouilla* præcipite, aliquid fregerunt, aut contuderunt. Pellis  
ouilla recens detracta corpori affigitur, quæ myrteo te-  
pido uel rosaceo perfundi potest. Sed eos præcipuè iu-  
uat, quibus aliquid cruoris in cutē diffusum est: conco-  
quit enim ac digerit. Poroticò est, farinæ triticeæ unc. 6.  
sanguinis draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ an. 3. 1.  
omnia oui candido iuncta in linteo uel aluta alligantur.  
Triticea farina, gummi & mânia incoquuntur aqua: fit ca-  
taplasma quod reprimat, continet, & poron gignit. Atq;  
hic possunt è tragacantha, gummi, sarcocolla & aliis id  
genus mucagines colligi ad cataplasmata: è pauca mate-  
ria ferè sedecuplam mucaginem conficias. Iam uerò ce-  
leberrimum, & medicinæ ueteri decatatum remedium,  
Iis appellatum: quod in neruorum uitiis describetur.  
*Moschionis* Laudatum quoque Moschionis catagmaticon: inserto  
callo uulnera coniungit, cōtusis testiculis & aliis parti-  
bus medetur: hydropicos liberat. Exerta sedis tubercu-  
la reprimat, & rhagadas sanat dilutum butyro: gutturo-  
sis remedio est: omnem duritiem dissoluit: luxatis & cō-  
tortis articulis prodest: clauos adimit, qui in pedibus &  
manibus sine ulcere excitantur, atque omnino multi-  
plicis usus est. Cuius mistura sic habet: Lithargiri, pi-  
cis, seui uitulini ana unc. 20. terebinth. unc. x. mannæ.  
thuris tantundem, ceræ unc. 5. æruginis unc. 1. opopana-  
cis unc. 2. galbani tantundem, olei cicini, aceti, succi mo-  
ri ana heminam unam, picis liquidæ hemine dimidium.  
Lithargyrus leuissimè teritur, & fictili uase uel æneo  
cū cicino coquitur: ubi efferbuerint, adeps & manna inii-  
ciantur: assidue mouentur dū coeāt & spissentur: hic pix  
cera resina admiscuntur. Iam non inquinantibus galba-  
num



# LIBER III.

66

nū immittitur, deinde ærugo & opopanax aceto resolu-  
 ta. In alio uase mori succus & pix liquida ad crassitudinē  
 cocta cæteris permiscetur, coquuntur rursus ad purita-  
 tē: ex quo in uas aliud quod uinum habeat, deponitur,  
 atq; ita permittuntur triduū: postremo ex eodē uino pi-  
 sta ad usum reponitur. Adhibetur pharmacū in linteis,  
 & in aluta fractis ossibus intēditur. Alioqui e duplo ro-  
 saceo dissolutū nō aliter quā ceratū albū fasciis illinīt  
 & plagulis. Aegyptia Andromachi mollit, digerit, ad-  
 stringit, uulnera cruēta iungit, & alia adiuuat: uomicas  
 exugit, permagna uulnera ense facta etiā profundissima  
 triduo glutinat, præcisos nervos & musculos cōmittit:  
 luxatis, fractis, cōtusis, attritis & cōtorsis ossibus reme-  
 dio est, & cōtra inflāmmationes ualet: dolētes nervos &  
 musculos lenit: ferarū morsibus adhibetur: lippiētibus  
 & cephalalgicis solatio est impacta frōti: callos emollit,  
 & scirrhus edomat ac breuiter optimū ad plurima reme-  
 diū est. Describitur à Græcis Galeno & Aetio uitiosis  
 iā & corruptis tū Græcis tū Latinis codicibus. Nos ex  
 Galeni sentētia ita restituimus: Ceræ, litharg. ana dena-  
 rii 144. ammoniaci denar. 72. terebinth. unc. 4. & s. alias  
 unc. 4. succidæ lanæ ustæ unc. 2. & drac. 2. aristolochiæ,  
 thuris, squāmarum æris, & stōmatis ana unc. 1. myrrhæ  
 drac. 3. alias drac. 4. opopanax denarii 2. olei ricinii, si-  
 cyonii uel antiqui libr. 4. & s. Sic enim Gal. pro sex he-  
 minis olei Andromachi, Asclepiades autem heminas  
 3. scripsit. Litharg. oleo coquitur dum concreseat, squā-  
 ma iniicitur: ubi non inquinant, cera conspersa mari, ut  
 uoluit Asclepiades, deinde ammoniacum sedulo contu-  
 sum imponuntur: liquatis his terebinthina additur: au-  
 feruntur igne: hic thus & lanarum cinis insperguntur:  
 refrigerata manibus conuoluuntur, & usui sunt. Ni-  
 grum catagmaticum Asclepiadis, quod quia optimum,  
 & p. 15 n. uocata est, admiranda in fracturis, etiam ossibus  
 lepreffis: immersa hæc & ab aliis seiuncta callo copu-  
 at. Litharg. bituminis ana unc. 25. ceræ, picis aridæ ana  
 unc. 12. & semiss. resinæ picæ, terebinth. ana unc. 6. &  
 rach. 2. aluminis, propoleos ana denar. 30. ammoniaci  
 1 2 unc. 3.

Aegyptia  
Andromachi.

Ascle-  
piadis.



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Panalithes*

*Ordo curationis in fracturis.*

unc. 3. æruginis denar. 10. & s. olei sextarii 4. Lithargyrus in oleo coquitur, dum non contaminet: cera & bitumen seorsum liquefcunt, neque commouetur, his pix fusa traiecta que colo cõiungit: omnia lithargyro vniunt. Ammoniacũ verò bene cõtusum postea immittit, atque ita coquuntur omnia in solidum corpus: hic premollita cera & propolis permiscetur: ubi probè coierint, subducuntur igne, tumq; alumen & ærugo in pollinem trita respergunt, uersantur omnia, & oxyrato mersa subiguntur. Panalithes ad contusa, fracta etiam cum vulnere, uulnera neruorum & uertebrarum: purgat collectio- nes, incisum scrotum solidat, uenenatos morsus bestiarum sanat, aliaque præstat plurima. Olei dulcis unc. 9. bituminis, ceræ, resinæ picæ, picis aridæ an. libr. 1. Litharg. cerusæ, æruginis an. denar. 10. thuris, ammoniaci, myrrhæ, aloes ana unc. 1. opii, succi pomorum mādraq. ana denar. 6. aluminis, chalcanti, chalciteos, croci ana semuncia, aceti quod sufficit. Quæ teri possunt omnia à lithargyro ad crocum in puluerem trita ex aceto conducuntur in mortario, dum sit luti crassitudo. Oleum, cera, bitumen in fabales pillulas diuisum nihil uersando colliquantur, liquatis pix & resina commiscetur, collantur omnia, atq; reponuntur. Fracturis ossium caluarie, cartilaginum, utilissimum est barbarum quod capite de Hæmorihagia describitur, & alia, quæ superiori- bus libris scripta inuenies. In fracturis prima cura sit, ut initio repellas phlegmonem, & dolorem prohibeas. Tertio iam & quinto die si quid contusum erit, in pus & saniem conuerter: suppurationem sedulo purgabis: siccabis ulcus, & si qua ossis vitia sũt, corruptela, caries. malè iuncta squāma, ea omnia diligenter adimes: fractura partes ritè coaptabis, & callo iunges. At postremum vlcus, implendum, & cicatrice claudendum est. Cõtingit aliquādo in capitis nuda membrana, ut minus tergendo siccandoque quā conueniat fungus succrescat, quia uidelicet in tumorem laxum & mollem membrana ex- tuberat. Hic ergo siccadum magis, & quæ tergeant, in- cidant, laxent intermiscenda. Cõcreti calli signum est

quæ



quū iam sine ulcere exudante sanguine fasciæ intingun-  
 tur. Tum. n. coactus porus asperginem sanguinis ē spon-  
 giosis ossium cauernis foras extinguit. Id ferē fit criti-  
 cis diebus 14. 17. 20. 21. & hinc succedentibus septena-  
 riis. Signum quidem à veteribus annotatum, quanquā  
 aliquando sine eo calli concreſcunt. Conueniens callus  
 est, qui neq; maior, neque minor, durior aut mollior q̄  
 oportet, neq; distortus est. Iustus callus confirmari de-  
 bet medicamentis quæ *ἰσχυρά* vocant, quæq; cruētis vul-  
 neribus adhibentur. Siccant leniter, & callum mediocri-  
 ter confirmant. Ac de his multa capite de glutinātibus.  
 Callum confirmat affusum vinum, quod *τεθαλασσομήτιον*  
 & *θαλάττιον* Græci, Latini salsum & marinum vocant:  
 quod si desit, saltē vino leniter adstringente liqueface-  
 re oportet. Idem vinū efficit, in quo balaustia, rosa, myr-  
 ra, muscus qui veluti canities quēdam quercui inheret,  
 absinthium, vlmī cortex & radix præcokerint. Addunt  
 poroticis quæ callum durant, bolum armenium, galbu-  
 los cupressi, & alia id genus. Sed hic moderatio quædā  
 adhibenda est, ne nimium stringendo nimium atteratur  
 callus. Confirmant poron rosacei vnc. 4. resinę vnc. 3. ce-  
 ræ vnc. 2. colophonię, mastiches, thuris ana semuncia,  
 coni cupressi, radicis erythrodani ana dra. 1. Melius fiet  
 auctis emplasticis, minuto oleo, & adiecto momēto cro-  
 ci. Al. Thuris, farinæ piltrinalis, picis, mastiches, boli ar-  
 menij an. vnc. 2. sepi arietini, ceræ albæ ana selibra. Li-  
 quefactis ceræ & sebo reliqua infriantur: in mistura lin-  
 teum sepius inculcatur, & satis inquinatum fracturę im-  
 pingitur. Sparadrapum vocant. Vtuntur Apostolico &  
 Oxycroceo. Apostolicon materiam attrahit cogendo  
 poro: siccatur, confirmatur. Oxycroceum duriores poron  
 magis emolliat, quā extenuet: vtrunque emplasticon  
 & gignendo callo idoneum est. Iam uerò constare ar-  
 bitror remedia comparari, vt mollis & dura corporum  
 natura est, vt alio callo tibiam messoris, alio pueri con-  
 seras. In hoc enim minū siccantia, minū stringentia iu-  
 stum poron contrahent. In messorē fortioribus omni-  
 no vtendum est. Callus maior extenuandus est dedu-  
 ior.

Conueniens  
callus.

Mista quæ  
confirmans  
poron.

Sparadra-  
pum.

Apostolico.  
Oxycroceo.

Callus ma-  
ior.



Et a parte alimēti, & mutata qualitate diu leniterq; affri-  
canda pars est ex oleo, sale, nitro. Eadē calida marina fo-  
ueri debet, iduciq; malagmatis quę discutiāt, quęq; cō-  
trahant: colliganda arctius: oleribus utēdum & uomitu.

*Excrefcens  
callus recēs  
& uetus.*

Alterum mēbrum perfricandum, uinciendum molliter,  
& sinapismo illinendum, unde plus sanguinis excipiat.  
Paulus in recēti callo qui supercreuit, uehēmēter strin-  
gētia instituit, arctissimē legat, lamina plūbea, interdū  
apposita. In eo uerō qui iam uetustate induruit, si quidē  
pudendum inde ac deforme mēbrum est, neq; officium  
facit, cutem aperit, deradit, poron terebra pertundit, la-  
cerat scalpro, quodque uidetur superesse, perampurat.  
Quod si nullum naturę munus per callum intercidit, si  
nullus aut non ita conspicuus membri pudor est, nullus  
denique dolor, pręstabit abstinere ferro. Qui uerō infra  
modum crescit, aut non crescit quidem, quo iam tempo-  
re admotis auxiliis debuit coalescere, alia ratione pro-

*Vnde tar-  
datur porus*

moueri debet. Ac ferē tardatur callus, quia nimium ac-  
sępius fouetur locus, parum conuenienter adstringitur,  
sępius & ante tempus fasciæ resoluuntur. Non raro quo-  
que in ratione uitę peccatum est. Omnia ergo commu-  
tanda in melius, ac de integro ad pręcepta artis, ad auxi-  
lia & alimenta, quę callum gignant, recurrere oportet.  
Quod si atrophia & inopia alimenti totius corporis cal-  
lus nō prouenit, in primis consulendū corpori, deinde  
affectę parti, postremo ad curā calli decurrēdum est. Sę-  
pe etiā astrictioribus linteis affractum mēbrum uitium  
contrahit, atque intabescit. Hic ergo instauranda uita  
est, distringenda ligatio. Ac de remediis quę ad hanc  
rem faciant, dropace, sinapismis & aliis dicentur quę-  
dam capite de Pyroticis. Sed quia hic casus uitiosa ossa  
interdum sequitur, pauca quoque hoc loco contra hoc  
genus mali differemus. Extenuatum membrum uehe-  
menter iuuat commoda deligatio, sed contra quā in  
fracturis. Marcescente tibia femur superius alligamus  
ab inguine ad genu deducta fascia: atque initio qui-  
dem qua scilicet inguen proximum est, arctior deinde  
paulatim relaxatur. Sic enim per communes uenas qua-  
si rinulos

*Extenuati  
membri cu-  
ratio.*

*Deligatio  
extenuati  
membri.*



si riuulos sanguis deorsum exprimitur. At contabescere dextro femore, uel toto crure, femori sinistro fascias iniicimus è genu ad inguina ductis orbibus: atq; initiis astrictior deligatio: astricta quoq; sed minus, quo propius inguen appetit. Qua quidem arte aliqua pars sanguinis ueluti diuerticulo in gracile membrum recurrit. Sit autem ea ratione temperata deligatio, ut neque dolorem creet neq; uniuersum sanguinem à sano membro repri-  
 mas. Hoc n. alere frugalius, nutrice tamen certum est: quod quum langueti mēbro aliquid proprii alimēti im-  
 periat, retineat tamen unde tenuiter sed cōmode nutria-  
 tur. Eadem ratio in superioribus membris seruanda est. Arescēte vlna brachium deligamus: cōtabescēte brachio uel tota manu, ad reliquā manū uincula cōuertimus, fri-  
 ctione, perfusione, metasyncriticis uocatis, dropacibus, sinapismis ea ratione utēdum erit, quæ capite de Pyro-  
 tici describetur. Sunt etiā acopa ad mēbra cōfecta macie  
 accōmodata: quale est Damocratis. Illinitur à cibo: mar-  
 cidus exucco q; senes reficit, & calore fouet: Hyeme &  
 in frigoribus inungitur dormituris Vespere. Ammonia-  
 ci, ceræ albæ, mellis recentis adipis anserini recentis,  
 thuris ana unc. 10. galbani, medullæ cerui, æsypi, tere-  
 binthinæ pellucidæ ana unc. 4. uini falerni, alioqui gil-  
 ui odoriferi ad circiter heminas quinque, olei hemi-  
 nas 40. Parandum est maiusculo mortario: thus & am-  
 moniacum confringuntur, & affuso uino macerantur:  
 teruntur, circunducuntur duro cochleari, dum sit mellis  
 crassitudo: mel æsypus, medulla cerui deinceps immit-  
 tuntur, uersantur, circumaguntur, donec cum aliis bene  
 cocant. Dum hæc fiunt, cera figlino uase cum oleo eli-  
 quatur: ex quo adeps, terebinthina, galbanum permi-  
 scentur: unita omnia transuantur, & spathula com-  
 mouentur. Refrigerata pinsuntur manibus, postremo  
 aliis in mortario coniunguntur: fitque liquidi bonique  
 mellis crassitudo: stanneo uase uel buxco reponi debet.  
 Neruorum doloribus, perfrictionibus, inflammationi-  
 bus uteri in pestis utilissimum est. Distortus callus, si  
 quidem mollis est, laxante foru & diaphoreticis exina-  
 niri

*Acopon  
 Damocratis  
 ad membra  
 tabida.*

*Distortus  
 callus.*



INSTIT. CHIRURG.

*Mollior cal-  
lus & du-  
rior.*

*Mucosus  
humor.*

*Mucosus  
humor quo  
modo uan-  
cuandus.*

niri debet: fouet tepida, hydrelæo, altheæ, & similium decocto. Discutitur arida ficu mista stercore columbino. Sed utrunq; genus medicamentorum libro. i. abunde explicatum est. Si uerò nimium induruit, eadem quæ in supercrescente & inueterato poro cõsilia sunt. Mollior adstringentibus firmari debet. At uix durior esse potest, nisi ea de causa fragilior uideatur, ubi nouo callo opus est. Est quû in cartilagine, neruo osse mucosus humor colligitur infirmitate naturæ, quæ cõcoquit: albus is est & uiscidus, qui similitudine puris medico possit imponere: cedit enim digito pressus atq; dilabitur. Is si negligitur, sic ossa afficit, ut hæc inde corrumpantur: uicinæ carnes uitium trahant, & mucco elangueât. Ex quo fit, ut relinquant ossa, societasq; illa & copulatio quæ ossibus est cum carne, dissoluatur. Aliquando quoq; in tophos humor ille concrescit. Sed de tophis postea dissetur, ut de gangliis, quæ inde etiã cõmouentur. Contusis neruis, osse, cartilagine mucus ille magna ex parte nasci cõsueuit, qui cum crassus sit, lētus & frigidus, & in alto desideat, nō ita facilè uacuari potest. Curandum tamen, ut laxata cute, fusa incisaque materia in halitum & uapores sensim expiret: alioqui factò uulnere repurgari debet: quanquam partium ratio prius habenda est, alioqui periculum fit, ne uel occidas, uel grauiter lædas. Quod in igne similiter animaduertere oportet. Finge igitur contusa costa, fracta, collisa, coisse mucum, & desperatis, aliis auxiliis ad ferrum & ignem decurrendum. Periculum imminet, ne uenæ, arteriæ, nerui qui interseruntur costis, conuulnerentur: ne uel ferro uel igne intima mēbrana uioletur. Inueterato malo, inquit Hippocrates, & desperatis aliis remediis, si quidē dolor est, & mucum illum caro lateris concepit, optimum in igne remedium est: uidendum tamen, ut neq; os cōtingat ignis (nisi iam corruptum atq; sideratum uideatur) neque superficiem solam transcurrat, sed carni prudenter imprimatur, ut ad membranam non perueniat. In fractis & dimotis ossibus inflammationum reliquæ disperguntur, ne inde rigeant articuli, & ad suos motus colligen-



colligentur. Disperguntur pharmacis quæ molliant atque discutiât: frictione & motu: frictio sit lenis, mollis, quæ paulatim intendatur circumductis manibus modo sursum ac deorsum, modo in latera & orbem, ut inde musculorum fibræ molliantur, & reliqua inflammatio euanescat. Leniter quoque mouendus articulus, ut paulatim & sine dolore naturæ suæ consuescat.

*De remedijs neruorum.*

*Cap. II.*

**S**equitur neruorum locus, in quo tendines & ligamēta *Vitia neruorum.*  
 includantur: neq; subtilius de nominibus disputetur, qua parte præcipue rerum nō uerborum doctrina requirēda, & cura sedulò suspicienda est. Igitur uulnerant nerui, cōtundūtur, dolēt, torpent, rigent, cōtorquentur. Sauciato neruo conuulnerari caro ferè cōsueuit. Sauciatur, quia pungitur & inciditur. Quā quū accidit, omnino pro *vulnera neruorum.*  
curetur, ut ne ante tēpus os uulneri coeat, & iungat *Cautio.*  
ur, unde sanies nerui suo ueluti emissario interclusa, neruis  
uos lacestat, atq; hinc oriatur dolor, phlegmone, febris,  
deliriū, cōuulsio ad quæ horrēda mortes postremò inse-  
quātur. Excludēda sūt a neruorū cura, qua certè neruos *Vitanda in*  
cōtingāt, quæcūq; uel natura sua uel aduēticia qualitate *neruis.*  
refrigerent, quæcūq; acria, quæ humectent, laxēt, mol- *Frigidum*  
liant, concoquant, putrefaciant. Cuidam ad flexum na- *quantū no-*  
tium qua in femur desinit, coit abscessus: expurgata *ceat neruis*  
forde detectus neruus est, qui frigore percussus uniuers- *Historijs*  
sum crus stupidum reliquit. Alteri uulnus magnum in *ostenditur,*  
brachium illatum est cæsis etiam neruis, qui a ceruicis *quod no-*  
finibus per brachium decurrunt. Adhibitis iustis reme- *ceat frigus*  
diis, lanæ quoque oleo calēte tinctæ superdatae sunt, iis  
demq; obstipata ceruix contra iniuriam frigoris. At is  
egressus domo publico se dedit: ubi paulatim frigescente  
lana oleum quoque refrixit: ex quo dolere cœpit, tenso  
que membro & ad ceruicem usq; progressio malo, totus  
ferè conuulsione rignit. Omnino ergo ui frigoris uin-  
dicandus neruus est, multo magis quum uulnus accesserit.  
Frigidum enim, inquit Hippocrates, ulceribus ini-  
micum & neruis. Itaque dum hi curantur, quumque  
inseruntur pharmaca, non solum uidendum erit, utne  
 hæc



hæc imponatur frigida, sed et ne vulnus aut certe q̄ mi-  
nimum frigori exponatur. Inusta ala uetat Hipp. ne dum  
curatur ulcus, brachium altius attollatur, ueritus scilicet  
ne ita explicata ala excepto frigore uioletur. Idque me-  
tuendum magis, quam in ulcere dolor est, quæ uisio com-  
mit, qualis est ubi cauterium impresseris: deinde etiam si lo-  
cus neruaceus est, & aliquid neruorum nudum exillit.

*Aeria quæ  
in nocent.*

Gravior quoque iniuria aerium est, quæ quum admota cuti ue-  
hementer lædatur, ægrum quidem præcipitabunt, si nuda-  
to neruo continenter inseratur. Quidam posteriore tibia  
vulneratus est, qua parte tres illi muscoli in tendinem  
cocunt, qui calcem comprehendit, atque hinc in plantam ex-  
porrigitur. Itaque aperto neruo medicamentum quod ha-  
bet euphorbium, continenter illitum est. Ex quo dolore

*Vitiosa cu-  
randi via  
Thessal.*

facto, conuulsis neruis, atroci morte sublatus est. Tole-  
rabilior fortasse uideatur, quæ nihilominus periculosa est  
medendi via, iam olim Thessalo & antecessoribus Gale-  
ni familiaris. Cuiusdam ergo diuisa caute compuncto neruo  
vulnerata stylo manus est huic pharmacum Thessalus im-  
pegit, quo cutis coalesceret. Atque inde orta inflammatio-  
ne cataplasma e farina tritici hydreleo cocta instituit,  
ex quo contabescens æger intra septimum diem iugulatus est.

*Alia inimi-  
ca neruis.*

Gladiator quidam ad genua qua patella est, & tenuis la-  
tusque, redde se explicat, vulnus acceperat: in quo capta  
curandi uia uisitata Thessalo, ortaque inflammatione idem  
adhibuit cataplasma, calida aqua liberaliter affusa co-  
persum quoque oleum est. Atque hoc genere curandi tum hic  
gladiator perit, tum alii rapti sunt, alii claudicarunt, qui  
busdam manibus, contorta, inutilis manus reddita est: multis  
putruere articuli: ac breuiter quibus super datum fuit,  
grauè aliquod detrimentum corporis incurrerunt. Col-  
legendum ergo peccasse Thessalios, qui implexum morbum  
quasi unum & simplicem curarent, & quum mederentur  
morbis, nullam rationem affectus partis susceperent. Pecca-  
tum quoque hac parte, quod calida foras, conspersus oleo, &  
cataplasmate illo inductus neruus est. Hæc enim ut alia  
genera inflammationum iuuare possint, inflammatis neruo-  
rum uulneribus inimicissima sunt. Atque hæc obtiter de  
uicula

*Explicatur  
peccatum  
Thessalio-  
rum.*



uitiosa illa curandi uia. Nunc aut legitima medendi rō  
 explicāda, & iusta neruorum remedia describenda sunt.  
 Atq; si lubet, ad curā reuocentur, cui manu stylo vulne-  
 rata neruus suffixus est, & aliter gladiator, qui ad genu  
 vulnus acceperat. Optimum enim docendi genus atq;  
 clarissimum, qđ suis legibus quidē & pceptis constat,  
 exemplis quoq; ita illustratur, ut tota curandi rō uelu-  
 ti qđā rerum historia sub aspectum ueniat, & quasi ocu-  
 lis ipsis usurpetur. Quæ pfectō uia hac p̄cipue medendi  
 parte consecranda nobis, in qua p̄cipitia multa occur-  
 runt, & nō nisi graui iniuria uitæ aberratur, itaq; pona-  
 mus cōfixum neruum uulnerata manu, leue quidē vul-  
 gari sensu, at reuera periculosum vulnus, etiam si stylus  
 tā subtilis q̄ acus pupugerit. Etenim orietur dolor, &  
 ille malorū uersus notatus initio connectetur, si uel ne-  
 gligas, uel aliena remedia instituas. Quæ oīa duplici ra-  
 tione defugere oportet. Primū quidē iusta medēdi uia:  
 deinde ubi remediis nihil proficias, pfecto neruo unde  
 grauiore illæ iniuriæ cōmouentur. Nā non solū neruo  
 sed capite musculi uulnerato, si quidem alia auxilia de-  
 sperantur, ad ferrū decurrere oportet, oīnoq; p̄ciden-  
 dus tendo, & neruus est. Sed (si datur) alia prius inuen-  
 da medendi uia: primūq; animaduertendū, an os vul-  
neris & uia ad neruum satis dehiscat. Vbi enī angustio-  
 ra sunt, & p̄terea metus est, ne celeriter coeant, in cru-  
 cē uel decussem cōfixā cutē interfecabis: multo magis  
 si quid grauioris iniuriæ iminet, ut sit, qua sanies efflu-  
 at, qua trāspiret neruus, qua deniq; uis medicamēti ad  
 punctum neruum permeet. Ac plethorico deplēdus san-  
guis statim initio, Caco chymo uirium pharmaco expur-  
gandum est. Dextra manu læsa ē malleolo dextro san-  
guinē detrahes: dextro pede uulnerato, axillaris dextra  
aperienda est. Intersecta cute uel alio facto uulnere, si  
quid cruoris inest, lanā, linoxylon, linteolū molle spe-  
cilli nucleo adalligabis, mtingesq; sapa uel melicrato,  
ne asperitate lædant: tum exprimes, & cruorē inde mol-  
liter exrergebis. Ac dulci sapa uti oportet, non ea quæ  
astringat. Post initia loco sapa, unū dulce, deinde ēt ui-  
num

*Legitima**curatio.**Optimū do-  
cedi genus.**Hypothesis**Duplex ra-  
tio curadi.**storia.**uero p  
topica.*



num album, q̄ minimū aque sustineat, utile est: quo iam  
tēpore ad cicatricem uulnus adducitur. Fugiendū uinū  
*Fotus ex o-* quod acre est. Ex quo oleo calente manū uulneratā, car  
*leo & oxe-* pū, alā, cernicē torā, sed præcipuē qua in deorsum abit,  
*leo compun-* & dorsi initiū largiter fovebis. Sic at̄ oleū calere decet,  
*cto neruo* ut neq; mordeat feruore, neque tepore soluat. Oxelco  
*in manu.* similiter uti licebit æstate q̄dem, & bene carnosō ægro:  
*Lanarum* omnibus superdant lanæ eodē oleo delibutæ, & aliæ sic  
*usus.* cē supalligant, ne qua parte subeat frigus. Aeger domi  
desidet tepido cōclauī: uino interdicit, parsimonia impe  
rat, procurant omnia, quibus series illa malorū auertat.  
*Quando sol* Ac pro lanis complicata lintea æstate: hyeme linoxylō  
*uēde lana.* vsurpari potest. Bis terve uno die resoluunt omnia, sæ-  
pius ēt hyberna nocte, & ubi intercidit aliquid nouæ in-  
iuriæ. Repetit oleum & lanarum calor resouet, oīnoq;  
adhibet cura, ut ne quid frigeat: quæ omnia ad quintum  
& septimum diē uersanda sunt. His rebus ita prouisis, si  
mul atq; sanies ulceris existit, de medicamentis cogitan-  
*Duplex ge-* dum erit. Quorum ferē duplex genus est. Atq; illud qui  
*nus medica-* dem abunde siccatur, leniter astringit, digerit, & aliquan-  
*mentorū* do exterget: quæ omnia sine ullo morsu & aspredine ef-  
*in vulneri-* ficere oportet: datur hoc in conceptis linteis, & exposi-  
*bus neruo-* to neruo adhibetur. Vbi enim opertus neruus est, altero  
*rum.* tātūm genere uti licebit, quod longius quidē à neruo, su-  
per datur cuti temperatura molli in plagulis, ut uicina  
quoq; cōprehendat. Atq; hoc paulo acrius est, sed ut ne  
mordeat, tenui natura, ualde siccatur, moderatē calefacit,  
apertū uulnus cōtinet, & sanie nerui foras eripit. Aper-  
to neruo carptū linteolum primo genere delibutum in-  
teritur. Ac medicamenta iā nō oleo, sed dulci sapa soluē  
da sunt: deinde hoc genus acrius in splenio superacom-  
modatur: ex quo modo cataplasma impingitur modo la-  
næ adalligantur, oleumq; & alia, ut prius quandiu uideli-  
cet res in metu est, sedulo adhibentur. Accedunt ad hæc  
quæ purgent ulcera neruorum, quæ neruos glutinent,  
quæ putredini aduersentur. Priuatim quoq; in punctis  
neruis abscessus quidem parui, distincti spaciis suboritur,



tur, & uicina occupant, quibus remedia inuenta sunt. At  
 que operto neruo regenerata carne ad acria ueniendum  
*Νι' ε' υ' φ' ο' ρ' β' ι' ο' υ* & similia, quæ non nisi periculo nudatum  
 neruū attingat, et si nō ignoro, qui experientia, freti (ut  
 affirmāt) externum neruum cādenti ferro curent, atq; ita  
 omni iniuria, phibeant. Nunc ergo ad ea oīa materia re-  
mediorū deinceps explicet, initio ducto ab oleis. *Particula -*  
*rismateria.*  
Olea.  
 cōueniunt ad forus, & qbus pharmaca diluantur, dulce,  
 bimum, trimumve, nō astringens, anethinum, chamæme-  
 linum, zābacinum, lumbricinum, hypericinum, canabi-  
 num, caryinon, rosaceum, in quo terreni uermes infer-  
 buerint: terebinthinum, ricininum, sicyonium, rutaceū,  
 galbanarium, styracinum, sinapinum, raphaninum, ex  
 ouis pressū, & alia quæ in anodynīs descripta inuenias.  
Leuiora initio quādiu dolor metuitur, acriora ubi iā di-  
scutiēdum est. *Medicamē-*  
In medicamentis quæ aperto neruo adhi-  
beas, alia mitiora, alia magis cōtrahunt. *ta in nudis*  
 Atq; hæc mate- *neruis.*  
 ria secundo libr. ferè explicata est. Cera utimur, resina, *Lauanda ce*  
 & metallicis prius elotis. Calcem ex aqua dulci sæpius *ra, resina, et*  
 extinguimus, sæpius lauamus: ex quo solutā plurimo ro- *metallica*  
 sacco nudato neruo imponimus: at rosaceo sine sale cō- *quando.*  
 parato uti cōuenit. Quidā et ex matura bacca oleę cōfe-  
 ctum uolunt. In eodē vsu est diapompholigos, quod hoc  
 loco ita cōficiatur: Cerusæ, pōpholygos, lithar. ana  $\bar{z}$ . 2.  
 cadmiæ  $\bar{z}$ . 4. medulæ cerui  $\bar{z}$ . 3. ceræ, olei ros. ana libr. 1.  
 myrtini sēlibra: *metallica trita, cribrata, lota, liquatis*  
 aliis intermiscantur: coquantur omnia dum non inqui-  
 nent. In usu (quod & de aliis crassioribus pharmacis se-  
 mel dictum sit) diluendum oleo: æstate, rosaceo: hye-  
 me, chamæmelino & aliis generis eiusdem. Phœnicino *Phœnicinū*  
 similiter utendum erit, quod minus habeat chalciteos. *Pastilli.*  
 Pastillorum eadem ratio Polyidę, Andronis, Passionis,  
 qui in hēmorrhagia describentur. Chalcārtho loto & re-  
 liqua materia minuta in pollinem comparētur: diluun-  
 tur ut prius, & durioribus naturis magis conueniunt.  
 Calx sub canicula tertio lauanda mari, atque imbuta  
 oleo, operto neruo opponitur. Melius elota & magis  
 resoluta sapa, uel, ut alij, multo oleo etiam exposito ner-  
 uo



uo adhiberi pōt. Aqua uerò in remediis neruorū oīno  
abstinendum, nisi ubi calor & acius medicamentum tē  
perandum: sic enim misceri potest, efficiendum tñ est, ut  
dum liquantur illa, absumatur aqua in halitum, & solā  
uim qua tēperet, relinquat. Amicum neruis dia tu meli  
ros, tetramyron appellant, qđ iā exoletis myracopis cō  
fici non pōt. Non longē abērit qđ hac temperatura cō  
paretur: Mellis, terebinth. liquidæ an. unc. 3. olei nardi  
ni, costini, rosacei, chamæmelini an. unc. 3. uini odorife  
ri lib. 1. foliorum maioranæ, calendulæ, florum chamæ  
meli, anethi, meliloti, rosarum, rorismarini an. drach. 2.  
cinamomi, radicis acori, cyperi an. drac. 1. Hæc oīa no  
cte integra macerentur uino, postridie olea sup affundā  
tur: coquantur oīa dum expiret uinum: reliqua conce  
pta colo traiciantur: expressum oleum melli & terebin  
thinæ seorsum fufis uniat, moueātur oīa in cineribus  
sublatis igne puluis respergatur ex ambaris & moschi  
ana granis duobus. Sunt & alia id genus, q̄ in anodynīs  
describentur, quæ ceræ, terebinthinæ & melli mista ad  
rem p̄sentem pertineant. Sunt qui solo melle ex rosa  
ceo pisto uti soleant. Est & hoc ē melle qđ cōueniat. Li  
tharg. olei ueteris an. un. 4. colophonæ, ceræ lotæ, axun  
giæ veteris ana vnc. 3. & ad circiter drac. 3. Lithar. oleo  
coquitur, deinde axungia, postremo cera, & colopho  
nia seorsum fusa coniunguntur: in usu soluitur ut prius.  
Aliud. Ceræ vnc. i. terebinth. semuncia, olei mastichini  
vnc. 3. mellis semuncia: coquantur oīa molli carbone:  
subductis igne insperge pulueris lumbricorum, mirrhæ  
radicis symphiti ana drac. 1. versentur oīa, & sedulo cō  
iungantur. Aegyptia Andromachi, Giluū Haliei, Iſis  
quæ in his libris scripta inuenias, soluta rosaceo vsui  
sunt. Sed quæ parantur melle, magis tempestiua sunt,  
quo tempore sordescit vlcus. Quæ uerò sunt ē metalli  
cis, & siccat magis, leniora quidem initio, fortiora post  
initia usurpanda sunt. Turunda posteris imbuitur tere  
binthina, oui luteo, & momento croci inseriturq; decli  
ui parti uulneris, qua emissarium sordis patescit: terget  
& lenit. Iam uerò quæ purgent ulcera neruorum, quæ  
que

Aliud ē  
melle.



que glutinent, ex secundo lib. repetenda sunt. Peculiari  
 ter neruos cōiungit uocata Cizicene. Thuris quamopti *Cizicene et*  
 mi, myrrhæ, aristolochiæ, chalcitidis uisæ lotæq; iridis *quæ gluti-*  
 galbani ana semuncia, lythargyri, terebinth ana unc. 1. *nent neruos*  
 olei unc. 9. Omnia ahenis capta blandis cineribus co-  
 quenda sunt, mouendaq; sine requie: postremo in frigi  
 dam mersa manibus coniunguntur. Aliud. Carnis lima *Elimacibus*  
 cum unc. 2. myrrhæ, thuris, picis torrefactæ ana drac. 1.  
 Tunduntur carnes, reliqua uerò in puluerem trita sedu-  
 lo intermiseruntur. Aliud. Carnis cochlearum bene con- *E cochleis.*  
 rusæ unc. 3. farinæ piltrinalis, picis sicæ, pulueris lum-  
 bricorum, & radices symphyti ana 3. 2. terebinth. è uino  
 lotæ semuncia: iungantur oia. Visitata sunt unguentum *Visitata po-*  
 de uermibus, Basilicum magnum Mesuæ, emplastrum *steris.*  
 relatum ad Andromachum, Diachilon in linteolo, inci-  
 so neruo soluta adhibentur, soluuntur rosaceo & tere-  
 binthina mistis. Intestinum terræ per se intritum & ap-  
 positum, uel aliis cochlearum more intermistum. Atq;  
 hæc obiter. Nunc autem breui cōpendio oia cogamus, *Compendiū*  
 Cōpuncto neruo prima ratio totius corporis habenda *eorum quæ*  
 est, ut uel purgetur pharmaco, uel phlebotomo deplea- *dicta sunt.*  
 tur. Deinde prouidendum, ne diuisa cutis celerius coeat:  
 quod si metuitur, intersecandum atq; ampliandum uul-  
 nus est: extergendus cruor, & si expositus neruus est,  
 primi generis pharmaco integere oportet. Oleo fouen-  
 da manus, carpus, cubiti articulus, ala, ceruix: superalli-  
 ganda lanæ, instituenda uita quæ grauiores casus pro-  
 hibeat. Qui si iam existunt, neq; remedio locus est, in-  
 tercisa cute, satis ampliato uulnere medium neruum p- *N.*  
 cides: hic enim detrimentum partis certo exitio uitæ  
 pferendum. Præfecto neruo extra periculum æger est,  
 & cōmuni illa curandi uia uulnus claudere oportet. Plā  
 uerò intacto neruo & plaga satis hiant, eadem captan-  
 da medendi uia quæ aperto neruo exposita est: nisi q̃  
 relicto primo illo genere pharmacorum, tātum utimur *Secundum*  
 secundo, de quo iam cōnectatur oratio. Atq; hæc mate- *genus phar-*  
 ria in multiplici natura rerum posita est. Incerealibus *macorum.*  
 subtilissimus est orobus: hoc solum calidius est. Lupi  
 nus



**Ceralia.** nus quoq; & cicer in usu sunt. In farinam cōmoluntur,  
**Lixivium.** incoquuntur lixiuio, coguntur oīa in cataplasma. Lixi-  
 uium ut est materia unde excolatur ita uel acius, uel  
 clementius esse par est. Præstantissimum ē ficu & tithy-  
**Liquabilia** malis. In liquabilibus succus est cyrenaicus, medicus, scor-  
 dolaſcer, quibus Aſſæ noſtræ & Bengerinum ſucceſſe-  
 runt: ſagapenum, propolis recens, opopanax, galbanū,  
 piū, refina, terebinthina præcipue & larigna, adeps qui  
 fit tenui & calida natura, ex feris, p̄datoriis auibus & ru-  
**Planta.** ſticis, de quibus in attrahentibus. In plantis tithymalo  
 rum ſuccus & cinis, ſuccus & puluis maioranæ, calamin-  
 the, ſabinæ, anagallidis, baccarum lauri & iuniperi, aco-  
 ri, mari, aristoſochiæ, mei, gentianæ, ireos, enulæ, bryo-  
 niæ. Adhæc piper, cardamomum, zynziber, caryophil-  
**Metallica.** lon, cinamomum aliaque id genus. Metallica uſui ſunt  
 miſy, chalcitis, ſquamma, ærugo, chryſocolſa, calx, ſul-  
 phur uiuum, uitreoli genera, arſenicum. Fermentum  
 quoq; utile eſt, ſed quanctuſtiſſimum euphorbium, ca-  
 ſtoreum, ſtercus columbinum. Poſtremo quoque multa  
**Formule** rum uſus eſt hac parte, quas in attrahentibus ſcriptas  
**quedam.** inuenias. Terebinthina p̄ ſe in natura molli: in dura cū  
**propolis.** ſantillo euphorbii ſatis efficit. Eadem rō p̄ oleos, ſi qui  
 dem pinguis eſt: durior cōueniente oleo uel adipe mol-  
 liatur. Fermentum uetus p̄ ſe, cum propoli pingui, mel-  
 le, pice liquida uel pari terebinthina miſtum. Lactē ē  
 tithymali leniter intingitur: ex aceto piſtum efficacius  
 eſt ſagapenum, terebinthina, oleum ſimul liqueſcunt,  
 uel cum his ſagapeni loco, galbanum, opopanax & alia  
 id genus: tantumq; olei intermiſcendum, ut ſit tempera-  
 tura mellis. Reſinis liquidis, terebinthina, abietina, pi-  
 nea utendum ſiccis, friſta abietina terebinthina, ſtrobi-  
 lina quæ durioribus idonea eſt, pauco oleo ſoluendæ  
 ſunt. Sulphur uiuum, non lapidoſum, tenuium partium  
 aut caſtoreum ex oleo ſubigitur eodem temperamēto.  
 Mollia enim hæc omnia & compage quæ conſiſtat qui-  
 dem, ſed nō diffuat, eſſe oportet. ſordium inſtar in mol-  
 lioribus corporibus, craſſitie mellis in durioribus. Te-  
 trapharmaco duodecima pars ſulphuris, arſenici, eu-  
 phorbij,



phorbii, calcis immiscetur: soluendum prius ex oleo *Me-*  
dicamenti *di' e' v' p' p' bio* plurimus usus est, quod quia in ce-  
ratis ferè est, de his quoque breuiter nobis disserendum.  
Igitur cerata variè concinnantur è cera, pice, resina, pro-  
poli, adipe & oleo. Simplicex è subdupla cera, vt in catag *Creatorum*  
matico: pari, vt emplastrode: subtripla & subquadru- *ratio.*  
pla ad oleum, vt in acopis, temperatur. Miscetur adeps *Simplex.*  
& terebinthina liquida, sed vtroq; misto oleum iusta ra-  
tione minuendum est, ne temperamentum liquidius dif-  
fluat. Picatum quodque aridam resnam capit è ceræ  
parte una, tribus & quatuor olei, subdupla pice vel resi-  
na ad ceram compingitur. Quæ ratio seruari potest in  
ceratis, quæ galbanum, propolim, sagapenum & alia id  
genus concipiant. Terebinthina & quæ liquida sunt,  
subtripla cera commiscetur: duplo interdum misto o-  
leo, interdum triplo. Iam verò euphorbij bimi & trimi *Modus en-*  
ferè æquale pondus, & ceræ temperatur: ad unc. i. cere, *phorbij.*  
drach. 6. euphorbij: recentis sexta pars satis esse potest.  
Quarto, quinto & sexto anno æquale sit ceræ euphor-  
bium: vetustiore vtendum non est. Sextula euphorbij  
aliquando satis esse potest. Et vt sunt corpora, vt vici-  
na cuti vel longius ab hac punctura est, ita lenius & a-  
crius pharmacum misceri debet. Ac quanto plus cœpe-  
rit euphorbij, tantò acrius futurum est. Sed omnino in  
euphorbio annorum habenda ratio. Neque aliter ster-  
core columbino & puluisculis acrioribus qui ceratis in-  
spargantur, vtendum erit. In cerato è stercore columbi-  
no modus stercoreis interdum deciditur, tantumque æru-  
ginis crudæ sufficitur, quantum stercorei, subtraxeris. *E stercore*  
Ceratum aliquando succis illis plantarum imbuitur, aut *columbino.*  
puluisculis permiscetur. Verum exempla quedam subii-  
cere melius est. Acerrimum erit, ceræ sesquuncia, olei  
vnciæ quatuor & semiss. euphorbij recentis semuncia.  
In medio tantum drachmæ tres euphorbij: in infirmo  
ad circiter drach. 2. Satis vñtatum est veteribus quod  
sequitur. Ceræ vnc. i. terebinthinæ liquidæ, picis ana-  
semuncia, euphorbij recentis drach. 2. Euphorbium li-  
quatis alijs permiscetur, vel ex oleo tritum confusis cæ-  
teris



Probatio  
medicamenti

teris coniungitur. In usu uim medicamenti sensus iudicabit. Acrius arrodit, & os uulneris amplificat: hinc quoque rubor & dolor grauis in ambitum excitatur. Hoc ergo celeriter reuellendum, relictoq; linamento quod fortasse incumbat neruo, oleo paregorico fouendus locus est, donec acquiescat dolor. Hicque benignius ceratum misto adipe, deducta parte euphorbii, imponendū. Languidius neq; sensum ullum neque calorem mouet, auctoq; euphorbio acuendum est. Iusto uero pars molliter incalescit, & leni quasi pruriginē titillatur. Atq; hæc in cerato *ἡ εὐφορβίου*, de probando pharmaco in toto hoc genere communia sunt. / Ceterum falli contingit quod à languidiore medicamento pariter atque ab acriore dolor excitatur & inflammatio, idque præcipue ubi uulnus cutis angustius est. Nam cū medicamentum non attrahat, aut attrahat quidē, sed minus quā conueniat, sanies multa colligitur, quæ insidens neruo eas iniurias accersit. Sed ab acriore paulo post quam adhibitum est, à languidine multo post dolor & alia id genus commouentur. Atq; hæc medicamenta bis terve interdū absolui debent, nocte non mutantur nisi longiore. In medicamento quod è metallicis conficitur, usitata ueteribus: Misy, erugo, chalcitis & squamma æris. Misy & chalcitis exoleta sunt, nisi ad uitreoli & cuprosque genera decurras. In his thus additur, adēs, resina, galbanum, quæ uim metallorum emolliant: Oleum sesquialterum ceræ, ceræ dupla, tripla, media inter hæc ratione ad metallica. Eadem resinæ sextupla & septupla est thuri uerò & galbano nōcupla, quincupla & septupla est. Validissimum est, ceræ lib. 1. olei ueteris sesquilibra, hyeme etiam ad circiter lib. 2. chalciteos crudæ unc. 1. misyos unc. 1. squamæ æris unc. 3. terebinth. unc. 2 galbani sesquincia, thuris 3. hic cera quadrupla thuri, octupla galbano, sextupla resinæ dupla metallicis. Infirmitatem cerā triplam capit ad cremata metallica, augetq; modum thuris & galbani, ut utriusque pondus ferè subduplum sit ceræ, ad libram unam ceræ, galbani uncias duas, thuris uncias tres. In medio media seruanda ratio. In his cera sit mollis, resina liquida,

Medicamentum è metallicis.

Proportio ceræ ad oleum, metallica, et alia.



na liquida, thus & galbanum utraque pingua. Metallica modo cruda, ut sit acius pharmacum: modo cremata, ut sit clementius, usurpantur. Eadem sub canis ardoribus ex aceto acerrimo pluribus diebus interuntur. Acetum uetus præferendum, quod nihil austerum, nihil uinosum resipiscat. Sed hac arte squamma præcipue elaboranda est. Thus quoq; eodem aceto leniter interi utile est: Cera, oleum, resina colliquantur: thus & galbanum intermiscetur: metallica in aridum pollinem uersa paulatim resperguntur, uoluuntur spatha in prunis, & sedulo coniunguntur. Aliud est metallicis, quod à Galeno descriptum est: Cerae uncia sex, olei uncia nouem, misyos drach. 6. chalciteos denarius unus, squamæ uncia duæ & s. thuris sesquuncia, galba. 3. 2. Magdalides inde fictæ usus tempore diluuntur, & in lita linteolis applicantur. Est & tertium genus *ἡ τῶν τρητῶν*, è liquabilibus: quod & punctis neruis & canum moribus auxilio est. Sed hoc ut alia è metallicis, duris corporibus idoneum est; quanquam aliquando in teneris naturis infirmo pharmaco utimur, cerato *ἡ τῶν* reperamus, oleo deniq; prolixius hebetamus. Piceis unc. 4. aceti acerrimi unc. 6. & ad circiter drach. 4. opopanax unc. 1. Pix sit mollis, inferuescat aceto dum consistat: opopanax aceto fusus aliis coniungatur in calidis cineribus. Dilatatum manu in magnitudinem uulneris interdum apponitur, si quidem durum corpus est: in molli diluitur oleo, & in splenio accommodatur. Aegyptia Andromachi. Giluum Haliei & alia: uerum paulò crassiora nec ita diluta in eodem usu sunt. Sequitur Isis illa sacra, & ex templorum adytis repetita, quæ *Isis.* iudicio ueterum omnia emplastra superat. Ex Vulcani templo, Aegypto translata est, hieroglyphicis primum *Hieroglyphica.* descripta. Erant hieroglyphica monumenta rerum in mysteriis Aegyptiorum descripta, non literis sed formis animalium & mutarum rerum, ne prophano uulgo innotescerent. Qualia Orus Apollo Græcus author commemorat, Scribonius Glichoni, Græci Epigono, alii Hermioni hierogrammateo attribuunt. Neruis punctis *Virtus Isis.* & uenenatis moribus utilissima est: curat artuum fracturas



# INSTIT. HCIRVRCIC.

Auras etiam cum uulnere: effractam caluariam per sanat:  
facit ad detectam membranā tegentem cerebrum diluta  
rosaceo demersas squāmas ossium, & testulas caluariæ  
extrahit. Cephalalgias ueteres per sanat, si raso capite  
dies uiginti insideat. Imponitur fronti cōtra hæmorrha-  
gias narium, & fluxiones & oculos. Anginosus affigitur  
collo: glutinat, incarnat, mollit, & fistulis inditur dilutū  
rosa in collyriis. Celeriter pus generat. idemq; per spi-  
racula exorbet latēte uia: gangrænas & putredinē cōpe-  
scit. Suppurationibus mamarū prodest: prolapsis intesti-  
nis ē uulnere ac repositis, post arctatum uulnus fibulis  
aut sartū acia utilissimē imponitur Lateris, stomachi,  
uentris, iecinioris, lienis frigidum dolorē sedat. Ad lu-  
xatum omne, & eiectū, & repositum articulum be-  
ne facit. Podagricis mirifice prodest. Cācros, serpentes,  
& carbunculos reprimat, purgatq; ue. Ad neruorum uitia  
omnia acopo melius facit: trahit aculeos, parotidas &  
callos discutit. Adenas ulcerū & mēbranas ita eliquat,  
ut per se decendant: uacillantes unguēs, uel cōfirmat, uel  
extrudit. Gōmotum dentem stabilit, ulceribus narium  
medetur, ac breuiter præter cætera admiranda est. Sed  
nariē describitur: mistura hæc magis placuit. Ammonia  
ci gruginis rasæ, salis ammoniaci uel fossitii, squammæ  
æris more ueterum ustæ, aluminis, aristolochiæ rotundæ,  
& ut, Scribonius, sarmentitiæ, thuris ana unc. i. myrrhæ  
aloes, galbani, aut ut Asclepiades, mannæ ana sesquun-  
cia. Scribonius sextās: ceræ lib. i. & semuncia ut Heras,  
Andromachus, Asclepiades: Scribonio triens: aliis unc.  
i. colophonæ, terebinthina ana lib. 2. & unc. i. ut An-  
dromachus, Heras, Paulus: alii scribunt denarios  
sex, alii denarios sexaginta. Quidam codices habent de-  
narios centum. Scribonius terebinthinam omittit, & co-  
lophonæ scribit pondo quatuor alias pondo duo & bes-  
sem. Adhæc olei ueteris sesquilibra, cui rationi con-  
sentit Scribonius, & sextarium scribit: alii lib. i. ponūt,  
alii selibram, heminas duas, heminæ demidium, unc. 3.  
Certum est autem copiosum oleum esse necessarium, ut  
pharmacum cōsistat. Epigonus addidit succi radicis dra-  
conii

*Mistura.*



contii sesquunciam: alii præterea succi seridis unc. i. succi marrubii sesquunciam. Galenus sine succo seridis aliquando confecit, & alumen sustulit. Veteres ferè tantum sex denarios ulti aluminis miscuerunt. Alia teruntur, alia liquefunt pro sua quæq; natura excepto galbano, quod in mortario cum tritis pharmacis circum agitur, aceto paulatim fuso, idq; melius in sole: ex quo aliis liquidis intermiscuntur omnia: ubi uerò sublata foco intepuerint, manibus aceto tinctis diu uersantur: ærea pixide ad usum reponuntur. Medicamentum diluitur uino uel aceto ubi glutinandum: aceto, ubi molliendum, In gangræna & putredine succos illos recipit: in uulneribus neruorum succum dracontii: alumen ubi repellendum. In punctis neruis sit compage mellis: in aliis modo crassius, modo liquidius, ut res & corpora postulabunt. In proxima laude est *αλάντης*, cui propter insuperabilem uirtutem nomen inditum est. Parem Isidi uim habet: diluitur ferè oxelæo, immittitur fistulis, contractos articulos laxat, mollit, digerit. In abscessu uentris, coli crassius dilatatum manu imponitur: thorulus oxelæo calente madens superimponitur, qui bis quoridie eodem oxelæo irrigandus est: tertio primum die uel quarto absolui debet. Hic si quid exasperauit, fotu olei mitigatur: ita efficit, ut ne purulenta uomica colligatur. Iam collectam extenuat, & per intestina quasi miraculo depellit. Reliqua uerò Isidi similiter efficit, mistura sic habet. Squammæ gris unc. 7. & drachm. 2. aliàs unc. 6. & semiss. in aliis sesquuncia: pyrethri, herbæ pedicularis, cocci cnidii, seminis sinapi, cachryos, alioqui granorum paradisi, stercoreis columbi, aristolochiæ larmetitæ, æruginis, cyperi, seminis erucæ, cumini ana unc. 2. aliàs denar. 6. nitri, salis ammoniaci ana unc. 4. baccarum lauri, mannæ, iridis ana unc. 15. al. unc. 2. & semiss. aceti acris sextarii 16. al. 12. decocti caricarum cyati 4. & semiss. hoc est, ad circiter unc. 7. olei heminas 5. hoc est, ad circiter libr. 4. Tunduntur primum quæteri possunt: ex quo aceto sparso iterum contunduntur sub canicula: ubi uersata diu exarescant: hic iniecto sic

preparatio  
isidis.

fusus.

Compositio  
aniceti.



cum decocto & oleo omnia coniungantur. Reposita in ære rubro per interualla aceto respergantur, ut seruentur mollia. In usu unc. 2. dissoluuntur aceto, & cum sextuplo cerato quod resinam habet, octuplo, quadruplo permiscuntur. Descriptum prius decoctum caricarum & ceratum, quod resinam habet. In cæsis neruis non alia pharmacorum ratio. Linamenta primo genere delibuta nudato neruo imponuntur: aliud e secundo genere superdatur in plagula: cataplasma, lanæ, & alia similiter comparantur. In transuerso uulnere ut periculum maius est, ita liberalius depletur sanguis, seuerior uigilantia ponenda est. Iam sit exemplo gladiator ille qui priore femore qua musculi in patellam abeunt, transuerso uulneratus sit. Magnum sit uulnus & profundum: uacuandum corpus. Purgandum uulnus cruore terso, nudus cæsusque neruus bene diluto pharmaco e primo genere in carpto linteo oblitipandus est. Superdandæ lanæ oleo uel oxelæo delibutæ, totum crus oleo foueatur, inguë, ile, pubes, spinæ pars quæ lumbis & coccyge intercluditur: ac breuiter tota spina dorsi & cernix calente oleo irrigentur: contegantur lana superiore ratione. Sæpius absoluantur ut prius, præscribatur quies, uinum excludatur, decumbat lecto, omnes aditus frigoris intercludantur. In eam figuram componatur femur in qua citra dolorem permaneat, quod & puluino molli innitatur, leniter proclinetur parte aliqua, ut quum cæperit esse sanies, commodè repurgetur. Quo tempore ad secundum genus pharmacorum ueniendum, quale est quod habet euphorbium. Sed hic labris nimium dissidentibus sutura opus est, quæ & musculos capiat, & subiectas membranas intertextas carni, & carnem ipsam altius configat. Verum adhibenda cura, ne uel neruus, uel tendo, uel uas denique magnum transcursu acus uulneretur: deinde etiam ut decliui parte emissarium relinquantur, qua sanies defluat, quæque medicamenta uulneri insistantur. Iam uero ubi & uulnus purum & intestus carne neruus est, ubi iam omnia in tuto posita sunt, ad communem uulnerum curationem te conuerteres. Longa qui dem

*Transuerso  
cæsi.*

*Hypothesi.*

*Sutura.*



dem medendi uia: sed hic præcipue cogitandum, ut ne  
 quum nimium properes, tardius absoluas. In rebus du-  
 bis, & quæ non urgent, sat cito, ueteri sententia, si sat  
 bene. In recto uulnere minor metus est: deligatione  
 utendum, parcius depletur sanguis, neque saturis opus  
 est, si quidem fasciis coniungi possit: pharmacis ea ser-  
 uetur ratio, quæ in transuerso præscripta est. Nunc de *De putredine.*  
 putredine & abscessu, quæ uulneribus neruorum malè *Historia.*  
 curatis suboriri solent. Adolescens Galeno commissus  
 est, cui ex contusione medii digiti articulus computru-  
 erat. Itaque Galenus contusum locum cataplasmate ex  
 hordeacea & lixiuio induxit, tensa uero in ambitum, &  
 cognatione dolentia oleo calente liberaliter perfudit:  
 subtracto deinde cataplasmate madentem locum mol-  
 liter exersit lana quidem sicca: ex quo subiecit catag-  
 maticum ceratum quod oleo ad ceram duplo cõficitur,  
 misto euphorbio. Communis enim curandi ratio pun-  
 cti, cæsi, contusi nerui & tendinis. Adolescens ergo po-  
 stridie melius habere cœpit, dolorque & tensio ad bra-  
 chium satis remissa est quo die pro hordeacea orobi fa-  
 rinam lixiuio iunxit. Tertio die omnia repetita sunt, fo-  
 tus, ceratum, cataplasma. Hicque superior manus &  
 brachium omni iniuria liberata sunt. Sed in contuso ar-  
 ticulo sempiutre corpus membranaceum apparuit, ex  
 iis quæ mediis tendinibus cõnexa in seriem digitorum  
 extenduntur: quod leniter commotum facile decidit.  
 Rectè quidem quod computruerat leni tractu commo-  
 tum est: etenim tum demũ rescindi ferro aut uolsella,  
 uel digito putrefacta reuelli debet quo iã tẽpore ueluti  
 maturitate quadã facile sequantur: neque maior uis nõ  
 dum maturis inferenda est. Itaq; separatis putridis mē-  
 branis, quũ incolumis tendo nudatus esset, Polyidæ pa-  
 stillus sapa dilutus in carpo linteo adhibitus est, & ce-  
 ratum superdatum quod capit euphorbiũ: cui cataplas-  
 ma ex orobi farina & lixiuio adiectum est. Quarto die  
 non aliud superesse uisum est, q̃ ut reliquias inflamma-  
 tionis discuteret: alioqui ad cicatricem sese cõuertisset.  
 Quũ ergo nescio quid durũ relictũ esset, abũde siccati-



bus uti instituit: usque est lide medicamento, postremo ad epulotica transit. Atque hoc exemplum tibi positum sit ad contusis nervos & putria. In utroque conferunt initio cataplasmata & hordeacea uel fabacea cocta oxymelite, postea aliquid lixiuij additur, & reliqua farinarum genera usurpantur orobi, lolij, cicerum, supinorum: postremo solam lixiuium sine oxymelite coquendis farinis utile est. Plura contra putria in purgantibus. In contusis sed opertis nervis & cute integra oleū fati esse potest, quod laxet, discutiat, & dolorē leniat: qualia in anodynīs scripta sunt. In dolore pix liquida & paregorica mitteri possunt. At simul contusa cute & ulcerata, siccandum simul & constringendum: ubi salutare cataplasma athletarum ex oxymelite & fabacea farina coctis: Recens contusum membrum, fluentē calidū sanguinem à recens cāso animali excipiat, eoq; immergatur: aut in thoracem animā, is uia facta immittatur. In abscessu qui puncturæ in ambitum enascitur, Oribasi pharmacum accommodatum est. Cera, colophonix, butyri ana unc. i. picis aridæ mellis ana semunc. ærug. drachm. 2. ærugo in puluerem trita diutissimè in aceto uoluitur, & liquatis aliis sedulo permiscetur: coquantur omnia mota assidue dum consistant. Iam ad reliqua neruorum uitia properemus: ac de dolore in anodynīs.

*Torpor.* Torpor motus & sensus iniuria est, qui & stupor appellari potest: ubi præcipuè anatomica ratione recognoscenda neruorum radix est, quæ semel læsa suum uitium longè lateque disseminat, cuiq; remedia primum adhibenda sunt. Frustra enim digitum acopo fouebis, ubi ex eo obtorpuerit, quia inualsit ceruix, quo loco dorsum exterminat. Et ante remedia de causa mali quaestio habenda est. Torpor ergo & in totū corpus spargitur, & in membra præcipuè, crura & manus: plurimum quidem à refrigeratione, deinde neruorum angustia, quia uel luxata uertebra uel innato tuberculo opprimatur. Aliquando quoque excepta aura torpedinis genus hoc uitij nervis inuexit. Quod si nihil horum incidit ad ignauitā referenda & in erroribus uitæ causa quaerenda



reda est. Quibusdā solennis uacuatio: arthriticis, status  
 materiæ cursus recurrente periodo in nervos corporis  
 respargitur. Quartanæ & alii morbi id genus in suppo-  
 rem resolutionem corporis degenerant. Intēperies quo-  
 que hoc genus uitii nonnunquam gignit. Itaque in tor-  
 pore in obsoleto sensu corporis & motu, de causa mali,  
 de origine neruorum qui in læsæ partes abeunt, quæ-  
 stiones primū habeantur. Calefaciendum quod re-  
 frigit, reponendum, constituendumque quicquid loco  
 secessit: incidendus humor, atq; dispergendus, qui ace-  
 tabula, uincula, nervos, articula menta deniq; infarcit:  
 curanda tubercula, laxandæ angustia, reformanda uitæ  
 lex: incitanda uacuatio, diuertendus materiæ cursus, &  
 omnino contraria remedia contrariis uitiiis adhibere  
 conuenit. Quæ calefaciant, & hinc neruorum iniuriæ  
 repugnent, ampliter scribentur in dolorum remediis.  
 De luxatis ossibus superiore capite satis disputatū est.  
 Reliqua auxilia partim ex primo libro, partim ex ady-  
 tis medicorum repetenda sunt. Quod autē ad originem *An seruato*  
 pertinet, ut suo quæq; loco medicamenta imponantur, *motu pe-*  
 meminisse decet, nonnunquam motum obolescere ser- *reat sensus*  
 uato sensu: aliquando uerò permanente motu aboleri *& contrā.*  
 sensum: utrunque etiam interdum obtorpescere. At-  
 que ubi idem neruus tum ad sensum, tum ad motum à  
 natura parti datus est, seruato motu incolumem sen-  
 sum esse oportet. At incolumi sensu non protinus mo-  
 tus integer est. In multis corporis partibus neruorum  
 fibræ ad sensum in superficiem explicantur: rami uerò  
 musculis inseruntur, ut moueant: ubi saluo altero motu  
 si lubet, sensum exolescere contingit: multo magis quā  
 alio atq; alio ortu utrique enascuntur. Multis quoque  
 partibus ad uarios motus multi nerui, tēdines, musculi  
 à uariis locis inuēti sunt, quod in capite, artubus, ore,  
 thorace, & maxillis, atque adeo toto corpore facile in-  
 telligat, quicumque in anatomia disciplina fuerit exer-  
 citatus. Vt ergo iniuria partis est, tra requirendus neruo-  
 rum ortus, cui (si opus est) remedium instituas. Radicu- *Exēplis tres*  
 lum enim intermiscitibus uel contortis labro & genis *declaratur.*  
 ad eos



ad eos nervos confugere, qui a tertia cerebri propagine in totam ferè faciem disperguntur. Motus enim in vitio est, neq; sensus iniuria ad quæstionem proponitur. Requirendum ergo, nunquid detrimenti ceruix acceperit, qua parte latus ille musculus longè lateque in faciè explicatur: num qua relaxata vincula, nunquid iniuriæ à temporalibus musculis & nervis primum ortum sit.

*Historia  
quedam.*

Neq; absurdum minus quod sequitur. Cuidam in itinere e pluvia & frigido aquilone suprema ceruix inalserat, læsa quoq; grauter ea iunctura quæ ad vocatum dentem articulata est. Atq; hinc optimo iure sensus caluariæ obtorpuit, quia ab ea vertebra sublatis nervis, vis sentientis animæ capiti inspiratur. Igitur quum frustra calidis medicamentis pugnatum esset, quæ capiti impingebant: accersitus Galenus ad dentem vocatam vertebra remedia conuertit. Igitur recalsacta parte quæ primum inalserat, sensus caluariæ celeriter instauratus est. Multis iunctura illa frigore perculsa ut & tertio & quarto articulo collum modo constans, modo intortum dolensq; riget, neq; pro libidine conuertitur, vbi frustra capiti remedia imponas. Sed adhæc designâ-

*Efflatio læsa.*

de partes, vnde vincula procedant, oriantur nervi, inducantur muscoli quibus ceruix capiti colligatur. Sed & post dentem articuli vel pelluntur loco, vel frigore percelluntur: atq; hinc laborant muscoli qui è collo in thoracem sese explicant: ex quo efflatu intercepto ma-

*Comparatur inter se  
spina iniuria.*

teria vocis, vox quoque interdum suppressitur. Verum omnino meminisse oportet in tota spina leues esse iniurias quas frigus intulit: grauiore quæcunq; uel phlegmone uel tuberculo commouentur. Asperissimum malū est luxatis articulis, multo maximè quum intro pulsa,

*Nervi è spina foras intro.*

& in obliquum uel angulū torta uertebra est. Sic enim nervi angustius comprimuntur, qui è spina quidem exi-  
gui pauciq; foras discurrunt: plurimi uero atque præci-

*Historijs  
explicatur  
locus cui re  
media im-  
ponas.*

pui feruntur intro, & semel læsi longè grauissima pericula interminantur. Quidā subsectis strumis obtinuit nudato nerno, eoq; perfrigerato qui uocem fingit. Alteri in dorsum deurbato uox intercepta est. Atque hic

curato



curato dorso, ille concafacto uocali neruo uocem recuperauit. Pausanias sophista in dorsi initium præceps corrui, atque hinc seruato motu, intermortuus sensus est, qui ultimis duobus digitis & dimidio tertij inspiratur. In graui peripneumonia & pleuritide, ad extremos usque digitos sensus quibusdam uiolatus est, plurimis brachium condolescit, aliis quoque motus leniter obtunditur, læsis scilicet ueruis qui à dorsi initio primæ costarum spacia intercurrunt, & in brachium, ulnam, extremos quoque digitos sparsi deferuntur. In torpore & tremore manuum recognoscendum, num quid uitij ea parte spina fecerit, quæ quarta & nona uer-tebra intercluditur. A sexta quidem, septima & octaua in totâ manum nerui dimittuntur intermissis fibris à superiori bus articulis. Sed è septima & initio dorsi, interiore manu & posteriore plures decurrunt: in ulnam, ultimos digitos & dimidium tertij dispescuntur. A superioribus coniugijs uer-tebrarum in superius brachium, exteriorem prioremque manum, maiores quoque digitos nerui disperguntur: quanquàm ita hi omnes sese implicât, ut non facîle in medio cursu & finibus separentur. Ceruice læsa qua quintum spondylium quarto conseritur, offensat respiratio, quia hinc diaphragma neruos excipit. Affecto dorso & neruis qui costarum spacijs interseruntur, uox hominem deficit: quia maior uis illa spiritus, qui materia uocis est, non efflatur. Lumborum iniuria & inde laborante abdomine ingrauescit respiratio, & excrementa segnius depelluntur. Quidâ è scala præceps in lapidem impegit, qua lumbi sacrum os exarticulant, isque locus intro compulsus & oblique luxatus est. Ex quo cepere crura frigescere, orta que inflammatione alui excrementa & urinæ restiterunt. Puero in captura piscium spina perfrixit, qua lumbi desinunt: cōdoluit uesica, aluius sine uoluntate ster-cus deiecit. Alter in eadem iniuria inuitus omnia commingebat. Cui-dam puero in osse sacro exarticulata & intro pulla uer-tebra est. In quo neglectum malum occalluit, atque inde factum, ut non nisi ægrè & in stillicidium urina ex-prime-

*Accidētia  
manuum i  
grauu pleu-  
ritide & pe-  
ripneumo-  
nia.  
In uitij  
manuum.*

*A dorso &  
lumbis ini-  
ria.*

*Suppres-  
& sine uo-  
luntate:  
Et urin.*



*Nervi crura-  
rum.*

primeretur. Alteri oblique torta articulatione, urina in totum suppressa est. Atq; hæc non iniuria, si quis intelligat e finibus lumborum nervos in crura plurimos, quosdam in vesicam, podicem & genitalia dispergi: maximos posteriore parte recta in poplitem decurrere: minorum alios quidem qua pubis os foratum est in priora crura disseminari: alios uero oblique ad inguina diuertere, unaque cum magna uena & arteria, atque extra has in anteriores partes femoris deferri. Ab osse sacro alia quoque nervorum soboles superioribus intexitur, unde & vesicæ & alijs partibus perplexæ fibræ inferantur. Atq; hæc obiter. Neq; enim huius instituti est anatomiam describere: sed parum explicata remedia uideri possint, nisi etiam designetur locus, cui applicentur. Frustra enim torpentem pedem excites, & anum vesicamq; refoucas, quum à lumbis prima mali labe orta est. Atq; hoc in lumbis semel explicatū, in alijs spinæ partibus & inde factis iniurijs seruare cōueniet. Et quæ de torpore, de paralyfi quoq; & tremore dicta putetur.

*Rigor et cō-  
tortio.*

Contra q̄ oia in doloribus Acopa scripta inuenias. Iſi, aniceto, altisq; generis eiusdem uti liceat. Nunc ad reliqua transeundum. Igitur rigent nervi, atq; contorquentur: utriusque quia conuulsi, gangliis occupati, & eo uitio impediti, quod inflexis nervis ancylū, quodq; tensis atq; rigentibus orthocylon appellant. In ancyle contendi membrum nō potest, & quasi reuulsum mancūq; manet galiancon Hippocrati qui inde cubito est breuiore, ancōs Galeno appellatur. In altero uitio exertū est rigidum nec iam inflectitur: quia uidelicet ueluti alternante imperio, motum efficiunt ceduntq; nervi, tendines, musculi quicunq; à natura ad mēbrorum flexus cōtentionesq; instituti sunt. Atq; hæc quidem in totū corpus incidunt, in nervos, tendines, musculos & articula cōiugia, per quæ collum capiti copulatur, sed præcipue in digitos, cubiti iuncturas & poplitis. Familiaria arthriticis e materia crassa quæ in articulis concreuit. Eadem efficit cicatrix magna, quæ in callum obduruit. Iisdem immoderata siccitas, & flatus aliquando causa est.

*In quibus  
partibus  
ancyle etc.*



est. Atque hic facile discutitur. Siccitas hydrelæo, in *Causa.*  
 quo semen lini, althææ, fœnigræci & horû folium & ra *Curatio.*  
 dix inferbuerint balneis aquæ dulcis, in lito dulci oleo  
 & similibus téperatur. Rescinditur cicatrix, ut cōtractę  
 partes elaxétur uitis neruis & tendinibus. At schir-  
 rhus frequentissima causa est. Is ergo statim initio laxā  
 te materia quæ præterea remolliat, tēteri debet: hydre  
 læo in quo tum illa, tum cucumeris syluatici radix, &  
 lauri folia præcoxerint. Irrigandę partes, fouendęque  
 sicyonio, irino, aliisq; id genus, ex quo lenioribus aco-  
 pis utendum erit, quæ molliter affricentur: atq; hinc su-  
 peralligantur lanę modo succide, modo oleo delibutę:  
 Blandē commouetur articulus, ut paulatim assuescat na-  
 turæ. Itaq; initio diachylon, & leniora malactica oleo  
 lirino, irino, anethino, sicyonio, & aliis id genus dilues  
 atq; hinc articulum molliter affricabis. Postea uerò A-  
 mythæonis pharmaco, Cathægetæ, Asclepiadis, Anice-  
 to, lsi, emplastro de meliloto, immisto quidē oleo sed  
 paulo crassiore téperamento utendum erit. Atq; omni  
 no ea cōsectanda curandi ratio, quæ in malacticis pluri  
 bus explicata est. Cōuulsio, inquit Hippocrates, exina *Conuulsio.*  
 nitione fit & repletionē, at illa ferē in desperatis poni-  
 tur: Hydrelæo tamen, balneo, media materia & iis quæ  
 tepido humore laxent, uti licebit. In repletionē quali-  
 tas quoq; materię includenda, quæ uel acrimonia, ut  
 sanies in neruis, uel frigore mordeat: de quibus ex Hip-  
 pocrate quædā iam ante annotata sunt. Adhibetur m-  
 dicus, irrigātur olea quæ leniāt, laxent, discutiant, qu-  
 lia multa in doloribus resoluētibus, attrahentibus sc-  
 pta sunt affricantur acopa, illigantur lanę, impingi-  
 tur emplastra eiusdem naturæ, quæque omnino contra  
 causam mali depugnent. Malagma Scribonij quod Ca *Malagma*  
 thægetæ pharmaco simile est, ad omnem rigorem, con *Scribonij*  
 uulsionem, tensionem, contractionem, dolorem ner *ad multa.*  
 uorum & caninum spasmus, ad ancylas denique &  
 ganglia utile est. Idellii, sepi uitulini, ireos ana unc. 2.  
 opopanax, galbani, ammoniaci, cachryos, aut baccarū  
 lauri, uel granorum paradisi ana unc. j. piperis grana cé-  
 tum



tum viginti, ceræ vnc. 7. terebinthinæ vnc. 6. Trita arida  
cribrantur: quæ succum habent, cum resina subiguntur:  
cera particulatim fracta in feruentem aquam demitti-  
tur, subacta manibus aliis intermiscetur in pila: versan-  
tur omnia: sed pilum conuenit subinde perungere oleo  
cyprino, vel terebinthino, aliove generis eiusdem. Li-  
quescit pharmacum in oleo, ut sit acopon, quum res exi-  
git. Ganglia uocamus concretiones quasdam & contor-  
tiones ad cartilaginem uel neruum, ex lenta crassaque  
materia, quale neruorum alimentum est. Alii ganglion  
definiunt tumorem nerui à ui externa, casu, ictu, labori-  
bus: nam raro sponte provenit. Extremis membris ferè  
nascitur: rarius in cubito, capite & reliquo corpore. At-  
que hic tumor inæqualis est, renititur & in latera pres-  
sus diuertit, nec in orbem circumagitur. Quibusdam par-  
tibus curantur ferro, aliis ut pedibus & manibus, non  
nisi cum periculo cultro vulnerantur. Ammoniacum er-  
go ad ignem dilatandum manu, molle atque vnguino-  
sum, aut eorum medicamentorum aliquod quæ in ma-  
lacticis descripta sunt, emplastri temperatura. Cali-  
dum & ita diductum, ut totum ganglion comprehen-  
dat, affigi debet: superdatur plumbi lamina, eaq; arctif-  
sime constringenda, alligandaque ut nullo modo gan-  
glium diuertat. Alij solam laminam sine pharmaco ad-  
alligant. Atque ubi dierum aliquot interiecta mora emol-  
litum ganglium videatur, detracto plumbo & pharmaco  
statim pollicem dextrum ganglio infiges, reliquos digi-  
tos in ambitu constitues, omnino premes, & quanta vi  
poteris ganglion vrgebis, donec solutum diffluat. Hæc  
quidem veterum iam exoleta ratio est. Nostri melius:  
pediculum membranaceum, glandulas, venarum nouā  
propaginem unde ganglium cōit augeturque, annotant:  
viā ferro aperiunt, nudant omnia, filo vasa intercipiunt,  
neruos deliniant, pediculum, glandulas, venas unde nu-  
tritum uitium ligant, siccant, tabefaciunt, urunt, preci-  
dunt, atque ea ratione quasi radicem mali extirpant: ut  
postea noua regenerata suffecta que materia nouum gan-  
glium renascatur. Quanquam hæc curandi ratio non si-  
ne

*Ganglia.*

*Curatio.*



ne periculo est, si quidem & ganglion magnum est & eo loco, ubi insignium uasorum neruorumq; coitio fit. Subsunt quoque aliquando putrefacta corruptaq; uasa insignis uenæ aut arteriæ, quæ nudatæ sanguinem effundunt, quem nemo supprimat: unde æger paulò post extinguatur. Terebinthina, calx uiua, adeps anserinus, bene temperata ganglion dissoluunt. Aliud quod etiam facit ad ancylas: Cerusæ, olei ueteris, picæ an. lib. i. ceræ unc. 2 galbani, ammoniaci an. unc. i. Cerusa oleo coquitur ad puritatem: hic ammoniacum immittitur, deinde resina & cera: postremo galbanum præmolitum igne. Alij quoque aliter comparant. Plura ad ancylas & quæ cõuulsis & ganglijs bene faciant, septimo cata geni: quale est Tetranyron antea notatum e melle, quod cõtractis & conuulsis utile est: & dysodes acopon. Ceræ, terebinthinæ, medullæ cerui an. unc. i. galbani, ammoniaci ana denar. 6. olei ueteris sesqui libra, Et alia quæ proximo capite describentur. Atque hic terminetur oratio, *Ligamenta* ubi monuerimus ligamenta duriora eaq; præcipue, quibus inter se ossa coniungantur, in minori esse periculo. Neq; ab alijs metuendum, quæ musculis inseruntur. Vtrûque genus vulneratum ualde siccantia medicamenta perferre potest. Tendonum media natura est.

De dolore.

Cap. III.

**A**ccidunt multa in opere chirurgiæ, quorum remedia aliquot conspersa locis obiter annotata sunt: cõtra callos, gangrænas, putredines, cancos, contra uermes, rheumata, & alia. Iam de dolore simul & intemperie atq; hæmorrhagia instituenda oratio, à quibus curandi consilia sæpenumero conturbantur. Dolor ergo omnino fit subita alteratione & soluta corporis continuitate. Alteratio intemperiem facit elementorum, sed à calore & frigore dolor acerrimus: à siccitate mediocris: *Doloris cause.* calida & ab humiditate propè nullus uel stupidus excitari solet. *Alteratio* Atq; hæc ferè non tam qualitate quàm copia dolorem *calida & frigidissima* facit. Est quum intemperies sola partem afficit, quæ si *lores infert* inualuit & radicem fixit, ægerrimè percuratur. Est quum collectus humor etiam excruciat: acerrimus quidem, ut feruida



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Dolor ab in-  
temperie.*

*Solutio con-  
tinui.*

*Generalis  
ratio.*

feruida bilis: & frigidissimus, ut qui uitreus à Praxago-  
ra appellatus est. Id quod ad curandi rationem maximè  
pertinet. Atque omnino qui contumacior dolor est, nec  
facile mansuescit, intemperiem ostendit. In quo summo  
pere cauendum erit, nec (quod ferè fit ignorantia artis)  
frequentibus phlebotomiis, sæpius reuocatis catharti-  
cis cucurbitulis egros ex carnifices. In quibus solis sum-  
ma morborum præsidia medicorum vulgus collocare so-  
let. Primum ergo quæstio habeatur de prægressis & cō-  
tinētibus dolorum causis, deinde curandi consilia ineā-  
tur: comparentur remedia quæ præsentibus uitis opus  
esse uideas. Dissoluunt corpus acia, ut quæ arrodant se-  
cantia, ferrum, lapis & alia: quæ contundunt, ut obtusa  
quædam corpora, in quæ incurras, aut quæ aliunde mo-  
ta ui maiore corpus appetant. Ad hæc quæ distēdunt, uis  
flatuum & humorū copia: postremò quæ uel calore uel  
frigore vehementer lædunt. Iam uero contraria omni-  
bus quærenda remedia: qualia certè antegressa causā &  
doloris proprietas, pars denique ægra dolensq; præci-  
puè indicabunt. Ac dolori quàm celerrimè occurren-  
dum, neq; committendum, ut diutius crucientur ægri,  
quibus in desiderio uel magna celeritas mora est. Negle-  
ctus dolor labefactat vires, fluxiones attrahit: unde ex-  
acerbatur, phlegmone incenduntur, cōuulsiones rapiūt  
ægros, ac sæpe mortes: aut certe vlcera madescunt, quæ  
sicca esse seruata naturali ratione, & vacua excrementis  
necesse est. *αἰσδυα* vocant *παρηγορικά* & *λυσιπίνια*, quæ  
dolorem sedent, tenui substantia, primo gradu calida,  
uel ita temperata, ut familiaritate elementorum natu-  
ræ partium consentiant: oleum dulce, ætate medium,  
chamæmelinum, anethinum, e semine lini, altheæ, fenu-  
græci, e dulcibus amygdalis, e lumbricis, vulpecula, me-  
li, lutra, erinaceis, liniacibus, & pullis cygni oleo rabe-  
factis: e floribus zābaci, hyperici, sambuci oleo immer-  
sis, persolatis, ac subinde commutatis. Oleum extortum  
e tritico incude & candente ferro, ex ouis pressum, e sar-  
mentis vitium: alia quoque plurima, quæ primo libro  
descripta sunt. Atq; hæc omnia tensa, constricta, refrige-  
rata

*Olea.*



rata iuuant. Rosaceum lenit, repugnatque causæ ubi à *Rosaceum.*  
 calore dolor, uel à dolore calor commotus est. In ano- *Pinguis.*  
 dynis butyrum est, æsypus, lana bene succida, suillus  
 adeps, uitulinus, asininus, felinus, uulpinus, melinus: è  
 cercopitheco, simia, euniculo, ciconia, catello, Sciuro *Sciuri a-*  
 quo ad aurium dolores Archigenes usus est: Otide, pha *deps.*  
 lacrocorace sortilegarum superstitione, anatinus, anse-  
 rinus, gallinaceus, olorinus, ex anguillis & dulcis aquæ  
 piscibus: sed præcipue humanus. Hæc omnia sunt re-  
 centia, bene purgata & conuenienter lota, si quid tanco-  
 ris, situs, lalluginis, acrimonix, aut alieni uitri concepe-  
 rint. Lenit diachylon minus solutum rosaceo & chamæ-  
 melino. In summa, quæcunque coquant & moderanter *Malactica*  
 emolliunt, doloribus medentur. Sed confectis recens *& peptica*  
 utendum erit solutis rosaceo, uel conueniente oleo. Li *anodyna*  
 quidiora sunt si quidem cuticularis dolor est: nō ita li *sunt.*  
 quida, si is altius cruciat, id quod in anodynorum usu se  
 mel dictum sit. Eo modo parygro recente & terraphar- *Cōsistentia*  
 maco dilutis rosaceo uti licebit. In hoc genere mucciagi *anodynō.*  
 nes sunt è semine lini, althææ, scenugræci, nucleis cydo *Mucciagi-*  
 niorum, malux, althææ, loliorū radicibus, gummi arabi *nes.*  
 co, tragacantha, atq; oīno media materia, q̄ aliquid me-  
 dullaceū habeat & unguinosum. Colliguntur aqua mal-  
 uacea, liliacea, chamæmelina. Esto quadrupla aqua. Se-  
 mine ad circiter duplam muccaginem efficiunt iniecta  
 aquæ calidæ. Paucum gummi multā muccaginē reddit,  
 quo modo etiā radices q̄ quasi medulla pingui præditæ  
 sunt. Iunguntur oleo quod sit sesquiplum, & ceromatis.  
 Lac muliebre & uaccinum ad dolores facit. In lacte cha *Lac.*  
 mæmelum, althæa, malua, melilotum, anodyna semina  
 interanea, pedes, capita hædorum, & ueruecum perco- *Balnea, so-*  
 quantur ad infusiones, fots & balnea. E materia pista, *tus, infesio-*  
 & butyro, uel paregorico oleo iuncta sunt cataplasma- *nes.*  
 ta. E farinis hordei, tritici, mica panis similaginei, in- *Cataplas-*  
 coctis sapa, uinis dulcibus & lacte finguntur epithema *mata & epi-*  
 ta, iunctis, si lubet, uitellis oui, affuso rosaceo, resperso *themata.*  
 croci puluisculo: lenient hæc omnia & concoquent. *Fraxinus.*  
 Tenella fraxini folia aqua cocta pistaq; malignis, can- *In magnis*  
 L *crois doloribus.*



Noxa le-  
uientium.

Astrictio.

Virium ra-  
tio.

Fœtus.

Dolorem le-  
uunt.

crofis & dolentibus ulceribus remedio sunt: decoctum in eundem usum ad focus adhibetur. In magnis doloribus & uehementer intentis locis assidue fouendū tepida, hydrelæo, interaneorū hēdi & ueruecis decocto, aliisq; generis eiusdem, deinde impingendum cataplasma lene & molle. Grauitas enim, durities, asperitas omnino declināda sunt. Iā uerò in hoc genere pharmacorum uitium est, q̄ quæ leniunt, ferè relaxant, fundunt, liquant, unde in plethora & cacochymia, materia calore fusa locus infirmus dolensq; opprimitur, grauius dolet, amplius distēditur: sæpe etiā uiribus suis, concidit atq; eneruatur. Ex quo rosarum folia, absynthii cymas, aliaq; generis eiusdem cōmiscenda putant, ubi ad focus, balnea, infusiones, epithemata pharmacū præparatur. Sed hic astringentibus abutendum non est. Etenim nimia astrictio dolorem auget. Modus est, ut inde fluxio molliter reprimitur, contineantur uires, & iustum dolori solatium adferatur. In balneis dolentes articulos præligari iubent, obstipantq; repellente auxilio, priusquam in solum descendatur. Atq; omnino uacuandum prius corpus est, si quidem postulat casus: ex quo ita mitigandus dolor est, ut ne quid inde uires aut quamminimū detrimēti patiātur. Sed tum maximè cura uirium suscipi debet, ubi aliquid urget, quod naturæ uiribus excludatur: qualis est fœtus in dolore partus, qui ut edatur, firmo abdomine, robustis lateribus, utero ualente, contentis nervis omnibus matris, suis denique uiribus opus habet. Itaque in laborioso puerperio dum laxamus uias, & dolores consolamur, summa ratio uirium semper habenda est. Eadem cura sit in calculis, & doloribus thoracis, ubi sputum crassius, & suppuratio repurganda est. Atque hæc, de iis, quæ reuera anodyna sunt, dicta fuerint: quorum multa ad ea quæ postea dicentur, referri possunt. Itaq; genus aliud effingunt quod sublata causā dolorem uincat, quale est oleum laurinum in refrigeratis: uiolaceum calefactis: siccat hydrelæon: sinapisinus, ubi pars aliqua humiditate elanguit. Ad hæc quæ contra copiam & uicium materiæ adhibentur, ex quo medentur doloribus,



bus, phlebotomia cathartica, clysteres commansa & naribus inserta, diamassemata & erina Græci uocant, apophlegmatismis, ptarmica, hoc est sternutatoria, quæ lachrymas, menses, mariscas emoueat, sudores eliciant, aliaq; generis eiusdem. In doloribus, inquit Hippoc. re media sunt, phlebotomia, purgatio, ultiō, sectio, sternutatio, calfactio, refrigeratio. At caloris in sedandis doloribus frequētior, frigoris aut rarior usus est. Calor enim naturæ familiarissimus, quiq; uim frigoris possit retundere, & graues æstus partium attemperet. Inimicum uitæ frigidus est, eoq; solū utimur, ubi intēperies calida siue materia est, ut in erysipelate quodā, æstuate capite, aut alia parte corporis ab ardore solis, & ambustis. Ac tertium genus, si lubet, statuatur eorum quæ stupefacto sensu dolorem fallunt, quia quod doleat, sentire necesse est: & extincto sensu, dolor necessario conquiescit. Narcotica, ypnotica, & carotica talia appellant. Ac de omnibus ordine disseramus. Colore dolorem sedant tū quæ reuera anodyna sunt, tum oleum laurinum, iuniperinum. Bacce macerantur uino, deinde oleum extunditur mola coxariis & frigidis articulorum doloribus. Ad hæc galbanarium, sulphurinum, styracinum, piperinū, è cinamomo, cardamomo, nuce myrepica & caryophilis expressum. Nardinum, costinum, cnidelæon, sinapium, è sabina, ruta, maiorana, roremarino, saluia, cetaurio, enula, iri, gentiana, aristolochia, bryonia, acoro & alia materia, quæ iam ante capite de resoluētibus & attrahētibus descripta est. Oleum terebinthinum è terebinthine lib. i. laterum antiquorum uel ut Albucasis recētium, (quò plus olei imbibant) unc. i. mastiches, styracis ana unc. i. Lateres igniti extinguuntur oleo, & infriati cæteris commiscuntur. Capiuntur omnia capsula uitrea, ita resoluuntur igni. Triplex liquor deinceps effluit, quorum tertius optimus est. Aliud. Flores roris-marini amphora uitrea includuntur, quæ incerato duplici linteo obstopanda est: elicitur oleum calida arena. Oleum philosophorum, petrelæon de lateribus, Sabiuinum & alia permulta, quorum descriptio ex Arabum

*Sententia Hippocra. 6. Epid. Calor et frigus.*

*Tertium genus.*

*Oleum terebinthinum.*

*Oleum e floribus roris-marini.*



Balsaminū.

fibris petenda est. Eiusdem generis est oleum fecarium, quod de tartaro appellat. Efficacissimum balsaminum, quod uariè cōficiunt. Thuris candidissima, mastiches an, unc. 2. ligni aloes unc. 1. caryophyllorum, galangæ, cinamomi, zadoris, nucis myreplicæ, cubebæ ana unc. 1. myrrhæ, aloes, ladani, sarcocollæ, castorei an. semuncia: baccarum lauri sesquicia, ireos, aristolochiæ rotundæ, dictamni, symphyti maioris an. sesquicia: gummi quod elemi uocant, unc. 6. terebinthinæ pondus omnium: con- corporata omnia resoluuntur igne in alembico chymico rum arte. Primum extillat aqua, deinde oleum postre- mō pinguis melligo. Cōtra omnia uitia & causas neruo- rum ualere dicitur. Sunt qui addant aliquid olei rosacei

Ad dolores  
coli, uteri,  
uentris.

& myrtini, uermes terræ lotos è uino albo, & aquam il- lam quæ folliculis ulmi includitur. Cōtra dolores & fla- tus uteri, uentris, coli singulariter facit. Olei anethini lib. 1. seminis agni casti, sem. rutæ ana drach. 3. cinamo- mi unc. 6. conquassata hæc oleo immerguntur, & diebus quadraginta insolantur sub caniculæ ardoribus: alioqui loco tepido ad focum diutius continentur, dum uim materiæ oleum abunde combiberit. E decima parte ca-

Euphorbiū.

storei uel euphorbi & oleo remedium comparatur sin- gulare perfrigeratis. Atque euphorbi magnus omnino ulus est aliosis partibus, quæque dolcant, & uehemen- tius prefrixerint. Cuidam à genu acerbissimus dolor hy- berno frigore cōmotus est, cui Galenus ceratum quod euphorbium capit, ungendo loco à balneo instituit: quod quum successisset, dolore protinus cessante, idem remedium prospero semper euentu in aliis perfrigeratis atque hinc dolentibus particulis usurpauit. Adhibe- tur remedium & à balneo & ante balneum. Sed iam ferè exoleuit lauandi consuetudo, eaque res multis cu- riosior uisa est. Loco eius fouenda pars est decocto me- liloti, rutæ, chamæmeli, quæ in uino præferbuerint. In cephalalgis à frigore & hemicraniis, laudatum ue- teribus auxilium, quod paratur cera, oleo & euphor- bio. Ac misturæ ratio superiore oratione abunde no- tata est. Duplo ueteri euphorbio loco recentis uten- dum



dum est, postquam sedulo animaduertes ætatem euphorbii, & legitimam ab adulterato satis distinxeris. Alij naturali proprietate hemicranicos iuuari euphorbio prodiderunt, si ex aceto tritum aduersis fronti & tempori illinatur. In eundem usum drachma recentis euphorbii in unc. 3. olei dissoluitur, atque instillatur auri. Sunt qui mistis uino tenui, giluo, odoro, & chamæmelino oleo omnium partium dolores persanent. Radix cucumeris agrestis in taleolas ceditur, & cum cauliculis absynthii hydrelæo coquitur. Experimento ueterum singulariter iuuat hemicranias: decocto fouentur partes, materia ad cataplasma subigitur. Calidum ut reliqua usurpantur, adhibita cura ut ne refrigescat. E sex uitellis assis, myrrhæ semisse drachm. granis 4. ellebori nigri oleum exprimitur ad focum in sartagine, singulari remedio ulceribus puerorum, & omnino dolentibus callis, putredine, uermiculationi, scabiei. Callis dolentibus styracis uncia duæ, uel eo plus in sesquilibra olei diluitur. Ex asserculis iuniperi lauri, abietis, ramentis cinamomi, calami aromatici, ferragine ligni sancti oleo immersis exprimitur oleum ea arte, quæ primo libro designata est, uel qua è iunipero Mesue, è cinamomo Nicolaus elicit. Diuturnis doloribus & qui intus crucient, efficacissima acopa à ueteribus prodita sunt. Quorum alia leniora, quæ externis doloribus adhibentur, quale oleum est: alia mediocria, quibus etiam compages crassior est. Atque hæc ex oleo, laxante materia & moderate calida temperantur, adipe, galbano, terebinthina, colophonia, inueteratis atque internis doloribus accommodata. Tertium genus iam acrius idemque corpulentum magis, quod contumacioribus uitis & in alto corpore latentibus imperatur. Acopa duplo, triplo, quadruplo, pari interdum ad reliqua quæ solida sunt, oleo permiscuntur. Myracopa sola odoris suauitate ab acopis distinguuntur. Ac iam subiiciamus formulas, ad quarum initar infinita prope acopa comparentur. Maiorana, rorismarini, fœnugræci ana lib. dimidium: surculorum

*Mistura uini & chamæmeli.*

*Eradice cucumeris.*

*Nō permitendum, ut refrigescat remedia.*

*Oleum ex omnis.*

*Ad dolentes callos.*

*Acopa.*

*Myracopa.*

*Acopon.*

*Ascepiadis*

1 3 lorum



lorum lauri libr. 2. flores iunci odorati unc. 1. uini ueteris, olei dulcis ana sesquilibra: stirpes contusæ triduum macerantur uino. Sed adhibenda cura est ut ne hoc uapescat: tertio die oleum superiniicitur, coquuntur omnia in diplomate moderata pruna. Atque ubi vinum expirauit, exprimuntur omnia, ut simul oleum in vas nouum diffluat. Ex quo capitur olei libr. 1. ceræ unc. 2. vel eo plus, ut fiat ceratomalagma. In quibusdam codicibus adduntur radicis cucumeris agrestis, nardi celticæ an. libr. 2. quæ cum aliis uino maceranda & oleo coquenda sunt. Aliud ischiadicis, opisthotomicis, & omnibus doloribus neruorum: Ceræ selibra, terebinthinæ libr. 1. guttæ ammoniacæ in aceto dissolutæ unc. 1. opopanax unc. 1. galbani, medullarum cerni & tauri, æsypi ana. unc. 2. olei irini unc. 9. mellis unc. 3. Cera oleo colliquatur, terebinthina additur, deinde medulla & æsypus, reliqua igne remollita & cum aliis fusa permiscuntur. Quod sequitur paralyticos sanat, & neruorum doloribus medetur. Rutæ uiridis unc. 3. pulegij sicci, cyperi ana unc. 3. salis, nitri unc. 2. fœnugræci, mercurialis, succi marrubii, roris marini, aristolochiæ ana un. 3. amigdalorum amarorum desquamatarum lib. 3. iris illiricæ uel florentinæ, terebinthinæ, baccarum lauri, radicis cucumeris agrestis, guttæ ammoniacæ ana selibra, ceræ lib. 1. olei lib. 9. uini modus controuersus: alii enim unc. 5. alii lib. triginta: iusta mensura fuerit libr. 12. In quibusdam exemplaribus adduntur sabinæ selibra, ellebori albi sesquilibra, myrti uiridis unc. 9. foliorum lauri siccorum 3. 9. bdellii libr. 1. quæ si adiiciuntur efficacius fiet acopon: sed ita uini & olei demesum augendum erit. Interuntur quæ contundi possunt paulatim affusa aqua: ex quo iterum tundenda sunt: contusis uinum oleumque insperguntur, ut integram noctem madeant: postridie incoquantur. Atque ubi uinum exhalauerit, omnia cōcepta sacco extringantur, ut eliquetur oleum: cui excolato cera, resina, bdellium, ammoniacum deinceps confundantur.

*Acopon* E crocino, nardino, enulato, costino, quæ à Mesue de quibus fiât. scribuntur, singas acopa: condienda musco, ambare & aliis



aliis aromatibus, ut sint myracopa: cera additur, liquida  
 terebinthina, styrax, galbannum, opopanax. Similiter &  
 ex laudatis oleis, quæq; suauiter oleant. Terrestrem testu-  
 dinem acuminata cāna ueteres transfigebant, qua parte  
 ceruix clauiculæ cōmissa est, & inde ducto sanguine aco-  
 pa perfundebant, coque meliora putabantur, quò plus  
 sanguinis combiberent. Stāneis uasis, uitreis, plumbeis  
 & buxeis reponenda sunt. Sunt qui mirabilem vim tri-  
 buant renascentibus corniculis ceruorum, ubi primum  
 extuberant & quasi plumata lanugine integuntur. Co-  
 quunt vino, dum mollicie diffuāt. Singulariter excitat  
 torpētes neruos, atq; paralyticos: Saluæ, chāpepyteos,  
 maioranæ, florum meliloti & chamemeli ana unc. 2. olei  
 nardini lib. 3. uini gilui, tenuis, odori, subausteri sesqui-  
 libra: omnia illa uino resperguntur, macerantur nocte,  
 postridie oleū superfunditur, coquuntur in diplomate:  
 cōsumpro uino diploma subducitur, materia rariore sac-  
 co excipitur, ut purum oleum diplomate relinquatur, in  
 quod materia uehementer exprimenda est. Postremò  
 oleo misceātur corniculi cerui, ut prius tabefacti un. 3.  
 mastiches drac. 6. croci drac. 1. Al. Olei costini, olei nar-  
 dini ana unc. 2. terebinthinæ unc. 1. ceræ sesquuncia mo-  
 schi grana sex. Al. Extremitatum ebuli, surculorū lauri  
 & rorismarini, maioranæ, calendulæ, saluæ, chamēpy-  
 teos ana unc. 2. florum chamemeli, rorismarini & lauā-  
 dulæ ana unc. 1. baccarum lauri & iuniperi ana 3. dimi-  
 dium, radices enulæ, ireos, acori, aristolochiæ ana drac.  
 6. pyrethri drac. 2. seminis lini, althææ, scēnugræci, sina-  
 pi, cardamomi, nasturtij ana drachm. 1. conquassentur  
 omnia & noctem integram madeant in uino, postridie  
 coquantur in duplici uase. Atque ubi totum propè ui-  
 num euauerit, omnia magno conatu exprimantur: ex-  
 presso succo immisce olei lumbricorum olei terebin-  
 thinæ ana unc. 4. coquantur ad crassitudinem: in alio  
 uase seorsum liquentur igne molli, olei costini & nar-  
 dini ana selibra, styracis, galbani, resinæ, terebinthinæ  
 ana unc. 1. opopanax Benicoi uocati ana semuncia,  
 mastiches, sarcocollæ, thuris ana drachma. 2. liquata

*Cornua cer-  
uorum.*



*Cōtra uene-  
na frigida.  
Gaiacum.  
Probatio  
gaiaci.*

*Vis gaiaci.*

aliis vniuntur, & rursus coquantur puris carbonibus, se-  
dulò uersentur spatha. Subducta foco rursus circum-  
agantur ut paulatim refrigescant: quod cum sit aqua mi-  
scellanea quæ odorem mosci rapuerit, respergantur: a-  
que ita reponantur alio die, inueteratis neruorum cau-  
sis & profundis doloribus. Ad uenena frigida, & inde do-  
lentia præcordia nihil prestantius uino tenui, giluo,  
acri & odoro: seruato utitur Hippocrates & condi-  
to. Alii aromatite, ueteres etiam alio & sale: Alexi-  
pharmacis, theiaca, antidoto Mithridatis. Nec omitten-  
dum nostra memoria usitatum remedium è ramentis &  
delinata scobe Gaiaci, vel ligni sancti. Eligatur graue,  
densum, unguinosum, quod ad lucernam pingue quid re-  
sudet: nihil expiret graue, non sit obductum situ, arro-  
sum carie, aut euandum, quæ uitia subterraneis locis  
non perflatis, ubi diutius latet, & à cortice celerius, ferè  
contrahit. Ac dum eliminatur scobina, contumax esse  
oportet & odoro halitu quodam euibrare nares, sternu-  
tamentumque commouere, gustu acri & aromatico: quod  
enim dulce uel acidum est, minus probatur. Recenti fer-  
ragine utendum est: expirat enim & uim amittit uetusta  
re. Cæsa sit materia (si quidem resciri potest) ad æstium  
solstitium, ætate media, quia tenella arbor crudo humo-  
re aqueoque plena: uetusta uerò exucca & arida est. Me-  
diis annis plus habeat oleamenti, quod in præsentia de-  
siderandum est. Maceratur die uno breuis atque diutius,  
ut uel acrius uel clementius pharmacum desideratur.  
Meracum coquitur ad dimidias plus minusque, & aliis  
intermixtum, ut sunt consilia medicorum, igne puro,  
fidei vase bene operculato, uel quod inflexo tantum  
corniculo foras hiant leniter exhalet. Ac cute qui-  
dem magis resiccat: summa uis tamen in carne, & in-  
testina pulpa pingui, unguinosa, suauiter olente. In-  
cidit, terget, tenuat, calefacit, sudorem mouet, quæ  
quidem amarum & acrimonia præditum est: terre-  
no elemento corroborat: unguinosa parte & aerea la-  
xat, mollit, anodynum est. Ex quo frigidis articulo-  
rum doloribus, neruorum causis auxilio est, medetur  
tophis



tophis. Reliquias quoque luis veneræ partim attemperat, partim sudoribus extringit: eaque frequenti experimento paucis diebus obliterat: de quo iam à multis iusti commentarii editi sunt. At suo quisque utatur modo, eligat, diuidat, maceret, coquat, temperet, exhibeat. Sit aqua sextupla, octupla, decupla, duodecupla. Nam in his omnibus controuersa res est, quam facile dirimet quicunque nouit omnia ferè remedia integris viribus multifariam posse deformari, eaque oportere uitis & corporibus, ætati, cælo & aliis variè accommodari. Igitur sua quisque probet, nec damnet aliena. Meminisse tamè conuenit, ut attenuantium omnium, sic huius ligni immoderatum usum admodum periculosum gracilibus: deinde quoque iis quibus mediocre corpus est. Hinc enim calor acrior effectus tabem inducit. Eadem ferè ratio. Iuncati ligni, uarini aut Synarini: quod recens cognitum est. Decisis frustulis, alii etiam puluere utuntur in duodecupla, uigecupla, & eo copiosiore aqua maceratis, & dum pars tertia uel quarta expirauerit in diplomatris uapore uel clementi igne coctis, cui in usu quadrantem uini albi, tenuis & odori infundi iubent. Atque hæc in præsentia de medicamentis, quæ calore suo dolorè leniant, & frigidam intemperiem corrigant. Nunc ad ea transeundum quæ refrigerent, & anodyna sunt. Duplex horum genus est: alia enim tantum refrigerant, alia etiam stupefaciunt. In primo genere sunt aqua etiam tepida, oleum conditum rosis, uiolis, nymphaea, papauere, mandragora, cucurbita cucumere, alterco, lactura, portulaca, lenticula palustri, psyllio, polygono, caphura, floribus herbæ quæ primula Veris appellant, millefolio: & ea omnino materia, quæ reprimat, nec ita astringit. Ex oleis & cera alba, cerata fiunt: cera mollitur igne, manibus uersatur, & immersa aqua modò rosacea, modò uiolacea circumducitur. E descripta materia aquæ resoluantur igne, quæ uocant stala-gmata colliguntur muccagines, exprimitur succus: omnia ceratis permiscuntur. Recenti succo utendum est, quia celeriter acorem trahit atque corrumpitur. Muc

*Iuncatum  
lignum.*

*Quæ refrige-  
rent.*

*Olea.*

*Cerata.*

*Aquæ, muc-  
cagines, suc-  
ci.*

cago



*Cerati for  
mula.*

eago quoque paucos dies sustinet. In his linthea inculcentur, applicanturque dolenti loco. Subinde commutantur, dum ardor simulque dolor conquiescat. Sitque hæc cerati formula: Ceræ albæ unc. i. olei uiolacei unc. 3. misceto in uase duplici, subductis uapore ignis mucaginis seminis psyllii sesquinciā cōiungito, & affusæ rosaceæ semuncia respergito. Sunt qui cerusæ è uiolacea lotæ unciā unā plus minusve adiiciāt. Idē præstant

*Vnguenta.*

unguentum rosatum, uiolatum, papauerinum & alia, quæ ad horum instar cōficias: Nutritum Rasis, populneum tum unguentum tum oleum. Populnei oculi uere collecti pari rosaceo infunduntur, uini paulo plus quàm olei adicitur, macerantur omnia diebus septē & quotidie cōmouentur: octaua coquuntur die mollibus prunis donec uinū absumatur. Licebit quoque caphuræ momentum immi

*Parabile  
Gale. reme  
diū ad mul  
ta.*

*Contra can  
tharidas et  
uenena.*

*In graui ar  
dore parcē  
dum oleis.*

*Sententia  
uetus.*

*Paregoricō  
Asclepiadis  
usus multi  
plicis.*

scere. In feruidis doloribus aurium, palpebrarum, maxillarum, pedum, manuum, tendinum & neruorum, utilissimum & inuentu facile Galeni auxilium. Ouum crudū optimo rosaceo permistum: Oribasius cocto utitur & è uino pisto: Alii coctura durum & cōstans emplastri modo calidum apponunt. Aestuosis interaneis à cātharide & uenenis lacte utendum præcipit Hippoc. Renocandum in memoriam quod ante dictum est, in ardore graui, ut feruente erysipelate parcendum esse oleis, & iis omniō quæ celeriter flammā cōcipiant: hoc enim est ueteri sententia incendium oleo restinguere. Optimum est Galeno & antiquis celebratum, quod Asclepiadi tribuunt: laudauit Octauius: Nutrito Rasis quod cerusam capit finitimum est: facit ad ani uitia dolentia, achoras, herpetas, acrem serpiginē, erysipelata: exasperata pharmacis delinit, extinguit cancras, pudendis & genitalibus cācro, maligno ulcere & dolore læsis, solatio est. Paratur hoc modo: Oleum dulce, rosaceum, myrtinum, demēso nouem unciarum pistillo & mortario plumbeo tādū uersatur, dum sit strigmentosum ac liuidum. Hic lithargyri & cerusæ utriusque tritæ pondo coniungitur, & usui in plumbeo uase reponitur. Dolentibus cerebri membranis in uulneribus capitis, optimo rosaceo uel sanguine colum-



columbino utrisq; tepentibus Gale. usus est. Semina pa-  
 paueris, alterci, psyllii, cydoniorum, cucumeris & simi-  
 lia cōtunduntur affusa rosarum aqua, lactucæ, uiolarum  
 aliorumq; id genus donec fiat quasi pulticula: aquarū  
 loco succus ex alterci, lactucæ & papauerum foliis affun-  
 di potest: folia quoq; sub cineribus cocta, uel ad ignem  
 emollita & calida adhibita, dolorem sedāt. Succum folio-  
 rum & capitum papaueris, alterci, cicuta, uiolarum, la-  
 tucæ, pomorum mandragoræ oleo dulci uel optimo ro-  
 saceo infunduntur, diebus aliquot insolantur & quoti-  
 die agitantur: deinde coquuntur blando igne donec so-  
 lum oleum reliquum sit. Ac sint olei lib. 5. succorum 2.  
 coctis probe permisceatur opii, syracis ana unc. 1. cali-  
 dis doloribus, phreneticis, conciliando somno fronti,  
 tēporibus & naribus illinitur. Psyllium feruida immer-  
 sum inflāmato oculo applicatur. Ceratū ē psyllio aliis  
 partibus dolore pressis atq; calētibus idoneum est. Cy-  
 donia & alia quædam genera malorum, ut persica, hoc  
 modo concoquenda sunt. In ollam nouam aqua diffun-  
 ditur, subiicitur focus: malum ē figlini ausa uel aliter su-  
 spenditur, ut ne cōtingat aquam, sed sublatis uaporibus  
 infumetur, & eo anhelitu emollescat: eximitur cutis,  
 mollita caro & medullaceum corpus tēperanter calens  
 dolenti loco adhibetur. Eadē arte quæ refrigerent me-  
 lius in diplomate & vaporibus cōparantur. Iam familia-  
 re est podagricis epithema Asclepiadis: Medullæ panis  
 similaginei lib. 1. incoquatur lacte, deinde cum tribus  
 vitellis oui, sequuncia rosacei subigatur, & drachma cro-  
 ci intingatur. Quod si asperior dolor est, immisceatur  
 opii soluti sapa semuncia. Sed ad narcotica non temere  
 decurrendū, de quibus hinc sermone ducto differamus.  
 In narcoticis potentissimum est opium, deinde cicuta,  
 altercum, mandragora, torpedo piscis. Opium succiso  
 scapo & calice papaueris quasi e plaga fluit. Sed aliter  
 adulterant. Synceritas probatur odore graui, gustu ama-  
 ro, leni corpore, denso, graui, candido, neque aspero,  
 neque grumoso, quodq; statim aqua diluitur & nebu-  
 lam facit: in sole statim resudat & se diluit: difficilior  
 accen-

Psyllium.

Modus co-  
quendi cy-  
donia & a-  
lia id genus

Epithema.

Asclepiad.

ad podagrā

De narcoti-

cis.

Opium.

Probatio

opij.



*Vsus opij.*

accenditur, & in lucernis pura nec atra elucet flāma: crebro extinguitur, & extinctum odorem seruat. Vsus eius uacuato corpore, desperatis leuioribus auxiliis in ardore graui, intolerabili dolore, acriore sensu, firmis uiribus uel non ita fractis. Deinde si quidem tenuior & acrior humor est aut spiritus: nam in crassis lentisq; humoribus periculosa narcotica, minus ubi crassius flatuosusq; spiritus dolorem acerbiorē excitat. Interdicuntur pueris, senibus grauidis mulieribus, & quibus ætate uel morbo calor languidior est. Postremò ubi iam uale tudo impatibilis odium ægro, desperationem medicorum attulit. Eoq; maximè ut inde obstupescat sensus, ac solatium ægro, & remediū morbo procuremus. Quæ ut præstet, nouum tamen uitii corpori contrahit, quod postea calidis medicamentis obliterandum est. Nā uel potentius, uel sæpius admotum caliginem oculis & rugas facit, surdastros reddit: deuoratum mortiferum est. Hinc aliæ partes ad motum sensumque torpent, & uiribus defectæ excrementis corporis opprimuntur: Vt nō omnino absurde à Diagora, Erasistrato & Andrea ueteribus medicis in totum damnatum sit: Sed postea vsus eius nō improbat & adhibita ratio ut ne noceret, atque aliis pharmacis eius uolentia retusa est. Quidam cremabant olla dum ruffum & molle euaderet: sed ultima uim eius exolescere scribit Galenus. Alii cauto cydonio & qua pateret, pasta præcluso incoquunt. Hæc obiter ne in re lubrica & plena periculi chirurgus cadat, ne quidpiam nisi mature & optimis medicis authoribus moliat. Diluitur sapa e musto, uino dulci, muliebri lacte, liquore oui: permiscetur rosaceo, amygdalino oleo e castoreo dum sit mellis crassitudo: ita plures menses macerari melius est, sed multo magis cum dandum est in corpus. Medicamentis quæ opium caperent, semestribus & annotinis ueteres utebantur, ad sextum annum & aliquādo decimum asseruabant. Specilli nucleus puro linteolo, lana molli, linoxylo denique circūuoluitur, imbuatur pharmaco, tum quāmolissime fieri potest, dolori illinitur. Clementius est multo castoreo,

*Noxa ab opio.*

*Qui omni no damna runt opium*

*Quibus di bitur opiu, & utendi modus.*

*Quibus per miscetur.*



reo, pipere, cardamomo, myrrha, cinamomo, sinapi, cro-  
 co, pirethro, & aliis quæ multum calefaciant, coquant,  
 leniant, incidant, discutiant, quâ tum uidelicet casus in  
 præsens exigit. Atque ubi crudelior dolor est, æqualis *Modus mē-*  
 oīum modus est & opij. alioqui dupla, quadrupla, se- *stura.*  
 xtupla, decupla quoq; reliqua opio inuenias. Quæ oīa  
 ut scuit dolor, & sunt corpora, summa rōne distinguere  
 oportet. Quod uocatur Meconium, languidus est opio.  
 Succus est contortis prelo uel contusis, in mortario fo- *Meconium*  
 liis & capitibus papaueris: cui si semen tritū immisceas  
 coquas ad spissitudinem, & in sole sicces, opium habe-  
 bis. Iisdem aqua coctis interdum extinguitur quod im-  
 becillimum est. Siccatur umbra, & ut opium usurpa-  
 tur. Alii pollinem ex aridis calcibus papaueris ad stu-  
 porem miscent. Cortex radice mandragoræ magis nar- *Cortex radi-*  
 coticus est sua radice. Cicuta similiter & alterco uten- *cis mandra-*  
 dum est. Torpedo piscis inde nomen habet, & Græcè *gora. v*  
 carci, quæ etiam procul & è longinquo, uel si hasta, *Torpedo.*  
 uirga, remo, harpagine, fune attingatur, inspirata ui,  
 odore uel aura leui sui corporis, quanuis præualidos la-  
 certos torpore retinet, & celeres ad cursum pedes alli-  
 gat. Pisces alios sepultos limo primum consopit, de- *Remedia è*  
 inde ad escam rapit. Exemplum uero sponte oblatum, *torpedine.*  
 ut alia plurima ad salutem hominis & remedia medici *Oleum è tor-*  
 transulerunt. Vinam torpedinem oleo extinguunt, ut *pedine.*  
 sit narcoticon. Et hoc quoque mirum quod inuenio. Et *Ad facilem*  
 capiatur, cum luna in libra fuerit, triduoque asseruetur *partum.*  
 sub diuo, faciles partus facere: postea quoties infera-  
 tur, adiutare: non alia ui fortasse, quàm quod uelut in-  
 duciis dolorum datis, natura ad excludendum foetum  
 confirmatur: felle quod suo pisce calidius esse oportebat,  
 genitales partes illitæ ad uenerem torpent. Viua  
 torpedo subiecta plantis arthriticis in præsentia & in  
 reliquâ uitâ dolore liberat. Inueteratas pœnas capitis  
 consopit. Nigra præfertur: tã diu insilat, donec perme-  
 ante aura dolor obdormiscat. Noui podagricos, qui sæ-  
 uiente malo dolentem pedem frigidissima perfundât.  
 Alii hybernas reponunt niues eidem remedio. Sed  
 ubi



# INSTIT. CHIRV RGI.

- ubi frigore dolor obtorpuisset, petrelæo fouent, & paroxysmis liberantur. Arcanum hoc est Albucasis. Bina capita aut plura alliorum cum unc. i. opij trita permiscuntur, & uocato alébico quod uitreum sit, capta resoluuntur igne, destillat aqua singularis, quæ per se datur demenso cochleari, aut cum uino internis doloribus. Aliiter quoque excolatur sacco subquadruplo iofacchare addito & exiguo cinamomo. Alij opio quadruplâ theriacam permiscunt, & dant alembico. Cruciatibus aqua id genus instillatur, infunduntur auribus capte auriscalpio: hinc topica auxilia imbuuntur, insuccantur linthea, quæ oculis & aliis partibus applicant. Alia aqua. Theriacæ uncia duæ conditæ enulæ & ireos ana. unc. i. succi baccarum lauri & iuniperi, succi betonicae, centaurij minoris, uerbasci, marrubij ana unc. 3. florum nymphaeæ & uio larum, cortitis radice mandragoræ ana unc. i. seminis alterci albi unc. i. opij uncie duæ, excepta alembico artificio resoluuntur: sed melius in diplomatis. Veneno læsis quæ urant corpus, internis doloribus qui cum febre cruciatur, ut prior exhibetur. Diarrhodon Nili ad fluxiones acres & cruciatus intolerabiles oculorum. Rosarum resectis, unguibus drach. 4. croci drach. 2. gummi arabici drach. i. spicæ, opij ana scrupuli dimidium: uniuntur aqua. Quidam Græcis aucta spica & opio conficiunt, quod in uocato Sief rosato posteritas secuta est. Ac constare arbitror, ut asperior dolor est, ita conuenire opium augeri. Initij inflammationum conuenit hoc collyrium album. Gummi arabici, tragacanthæ ana semuncia, cerusæ lotæ drach. 6. opij solutio sapa uel uino dulci drach. i. iunguntur liquore oui. Incremento. clementis utile quod sequitur: Sarcocollæ (ut dicunt) nutritæ drach. dimidium, amyli, tragacanthæ ana semuncia, cerusæ lotæ drachm. 6. thuris sesquidrachma, opij drach. i. conficiuntur aqua. Rectè quidem initio, quæ reprimant: incrementis etiam quæ leniant, author commiscuit. In uigore lenientium modus augendus est. Sarcocolla uero nutrienda, uel si lubet, maceranda hoc modo, ut sit suauissima, siccet, incarnet & cicatrice claudat.
- Areanum.*  
*Albucasis.*
- Alia aqua contra maleficia.*
- Diarrhodon Nili.*
- Siefrosatū.*
- Collyrium album initio. Aliud incremento.*
- Sarcocolla nutrita.*



dat. Trita igitur dies aliquot maceretur rosacea, consumpta aqua, rubi canini succus affunditur, quem ubi cōbibit subijcitur lac mulieris uel asinæ: postremò reficcatur illa: puluis usui est. Mirabile collyrium Alexā *Collyrium Alexandri.* tæ drac. 10. cerusæ lotæ unc. 1. scoriæ ferri, ustæ, lotæ, gummi arabici, tragacanthæ ana semuncia, opij drach. 2. cōpinguntur è pluuia diluto prius opio è sapa, quod reliquis collyriis commune fit. Sunt qui thure addito & momento croci conficiant, unde leniendis doloribus magis conueniat. Cadmia uerò & scoria hac arte cōparandæ sunt. Ex his fragmēta parua crudis fistilibus cremantur, donec percoquantur uasa: hic metalla extinguuntur lacte, semel atque iterum cremantur, ustaq; extinguuntur: transferuntur in mortarium, ubi ex aqua fontis diu uersantur & omnino perpurgantur, arida in pilam repetuntur, uoluntantur manibus affusa pluuia, postremò sicca teruntur in puluerem, planè diuino auxilio ubi lippitudo & fluxio acris est, ubi siccanda suppuratio, lachrymatio & alia. Suaue epuloticon est, & implet carne. In pruritu, ustione & ardore mirificè iuuat captum liquore oui. Asclepiades cadmiam fractam excipiebat melle, fistile cremabat, quod multis rimis uel breui foramine pateret in uertice, donec è nigro fumus albidior exhalaret. Atq; hæc mistura detergendo & incarnando magis idonea est. In usu collyria liquidissimè diluuntur liquore oui, muliebri lacte uel asinæ, decocto meliloti ex huius unc. 1. & aquæ unc. 9. uel decem *Decoctum meliloti oculi* coctis ad tertias. Palpebra molliter attollitur: medicamentum tepidum è corniculo instillatur, uel eodem re- *laxe.* uersæ palpebræ sublinuntur, linteolum molle incud- *Utendi mo-* tum lacte & oui albumine superdatur, laxiore fascia, *du.* molli, leni, simplici & iisdem liquoribus insuccata omnia continentur. Ad aurium dolores opium sapa dilui- *Ad aurium* tur, pari castoreo seorsum trito coniungitur, uel duplo. *dolores.* In usu lacte, sapa, rosaceo uel amygdalino dissoluuntur. Infunditur autem ut reliqua, oricularijs clysteribus uel auriscalpiis, *οτιχύτας* uocant *οτιχλιδας.* Aliud *Opii*



# INSTIT. HCIRVRCIC.

*Ad dolores  
dentium.*

Opium soluti sapa, castorei tritiana drach. 1. myrrhæ scrupuli duo, croci scrupulus unus: diluuntur ut prius. Alio qui coniunguntur lacte, sapa, oui candido, ut sit mellis crassitudo. Linamentum molle uel auriscalpium auersa parte (καθ' ὅσον uocant) obuolutum lana mistura intingitur, & quam blandissime inseritur auri. In cruciatu dentium aquæ instillantur, catapotia induntur cauis. Opium, myrrhæ, styracis ana drach. 2. piperis albi tusi & cribrati, galbani ana drach. 1. è uino cretico uel simili catapotia formantur. Eodem modo multa confinges è pipere, cardamomo, pyrethro & aliis triplis uel quadruplis opio. Styrax, cera, mastiche, galbanum, terebinthina opio ita permiscuntur, ut ex aliis prius coalescat catapotium, quod sexta parte opii diluti sapa imbuatur. Edulca sint & odora, bene etiam sapiant quæcunq; mista opio insinuantur denti, uel corpori inferuntur per os.

*Podagricis*

Podagricis. Styracis liquidi drach. 2. opii drachm. 1. Al. Cerati rosacei sesquuncia, opii semuncia, croci drach. 1. Al. quod statim dolore liberat. Succus absynthii, croci, opii ana drach. 1. ceræ semuncia, unguenti irini drach. 6. uini cretici uel similis quantum sufficit: cera & unguentum una colliquantur in diplomate, intinguntur croci opium dilutum sapa coniungitur, omnia succo absynthii & uino perluuntur: irini loco aliquo ex descriptis myracopis utendum erit. Al. Seminis cicutæ desquamata drach. 6. croci, opii ana drachm. 1. passi cretici uel uocati maluatici quod sit satis: trita reliqua excipiuntur cerato rosaceo, & passo imbibuntur. Al. Dialthææ unc. 1. styracis drach. 2. opii scrupuli duo, croci scrupulus 1. Ita diluto tetrapharmaco, parygro & aliis paregorici, opio subtriplo, subquadruplo, subdecuplo etiam plus minusue unguenta finges. Conueniunt internis doloribus Asteriacæ diacodyon, Philonis antidotus, Reliquies, Trochisci ex electro, trochisci stellæ, pillulæ ad cynoglossum, Panacea, Harmonia, & alia de quibus ad medicos omnino referendum est. Ac breuiter non nisi summa rōne narcotica imperanda sunt, ubi intolerabilis dolor est, ubi cōficiuntur uires graui animi deliquia

*Internis do  
loribus.*



liquia incidunt, & à reliquis auxiliis desperatio est. Ac  
 quanquam suus cui qui dolor atrocissimus est, sed ei  
 præcipue qui natura molli & pusillo animo natus sit,  
 non protinus tamen subscribendum ægro. Sed ea prius  
 animaduertenda sunt, quàm ad narcotica temere de-  
 curramus. Atque hæc de refrigerantibus & narcoti-  
 cis. Siccitas aqua tepida, hydrelæo, dulci oleo, tempo-  
 re balneorum temperatur. Humiditas phlebotomo ca-  
 thartico, sinapismis, dropacibus & cauteriis nacuanda  
 est. Atque in hoc etiam genere ponendum esse argen-  
 tum uiuum, quo iam ueluti extremo præsidio in lue ue-  
 nera uti solenne est, satis indicat diffluens illa saluatio  
 & alui profluvia. Hydrargyron uocant, quia liquidum: *Hydrargy-*  
 quatuor olim generibus distinctum, naturali quidem *ron, & eius*  
 duplici: altero, ut aut ille, uomica liquoris æterni quod *differentie.*  
 quæ è uenis metallicis sponte diffluit: altero quod exu-  
 dans in argentariis fodinis cameris hæret & guttatim  
 coit. Fuit & factitium duplex: alterum è minio, alte-  
 rum è marmoris ramentis. Iam uerò è plumbo quo-  
 que eliquatur. Eligatur purum, splendidum, albicans,  
 bene depuratum plumbo: quod iterum repurgandum,  
 excolandum, macerandum & ut loquuntur sedulò ex-  
 tingendum est. Ac dum extinguitur, & aliis intermi-  
 scetur, diu uersari tundi quæ necesse est. Extinguitur sal-  
 uisani hominis, qui neque ore neque naribus olidum  
 quid spiret, qui non oleat hircum, qui denique omnino  
 inculcata ualitudine perfruatur. Adhæc terebinthina  
 & inde oleo, uel amygdalino, amaris, detergentibus,  
 tenuantibus pharmacis, quæ consolentur neruos, ma-  
 leficis iniuriis corporis & medicamentis aduersentur.  
 Postremo sedulò miscetur acriter uolutando circum-  
 agendo quæ, donec effusum omnino quæ resolutum in  
 axungis, unguëtis, oleis & mistura quæ lubeat, atq; ita  
 periisse uideatur, nusquam quæ integritas eius appareat.  
 Modus autem ad pingua ut ad circiter quadrupla sint,  
 sextupla, noncupla, euariante ratione, ut est uitium  
 & corporis natura. Sed misturæ usus quæ ratio ex alio-  
 rum commentariis, qui de lue uenerea scripserunt, re-  
 m petenda



*Contra uitia hydrargyri* petenda est. Contra interna uitia quæ relinquat hydrargyron, lac caprinum multum subiunde potum, & subinde reuomitum auxilio est. Vinum quoque in quo absynthium, hyssopus, organum, apii & ormini semen, cacumina centaurii minoris, gentianæ radix & alia id genus in ferbuerint. Mirabile hoc contra ea uitia hydrargyri. Scobs ex auro subtilissime delimatur, & in superiore uino propinatur. Balneis quoque utendum est, & aqua illa theriacali. Illinendum corpus oleo quod est sulphure comparatur. Alia quoque iniuria corpori accedit frictionibus illis, usque hydrargyri. Nam dum fricantur ægri, atque inedia, æstuariis, sudoribus, salua, profluuiis, graui animi cura, fastidio, uigiliis & doloribus tenuantur, sanies quædam necessario eliquescit, quæ nisi uel sudoribus uel aliter uacuetur, suppressa parte aliqua desidet: hicque mora lentescit mucro similis, tandemque in tophum coit: quod quum sit, acerbissimi dolores interdum commouentur. Eadem rursus aliquando in periosleon sese dispergit, intus cruciat, ossa atterit, cariem nigredinem, siderationem denique comminatur. Constat autem experimento impatientes cruciatus, qui inde generantur, frustra adhibitis aliis auxiliis impresso cauterio sæpenumero percurari. At summa vi imprimendum ferrum est, quod omnino igne excandeat: quia uidelicet in rebellis uitio quum semel ad crudele auxilium decurrendum est, agere clementer & quasi blandiri malo, seuire est. Sæpe fit etiam quum neque tophus, neque aliud quicquam foras emineat, ut uirulenta illa sanies intus delitescat, quæ membranis ossum & neruis insidet, eaque discruciat: ubi cultello facienda uia est, uacuanda materia, & si quid uitii os contraxit, cadente ferro mali uestigium omnino oblitterandum est. Atque hæc sunt communia iis qui cinabrio uocato, aliisque generis eiusdem infirmantur.

*Tophi generatio.*

*Sanies insidens periosleo.*

*De Hæmorrhagia.*

Cap. IIII.

Non est recenti solum sed & inueterato ulcere sanguis effluit, apertis, ruptis, excisis uasis. Ex arteriis hæmorrhagia periculosior est, deinde est maioribus uenis,



nis, quas inde emorruis uocauit Hippocrates. Apertis *Remedia in*  
adstringentia, ruptis glutinantia, exesis sarcotica & bo- *genere.*  
ni succi alimenta remedio sunt. Atq; uniuersa hæc ma-  
teria aliis locis explicata est: nerum & hoc loco, quæ ue-  
teribus medicis ac posteris ad hæmorrhagias probata  
sunt, aliqua ex parte referentur. Aperta sunt tum quæ *Ad aperta.*  
clausulis dehiscant, tum quæ poris atq; spiraculis rare-  
facta sint: eaq; iuuant plantago, balauſtia, hypociſthis,  
rhus, omphacium, galla, & hæc magis, si deflagrās igne, *Galla.*  
austero uino uel aceto extincta sit & intrita, acacia, ma-  
licorium, & capitula punicorum, symphyti radix, porri  
contusum, polygonum, pernicea, terra sigillata, argila-  
cea, figlina, bolus armenus, rhabarbari magma, rubigo  
ferri, lapis hæmatites, passæ uux nucleus, flos galli,  
menta oxycrato tincta, lanugo quæ cotoneis quæq; qui-  
busdam salicibus infidet, & quæ ex his paniculæ depen-  
dent: fragorum herba, cynosbatus, aqua frigida, uinum  
adstringens, acetum, oxycratum & alia quæ in epuloti-  
cis, glutinantibus & repellentibus prius descripta sunt.  
Eadem quoque ruptis, & hæc peculiariter conueniunt, *Ruptis.*  
rhus, manna, aloe, mastiche, tragacantha, gummi, amy-  
lon, gluten, larigna terebinthina, pix sicca, colophonia,  
gypsum, farina pistrinalis, cochlea cum domo trita. Ho-  
rum alia in puluerem trita insperguntur, alia impingun-  
tur. Ac ferè meliora sunt quæ emplastica: ex quo in oui *Vtendi ra-*  
candido, resina liquida, tragacanthæ succo, conuenien- *tio.*  
te mucagine rectè imponuntur. In eadem quoque ma- *Linamenta*  
teria linamenta madent: linamenta uero ut res exigit, *rum differe-*  
figura commutantur, ac ferè omni genere linamentorū *tia.*  
usos ueteres in hæmorrhagiis inuenias. Aliud ergo lina-  
mentum in longitudinem implicatur, macron moton,  
alii limniscon uocant, quo in profundis ulcerum uasis  
uti necesse est. Eadem crassiora fingi possunt & tenuio-  
ra: quæ si penem referant, illi priapiscotus motus, nos  
fortasse penicillos appellabimus: quibus in uteri hæ- *Penicilli.*  
morrhagiis & angustioris sinus ulceribus opus est. His  
exilia quidem sed oblonga linamenta in propinquo  
sunt, quos uermiculos uocant: hi uasis hiantibus inse-



*Vermiculi.* runt, est & spheniscos cuneolus contortū linamētū &  
*Spheniscos* implexum angustiore cono, & base ampliore: hoc naribus  
*Cuneolus.* inditur, & iis vlceribus, quæ ore quidem latiore patēt,  
 sed in sinum paulatim contrahuntur. Qui verò motos  
 ellychniotos appellatur, non à figura sed materia nomē  
 habet, fungi genere uel spongiæ, unde & uulnerarii pe-  
*Loco elly-* nicilli & funiculi lucernarii fingeantur. Nunc ē mol-  
*chny.* lioribus spōgijs: fungorum pediculis, iunci genere quē  
 scriptum uocant, quodque pro ellychnijs lucernarijs  
 utuntur: medulla scambuci aliisque id genus loco elly-  
 chnii uti licebit. Quæ dum intruduntur cauis, si quidē  
*Spongia.* replicantur, specillo impelli possunt. Eo modo Hera-  
 clides spongia modo sicca, modo in acetum acre mersa  
 uti præcipit in narium hæmorrhagijs, sed extrema par-  
 te alliganda filo, ut tempori reuelli possit: quæ si tena-  
 cius inhæsit, madefacienda aqua, ut facilius redeat.  
 Rursus linamentum aliud *σπειρόν* cōtortum, ē materia  
 ita contorta & implexa, quales ferē turūdæ uulnera-  
 rię confinguntur. Aliud genus est *ξύλον* derafa quædam  
 lanugo linteorum, *πλάτα* vocant & *ξύματα*, quasi vol-  
 suras & rasuras quasdam quæ concerptis ac depexis lin-  
 teis colliguntur. Atq; hæc uariē formari possunt, ac sæpe  
 in floccos, *χρησίδας* uocant, & tomenta conferuntur, un-  
 de implent uulnera, sordes extergent, siccant, offarciant  
 uasa & uicina loca, ex quibus hæmorrhagia commoue-  
 tur. Vt ergo figuræ sunt partium & uulnerum, ita lina-  
*Epilis lepe-* menta uariē commutentur. Iam uerò ē pilis leporis pe-  
*ris.* nicilli, uermiculi, flocci, cuneoli conuenienter fiunt. Et  
 rursus ē lanugine illa salicis atque cotoneorum. Ascle-  
 piades lanugine utebatur quæ Platani folijs inhæret:  
 quidam panniculis salignis: alii molliter euellunt  
 quod uelut muscus candidus populi folijs adnascitur.  
 Hæc autem liquoribus & medicamentis quæ retineant  
 insuccantur. Vermiculus hianti uasi inseritur, floc-  
 cus eadem materia saturatus superdatur & alia simili-  
*Deligatio.* ter, ut postulat casus. Tum ligantur omnia iniectis vasi  
 tribus aut quatuor fasciarum orbibus, uel etiam pluri-  
 bus ad eam partem unde profuit sanguis: ex quo fascia  
 ad



ad radicem uasis paulatim adduci debet, ut sursum uersus magis magisque adstringatur, & illabentem sanguinem retineat. Tertia die resoluenda lintea sunt, neque commutanda linamenta, si quidem firmiter inhaerent, tantumque irriganda pharmaco, & ut prius religanda sunt. Quæ si uacillant, digitus uasi imprimendus, reuelenda turunda, noua omnia de integro repetenda sunt: idque tandiu reuocandum, donec renata carne ac benefestipato uase extra periculum omnia uideantur. Aliquando fit, ubi in superficiem uasa exponuntur, ut digitus impressus sanguinem sistat coacto grumo. Atque is medicamento inungi potest quod & lentum fit & glutinet. Quod si uas longius recessit, specilli extremo lana, linamentum, aut aliquid tale obuoluetur, quod conueniente pharmaco madeat, atque ita inducetur. At si *Prehensio.*  
patitur locus, nudatur uena, hamo prahenditur, leniter *Præcisio.*  
intorquetur, intercipitur laqueo: aliquando etiam uolsella capta duobus locis deligatur, atque media interciditur, ut extrema in se coeant, & nihilominus ora præcludantur. Id uero in maioribus uasis non caret periculo. Vbi nec id quidem res patitur, candenti ferro inuri possunt. Funiculi uero quibus religantur, sunt o è molli lycio uel serico, sed qui firmiter præstringant, teneât *Canterium.*  
nec facile dissoluantur, aut putreant. Itaque chordis aliquando utendum erit, sed tenuioribus quales testudinibus musicis intenduntur: setas alii usurpant. In magnis vulneribus. & ea sede quæ uenas insignes habet, profusio magis metuenda est: id ferè intelligi potest ex im *Ubi magis*  
petu ruentis sanguinis. Hic ergo maiore cauendum cura: siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, aut potius lintea complicata, quæ uocant diplomata, & ea manu comprimenda. Quod si nec hoc modo sanguis acquiescit, & multo sanguine lintea inquinantur, ea sæpius commutabis. Et si sicca parum ualent, aceto madefacienda *Acetum.*  
sunt. Id uehemens ad sanguinem suppressendum est, Ideoque quidam id uulnere infundunt. Probanda quoque hæc ratio, cauum conceptio linamento impletur,  
m 3 pla



*Alia ratio in metu hæ-  
morrhagiæ.* platysma superdatur & diplomata. Hæc uero pulticula  
potius inculcantur, quæ retineat, qualis ex ouo, farina  
gyri uel triticea, & bolo armeno parari solet. Atq; om-  
nia fasciis alligantur, quæ madeant oxycrato. In somno  
& interualis, in excubiis esse oportet, qui subinde reco-  
gnoscat, nū quid sanguinis per lintea exudet. Sic enim  
noua consilia capienda sunt, aut solutis linteis noua im-  
ponenda. Sed alius rursus metus subest, ne vi maiore &  
ante tempus retenta materia magnam inflammationem  
postea moueat. Ideoque scriptum ab Hippocrate, utile  
esse crebro sanguinem fluere ex omni uulnere, nisi sit  
in uentre. Recognoscendum tamen est, num qua ante  
uulnus profusio præcesserit. Sic enim profluens sanguis  
celerius retinendus est. At si ante tempus suppressa ma-  
teria est, & inde metuitur inflammatio, quod pntes su-  
peresse, uel phlebotomo, uel aduersa parte fixa cucurbi-  
tula detrahes: unde abeat metus, & sanguinis cursus re-  
uocetur. Adhibenda quoq; partium ratio est: nam quæ  
natura frigida, exangues, neruaceæ, quale cerebrū, qua  
lis uterus est, multo effuso sanguine grauius læduntur.  
*Nō temere  
supprimen-  
dus sanguis* Adhæc quæ plurimo spiritu indigent ut oculus, eo dete-  
rius suo munere perfunguntur. Præterea quibus pluri-  
mus calor opus est, ut uentri quo cōcoquat, thoraci quo  
uitam foueat, larga profusione peius laborant. Itaque  
tempēstine claudatur sanguis, iusta ratione leuato cor-  
pore, ut phlegmonem prohibeas, resicces uulnus, unde  
possit celerius coalescere. Atque omni adhibita cura de-  
speratis aliis auxiliis ad ignem & cauteriis decurrēdū:  
*Ratio par-  
tium in sup-  
primendo  
sanguine.* multo magis si quid putre, rodēs, serpēs, aut uermiculo-  
sum: si eiulmodi locus est, qui facile computrescat, qua-  
lis est sedes, os, genitalia, quique uim ignis sine pericu-  
lo sustineat, ut qui in carne & sine neruis est. Sed ad hæc  
non prius decurritur inflammationis metu, quàm satis  
multa materia profluxerit, quàm bene purgatū corpus  
Escharoti & uacuum excrementis extiterit. Escharotica hoc loco  
uehementius adstringere oportet, ut firmam neq; deci-  
duam crustam efficiant: Alioqui remedia profluuio uin-  
cuntur, & excussa crusta maior uis sanguinis erumpit.

In



In remediis laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguifuga, uincula aduersa parte & cata ephrasyostian reuellendo adhibita. Cucurbitulae ratio ex libello nostro repetenda: de phlebotomia & sanguifugis alio quocumque opere differemus. Purgatio saepe necessaria, sed tardius opitulatur, nisi interuallis & quasi datis induciis hæmorrhagia moueatur. Id ferè fit quò statim periodis humor acris ad partem unde profusio est, uerti consuevit. Atque his ferè remediis adstringentibus, emplasticis, delegatiõibus, funiculis, uinculis, auersionibus, præcisionibus, igne & cauteriis hæmorrhagiæ retinendæ sunt. In remediis uidendum prius, qualia esse oporteat, quæ singulis partibus medeantur. In hæmoptycis qui sanguinem è thorace reiciunt, atque omnino ubi longa & anfractuosa uia est, quæ medicamentum inuehat, qualis est ad renes & pulmones, adstringens quidè & uiscida materia necessaria est. Verum ne quod adstringit, resistit in uia, & quod uiscidum est, lentore suo hæreat cursu, aliquid medicamentorum quæ tenuitate partium prædita sint, necessario miscèdū erit. Vbi uero recta uia est, aut non adeo inflexa, ut ad gulam, uentriculum, intestinum rectum, uterum & uesicam, eo genere medicamentorum quæ tenuia sint, nihil est opus. In exteriori corpore satius fuerit, ulcus emplasticis obstipari, in conceptis linamentis aut turundis: deinde uias intercipere repellentibus auxiliis, quæ scilicet sanguis decurrit. Frigidum enim & adstringens, quale repellentium genus est, ulceribus mordax. Et in his frigidum utendum, unde fluit sanguis aut fluxurus est, non ut partibus quidem adhibeatur quæ sanguinem reddunt, sed superioribus locis ubi uenæ sunt communes, quæ ad uiscus materiæ cursus est. Aliæ quoque partes, ut thorax & quæ diaphragma transiunt, quæ exangues, natura frigida & neruaceæ, frigidum leduntur magis. Itaque iam auersa materia neque id quidem locis omnibus, frigida conueniēt. Columbae sanguis & eo magis pharmacum e thure, aloë ouis candido, & pilis leporis hæmorrhagias e membris cerebri reprimunt. Thuris partes duæ, aloë pars

Phlebotomia &amp;c.

Purgatio.

Ratio remedium ex ratione partium.

Quomodo frigidis utendum.

Locus Hippocratis 5. Apho.

Ad hæmorrhagias medicamentum e thure.

Medicamentum e thure.



*re, aloë, ouo* una, uel eo plus in duriore natura: trita excipiuntur li-  
*et pilis le-* quore oui. E mollissimis pilis leporis uermiculi fingun-  
*poris.* tur, illinuntur pharmaco, & apertis uasis inferuntur. Ex  
 iisdē pilis formatur floccus, qui eodē medicamento im-

*Historia.* buitur, & ita superdatur, ut incumbat uermiculo. In eu-  
 nucho lummā manum ulcus malignum occupabat, secu-  
 ra profusio: adhibitum hoc remedium, nec eo quidem  
 acquieuit sanguis. Postea uerò in totum restitit linamen-  
 tis ex dilutissimo oxycrato pressis, subinde irrigatis ne  
 exarescerent: id in corporibus sensus acrioris fieri con-  
 uenit. Cuidam e vulneratis cerebri membranis largius  
 profluentem sanguinē acetum cohibuit, quum iam uaria

*Thus, Man* genera remediorum frustra tentata essent. Loco thuris  
*na.* usurpatur manna, ut quæ adstringat magis, sed thus em-  
 plasticoteron pharmacum reddit. Loco pilorum lepo-  
 ris linoxylo, quod lingua Syriaca uocatur Cotton, &  
 memorata lanugine cydoniorum bene depexa atq; car-

*Spongia.* minata, postremò comodè intorta uti licebit. Spongiarū  
 hac parte multus usus est: nā & inde cuneolos modo sic-  
 cos, modo aceto tinctos, tum naribus tū ulceribus, quæ  
 sanguinem fundunt, effingimus. Spongas forti aceto im-  
 mergimus, & magna uolsella captas in candente lapide  
 uolutamus, ut inde fumus sanguinē supprimat. Sic usus  
 Heraclides. Easdem alii sed molles ex oxycrato pressas  
 impōnunt. Verum in eo quod sequitur omnium uete-  
 rum medicorum consensus est. Spongia noua, alioqui  
 uetus, sed marina, uel lixiuio querno repurgata, acerrī-  
 mo aceto inebriatur: ex quo inquinatur liquata pice, de  
 inde trito bitumine, galla, uel re simili conspergitur, at  
 que ita crematur testa figulari clausa, dum cinerescat.

Alii aceti loco taurino sanguine imbuunt: ex odore ui-  
 no propinant singulari ope dysentericis, menstribus & in-  
 ternis hæmorrhagiis. Datur puluis in ouo sorbili hæmo-  
 ptoicis, & iis qui sanguinem uomunt: aridus inspergi-  
 tur expositis locis, unde prorumpit sanguis, & emplasti-  
*Lana sordi* cis auxiliis commiscetur. Eandem uim attribuunt crema-  
*da adstrin-* tis lanis sordidis: utrunque cinerem in clysteribus dy-  
*gens, &c.* sentericorum iniiciunt. Olla recenti quæ lato dehiscat  
 ore



ore copiosa lana includitur, operculum superdatur uasi quod uel glutino uel figlina terra, alioqui gypso subactis aqua fideliter compingitur: in clibanis & fornacibus largo igni cōburitur, dum olla percocta sit: sic enim Damocrates. Ea prius immergi aceto potest, aut contaminari liquefacta pice, atque omnino ita comparari ut spongia, deinde cremari. Hippocrates absumentis carni- bus putridis & excrementis inspergit. Alii eodem au- xilio impetiginēs exterunt. Emplastra sunt gypsum cru- dum, gyris farinx, si oui candido excipias. Cochleæ cū suis uolutis & salina cremantur nouis fictilibus, cinis se- tæ arteriæ inspergitur, & sanguinem sistit. Mucus sa- liuosus, qui compunctis cochleis & limacibus reddi- tur, emplasticus est, in quo cineres & puluisculos, qui sanguinem claudant, conuenienter adhibebis. Vitellus oui exassatur, ut in puluerem possit resolui, & hæmor- rhagiis meningum cerebri inspergitur. Barbarum quod mirifice sanguinem compescit, uulnera magna præcipue capitis præ cæteris glutinat, fistulis, lacunis, fractis ossi- bus medetur. Bene facit hepaticis & lienosis: citra inflā- mationem glutinat, neruis, cartilaginibus, & ossibus præ- cis remedio est. Cuniculos ulcerum & purgatos sinus coniungit: ualet ad canum hominumque morsus. Præ- stantissimum uero ad sanguinem suppressendum, præ- sertim in iis qui sanguinem reiciunt. Nam in aluta pe- ctori, dorso & lateribus affigitur, ac ueluti miraculo cō- pescit. Ceræ, picis, resinæ pini, bituminis an. lib. i. mānē  
3.6. cerusæ unc. 4. chalcanti unc. 4. opopanacis unc. 2.  
olei semūcia, uel ut aliis melius selibra, aceti sextarius. Ceram, bitumen, oleū, & maiore acetī partē in olla col- liquato, deinde picē & resinā adiciro, quas in minima frustra prius concidito: ubi semicoctum fuerit medicamē- tum, ollam subducito, utcunq; refrigeratis attramentū sutorium purgatum, & ex acetī sextario lœuigatum sic- catumq; paulatim inspergito, commoueto ne quid effer- uescat. Cū nō inquinat pharmacū, ollam deponito, opo- panacem in reliqua acetī parte (nā maior pars statim in i- tio cū aliis in ollam data est) maceratū immittito: ut dis- solutus

*Cochleæ.**In hæmor-  
rhag. arte-  
riarum.**Vitellus.**Barbarum.**De ceruicta*



# INSTIT. CHIRURGIC.

solutus fuerit, cerusam & mannam tritas inspergito, & paulatim tepesciens curato ut coeat, & nec opopanax, nec manna aduratur. Hic in mortarium trās fusa omnia circumagito, misceto, ac tandem reponito. In usu medicamentum astate quidem tertia die solui potest, si quidem res ipsa atque necessitas postulet: acere non nisi quinto detrahitur, ut hyeme septimo. Vitreolum crudum chalcitidis loco miscere licet, & si bitumen desit,

*Mummiā.*

*Pilule quæ  
sanguinem  
claudant.*

pix liquida supponitur, aut mummiā appellata, quam alii humiā vocant, cuius claudendo sanguine mira vis ab Arabibus medicis tributa est. Concorporatur oui albumine, succo polygoni, plantaginis & similibus. Fingitur inde catapotia hoc modo. Muccaginis, gummi arabi & tragacanthæ collectæ in aqua rhois aut cornorum ana drac. 2. mummiæ, massiches ana drac. 1. zuccari rosacei quantum sufficit: tenentur sub lingua hæmoptoicis: uomētibus sanguinem in sorbili ouo diluuntur. In cruentis dysenteris cum decocto oryzæ tolte aut auenæ, succo plantaginis, rosarū, uirgæ pastoris, hordei cremore; in quo tragacantha maduerit, aliisque eiusmodi clystere iniiciuntur. Commiscuntur emplastris, cataplasmatibus & aliis quæ sanguinem cohibent. Dissoluantur liquore oui, & inde cunēoli apertis uasis & naribus imponuntur, aut floccus inde madidus profusioni obstitatur.

*Alia pilule*

Alia catapotia eiusdem usus: lapidis hæmatitis, boli armenii, coralli rubri, mummiæ, & in pulmonariis, pulmonis uulpis resiccati ana drach. 1. seminis urticæ & cinnamomi (ubi medicamenti uim altius penetrare conuenit) ana drachm. dimidium, zuccari rasoci semuncia. Iungantur in catapotica ex muccagine tragacanthæ, uel syrupo myrtino. In medicamentis quæ sanguinem sistant, adhiberi possunt trochisci ex electro aut carabe, e terra sigillata, nonnuquam etiam narcotica, quæ soporem faciant, & frigore sanguinem compescant.

*In erosione.*

Hæc ut alia diluere & usurpare oportebit. In erosione ubi uniuerso corpori consuleris, nec aliter mederi datum est, uniendum ad pastillos. Andronis, Passionis, Polyidæ & similes ex quinto de compositione pharmacis



macis catà geni:epischeticus; à retinendo Græci uocant. *Pastilli epischetici.*  
 Sed uariè describuntur ab antiquis. Aliter enim ex Heraclide, Critone, Asclepiade, Andromacho, apud Galenon, Paulum, Aetium & Celsum, scriptum Andronium inuenias, sed hic satis sit Asclepiadis formulam acripisse, quanquam & hæc uariè à posterioribus describatur. Vt Galenus, cytinorum drac. 10. aluminis scissilis drach. 4. chalcanthi drach. 12. myrrhæ drach. 4. thuris, aristolochiæ gallæ ana drac. 8. in quibusdam adduntur salis ammoniaci drach. 4. Puluis fit ex omnibus, qui excipiat austerio uino. Polyidæ qui & ab iisdem posterioribus medicis aliter atque aliter conficitur. Hoc modo ex Asclepiad. Gal. Malicorii drach. 6. mirrhæ drach. 8. aluminis drachm. 5. thuris drach. 4. chalcanthi drach. 3. fellis taurini drachm. 6. uino dulci aut passo excipit: *Polyidæ.*  
 ad hæmorrhagias austerio uino excipi potest. Pasionis, *Pasionis.*  
 Squammæ drach. 12. æris usti, salis ammoniaci, aluminis, æruginis, thuris ana drachm. 8. reliquis in sole tritis ex uino uel aceto thus additur: pastilli forma in usu aceto diluuntur. Atque hi pastilli eo lubentius additi sunt, quia in plurimos usus chirurgi conuertantur. Re- *Usus pastillorum.*  
 centibus uulneribus, putredini, cariei ossium, fistulis, auribus purulentis, ozenis, ossibus corruptis, uulneribus neruorum, nomis, phagædenis, callosis ani rimis, prerygijs, excrescenti carni, inueteratis ulceribus, dysenterijs, alijsque plurimis uitiiis medentur, in quibus ualidè siccare necesse est. Soluuntur uino dulci, sapa, cenomelite, uino albo, fuluo, aceto, uino, aqua, oxymelite, oxycrato, melicrato, succis myrti, solani, cichorii, polygoni, austerio uino, oui candido & alijs id genus. Eligendum autem quod diluas, ut res in præsentia & corporis natura postulabit. Dulcibus, si temperanda astrictio: austeris & acidis, si prohibenda putredo & siccanda fluxio est: iis quæ detergeant, ubi & sordes est quam detergeas, & sanies quam eshaurias. In hæmorrhagia autem aceto, oxycrato, austerio uino, succis quoque memoratis dissolui debent. Ac primum quidem ubi uehemens hæmorrhagia est, ualidè astringentibus mate-



# INSTIT. CHIRURG.

materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli cõmiscuntur: postremò solis pastillis utendũ erit. Sũt & quæ sequũtur, celebrata ueteribus medicamẽta, quæ quia sanguinẽ supprimerẽt, ischẽma appellarũt. Chalcitidis dr. 16. alii 8. manẽ dr. 12. terebinth. frictæ & aceto extinctæ dr. 12. trita omnia inspergũtur locis unde profluit sanguis quãquã & succis & liquoribus & gummi compingi possunt. Datum Ario à Dioscoride Tharsæo mirificẽ sanguinẽ sistit. Chalcitidis drac. 8. manẽ drac. 16. contunduntur, cribrantur, & mista in pixide ærea reponuntur. Vbi usus postulat, gypsi crudi triti par modus cõmiscetur. Heraclidæ: malicorii acidi unc. 3. aluminis unc. 4. chalcitidis 3. 1. terũtur omnia in alimẽto tortili, naribus induntur & locis aliis unde emanat sanguis. Al. Chalcitidis dr. 6. manẽ dr. 2. terebinth. colophonix an. dr. 4. Adduntur his ad crustas calchanthũ, misy, auripigmentũ, sandaracha, calx uiua. Debilior crusta à calce uiua & auripigmẽto, nisi astringẽti materia cõiungantur. Ferrum candens igni, æs, aurũ & argentũ cauteria sunt. Sed ab auro & argento mollior eschara relinquitur. Celarius auxiliũ à ferro cauterio est. E subere uel spongia orbiculus tenuis feruida pice immergitur, & ita calens hæmorrhagiæ oppingitur. Alii malicorio, galla, radicibus astrictoriis prius ignitis crustas efficiunt. Recentiorum escharotica sunt uitreoli Romani semuncia, balaustrorum unc. 3. aluminis unc. 1. f. puluis. Al. Colophonix unc. 3. boli armenii sesquuncia, mastiches, olibani, sanguinis draconis, an. semuncia, symphyti rosarum ana dr. 1. sed hoc ischema potius quã escharoticon dicatur. Utũtur supprimendo sanguini puluere rubro, sanguine draconis & aliis de quibus antea. Plura uerò escharotica ex proximo capite repetenda. Vitreolis autem crudis utendum est, si crusta fiat: ustis & acerbo succo tinctis, si aliter sistẽdus sanguis est: ustura enim astringẽdi uirtus exoluitur. Adhibitis remediis membrũ ita collocari debet, ut altior sit locus unde hæmorrhagia, reliqua parte quæ radici uenæ propior est, ut ueluti resupino nase & deliui quasi deorsum resfluat sanguis Si uulnus est in extremo



tremo femore, qua parte genu est, hoc quidē superius esse oportet, ut femur totum qua inguē spectat, paulatim summitatur. Sit membrū in quiete & ea figura situm, in qua plurimū cōquiescat, nec doleat, ac mitella cōfirmata parte decumbat. Instituatur uita unde sanguis acquiescat: aquæ potus & similia: interdicator iis unde efferuescat, qualia uina quædā sunt, fortia & calida alimēta. Ac tū præcipuē hæmorrhagiæ cauendū erit in ulceribus, quum hæc intus exultāt natura quæ in arteriis est cōmota foras, ut uitū quo premitur à se repellat. A forti in ulceribus pulsu, inquit Hippocrates, profluium sanguinis. Sunt qui in hæmorrhagijs narium, quod in commentariis ueterum scriptura inuenias, profluente sanguine nomen ægri hominis & alia quædam plena superstrictione in fronte scribant. Alii granum salis aduersus auri inferunt, manūq; frigida immergunt, atque ita sisti sanguinem multa experientia profitentur. Nec desunt qui idem promittant admota urtica, quam Græcam uocant, cum sale ex aceto trita. Nonnulli utuntur millefolio. quidam porrum præcisis summis foliis naribus admovent, & inspirato halitu sanguinem cohibent: linamenta porri succo imbibita naribus immittunt.

De Pyroticis

## Cap. V.

**S**At istactum arbitror institutæ rei argumēto post adscripta remedia quæ parantur igne & eo genere pharmacorū, quæ inde pyrotica nominant. Quorū ut memoria superiora oratione sæpenumero facta est, ita & plurimus usus incidit: ac de iis oratio deinceps connectatur. Itaq; duplici ferè ratione inuāt: nā uel eo adhibetur, ut uita parti restituant: uel euincant uitia, quæ nullis aliis auxiliis expugnentur. Ac prius ueteri sententia decretum est, quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis. Atque commune hoc consilium est in omnibus quæ nulla alia ratione possint sanescere, ut uel ualentur igne, uel ferro peramputentur. Ac primum quidem medicamento curæ periculum facimus quod clementissimum est, deinde ferro exscalpimus, lacera-

*Duplex u.  
sus ignis.*

*Sententia  
uetus.*



*Sententia  
uetus.*

*Medicamē-  
ta pyrotica.*

*Pyroticorū  
genera.  
Dropax.*

*Vsus dropa-  
cis.*

laceramus, compungimus, idq; paulò durius: postremò  
acie ressecamus, uel delemus igne. In quo austerà quidē  
& aspera curatio est, & ueteri sermone MALA MEDI-  
CINA est, in quā aliquid naturæ perit. Sed crudelem  
medicum necessitas facit: uerum crudelitas blanda ora-  
tione quasi ueneno leniri debet, & fabulis occupato æ-  
gro stupefactoq; sensu exercenda est. Eadem quoq; se-  
ueritate utimur in quibusdā notis & tuberculis quæ pu-  
denda corpori excrescunt, & partibus nudis adnascuntur.

Medicamenta ergo quæ aliquid corpori detrahunt, ea  
uel extergent atque discutunt, uel latente igne depa-  
scunt. Quæ uerò languentem uitam partim calore par-  
tim spiritu recreant, blandiora sunt, quàm ut exurant.  
In quo tamen genere reperias quæ ruborem moueant,  
quæ bullas excitent, quæ deniq; (si quidem diutius im-  
morentur) tandem exulcerent. Atq; hæc omnia ut res  
& casus postulat, accommodanda sunt. Sunt igitur py-  
rotica dropax, simplicissimos, phenigmos, cathartica, sipti-  
ca, escharotica, ignis denique & inde cauteria. Dropa-  
ces picationes uertunt, non è uerbo quidem, sed pitto-  
tapitana, & pittosæ ueteres appellarunt, unde Latina  
uox conuersa est. Alii etiam dropacistas: è pice & quar-  
ta uel quinta parte olei, quibus subduplum, plus minus-  
ue piperis, & pyrethri, euphorbii & similiū misceri pos-  
sit unde melius calefacit, ut accepto sulphure, cinere sar-  
mentorum, & sale siccando magis conuenit. Sic. n. per-  
misceri solent: quia tum dropax tum sinapisimus, adhæc  
phænigmus eò sunt ut refrigerata calfaciant, confir-  
mētq; partes, quæ partim frigore, partim assidua fluxio-  
ne elanguescunt. Atq; hic siccandum magis: in frigore  
qualitas ignis augeri debet. Alia quidem possunt pluri-  
ma, hic tamen præcipuus eorum usus est. Et hæc in ge-  
nere metasyncritica ueteres appellarunt, quæ uidelicet  
exuccas, aridas & propè extinctas partes pristinæ natu-  
ræ reddant, & ut ita dicam, recorporent. Alutæ dropax  
impingitur, uel linteis complicatis quæ ptysmata & di-  
plomata Græci uocant. Deglabratur cutis eraso pilo:  
dropacismus calens inducitur: idem subinde reuellit  
prius.



priusquam refrigescat. Reuocatur pharmacum, dum in-  
 de efflorescat locus, & leniter extumeat. Nimium *Modus uti-*  
 est, cum immoderato usu pharmaci qui tumor prius ex- *lis dropacis*  
 titit, idem subsidet, & qui erubuerat locus exalbescit.  
 Hoc. n. uolumus, ut dropacis ope reuocata anima pars  
 quali mortua reuiuiscat, calorem suum ac spiritum reci-  
 piat, & iam proprio alimēto perfruatur: postremo etiā  
 corporetur, quæ confecta macie intabuit. Verum alia  
 tardius, alia celerius uitam recipit. Quæ breui rubet &  
 ignem concipit, ea celeriter instauratur: tardius autem,  
 quæ ægre recalescit. Desperatio est, quum neque fri- *signa utilia*  
 ctione, neque perfusione & fotu tepidæ, neque dropace *dropacis.*  
 melius coloratur. Aliis satis fuerit, si trib. aut quatuor  
 diebus adhibeatur dropax, nec id assidue quidē, sed uno  
 die: bis hyeme, semel æstate. Aliis bis terve singulis die  
 bus, nonnunquam rarius, tertio scilicet uel quarto quo  
 que die affigitur, ut uidelicet uel facile cedit, uel cōtu-  
 max languor est. Ac tepida prius fouisse confert, uel *Fictio.*  
 smegmate affricasse, quod aliquid thapsiæ, euphorbii,  
 piperis, pyrethri, radices capparis exceperit. Alii perfri-  
 cant sabano, hoc est asperiore linteo, panno cilicio, uel  
 simili, qui asperioribus setis contextu fuerit. Accōmo-  
 data quoq; folia ficulnea, pumex, os sēpiæ, squatinæ co-  
 rium, aliq; plurima quæ asperitate roborem trahant.  
 Hæc autem iis qui ægre reficiantur & plusculum refri-  
 xerint. Ac tum quidem dropax affigitur: qui si pertina-  
 cius hæret, quo iam tempore detrahatur, tepida foueri  
 debet: quem quum detraxeris, surfurum decocto eaq;  
 materia, quæ partim leniat, partim extergeat, locum fo-  
 uebis. Non absimile dropaci picinum oleum quod pis-  
 selæon quidam appellāt, ē pice liquida mistum & oleo.  
 Contra glabrera & caniciem veteres usi sunt. *SINAPISMVS* *Sinapismus*  
*usus.*  
 paralyticos, coxarios, podagricos, inueterata  
 rheumata, hemicranias, quæq; caloris inopia laborant,  
 adiuuat. Caricæ uno die macerantur aqua, nonnunquam *Materia si-*  
 cappares, si grauius malum est: in leuiore casu & sensu *napijmi.*  
 acriore panis triticeus, multoq; magis si in solā superfi-  
 cie agere oportet. Iam vero macerata materia contundi  
 debet.



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Utrum aceto  
an aqua ven-  
tendum.*

*Medic. Doloris  
a sinapi  
phænigmus*

*Materia  
phænigmi.*

*Lac ficul-  
neum.*

*Utendi ra-  
tio.*

*Mel anacar-  
dinum.*

debet. In leni sinapisimo, subduplū sinapi: in mediocri, æquale permiscetur. Acrior est, qui duplum recipit. At sinapi subtilissimè læuigandum, & quo tempore unā cū reliqua materia pinfitur, affundenda aqua in qua caricæ illæ uel alia maduerint. Sunt in ueteribus qui acetum prætulerint: alii aquam, quod experimento didicerint sinapi uim aceto exolescere, cuius rei authores sunt Galenus & Oribasius. Eodem modo quo dropax usurpatur. Si quis dolor aut feruor à medicamento extiterit, tepida rosacei fori, illitu cerati rosacei, cerusa & aqua rosacea pista, & aliis generis eiusdem extinguitur.

**PHOENIGMVS** rubore facto etiam uescas mouet & exulcerat, ut ad eorum genus referri possit quæ quia illinita exulcerant, uocantur ἀμυκτηρά. Ex nasturtio, sinapi, radice enulæ, lepidio, columbino simo, caprillo stercore, unde διασποράγας, aceto pistis. Adhæc scilla trita, tunicis allii & nucleis, cantharide, urtica, pulegio, ranunculis, tapfia, euphorbio, tithymalis, fæce usta, metallis acribus, lacte ficulneo. Lac ficulneum ante maturitatem pomi excipitur, siccatur umbra: unguenta aperit, & cum axungia exterit uerrucas. Quædam concepto igne eadē præstant, qualis est lana sordida bene carminata: admouetur igni dum uehementer incaleat. Assæ carnes, & diuisa oua similiter assata utraque calida imponuntur. Reliqua uerò quum usus est, uisco, melle, axungia uetere, terebinthina, cerato, acrioribus gummi & resinis, sapone, ut res exigit, & corpora uel mollia, uel dura sunt, excipere oportet. Alia quæ friabilia sunt, affricantur. emplastra uerò imponuntur loco, qui prius palpatu manibus, exercetur ferulis, aut asserculis euerberatur: affricatur etiam, ut laxatis spiraculis medicamenti uirtus celius penetret. Anacardia trita septem diebus macerant aceto, in eodem coquunt, dū tertia pars aceti euanescat: refrigerari sinunt, excipiant concha quod enatat oleosum. Id mel anacardinum est. Quidam eadē ratione macerant coquuntq; ad dimidias, per lintecolum excolant, traiecto succo mel adiungunt atque ita coquunt ad crassitiem: anacardia uerò cocta in umbra siccant & ad sinigmata



mata reseruant. Alii anacardos conquassant, sepeliunt melle dum hoc uim anacardii satis conceperit. Licebit etiā anacardia & hermodactylos in puluisculum terere & affricare, excipere sapone & aliis. Fermentū aceto tinctum anacardino melle & causticis cōcorporatur. Puluisculus ē sinapi, piperis, euphorbii ana drachm. i. infricatur, uel exceptus anacardino melle illinitur: & in sapone imponi potest. Sapo in causticis iure numeratur ab eo qui libellum scripsit de materia simplicium, quē falso attribuunt Galeno. E seuo bubulo, caprillo, ueruecino, hircino, & lixiuio ē calce, quod postea describemus: acriter relaxat, sordes corporis exterget, exiccat similiter nitro, mittitur in caustica. Aliis quoq; rebus additis modo clementior, modo acrior parari potest, ut magis minusve siccet, calfaciat, extergeat. Nam quod capitellum uocant, unde saponem cōficiunt, tum mollius tum uehementius licet effingere. E ficus, ranunculorū, tithymalorum cinere fortius est: mitius autē ē uulgari & usitata focis materia. Adduntur sales, pyretri radix & caparis: adduntur acria unde uis saponis intendatur. E lebo uetustiore efficacior est. Quod si recens usurpatur, & eluitur, & acria detrahuntur, moderatior sapo cōfici potest. Cantharidum pars ferē una, & ad circiter quatuor partes axungiae una conteruntur, post septimum diem molli pruna concoquuntur, colantur, & ad phlegmum reponuntur. Ab horum plurimis breui tempore rubor fit, deinde bullae excitantur, ulcus etiā si diutius intulerint. Vesicae cōfiguntur, humor exprimitur, relinquitur ulcus per quod uitium oīno repurgetur: hac arte coxarum, podagrici, hemicranici, cephalalgici saepenumero releuantur, repurgantur uiscera, atque oīno corpus sordibus & excrementis liberatur: sexcenta deniq; uitia uetusta contumaciaq; percurantur. Verum maturius detrahendum pharmacum quā existant bullae, si tantum uita calorq; refouetur: quia sic exhauriant, quod ad redintegrationem partis attractum sit. Et quae perfri- geratum corpus calfaciant, duorum sunt generum: tamen alia, alia uero crassiore natura. Tenuioribus utendum,

Sapo.

Cātharides.

Vsus phlegmorum  
qua exulcerant.

In tabidis  
et pfrigeratis  
partibus  
Duo genera  
calfacientium  
a substantia.



perfrigera-  
ta partes  
quomodo re-  
frigende.

Ceratum.

Cathareti-  
ca.

O. r. v. v. v. v.

tendum, ubi celerrime excalefaciendum corpus, quod recens in alit. Crassioribus locus est in iis partibus quibus paulatim calor elanguit, quia uidelicet hinc tardius quidem calor corpori infertur: exceptus autem longius persistit. Tenuiora celerius permeant, sed inde fugax caliditas, & quæ paulò post dissolvitur. Tenuia sunt piper nigrum, album, sinapi, & quæcunque tusa in pollinem facile resolvuntur. Crassum est zingiber, & huic proximum piper longum, quæ non ita facile inferiatur. In perfrictionibus usitatum Galeno ceratū dieuphorbion ex oleo tenui & calido, recenti euphorbio adiecta cera: de quo iam ante lib. i. capite de nervis, & dolore abun- de disceptatum est. CATHAERETICA sunt æs ustū, ærugo, squamma æris, alumen crematum, pulvis mercurialis, testa & terra furnaria, testarum, concharum, ranarum, panniculorum, rerum causticarum cinis, alia quoque in epuloticis descripta. Nemomēna uocat Hippocrates quæ ex crescentem, putrem, callosam carnem excidunt. Sunt qui horum loco suctu longo, dentibus, pinna detrahant. Alii uinculis iniectis tabefaciunt. anauron- chismōn ueteres appellant. Quidā nouacula excidunt uel absument igne. Vbi uero profundius malum est cathæretica Aegyptiacum & alia, aqua siccante & tergen- te eiusdemq; potestatis liquoribus dissolui conuenit. Oleum quod ē uitreolo exprimitur siccando & extere- do efficacissimum est. Tubuli plumbei illiti medicamē- to conueniente: Aristolochiæ gentianæq; radix, spōgia similiter illita immittuntur. Candelæ cereæ mista mate- ria cathæretica confinguntur atq; introducuntur. Fistu- læ argentæ aut plumbeæ locis aliquot quasi fenestris peruiæ conformantur, qua medicamēta iniicias: ut qua parte peruiæ sunt, medicatus liquor disfluat, & uitium attingat. At hæc non nisi periculo perferat nudatus ner- uus aut spiramenta uasis quæ in partem læsam desināt. Psoricon in melle, Aegyptiacum, uitreolum, arsenicū, sandaracha, arsenicum in axungia. Atque hæc subuige- cupla ferè sunt ad mel & axungiam: nasturtii & ueratri albi par modus in pollinem resolutus. Quod sequitur ozænas,



ozænas, ægylopos, polypos & corrupta ossa summo-  
 uet sordidis, putridis & serpentibus ulceribus exceptum li-  
 nametro & cum melle imponitur. Lamponis est ueteris  
 medici. Ex ære rubro nec sæpius conflato scobem colli-  
 ginus, eiusq; unciam capimus, salis ammoniaci uel vul-  
 garis torrefacti unc. 2. & tantundē ammoniaci, aluminis  
 unc. 3. aceti acerrimi lib. 4. & semis. Arida teruntur, ace-  
 ro perfunduntur in uase ex ære rubro. Excoquantur oīa  
 & pistillo ex eodē ære circumaguntur. Alioqui in ardo-  
 re solis sub canicula continentur, uersantur sæpius do-  
 nec pharmacum exarescat: hic in mortario iterum con-  
 quassantur, & in puluerem minuuntur. Hæc in melle ad  
 hibentur, insperguntur cauis, & naribus inspirantur, uel  
 per fistulas insusflantur. Hæc ferè in superficiem agunt,  
 excrecentem carnem cōplanant, inutilem adimunt, le-  
 niter arrodunt, atterunt uerrucas, polypos tabefaciunt,  
 absumunt putria pudenda, deniq; faciei tubercula resic-  
 cant ac detrahunt. Aere uiso more ueterum utendū erit  
 eoq; rubro, quodq; attritum colorē minii referat uel ci-  
 nabaris. Cum pari modo sulphuris & salis fictili crudo  
 inuritur, donec uas ipsum percoquatur. Spiramenta ua-  
 sis circumlinenda sunt & obstipanda creta figulari uel ar-  
 gilla, ex quo fornaci omnia cōmitti debent. Quidā pro  
 sulphure alumen indunt: alii aceto solo sine aliis resper-  
 gunt. Vltum cōterunt, ac ferè lauant, sed minori effectu  
 q̄ ut cathæreticon habeatur. Vltum uero & elotum præ-  
 stantissimum ad cicatrices remedium est. Quod seplasiæ  
 ostendunt durum, nigrum, solidum, crustaceum, longe  
 recedit ab ære uiso ueterum. Conuenienter cremādum  
 est: nam & supra modum uisum nigrum euadit. Lanæ sor-  
 didæ obstipantur olla quæ & cruda sit & ore ampliore.  
 Ea impleta lanis, figulari terra, gypso, glutine sedulo  
 obfignanda est, ut nihil hiet, nullis expiret rimis: ita for-  
 naci data percoquitur. Succida lana ita cremata flacci-  
 dis carnibus respergitur, easq; liquat. Ex antimonio cre-  
 mato, cathæreticus cinis est, qui etiā absumit caneros.  
 Quod ex eo & sublimato oleum elicatur, quodq; è cal-  
 ce uiua, uitreolis, aliisq; generis eiusdē, feruētissimum

*Lamponis  
ad polypos  
& multa.*

*Cathæreti-  
con usus.*

*Aes uisum.*

*Aes uisum  
seplasiarum.*

*Lanæ sordi-  
dæ.*

*Antimonii  
Olea calidis-  
sima.*



*Pulus acris  
Galen.*

*Septica.*

*Materia se-  
pticorum.*

*Escharoti-  
ca.*

*Vsus septi-  
corum et e-  
scharotico-  
rum.*

*Escharoti-  
corum pro-  
prius vsus.*

*Cautio.*

esse consuevit. Hippocrates siccatum salem subduplo  
melli mistum urit olla noua, puluerem ex crescenti car-  
ni aut putridæ inspergit, fasciâ arctius adalligat, ut uis  
medicamenti altius impellatur: id aliquoties repetit,  
persanato uitio locû aceto calido eluit. Admodû acris  
est puluis qui sequitur. Sandaracæ, arsenici, chryfocollæ  
ana: humidiora ulcera resiccat, maligna curat, excrescen-  
tem carnem detrahit: exceptus melle cremari potest, ut  
tenuior euadat & minus affligat: etenim tenuitas partiû  
efficit, ut uis ignis minus mordeat. SEPTICA cathære-  
ticis acriora sunt, exedentia uertunt, altius penetrant,  
tenellam, carnem tabefaciunt calore multo, nō ita cras-  
so corpore. Arsenicum, sandaracha, dryopteris, chryso-  
colla, ptyocampe, aconitum, sanguis equi admissarii:  
sed hæc ferè cum cathæreticis permiscuntur. Nam hæc  
acriora septica sunt. ESCHAROTICA ut nihilo plus  
caleant, rodunt tamen acrius crassiore materia: eaq; du-  
ris & callosis corporibus conueniunt, ut septica mollio-  
ribus. In escharoticis calx uiua, hoc est recens, nec con-  
spersa aquis: uini fex cremata & aceti, quæ secundû mē-  
sem nō superat. Atq; omnino septicis iuncta adstrictio,  
quæ acrimoniam non eluat, crustam faciet. Veriusq; ge-  
neris septicorum & escharoticorum ulcus est in solutis  
ulceribus, quæq; nimio humore fluant, putrilaginosi,  
depascentibus, & ubi ex intemperie partis ad cicatricē  
non ueniunt. Escharoticis peculiariter utimur in can-  
cris, carbunculis, hæmorrhagiis: sed paulo ante q̃ hæc  
adhibentur, frugalis uita, frigida liberaliter pota, uini  
abstinentia, alimenta refrigerantia, multo, magis ubi fe-  
bris uel iam subest, uel in metu est, instituuntur. Neque  
prius ea ratio uitæ commutanda, q̃ uis ignis omnino ac-  
quiescat. Frigida quoq; continetur ore, si naribus genus  
hoc remediorum immitti debet. Contingit aliquando  
uim causticam dilui, quia ea parte cui inseritur, multus  
humorisq; frigidus & aqueus colligitur: hic ergo reme-  
diu potentia augenda est. Est quum uim ignis altius pe-  
netrare oporteat, quæ tamen obiter retundatur, quia  
non ita aperta uia est, atque ita restitans medela sensim  
elan-



elanguescat. Hic ergo si nihil prohibet, uia ferro facien-  
da est, & intro compellenda remedia in eum locū qui  
igne affligendus est. In expositis partibus regio quædā  
circumscribitur nucali testa, umbilico è cera facta uel re-  
simili, quæ suis marginibus constans pateat in medio,  
qua scilicet ignis summittatur. Aliquando etiā ubi la-  
tius explicanda medela est & amplianda crusta, escharo-  
ticon nucis alucolo includitur, ut totum uentrem eius  
compleat, atq; ita imprimitur. Eadem ratio in aliis ma-  
chinis, quæ uel angustiore ambitu uel ampliore uentre  
confinari possunt è cera, lignis & radicibus. Alioqui em-  
plastrum paregoricon in platysmate extenditur, platys-  
ma meditullio decussatur, qua escharoticon pharmacū  
inseriras. Rursus aliud platysma escharotico superdatur,  
plagulæ quoq; & fasciæ adalligantur quæ contineant.  
Atq; hæc oui candido & rosaceo mistis inculantur, to-  
taq; uicinia lintheis constipatur, quæ in eodem liquore  
oui, & oleo inquinaueris. Septon sandarachæ, auripig-  
menti ana drach. 2. calcis uiuæ, mannæ, thuris, aristolo-  
chiæ ana drac. 6. pumicis, resinæ ana drac. 4. iridis drac.  
2. teruntur omnia. Al. Arsenici lib. 1. calcis uiuæ drach.  
2. diebus triginta in aqua mersa tundere oportet, id quæ  
in sole aut certe igne: bis quotidie aqua mutanda est: sic-  
catur pharmacum, & usui reponitur. Aliud. Sandaracæ,  
auripigmenti, calcis uiuæ, pumicis ana denar. 4. eadem  
macerantur arte. Al. Squāmæ æris denar. 4. sandar. den.  
2. elleb. nigri, aluminis, al. auripig. an. denar. 1. læuigatis  
utitor. Aliud. Squāmæ, sandaracæ, auripigmenti, ellebo-  
ri nigri, seminis urticæ torrefacti ana denar. 1. cum rosa-  
ceo tritis utitor. In serpente & humidiorē ulcere uten-  
dum arido: in cancro & struma cū rosaceo subactum ad-  
hibetur. Atq; hæc ferè materia septorum est, quā exu-  
ras, eluas: cerato & aliis temperare possis. Excipiuntur  
æsypo, butyro, axungia, salina aliisq; generis eiusdem,  
unde acrimonia retundatur. Elleboro magna uis inest  
contra callos: iniectus fistulæ ad tertium diem callum  
adimit. Iniiciendus è lixurio acris, aut ea aqua in qua  
cra metallica elueris. Interitur prius, & in sextuplo li-  
quore

*De ratione  
applicandi  
escharotica*

*emplastrum  
paregori-  
con, uide  
sup. 25:*

*Septa com-  
posita.*

*Elleborus.*



Callus.

*Materia e-  
ctiloticon.*

*Harpax.  
Olea que  
callis conue-  
niant.*

*diacalciteos.*

*Remediū ex  
partu gal.*

*ceruo*

quore iniicitur. Pulvis eiusdem excrescentem carnem at-  
terit. Iam uero callus est dura & compacta caro, unde pars  
stupet, albicat, pallet, & ita stringitur, ut non expiret.  
ectilotica sunt quæ callos detrahunt. Oppugnantur cal-  
li primum quidem malacticis, deinde causticis, postre-  
mo ad ignem ferrumque decurritur. Eraduntur unguibus,  
lacerantur scalpris, exteinduntur cultris ad uiuū, quodque  
reliquum sit caustico remedio absumitur, vel candenti  
ferro affligitur: at fluxio reprimenda prius quam exe-  
cetur callus. Exciso callo tepida fouetur locus, repurga-  
tur melle & æruginē si qua sordes extiterit, & ad cicatri-  
cem abluatur aqua, in qua alumen diffluerit. Ectiloti-  
ca sunt scilla cocta & cum calce trita, nitrum, sal torre-  
facta, sex cremata veteris acrisque vini, saxe acetī, cortex  
salicis vltus & aceto pistus, calx cremata cum pueri im-  
pubis urina, ærugo mellis, sali, thuri æqualiter mista.  
Calx irino uel lignistrino cerato capta: testī terraque  
furnaria, pumex crematus, ex aceto trita omnia: natur-  
tī farina aqua subacta, bdellium pingue cum melle, am-  
moniacum aceto fustum cum pari æruginē: radicis filii  
cinis, ærugo cocta leuigata, amygdala e melle trita. Squā  
mæ unc. i. æruginis denar. 2. cerati lētiscini vel mastichi-  
ni unc. 8. plus minusve. Harpax cū modica æruginē. Est  
autem Harpax mistura e viuis calce & sulphure. In cal-  
lis laudatum est Galeno oleum lentiscinū, quia mollit,  
digerit, astringit & reprimat; quæ omnia difficili ulce-  
ri opus sunt & oris. induratis. Terebinthum similiter  
& mastichinum. dia chalciteos aucto modo chalciteos  
fluxionem reprimat, quæ callum fouet & hunc exurit:  
accommodatum est duris naturis. Itaque in fistulis quæ  
fluxione & duritie laborant, duæ partes medicamenti  
duabus partibus olei diluuntur, atque oleum mediæ æ-  
tatis esse conuenit. Constat remedium multis experi-  
mentis Galeni, quod ita in rem præsentē parandum est.  
Lythargyri, olei ueteris ana unc. 3. axungie ueteris un-  
cie 2. chalciteos uncie quatuor, quinque, sex, ut sunt  
corpora dura uel mollia paretur, cetera ut prius, ita di-  
luatur oleo, ut liquidum infundi possit. Atque oleum  
lentī



lentiscinum, mastichinum ad eā rem idoneum est. In exposito callo solidius esse oportet. E lythargyro, chalcitide, ærugine, squāma oleo uetere & aceto ecclilotica fere cōpegit Asclepiades. Megetis singulare remedium, ammoniacū aceto dissoluitur & pari ærugini permiscetur, quæ si difficiliter unientur, oleum quod conueniat addi potest: alioqui loco æruginis Aegyptiaca ammoniaco misceatur. Atque hæc ut nihil initio effecisse uideatur, perseverandum tamen: semel enim & nec opinante medico perficiet quod uelit: id quod in emplastro dia chalciteos Galenus testatus est. Eccliloticon Asclepiadis, lithargyr. unc. 1. olei ueteris unc. 2. & semis, æruginis, chalcitidis, squammæ an. 3. in aceti denarii 6. Al. Lithargyri selibra, olei ueteris libr. i. chalcitidos unc. 2. squammæ aris unc. i. aceti unc. 2. & s. Aliud. Lithargyri selibra, squāmę chalciteos, æruginis ana semuncia, aut ut sit fortius, unc. 1. aceti unc. 3. & dr. 6. olei ueteris libr. 1. & 3. 4. Lithargyrus oleo coquitur ad crassitudinē, deinde squāma leuissimē trita inspergitur, assiduē mouentur: hic uas foco subducitur, ac refrigerescenti pharmaco ærugo & chalcitis ex aceto trita paulatim immittuntur, & circumducta spatha permiscetur: coquuntur iterum dum non contaminent: postremò traducta in mortarium circumagantur, subiguntur, uniuntur probè & ad usum reponuntur. Durorum corporum medicamentum est, quæ callum contraxerint, nec facilè cicatricem trahant: excrescentem carnem reprimat, crudis ulceribus conuenienter adhibetur: postremo fluida & diuturna iuuat. Sed initio quidem mala lactico temperare præstat cælypo, & eo cerato quod inde comparatur, butyro, medulla cerui & aliis id genus. In summa hæc obseruata medicis in curando callo, ut is paulatim mollioretur, incideretur, discuteretur. Atque hoc nomine reprimens auxilium fere miscuerunt, quia in callos humor aliquis ueluti mali fomes illabatur. Adde quod quæ mala lactico & laxante pharmaco soluta sunt, confirmare oportet, & hinc quoque reprimentia commiscetur. De callo qui ossibus adnascitur superius abundè scriptum est.

*Materia cōtra callos, Asclepiadis.*

*Eccliloticon Asclepiadis Alia ecclilotica.*

*Ecclilotica quibus generibus pharmacorum misceatur.*



*Tophi à lue  
venerea.*

*Crudele ma  
lum crudeli  
ter depellen  
dum.*

Tophi uerò qui à lue uenerea relinquuntur, iisdé quo  
que remediis curari debent, nisi contumacius repugnét.  
In his enim & breuissima & tutissima curandi uia igne  
perficitur, multo magis si suspicaberis tunicam adnatâ  
ossi, & inde os aliquid uitii contraxisse. Quòd si fit, blan  
diorem illam curandi artem quæ tophum mollit, secar,  
discutit, & frustra & cum periculo adhibeas. Hoc loco  
igitur malum malo medicari oportet. Cauteriũ topho  
accommodatum condatur prunis dum uehementer mi  
cet atq; excādeat: neq; enim rubere satis est, ut neq; le  
niter trāscurrere tophum & molliter attingere. Etenim  
imimisericorditer premēdus ignis est, inurēdus tophus,  
ut iam os subiectũ oculis exponi possit. Malo nodo ma  
lus cuneus quærendus est, ut est in prouerbio, raroq; cru  
dele malum nisi crudeli malo depelli potest. Exulto to  
pho cura quedam ossis ineũda est. sed tum maximè cum  
inducta crusta exciderit: uidendumq; nunquid arrosum,  
putre & cariosum extiterit. Hinc ergo ad ossium mede  
las recurrendum: si qua ramenta decesserint, cura sit ut  
partim frugali uita partim siccantibus remediis intabe  
scant: sic enim sponte sua excident. Ac remedia illa quæ  
siccant iam ante commemorata sunt, & postea describē  
tur aquæ fortes & alia generis eiusdem. Verũ naturæ  
corporum partiumque habeatur ratio. Etenim cum cru  
ris articulo quàm cum media tibia clementius agen  
dum est: neque enim uim ignis thorax sustinet, quam  
femur medium tolerare possit. Sed de his antea capite  
de aperienda uomica disputatum est. Fit aliquando ut  
excrecant ossa atque supra modum emineant, *et d'ous*  
nominant uoce ambigua: ubi pleraque frustra instituas  
quæ tophis adhiberi solent. Escharotica è materia sep  
tica confices mistis metallis acribus, quæ crassa & astring  
enti potentia prædita sint, ut firmior trahatur crusta:  
qualis est cadmia, chalcantum, chalcitis, uitreoli gene  
ra cruda omnia: quia scilicet uisura tenuiora sunt &  
adstringendi uim deponunt. Cruda igitur & intrita sa  
liua hominis uel aceto subigenda: cocta uerò crustam  
infirmius contrahunt. Septa parmiscenda aut cremata  
crudis



crudis quum altius imprimenda crusta. Verum celerri-  
 me operatur ignis, si quidem æger perofrat: atque is  
 uariis modis adhiberi potest. In quem usum tubuli li-  
 gnei, cannales ænei, ferrei, argentei uariè confinguntur,  
 aptantur cannæ & pennæ scriptoriæ, ut extrema parte  
 in æquabilem circulum circumscribantur. Ea pars im-  
 primenda loco, quem utere necesse est: aqua feruida  
 per tubulum infunditur contra clauos & uerrucas. In  
 ea aqua althææ radix, tragacantha, chamæmelum, hyss-  
 opus, pulegium quæque molliant, incidant, discutiât,  
 concoqui possunt, ut non solo igne sed alio quoque ge-  
 nere curandi uitium pertentes: aquæ loco, oxycrato,  
 oxymelite, uino & aliis uti datum est. Archigenes in  
 ægyloplas liquatum plumbum & feruens per infundi-  
 bulum instillabat: alii utuntur uitro. Sed machinas qui-  
 bus hæc omnia infundantur, corniculorum more pate-  
 re magis necesse est eo extremo quod dehiscit foras qua-  
 que medicamēta cauo immittuntur, ne si quid diffuat,  
 in nudas partes elabatur. Aliter quoque lana sordida  
 specilli nucleo adalligatur, feruente oleo nel butyro  
 intingitur, atque ita imprimitur loco. Fortius est, si è  
 uitreolo, calce, antimonio & uocato sublimato, aliisque  
 id genus axtortum igne & chymicorum arte oleum fue-  
 rit, aut minore impendio hæc eadem materia oleo infer-  
 buerit. Sunt qui nucali testa, uoluta cochleæ, crusta pa-  
 nis, oui cortice inurant. Alii è radice aristolochiæ, gen-  
 tianæ, struthii, ramento myrti, buxi & aliis id genus  
 cauteria affingūt. Continentur omnia in prunis, dum  
 carbunculent. In ore, nare & aliis partibus eiusmodi  
 ne quid obiter uiolens, enodi canna uel calamo scripto-  
 rio utendum est: atque hæc primum inferuntur cauis,  
 dum extrema parte laboranti loco insideant: tum per  
 eadem tenue ferramētum candens inferendum, atq; ita  
 inurendum malum est. Vtione Arabica exemplo uete-  
 rum usa est posteritas: uaccinum cauterium quidam ap-  
 pellant. Dioscorides in eo interstitio ubi pollex bra-  
 chiali committitur, caua ueluti lacuna subsides, in qua  
 lana oleo imbuta substernitur, deinde capillum stercus  
 feruidum

Ignis.

Archigenes  
ad Aegyo-  
pas.In cauis  
partibus.Vtione Ara-  
bica.



feruidum sæpius imprimitur uolsella captum uel forcipe, donec uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire. Melius Antylus, Plinius & Arabes cauum illud quod paulò infra unguem sub pollice pedis est, eo stercore inurunt, donec uis ignis halitu per tibiā & femur grassante in coxam penetret: hoc enim uisuræ genus coxariis inuentum est. Alii stercore loco hermodactylos & ranunculorum folia adalligant. Quod uidentur imitari leniore quidem remedio, qui lericulam aqua feruente plenam pedibus adiungunt, ut plantæ calorem ignis concipiant, atque hinc uapor per totum membrum ad coxam transmittatur. In ea aqua plurima concoquunt, chamæmelum, melilotum, anethum, ebulum, maioranam, chamæpytim, maluam, althæā & alia id genus quæ leniant, incidant, discutiant. Quillo fimo, aprino & aliis generis eiusdem ad uisiones similiter uti licebit. Commutandum subinde fimum est, priusquam deferbuerit. Auro & argento lenius, ære & ferro acrius inurimus. Ferro utitur Hippocrates in carne: fungo in neruo & osse, si quidem legitimū opus est Hippocratis quod peritonæos pathon inscribit: ubi buxeis fuis oleo feruente tinctis & fungis hepar inurit. Omnino autem magnitudo uitii & natura partis cum ui remedii conferenda est. Cæsim, punctim cauteria imprimuntur, adiguntur longius, latius & in circulum circumferuntur uno loco uel pluribus, semel ac sæpius transcurrunt tantum & leniter attingunt, uel diutius insidenti ui maiore imprimuntur, ut natura morbi, corporum & partium sustinet, ex quo uariæ cauteriorum formæ inuentæ sunt. Muniuntur uicinæ partes, ut ne uis iusto latius proserpat, oui candido & rosaceo, mucagine pyllyi, cerusa è rhodastagmate lota, & iis omnibus quæ quia phlegmonem prohibet, aphlegmononta Græci nominant: eaque in splenis & linteis adhibentur. Crustas autem nutare prius quam detrahantur, & ueluti maturitate quadam cedere oportet. Alioqui uis afferri solet, ex quo profundum ulcus relinquitur, hæmorrhagiæ commouentur, dolor, fluxio, inflammatio denique

*De crusta detrahenda.*

*Quæ crusta detrahunt.*



nique irritantur. Tempestiuè deduci possunt butyro iostagmate uel rhodostagmate loto, adipe anserino & gallinaceo, farina tritici in porri uel rutæ succo, lentacula cocta & cum melle mista, oleastri foliis cum melle litis, sulphure trito ex oleo, concusis nuccum intraneis, porri foliis salina pistis, lacte cum melle cocto, albo stercore canino, cinere uistarum hirundinum, aut cochlearum terrestrium, crematis minore centauryo, draconio, stercore humano, chalcite trita & subtriplo melle, uel chalciteos unc. i. ireos semuncia, adhibentur per se & cum melle. Nutrit lithargyro & usto butyro, radice ononidis, columbæ fimo cum melle, quod & carbunculos scarificat. In summa, detergente simul atque incidente materia, aliquando etiam molliente & paregorica: ac breuiter quæ ualde sordida & contumacia ulcera repurgant, eadem crustas detrahunt. Abstinentum hac parte iis quæ adstringant. Quod si pertinacior crusta est & alitior, inusta caro fordem includit, atque hæc inclusa periculum aliquod denunciet: quicquid est iustum scarificare conuenit, sic enim sordes aperta uina defluet. Recentiores chirurgi in septis numerant stuppas canabinas in cinerem uersas, hermodactylos, anacardia, bryoniæ radices, alumen, unguentum apostolorum, uitreoligenera, caprosam, quæ pro chalcantho, chalcitide, misy & fori usurparunt. Ad crustas crudis; ad exedendum & uim septicam uitis utendum magis. Addunt æruginem, unguentum uiride, ægyptiacum, trochiscos è calce. Calcis unc. 4. terantur cum melle non tam multo quidem quàm in purgantibus dictum est. Satis fuerit modo trochisci inde coeant, qui capsula figlina ordine collocati, & clibano dati eo crementur, ut in cinerem abeant. Al. Succi radicis asphodeli unc. 6. calcis uiuæ unc. 2. auripigmenti unc. 1. arida succo immersa sub canicula persolentur, dum squaleant. Alii trochisci caneros absumunt, & polypos narium. Calcis uiuæ, arsenici citrini ana drachm. 2. uitreoli, æruginis, aluminis ana drach. 1. gallarum, acaciæ, balau-  
stiorum

*Recentioria  
remedia.*

*Septis ut  
canabinas:*

*caprosam*

*Trochisci è  
calce.*

*E succo a-  
sphodeli.*

*Alchadico.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Cantharides.*

*Ranarum  
adepts.*

*Pastillus ni  
ger Andro-  
machi.*

*Sandaraca  
Materia pa  
stillorum.*

*Trochisci de  
arsenico.  
Sal alkali.*

*Capitellum.*

riorum ana dimidium drachmæ : teruntur omnia in mortario æneo quod sit expositum igni uel ardori solis : respergitur aceto, eoque acerrimo : idque subinde repetitur, & acetum nouum refunditur: quinto die trochisci fiunt, siccantur umbra, loco sicco & frigido reponuntur, qualis est patens Aquilonibus. In usu, uino diluuntur, & in linamentis adhibentur. Cantharidum uentres fermento cogunt uel sepo. Sed à cantharidibus urina ardor metuitur. nam & hæc illæ capiti genus hoc mali inferre possunt, cui gargarismus e lacte & ex eodem infusio remedio est. Sublimasi (quod uocant) plurimus usus est, sed paucum ut antè dictum est, plurimum butyro, adipe, ælypo temperandum ex duodecuplo, & aliquando uigecuplo. In adipibus septicus est e ranis uiridibus qui sint familiares sepibus & arboribus. E natatricibus nō ita calet. Quæ sequuntur ex quinto de compositione medicam. *Katari* in translulerunt. Niger pastillus Andromachi, malicorii denar. 10. aristolochiæ rotundæ, gallæ an. denar. 8. aluminis, aloes ana denar. 4. myrrhæ, chalcanti ana denar. 2. thuris denar. 4. colliguntur uino, & ex eodem dulci in usu dissolui debent. Al. Sandaracæ, auripigmenti ana denar. 2. mannæ, thuris denar. 4. tritis utitur. Sandaraca rara est nisi uenas illas colligas, quæ ueluti linea quædam rubra arsenicum transcurrent. Plurimos uero finges pastillos hac ratione fere dupla calce, subduplo arsenico, mista parte aliqua gallarum, thuris & aluminis. Trochisci de arsenico recentiorum. Calcis uiuæ lib. 1. auripigmenti rubri & citrini, alchali, acaciæ ana selibra: trita miscentur cum capitello. Est autem sal alchali, quantum conicio, genus quoddam salis quale ueteres fingebant è quercu, corylo, trunco harundinis carbuncula tis & aqua dulci uel marina coctis, salem nigrum appellabant: aut quod posteritas è brassica marina facit, quam & è beta & nitrosis complantis comparari potest. Alioqui torrefactum salem cum hydrargyro tandiu pistillo uolutabis, dū sal nigrescat: alii aliter alchali interpretantur. Capitellum ita fit. Calcis uiuæ, salis ammoniaci



moniaci ana lib. i. trita subigantur lixiuio è fabaceis scapis: deponuntur olla quæ è fundo hiet angusta rima: aliud figlinum subiicitur, in quod lixiuuium paulatim diffuat. Vas utrunque in idem septimum initio defodi debet. Ex eo lixiuio & sebo ut antè dictum est, fit sapo: catharticon, septicon & lene elcharoticon capitellum est. Alii tres partes cineris fabaceorum, unam uiuæ calcis subinde perfodunt aqua, diu conuolunt, & per quasillum rarum transcolant. E ficulneo lixiuio, tithymalino, & omnino è materia caustica capitellum acrius esse potest. Est apud Paulum simile quid capitello, κοίαν σαπωνοειδὴς appellat, lixiuiam saponarium interpretari licet. Aliud quoque capitellum quod fistulare uocant, arsenico, sublimate, uitreolo additis, ut una cum aliis in lixiuio extillent. Sexcenta id genus è materia quæ fistulis conueniat, effingi possunt. Sed ut redeamus ad pistillos, horum usus est in nemis, phagædenis, fistulis, rheumaticis & malignis ulceribus, reduuis unguum, putredine narium & aliarum partium, polypis, ozenis, condylomatibus, putrescentibus gingiuis, excrecente carne, gangrenis & aliis generis eiusdem. Sed omnino partium corporis & uitiorum habeatur ratio. Vis acrior obtundi potest tritis pistillis, & triginta uel quadraginta diebus insolatis, perfusisque frequente aqua, eaque sæpius commutata: aut si non datur uti sole, subinde perpluatur aqua, eaque uel simplici uel rosacea, aceto, uino & aliis ut res exigit: siccentur, aquæ iterum perfundantur, eaque tandiu reuocentur, dum dilutam satis exoleuisse acrimoniam perceperis. Aliquando miscentur melli, & una comburuntur, alias cerato diuuntur. In fluidis & humentibus uitiiis galla, malicorium, alumen & alia quæ siccent & reprimant, commodè temperantur. Atque omnino tutius est à leuioribus ad acriora sensim progredi. In humido & sordido ulcere pinguibus abstinendum: arida insperguntur. In calloso & squalente uitio sicca pinguibus excipi debent. Septica faciunt. Arabes, quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus

*Lixiuium saponarium.*

*Capitellum*

*fistulare.*

*Pastillorum*

*Usus.*

*Vis pastillo*

*rum quomo*

*do obtunda*

*tur.*



relinquunt, quod humido calore cum fetore partes cor-  
rumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, subli-  
matum, cinabrium, solani succo, brassicæ, limonum &  
aliis attemperant. Licet etiâ quod ueteres factitarunt,  
non tribus sed quod proximè dicebatur, triginta & qua-  
draginta diebus terere in sole sub canicula, uel loco ca-  
lente bis aut sæpius, quotidie mutata aqua, ut uitiis,  
partibus & corporibus accommodentur. Minium è micis  
metallicis, è sterili gleba plumbi, è cerusa uita quod a-  
lii Syricon, alii Sandicem uocant, ad epulotica potius  
referendum. Quod uero è sulphure & hydrargyro facti-  
tium est, in causticis censerî debet. Sed de his antea: u-  
surpant præter hæc aquas fortes, & ut dicunt Alchymi-  
starum, ex rebus acribus: stercore gallinaceo, columbi-  
no, arsenico aliisq; id genus, ut quibus aurum ab argen-  
to metalla à metallis separant. Salis ammoniaci, auri-  
pigmenti rubri & citrini, cuprosæ, æruginis ana: trita  
in alembicum uitreum bene stipatum luto & undequa-  
que clausum deponuntur: quæ ubi lento igne concalue-  
runt, liquorem reddunt: sed qui primum defluit, uel  
abiicitur, uel in alembicum repetitur: hic ignis augetur  
duplo: qui secundo fluit: fideliter reponitur. Alii ex  
aluminis rotundi, uitreoli Romani an. lib. i. salis nitri,  
uel crematæ facis aceti sesquilibra, aquam eadem arte  
eliciunt. Hæc callosis corporibus idonea sunt, & ossi-  
bus. Suspecta in naso, labris, palpebris, digitis, & puden-  
dis mollibus atque exiguis partibus, ubi uena, arteria,  
neruus insignis est: ac primum quidem minimum sit qd  
imponitur, deinde ut res exigit, & ferunt corpora, au-  
geatur. Ac iam constare arbitror, pyrotico omnia mo-  
dò mistura, modo uita & lotura retundi posse. In mi-  
stura oui liquor, psyllii mucago, ceratû rosaceum, un-  
guentum album, dialthæas, emplastrum è muscillagini  
bus, & alia propè infinita, quæ ad mediam naturam ue-  
niunt, quæ refrigerant, molliunt, usurpari debent. In u-  
stura ignis est: figlina cruda, pasta & alia, de quibus an-  
tea. Eluuntur aqua, aceto, uino & aliis generis eiusdem.  
Neque hoc in dubio est uacuatîs ac iam repurgatis cor-  
poribus

*Minium.*

*Aqua for-  
tes.*

*Ubi susse-  
cte aqua  
fortes, &  
alia id ge-  
nus.*

*Quibus tem-  
peres pyro-  
tica.*



L I B E R I I I.

104

poribus pyrotica adhiberi, quo iam tempore à leniori-  
bus auxilium desperatio est. Postremò leniendæ partes,  
quas uis ignis exasperauit.

LIBRI TERTII ET VLTIMI FINIS.



De ma churazion p[ro]fano 1:  
De repellētib[us] 2:  
De attrahētib[us] 5:  
De resoluētib[us] 7:  
De molliētib[us] 12:  
De suppurātib[us] 19:



